TRYG MED HVER PATIENT™

Hvad Du Siger til Patienten

Sætninger, der hjælper dig med at forklare refereret smerte forståeligt, så patienten får tillid til dig.

Indhold

1 · Sætninger til forskellige situationer

2 · Hvad du skal undgå

Næste skridt

AFSNIT 1

Sætninger til forskellige situationer

Sig dem med dine egne ord.

1.

Når patienten ikke forstår, hvorfor du behandler skulderen, når det er armen, der gør ondt

«Smerten opstår ikke altid der, hvor du mærker den. Den her muskel sidder bag på skulderen, men den sender smerten ud i din arm. Se, her på kortet kan du se det.»

2.

Når den refererede smerte gør patienten bange

«Det er et godt tegn: Vi har fundet det punkt, der giver dine gener. Hvis du mærker det meget kraftigt, så sig til, så letter jeg trykket med det samme.»

3.

Under trykket

«På en skala fra et til ti, hvor ubehageligt er det? Fra fem til syv er normalt; hvis det er over det, så sig til.»

4.

Når patienten spørger, hvornår det bliver bedre

«Hos mange ses en ændring efter et par behandlinger, men det afhænger også af, hvor meget vi gør sammen derhjemme. Derfor giver jeg dig et ark med.»

5.

Når patienten ikke laver hjemmeøvelserne

«Det tager ikke lang tid: to minutter om dagen. Hvilket tidspunkt på dagen passer dig bedst?»

6.

Når du skal henvise patienten til lægen

«Før vi fortsætter, er der nogle tegn, som jeg gerne vil have, at en læge ser på. Det betyder ikke, at der er et problem; det er bare mere sikkert sådan.»

7.

Efter behandlingen

«I morgen kan du måske mærke noget, der minder om ømhed, og det er normalt. Drik rigeligt med vand, og lav udstrækningen i aften.»

8.

Når generne vender tilbage

«Det sker tit, især i en stresset uge. Lad os sammen se på, hvad der har ændret sig på dit arbejde eller i din søvn.»

AFSNIT 2

Hvad du skal undgå

Disse sætninger skræmmer eller lover for meget.

Sig ikke

- [ ] «Det går helt sikkert over.» (Du kan ikke love et resultat.)
- [ ] «Du fejler ingenting.» (Det bagatelliserer genen.)
- [ ] «Du er helt spændt op.» (Det skræmmer og er ikke korrekt.)
- [ ] «Jeg skal nok gøre dig rask.» (Et overdrevent løfte.)

Næste skridt

I morgen: brug den første sætning, når du viser den næste patient den refererede smerte på kortet i atlasset.