REFERERET SMERTE · BAGHOVED OG NAKKE

Gør det ondt i baghovedet eller nakken?

> *Smertens kilde sidder ofte et andet sted end der, hvor du mærker den. Disse muskler kan referere smerte hertil:*

Trapezius – øvre fibre

Hvor: Over skulderåget, midt mellem nakken og acromion, i den øvre frie kant.

Sternocleidomastoideus (SCM)

Hvor: Langs muskelbugen, især i den sternale og den klavikulære del; det mest ømme punkt ligger i den midterste tredjedel.

Splenius cervicis

Hvor: Nederst i nakken, over skulderbladets øvre vinkel, ved siden af levator scapulae.

Suboccipitale muskler

Hvor: Lige under nakkebenet, til højre og venstre for midtlinjen, i dybden.

Semispinalis capitis

Hvor: I nakken, 2–3 cm fra midtlinjen, under nakkeknuden og midt på nakken.

Spørg din behandler, hvilken muskel der giver netop dine gener. Triggerpunktatlas · undervisningsillustration, erstatter ikke en lægeundersøgelse.

REFERERET SMERTE · HOVED: PANDE, TINDING, ISSE

Gør det ondt i hovedet?

> *Smertens kilde sidder ofte et andet sted end der, hvor du mærker den. Disse muskler kan referere smerte hertil:*

Trapezius – øvre fibre

Hvor: Over skulderåget, midt mellem nakken og acromion, i den øvre frie kant.

Sternocleidomastoideus (SCM)

Hvor: Langs muskelbugen, især i den sternale og den klavikulære del; det mest ømme punkt ligger i den midterste tredjedel.

Masseter

Hvor: I det overfladiske lag under arcus zygomaticus og over underkæbevinklen; i det dybe lag foran kæbeleddet.

Temporalis

Hvor: Over arcus zygomaticus i fire zoner, forfra og bagud; let at palpere, når patienten tygger.

Splenius capitis

Hvor: På den bageste sidedel af nakken, mellem SCM og trapezius, ca. 2–3 fingerbredder under protuberantia occipitalis externa.

Spørg din behandler, hvilken muskel der giver netop dine gener. Triggerpunktatlas · undervisningsillustration, erstatter ikke en lægeundersøgelse.

REFERERET SMERTE · ANSIGT, TÆNDER OG KÆBE

Gør det ondt i tænderne eller kæben?

> *Smertens kilde sidder ofte et andet sted end der, hvor du mærker den. Disse muskler kan referere smerte hertil:*

Trapezius – øvre fibre

Hvor: Over skulderåget, midt mellem nakken og acromion, i den øvre frie kant.

Sternocleidomastoideus (SCM)

Hvor: Langs muskelbugen, især i den sternale og den klavikulære del; det mest ømme punkt ligger i den midterste tredjedel.

Masseter

Hvor: I det overfladiske lag under arcus zygomaticus og over underkæbevinklen; i det dybe lag foran kæbeleddet.

Temporalis

Hvor: Over arcus zygomaticus i fire zoner, forfra og bagud; let at palpere, når patienten tygger.

Pterygoideus lateralis

Hvor: Dybt under arcus zygomaticus; intraoralt bag de øvre kindtænder, opad og bagud.

Spørg din behandler, hvilken muskel der giver netop dine gener. Triggerpunktatlas · undervisningsillustration, erstatter ikke en lægeundersøgelse.

REFERERET SMERTE · FORSIDEN AF SKULDEREN OG BRYSTKASSEN

Gør det ondt foran på skulderen?

> *Smertens kilde sidder ofte et andet sted end der, hvor du mærker den. Disse muskler kan referere smerte hertil:*

Scaleni

Hvor: På siden af halsen, bag og under SCM, over kravebenet.

Infraspinatus

Hvor: På skulderbladets bagside, under spina scapulae, i den midterste og øvre del af fossa infraspinata.

Pectoralis major

Hvor: Ved brystmusklens laterale kant (forreste aksillefold), under kravebenet og ved siden af brystbenet.

Pectoralis minor

Hvor: Under processus coracoideus, over 3.–5. ribben, dybt under pectoralis major.

Biceps brachii

Hvor: I den midterste tredjedel af overarmens forside, i begge hoveder.

Spørg din behandler, hvilken muskel der giver netop dine gener. Triggerpunktatlas · undervisningsillustration, erstatter ikke en lægeundersøgelse.

REFERERET SMERTE · BAGSIDEN AF SKULDEREN OG SKULDERBLADET

Gør det ondt i skulderbladet eller bag på skulderen?

> *Smertens kilde sidder ofte et andet sted end der, hvor du mærker den. Disse muskler kan referere smerte hertil:*

Levator scapulae

Hvor: Lidt medialt og over skulderbladets øvre vinkel; på siden af nakken, dybt under trapezius' øvre kant.

Scaleni

Hvor: På siden af halsen, bag og under SCM, over kravebenet.

Supraspinatus

Hvor: Over spina scapulae, i den mediale del af fossa supraspinata og lateralt under acromion.

Teres minor

Hvor: Ved skulderbladets laterale kant, under infraspinatus, over den bageste aksillefold.

Subscapularis

Hvor: På skulderbladets forside; du når den fra armhulen, langs skulderbladets laterale kant.

Spørg din behandler, hvilken muskel der giver netop dine gener. Triggerpunktatlas · undervisningsillustration, erstatter ikke en lægeundersøgelse.

REFERERET SMERTE · OVERARM OG ALBUE

Gør det ondt i albuen eller overarmen?

> *Smertens kilde sidder ofte et andet sted end der, hvor du mærker den. Disse muskler kan referere smerte hertil:*

Scaleni

Hvor: På siden af halsen, bag og under SCM, over kravebenet.

Infraspinatus

Hvor: På skulderbladets bagside, under spina scapulae, i den midterste og øvre del af fossa infraspinata.

Supraspinatus

Hvor: Over spina scapulae, i den mediale del af fossa supraspinata og lateralt under acromion.

Teres minor

Hvor: Ved skulderbladets laterale kant, under infraspinatus, over den bageste aksillefold.

Subscapularis

Hvor: På skulderbladets forside; du når den fra armhulen, langs skulderbladets laterale kant.

Spørg din behandler, hvilken muskel der giver netop dine gener. Triggerpunktatlas · undervisningsillustration, erstatter ikke en lægeundersøgelse.

REFERERET SMERTE · UNDERARM, HÅNDLED OG HÅND

Gør det ondt i håndleddet eller hånden?

> *Smertens kilde sidder ofte et andet sted end der, hvor du mærker den. Disse muskler kan referere smerte hertil:*

Scaleni

Hvor: På siden af halsen, bag og under SCM, over kravebenet.

Infraspinatus

Hvor: På skulderbladets bagside, under spina scapulae, i den midterste og øvre del af fossa infraspinata.

Subscapularis

Hvor: På skulderbladets forside; du når den fra armhulen, langs skulderbladets laterale kant.

Pectoralis minor

Hvor: Under processus coracoideus, over 3.–5. ribben, dybt under pectoralis major.

Latissimus dorsi

Hvor: I den bageste aksillefold, i højde med skulderbladets nedre vinkel.

Spørg din behandler, hvilken muskel der giver netop dine gener. Triggerpunktatlas · undervisningsillustration, erstatter ikke en lægeundersøgelse.

REFERERET SMERTE · MIDT PÅ RYGGEN OG MAVEN

Gør det ondt midt i ryggen?

> *Smertens kilde sidder ofte et andet sted end der, hvor du mærker den. Disse muskler kan referere smerte hertil:*

Serratus anterior

Hvor: På siden af brystkassen, under armhulen, i højde med 5.–6. ribben.

Trapezius – midterste fibre

Hvor: Mellem scapulas mediale rand og rygsøjlen, i højde med spina scapulae, overfladisk.

Iliocostalis thoracis

Hvor: Ca. 5–8 cm fra rygsøjlen, i den midterste og nederste thorakalcolumna.

Iliocostalis lumborum

Hvor: I lænden, ca. 5–7 cm fra rygsøjlen, under de nederste ribben.

Multifidus

Hvor: Lige ved siden af processus spinosi, i dybden, i alle dele af rygsøjlen (oftest i lænden).

Spørg din behandler, hvilken muskel der giver netop dine gener. Triggerpunktatlas · undervisningsillustration, erstatter ikke en lægeundersøgelse.

REFERERET SMERTE · BALDE, HOFTE OG LYSKE

Gør det ondt i hoften?

> *Smertens kilde sidder ofte et andet sted end der, hvor du mærker den. Disse muskler kan referere smerte hertil:*

Iliocostalis lumborum

Hvor: I lænden, ca. 5–7 cm fra rygsøjlen, under de nederste ribben.

Longissimus thoracis

Hvor: 2–4 cm fra rygsøjlen, i den nederste thorakal- og øverste lændecolumna.

Quadratus lumborum

Hvor: Mellem det nederste ribben og crista iliaca, ved den laterale rand af erector spinae, i dybden.

Gluteus maximus

Hvor: I den nederste mediale del af glutealregionen, ved siden af os sacrum og over tuber ischiadicum.

Gluteus medius

Hvor: 2–5 cm under crista iliaca, i den øverste laterale del af glutealregionen.

Spørg din behandler, hvilken muskel der giver netop dine gener. Triggerpunktatlas · undervisningsillustration, erstatter ikke en lægeundersøgelse.

REFERERET SMERTE · LÆND OG KORSBEN

Gør det ondt i lænden?

> *Smertens kilde sidder ofte et andet sted end der, hvor du mærker den. Disse muskler kan referere smerte hertil:*

Iliocostalis lumborum

Hvor: I lænden, ca. 5–7 cm fra rygsøjlen, under de nederste ribben.

Longissimus thoracis

Hvor: 2–4 cm fra rygsøjlen, i den nederste thorakal- og øverste lændecolumna.

Multifidus

Hvor: Lige ved siden af processus spinosi, i dybden, i alle dele af rygsøjlen (oftest i lænden).

Quadratus lumborum

Hvor: Mellem det nederste ribben og crista iliaca, ved den laterale rand af erector spinae, i dybden.

Rectus abdominis

Hvor: Over og under navlen, 2–4 cm fra midtlinjen.

Spørg din behandler, hvilken muskel der giver netop dine gener. Triggerpunktatlas · undervisningsillustration, erstatter ikke en lægeundersøgelse.

REFERERET SMERTE · LÅR OG KNÆ

Gør det ondt i knæet eller låret?

> *Smertens kilde sidder ofte et andet sted end der, hvor du mærker den. Disse muskler kan referere smerte hertil:*

Gluteus minimus

Hvor: Dybt under gluteus medius, mellem crista iliaca og trochanter major.

Piriformis

Hvor: I den midterste og laterale tredjedel af linjen mellem os sacrums laterale rand og spidsen af trochanter major.

Iliopsoas

Hvor: På forsiden af låret under ligamentum inguinale (lateralt for arteria femoralis) og i maven, på indersiden af hoftebenet.

Tensor fasciae latae

Hvor: På den anterolaterale side af hoften, under spina iliaca anterior superior.

Adductor longus og brevis

Hvor: På indersiden af låret, i den øverste tredjedel.

Spørg din behandler, hvilken muskel der giver netop dine gener. Triggerpunktatlas · undervisningsillustration, erstatter ikke en lægeundersøgelse.

REFERERET SMERTE · UNDERBEN, ANKEL OG FOD

Gør det ondt i hælen eller fodsålen?

> *Smertens kilde sidder ofte et andet sted end der, hvor du mærker den. Disse muskler kan referere smerte hertil:*

Gluteus minimus

Hvor: Dybt under gluteus medius, mellem crista iliaca og trochanter major.

Gastrocnemius

Hvor: I den øverste del af læggen, på det mediale og laterale hoved, under knæhasen.

Soleus

Hvor: I den nederste del af læggen, dybt under gastrocnemius, over achillessenen.

Tibialis anterior

Hvor: Lige lateralt for skinnebenet, i den øverste tredjedel af underbenet.

Peroneus (fibularis) longus

Hvor: På ydersiden af underbenet, i den øverste tredjedel, 2–4 cm under caput fibulae.

Spørg din behandler, hvilken muskel der giver netop dine gener. Triggerpunktatlas · undervisningsillustration, erstatter ikke en lægeundersøgelse.