PATIENTEN FORTSÆTTER DERHJEMME™

4-ugers Egenomsorgsplaner efter Gene

For hver af de 10 hyppigste gener en firugers hjemmeplan, som du giver patienten ved afslutningen af behandlingen.

Indhold

1 · Til patienten

2 · 10 planer

Næste skridt

AFSNIT 1

Til patienten

Sådan bruges planen.

Vigtigt

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

AFSNIT 2

10 planer

Tre øvelser, fire uger, ét råd til hverdagen.

Spændingshovedpine

1. **Trapezius – øvre fibre:** Sid ret op, hold fast under stolen med hånden på den side, der gør ondt, og læg langsomt hovedet over mod den anden side, til du mærker et let stræk på siden af halsen. Hold 30 sekunder, 3 gange, to gange om dagen.

2. **Suboccipitale muskler:** Læg dig på ryggen, læg to tennisbolde i en sok under nakken og hvil på dem i 2 minutter. Træk derefter langsomt hagen bagud 10 gange.

3. **Temporalis:** Når du mærker, at en hovedpine er på vej, så massér langsomt i cirkler på begge tindinger i 1 minut, mens du trækker vejret dybt.

UGE	HVAD DU GØR
Uge 1 · Kom i gang	Den første øvelse 1 gang dagligt. Læg mærke til, hvornår smerterne tiltager.
Uge 2 · Regelmæssighed	De to første øvelser 2 gange dagligt, og følg hverdagsrådet.
Uge 3 · Hele programmet	Alle tre øvelser 2 gange dagligt.
Uge 4 · Vedligeholdelse	Alle tre øvelser 1 gang dagligt; notér, hvad der hjalp dig mest.

> **Hver dag**
>
> Skærmen i øjenhøjde, 1 minuts pause hver time, afslapning om aftenen.

Nakkesmerter og nakkestivhed

1. **Levator scapulae:** Drej hovedet mod den anden side og kig ned mod din armhule. Læg hånden fra den side, der gør ondt, i nakken. Hold 30 sekunder, 3 gange, to gange om dagen.

2. **Trapezius – øvre fibre:** Sid ret op, hold fast under stolen med hånden på den side, der gør ondt, og læg langsomt hovedet over mod den anden side, til du mærker et let stræk på siden af halsen. Hold 30 sekunder, 3 gange, to gange om dagen.

3. **Splenius cervicis:** Én gang i timen trækker du hagen lige bagud (som om du laver dobbelthage) og holder 5 sekunder. 5 gange.

UGE	HVAD DU GØR
Uge 1 · Kom i gang	Den første øvelse 1 gang dagligt. Læg mærke til, hvornår smerterne tiltager.
Uge 2 · Regelmæssighed	De to første øvelser 2 gange dagligt, og følg hverdagsrådet.
Uge 3 · Hele programmet	Alle tre øvelser 2 gange dagligt.
Uge 4 · Vedligeholdelse	Alle tre øvelser 1 gang dagligt; notér, hvad der hjalp dig mest.

> **Hver dag**
> Lavere hovedpude, ingen mobil klemt mellem skulder og øre.

Kæbe- og ansigtssmerter

1. **Masseter:** Massér med fingerspidserne i små cirkler i 1 minut på kinden foran og under øreflippen. Vær opmærksom i løbet af dagen: hvis du bider tænderne sammen, så slap af i dem og lad tungen hvile mod ganen.

2. **Temporalis:** Når du mærker, at en hovedpine er på vej, så massér langsomt i cirkler på begge tindinger i 1 minut, mens du trækker vejret dybt.

3. **Pterygoideus medialis:** Tjek et par gange om dagen: tænderne rører ikke hinanden, læberne er lukkede, kæben er afslappet.

UGE	HVAD DU GØR
Uge 1 · Kom i gang	Den første øvelse 1 gang dagligt. Læg mærke til, hvornår smerterne tiltager.
Uge 2 · Regelmæssighed	De to første øvelser 2 gange dagligt, og følg hverdagsrådet.
Uge 3 · Hele programmet	Alle tre øvelser 2 gange dagligt.
Uge 4 · Vedligeholdelse	Alle tre øvelser 1 gang dagligt; notér, hvad der hjalp dig mest.

> **Hver dag**
> Læg mærke til, om du bider tænderne sammen, og undgå tyggegummi.

Skuldersmerter

1. **Infraspinatus:** Stræk den arm, der gør ondt, foran brystet mod den modsatte skulder, tag fat om albuen med den anden hånd og træk blidt. 30 sekunder, 3 gange.

2. **Supraspinatus:** Lad armen hænge afslappet og lav små cirkler frem og tilbage som et pendul i 1 minut. To gange om dagen.

3. **Pectoralis minor:** Sid ned og træk skulderbladene tilbage og ned, som om du vil putte dem i baglommen. Hold 5 sekunder, 10 gange.

UGE	HVAD DU GØR
Uge 1 · Kom i gang	Den første øvelse 1 gang dagligt. Læg mærke til, hvornår smerterne tiltager.
Uge 2 · Regelmæssighed	De to første øvelser 2 gange dagligt, og følg hverdagsrådet.
Uge 3 · Hele programmet	Alle tre øvelser 2 gange dagligt.
Uge 4 · Vedligeholdelse	Alle tre øvelser 1 gang dagligt; notér, hvad der hjalp dig mest.

> **Hver dag**
> Lig ikke på den side, der gør ondt; en pude under armen.

Albue- og underarmssmerter

1. **Underarmens ekstensorer (ECRL, ECRB, extensor digitorum):** Stræk armen frem med håndfladen nedad og bøj håndleddet og fingrene nedad med den anden hånd. 30 sekunder, 3 gange.

2. **Underarmens fleksorer:** Stræk armen frem med håndfladen opad og træk fingrene nedad og bagud med den anden hånd. 30 sekunder, 3 gange.

3. **Triceps brachii:** Løft armen over hovedet, bøj albuen og skub den blidt bagud med den anden hånd. 30 sekunder, 3 gange.

UGE	HVAD DU GØR
Uge 1 · Kom i gang	Den første øvelse 1 gang dagligt. Læg mærke til, hvornår smerterne tiltager.
Uge 2 · Regelmæssighed	De to første øvelser 2 gange dagligt, og følg hverdagsrådet.
Uge 3 · Hele programmet	Alle tre øvelser 2 gange dagligt.

UGE	HVAD DU GØR
Uge 4 · Vedligeholdelse	Alle tre øvelser 1 gang dagligt; notér, hvad der hjalp dig mest.

> **Hver dag**
> Udstrækning af underarmen hver time på arbejdet, et løsere greb.

Smerter mellem skulderbladene

1. **Rhomboidei:** Kram dig selv, som om du fryser, og krum ryggen, til du mærker et stræk mellem skulderbladene. 30 sekunder, 3 gange.
2. **Trapezius – midterste fibre:** Giv dig selv et kram og krum ryggen. 30 sekunder, 3 gange. Træk derefter skulderbladene bagud 10 gange.
3. **Pectoralis major:** Stil dig i en døråbning, læg underarmen mod dørkarmen i skulderhøjde og tag langsomt et skridt frem, til du mærker et stræk i brystet. 30 sekunder, 3 gange.

UGE	HVAD DU GØR
Uge 1 · Kom i gang	Den første øvelse 1 gang dagligt. Læg mærke til, hvornår smerterne tiltager.
Uge 2 · Regelmæssighed	De to første øvelser 2 gange dagligt, og følg hverdagsrådet.
Uge 3 · Hele programmet	Alle tre øvelser 2 gange dagligt.
Uge 4 · Vedligeholdelse	Alle tre øvelser 1 gang dagligt; notér, hvad der hjalp dig mest.

> **Hver dag**
> Rank siddestilling, træk skulderbladene bagud hver time.

Lændesmerter

1. **Quadratus lumborum:** Stå op, løft armen over hovedet og bøj dig langsomt til den anden side, mens bækkenet bliver på plads. 30 sekunder, 3 gange.
2. **Iliopsoas:** Gå ned på det ene knæ med det andet ben foran dig. Skub langsomt bækkenet frem, til du mærker et stræk på forsiden af det bageste lår. 30 sekunder, 3 gange.
3. **Multifidus:** Stå på alle fire, stræk den ene arm frem og det modsatte ben bagud og hold 5 sekunder. 10 gange på hver side.

UGE	HVAD DU GØR
Uge 1 · Kom i gang	Den første øvelse 1 gang dagligt. Læg mærke til, hvornår smerterne tiltager.
Uge 2 · Regelmæssighed	De to første øvelser 2 gange dagligt, og følg hverdagsrådet.
Uge 3 · Hele programmet	Alle tre øvelser 2 gange dagligt.
Uge 4 · Vedligeholdelse	Alle tre øvelser 1 gang dagligt; notér, hvad der hjalp dig mest.

> **Hver dag**
> Rejs dig op hver time, og løft med bøjede knæ.

Smerter fra ballen, der stråler ned i låret

1. **Piriformis:** Læg dig på ryggen, læg anklen fra det ømme ben på det andet knæ og træk det andet lår mod brystet. 30 sekunder, 3 gange.
2. **Gluteus minimus:** Læg dig på ryggen, læg anklen fra det ømme ben på det andet knæ og træk det andet lår mod brystet. 30 sekunder, 3 gange.
3. **Gluteus medius:** Stå op, kryds det ømme ben bag det andet og skub bækkenet ud til siden, til du mærker et stræk. 30 sekunder, 3 gange.

UGE	HVAD DU GØR
Uge 1 · Kom i gang	Den første øvelse 1 gang dagligt. Læg mærke til, hvornår smerterne tiltager.
Uge 2 · Regelmæssighed	De to første øvelser 2 gange dagligt, og følg hverdagsrådet.
Uge 3 · Hele programmet	Alle tre øvelser 2 gange dagligt.
Uge 4 · Vedligeholdelse	Alle tre øvelser 1 gang dagligt; notér, hvad der hjalp dig mest.

> **Hver dag**
> Hav ikke pungen i baglommen, og sid ikke med benene over kors.

Knæsmerter

1. **Rectus femoris:** Stå op, hold fast i noget, tag fat om anklen og træk hælen mod ballen med knæene ved siden af hinanden. 30 sekunder, 3 gange.

2. **Vastus medialis:** Sæt dig på en stol, stræk langsomt knæet, hold 5 sekunder og sænk det igen. 10 gange med hvert ben.

3. **Vastus lateralis:** Stå op, tag fat om anklen og træk hælen mod ballen. 30 sekunder, 3 gange.

UGE	HVAD DU GØR
Uge 1 · Kom i gang	Den første øvelse 1 gang dagligt. Læg mærke til, hvornår smerterne tiltager.
Uge 2 · Regelmæssighed	De to første øvelser 2 gange dagligt, og følg hverdagsrådet.
Uge 3 · Hele programmet	Alle tre øvelser 2 gange dagligt.
Uge 4 · Vedligeholdelse	Alle tre øvelser 1 gang dagligt; notér, hvad der hjalp dig mest.

> **Hver dag**
> Langsomt på trapper, gradvis øgning af belastningen.

Smerter i hæl og fodsål

1. **Soleus:** Stil dig foran en væg, sæt det ømme ben bagud, bøj knæet let og hold hælen i gulvet. 30 sekunder, 3 gange.

2. **Gastrocnemius:** Stil dig foran en væg, sæt det ømme ben bagud med knæet strakt og hælen i gulvet, og støt dig til væggen. 30 sekunder, 3 gange.

3. **Flexor digitorum brevis:** Sid ned og rul langsomt en tennisbold frem og tilbage under fodsålen i 2 minutter. Én gang om dagen.

UGE	HVAD DU GØR
Uge 1 · Kom i gang	Den første øvelse 1 gang dagligt. Læg mærke til, hvornår smerterne tiltager.
Uge 2 · Regelmæssighed	De to første øvelser 2 gange dagligt, og følg hverdagsrådet.
Uge 3 · Hele programmet	Alle tre øvelser 2 gange dagligt.
Uge 4 · Vedligeholdelse	Alle tre øvelser 1 gang dagligt; notér, hvad der hjalp dig mest.

> **Hver dag**
> Behagelige sko, om aftenen massage af fodsålen med en bold.

Næste skridt

Til behandleren: print den plan, der passer til din næste patients gene, og book en opfølgning ved slutningen af uge 4.