Hjemmeøvelse

HOVED, ANSIGT OG NAKKE · TRAPEZIUS – ØVRE FIBRE

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Trapezius – øvre fibre**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: tindingen, siden af hovedet, siden af halsen, bag øret, underkæbens vinkel.

Øvelsen

Sid ret op, hold fast under stolen med hånden på den side, der gør ondt, og læg langsomt hovedet over mod den anden side, til du mærker et let stræk på siden af halsen. Hold 30 sekunder, 3 gange, to gange om dagen.

I hverdagen

Lateralfleksions-udstrækning to gange dagligt; skærmen i øjenhøjde; ingen mobiltelefon klemt mellem øre og skulder.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

HOVED, ANSIGT OG NAKKE · STERNOCLEIDOMASTOIDEUS (SCM)

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Sternocleidomastoideus (SCM)**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: panden, omkring øjet, kinden, dybt i øret, issen, baghovedet.

Øvelsen

Sid ned, slap af i skuldrene og drej langsomt hovedet til højre og derefter til venstre, så langt det er behageligt. 10 gange til hver side, to gange om dagen. Stop, hvis du bliver svimmel.

I hverdagen

Langsomme hovedbevægelser og -drejninger; ikke se fjernsyn liggende eller læse med hovedet løftet.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

HOVED, ANSIGT OG NAKKE · MASSETER

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Masseter**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: kindtænderne i over- og underkæben, underkæben, øjenbrynet, dybt i øret.

Øvelsen

Massér med fingerspidserne i små cirkler i 1 minut på kinden foran og under øreflippen. Vær opmærksom i løbet af dagen: hvis du bider tænderne sammen, så slap af i dem og lad tungen hvile mod ganen.

I hverdagen

Daglig selvmassage med cirkulære bevægelser; undgå tyggegummi; vær opmærksom på, om tænderne bides sammen i løbet af dagen.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Temporalis**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: tindingen, øjenbrynet, bag øjet, tænderne i overkæben, siden af hovedet.

Øvelsen

Når du mærker, at en hovedpine er på vej, så massér langsomt i cirkler på begge tindinger i 1 minut, mens du trækker vejret dybt.

I hverdagen

Selvmassage af tindingerne, når hovedpinen begynder; hold øje med natlig tænderskæren.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Pterygoideus lateralis**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: kæbeleddet, kinden (over bihulerne).

Øvelsen

Stå foran spejlet og åbn munden langsomt og i en lige linje, uden at kæben glider ud til siden. 10 gange, to gange om dagen.

I hverdagen

Undgå hårde og store mundfulde; åbn bevidst munden langsomt og lige.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Pterygoideus medialis**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: tungeroden, svælget, under øret, kæbeleddet.

Øvelsen

Tjek et par gange om dagen: tænderne rører ikke hinanden, læberne er lukkede, kæben er afslappet.

I hverdagen

Bevidst afspænding af sammenbidte tænder; blød kost på dage med smerter.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

HOVED, ANSIGT OG NAKKE · SPLENIUS CAPITIS

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Splenius capitis**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: issen.

Øvelsen

Sid ned, før hagen mod brystet og drej den let mod den anden side, til du mærker et let stræk i nakken. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Undgå at kigge opad i lang tid (maling, oprydning på hylder); pude i den rette højde.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

HOVED, ANSIGT OG NAKKE · SPLENIUS CERVICIS

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Splenius cervicis**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: bag øjet, baghovedet, overgangen mellem nakke og skulder.

Øvelsen

Én gang i timen trækker du hagen lige bagud (som om du laver dobbelthage) og holder 5 sekunder. 5 gange.

I hverdagen

Korrektion af fremskudt hovedholdning; bevægelsespause hver time.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Suboccipitale muskler**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: siden af hovedet, bag øjet, panden, baghovedet.

Øvelsen

Læg dig på ryggen, læg to tennisbolde i en sok under nakken og hvil på dem i 2 minutter. Træk derefter langsomt hagen bagud 10 gange.

I hverdagen

10 hageretraktioner om dagen; skærmen i øjenhøjde; kort pause hver time.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

HOVED, ANSIGT OG NAKKE · SEMISPINALIS CAPITIS

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Semispinalis capitis**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: siden af hovedet, tindingen, panden, baghovedet.

Øvelsen

Sid ned, læg hænderne i nakken og lad deres vægt langsomt føre hovedet fremad. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Undgå fremskudt hovedholdning; hold bogen i øjenhøjde, når du læser.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Levator scapulae**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: overgangen mellem nakke og skulder, skulderbladets inderkant, bagsiden af skulderen.

Øvelsen

Drej hovedet mod den anden side og kig ned mod din armhule. Læg hånden fra den side, der gør ondt, i nakken. Hold 30 sekunder, 3 gange, to gange om dagen.

I hverdagen

Samme udstrækning to gange dagligt; undgå høj pude og drejet hoved under arbejdet.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Scaleni**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: forsiden af brystkassen, overarmen, skulderbladets inderkant, hånden (tommel- og pegefinger).

Øvelsen

Læg dig på ryggen, læg hånden på maven og træk vejret, så maven hæver sig og ikke skuldrene. 5 minutter om dagen.

I hverdagen

Træning af diafragmatisk vejrtrækning (mavevejrtrækning); ingen tung taske på skulderen.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

SKULDER, OVERARM, UNDERARM OG HÅND · INFRASPINATUS

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Infraspinatus**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: forsiden af skulderen (dybt), overarmens forreste yderside, underarmen, håndens tommelfingerside.

Øvelsen

Stræk den arm, der gør ondt, foran brystet mod den modsatte skulder, tag fat om albuen med den anden hånd og træk blidt. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Undgå at sove på den side, der gør ondt; i sideleje en pude under armen.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

SKULDER, OVERARM, UNDERARM OG HÅND · SUPRASPINATUS

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Supraspinatus**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: siden af skulderen (deltoidregionen), overarmens yderside, albuens yderside.

Øvelsen

Lad armen hænge afslappet og lav små cirkler frem og tilbage som et pendul i 1 minut. To gange om dagen.

I hverdagen

Undgå at løfte tunge ting over hovedhøjde; daglige skulderrotationer.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Teres minor**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: bagsiden af skulderen (punktformet), overarmens bagside.

Øvelsen

Stræk den arm, der gør ondt, foran brystet og tag blidt fat om albuen med den anden hånd. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Som ved infraspinatus; undgå at sove med armen over hovedet.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

SKULDER, OVERARM, UNDERARM OG HÅND · SUBSCAPULARIS

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Subscapularis**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: bagsiden af skulderen, skulderbladet, overarmens bagside, håndleddet.

Øvelsen

Stil dig i en døråbning med bøjet albue og håndfladen mod dørkarmen. Drej langsomt kroppen væk fra armen, til du mærker et let stræk foran i skulderen. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Øvelser i udadrotation; armen må ikke blive holdt tæt ind til kroppen i lang tid.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

SKULDER, OVERARM, UNDERARM OG HÅND · DELTOIDEUS

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Deltoideus**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: skulderen (omkring punktet), overarmen.

Øvelsen

Massér med fingrene i cirkler på ydersiden af skulderen i 1 minut, og før derefter armen foran brystet i 30 sekunder.

I hverdagen

Pauser ved gentagne løfteopgaver.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

SKULDER, OVERARM, UNDERARM OG HÅND · PECTORALIS MAJOR

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Pectoralis major**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: forsiden af brystkassen, forsiden af skulderen, overarmens inderside, brystregionen.

Øvelsen

Stil dig i en døråbning, læg underarmen mod dørkarmen i skulderhøjde og tag langsomt et skridt frem, til du mærker et stræk i brystet. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Korrektion af foroverbøjet holdning; skuldrene tilbage og ned.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

SKULDER, OVERARM, UNDERARM OG HÅND · PECTORALIS MINOR

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Pectoralis minor**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: forsiden af skulderen, brystkassen, overarmens inderside, håndens lillefingerside.

Øvelsen

Sid ned og træk skulderbladene tilbage og ned, som om du vil putte dem i baglommen. Hold 5 sekunder, 10 gange.

I hverdagen

Korrektion af fremskudt skulder; styrkelse af rygmusklerne.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

SKULDER, OVERARM, UNDERARM OG HÅND · RHOMBOIDEI

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Rhomboidei**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: skulderbladets inderkant, mellem skulderbladene.

Øvelsen

Kram dig selv, som om du fryser, og krum ryggen, til du mærker et stræk mellem skulderbladene. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Udstrækning af brystmusklen (rhomboideerne er ofte forlængede og svage).

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Serratus anterior**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: siden af brystkassen, skulderbladets nederste vinkel, overarmens inderside.

Øvelsen

Læg dig på ryggen, løft armen over hovedet og tag fem langsomme, dybe indåndinger ud i flankerne.

I hverdagen

Ofte efter hoste og intensivt løb: gradvis øgning af belastningen.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

SKULDER, OVERARM, UNDERARM OG HÅND · LATISSIMUS DORSI

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Latissimus dorsi**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: skulderbladets nederste vinkel, overarmens bageste inderside, ring- og lillefinger.

Øvelsen

Stå op, løft armen over hovedet og bøj langsomt over mod den anden side, til du mærker et stræk i siden. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Udstrækning efter pull-ups og trækøvelser.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

SKULDER, OVERARM, UNDERARM OG HÅND · BICEPS BRACHII

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Biceps brachii**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: forsiden af skulderen, albuebøjningen.

Øvelsen

Med strakt albue lægger du håndfladen på kanten af et bord bag dig og drejer dig langsomt, til du mærker et stræk foran på overarmen. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Undgå at bære tunge ting med bøjet albue.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

SKULDER, OVERARM, UNDERARM OG HÅND · TRICEPS BRACHII

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Triceps brachii**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: bagsiden af skulderen, albuens yderside, underarmens bagside.

Øvelsen

Løft armen over hovedet, bøj albuen og skub den blidt bagud med den anden hånd. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Pauser ved gang med krykker og ved armbøjninger.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Underarmens ekstensorer (ECRL, ECRB, extensor digitorum)**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: albuens yderside, underarmens bagside, håndryggen, fingrene.

Øvelsen

Stræk armen frem med håndfladen nedad og bøj håndleddet og fingrene nedad med den anden hånd. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Pauser ved brug af mus og ved skruearbejde; løsn grebet.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Underarmens fleksorer**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: håndleddets håndfladeside, håndfladen, fingrenes håndfladeside.

Øvelsen

Stræk armen frem med håndfladen opad og træk fingrene nedad og bagud med den anden hånd. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Pauser ved manuelt arbejde (havearbejde, montage); løsn grebet.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

RYG, RYGSØJLE OG TRUNCUS · TRAPEZIUS – MIDTERSTE FIBRE

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Trapezius – midterste fibre**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: mellem skulderbladene, brænden ved siden af rygsøjlen.

Øvelsen

Giv dig selv et kram og krum ryggen. 30 sekunder, 3 gange. Træk derefter skulderbladene bagud 10 gange.

I hverdagen

Korrektion af den foroverbøjede siddestilling; udstrækning af pectoralis.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Trapezius – nedre fibre**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: nakken, acromion, mellem skulderbladene.

Øvelsen

Læg dig på maven med panden på et håndklæde. Løft langsomt armene i Y-form og hold 3 sekunder. 10 gange.

I hverdagen

Styrkelse: armløft i Y-form fra maveleje.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

RYG, RYGSØJLE OG TRUNCUS · SERRATUS POSTERIOR SUPERIOR

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Serratus posterior superior**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: dybt under skulderbladet, bagsiden af skulderen, overarmens bagside, lillefingeren.

Øvelsen

Sid ned, læg hånden på maven og træk vejret langsomt, så maven hæver sig. 5 minutter om dagen.

I hverdagen

Abdominal vejrtrækning i stedet for overfladisk (hurtig) brystvejrtrækning.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Iliocostalis thoracis**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: midt på ryggen, maven (nogle gange), under skulderbladet.

Øvelsen

Sæt dig på kanten af stolen og bøj dig langsomt forover, så armene hænger ned mellem benene. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Bevægelsespauser ved langvarigt stillesiddende arbejde.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

RYG, RYGSØJLE OG TRUNCUS · ILIOCOSTALIS LUMBORUM

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Iliocostalis lumborum**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: lænden, glutealregionen, nederste del af maven.

Øvelsen

Læg dig på ryggen, træk begge knæ op mod brystet og hold om dem. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Løft med bøjede knæ og lige ryg; afbryd langvarigt stillesiddende arbejde.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

RYG, RYGSØJLE OG TRUNCUS · LONGISSIMUS THORACIS

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Longissimus thoracis**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: glutealregionen, lænden, hoftekammen (crista iliaca).

Øvelsen

Stå på alle fire, krum ryggen (kat) og sænk den derefter langsomt (ko). 10 gange.

I hverdagen

Afbryd kontorarbejdet hver time.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

RYG, RYGSØJLE OG TRUNCUS · MULTIFIDUS

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Multifidus**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: punktformet ved siden af rygsøjlen, korsbenet, maven (sjældent).

Øvelsen

Stå på alle fire, stræk den ene arm frem og det modsatte ben bagud og hold 5 sekunder. 10 gange på hver side.

I hverdagen

Aktivering af det dybe stabiliserende system (træk maven let ind uden at spænde mavemusklerne).

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

RYG, RYGSØJLE OG TRUNCUS · QUADRATUS LUMBORUM

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Quadratus lumborum**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: hoftekammen (crista iliaca), glutealregionen, siden af hoften, lænden.

Øvelsen

Stå op, løft armen over hovedet og bøj dig langsomt til den anden side, mens bækkenet bliver på plads. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Undgå at stå på ét ben og at bære tasken kun i den ene side.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

RYG, RYGSØJLE OG TRUNCUS · RECTUS ABDOMINIS

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Rectus abdominis**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: vandret bånd midt på ryggen, maven, lænden.

Øvelsen

Læg dig på maven, støt på albuerne og lad maven strække sig frit. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Udstrækning efter overdreven mavetræning.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

RYG, RYGSØJLE OG TRUNCUS · OBLIQUUS EXTERNUS ABDOMINIS

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Obliquus externus abdominis**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: siden af maven, lænden, nederste del af brystkassen.

Øvelsen

Læg dig på ryggen, bøj knæene og lad dem langsomt falde samlet til siden, mens skuldrene bliver i gulvet. 30 sekunder til hver side.

I hverdagen

Gradvis øgning af belastningen i rotationsbevægelser.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

BÆKKEN, HOFTE OG BALDER · GLUTEUS MAXIMUS

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Gluteus maximus**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: glutealregionen, korsbenet, omkring halebenet.

Øvelsen

Læg dig på ryggen og træk med begge hænder det ene knæ mod den modsatte skulder. 30 sekunder på hver side, 3 gange.

I hverdagen

Afbryd langvarig siddende stilling; en lille pude på en hård stol.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

BÆKKEN, HOFTE OG BALDER · GLUTEUS MEDIUS

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Gluteus medius**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: nederste del af lænden, korsbenet, siden af hoften, glutealregionen.

Øvelsen

Stå op, kryds det ømme ben bag det andet og skub bækkenet ud til siden, til du mærker et stræk. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Undgå at stå på ét ben og at sidde med krydsede ben; styrkelse af hoftens abduktorer.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

BÆKKEN, HOFTE OG BALDER · GLUTEUS MINIMUS

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Gluteus minimus**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: lårets yderside, underbenets yderside, bagsiden af låret, anklen.

Øvelsen

Læg dig på ryggen, læg anklen fra det ømme ben på det andet knæ og træk det andet lår mod brystet. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Afbryd lange bilture og langvarig siddende stilling.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Piriformis**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: glutealregionen, korsbenet, bagsiden af låret, bag hofteleddet.

Øvelsen

Læg dig på ryggen, læg anklen fra det ømme ben på det andet knæ og træk det andet lår mod brystet. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Undgå at sidde på pungen; undgå at sidde med krydsede ben.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Iliopsoas**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: lænden ved siden af rygsøjlen, korsbenet, forsiden af låret.

Øvelsen

Gå ned på det ene knæ med det andet ben foran dig. Skub langsomt bækkenet frem, til du mærker et stræk på forsiden af det bageste lår. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Udstrækning i udfaldsstilling efter langvarig siddende stilling.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Tensor fasciae latae**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: lårets yderside, knæets yderside.

Øvelsen

Stå op, kryds det ømme ben bag det andet og bøj dig til den anden side. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Undgå for kraftig hoftefleksion, når du sidder.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

BÆKKEN, HOFTE OG BALDER · ADDUCTOR LONGUS OG BREVIS

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Adductor longus og brevis**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: lysken, lårets inderside, knæets inderside.

Øvelsen

Sæt dig, saml fodsålerne og lad knæene falde langsomt nedad. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Opvarmning før hurtige sidelæns bevægelser.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

BÆKKEN, HOFTE OG BALDER · ADDUCTOR MAGNUS

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Adductor magnus**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: lysken, lårets inderside, dybt i bækkenet.

Øvelsen

Sæt dig med spredte ben og bøj dig langsomt forover med lige ryg. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Gradvis øgning af belastningen, opvarmning.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Pectineus**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: dybt i lysken, lårets forreste inderside.

Øvelsen

Sæt dig, saml fodsålerne og lad knæene falde langsomt nedad. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Undgå at presse lårene sammen, når du sidder.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Sartorius**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: forsiden af låret (brændende, stikkende fornemmelse), knæets inderside.

Øvelsen

Gå ned på det ene knæ og skub langsomt bækkenet frem. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Undgå langvarig siddende stilling med benene over kors på gulvet.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

LÅR, UNDERBEN OG FOD · RECTUS FEMORIS

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Rectus femoris**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: forsiden af knæet, omkring knæskallen.

Øvelsen

Stå op, hold fast i noget, tag fat om anklen og træk hælen mod ballen med knæene ved siden af hinanden. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Gradvis øgning af belastningen på trapper og i squat.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

LÅR, UNDERBEN OG FOD · VASTUS MEDIALIS

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Vastus medialis**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: knæets inderside, forsiden af knæet.

Øvelsen

Sæt dig på en stol, stræk langsomt knæet, hold 5 sekunder og sænk det igen. 10 gange med hvert ben.

I hverdagen

Styrkelse: stræk knæet fra siddende og hold.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

LÅR, UNDERBEN OG FOD · VASTUS LATERALIS

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Vastus lateralis**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: lårets yderside, knæets yderside, bag knæskallen.

Øvelsen

Stå op, tag fat om anklen og træk hælen mod ballen. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Undgå at ligge på siden på den ømme side.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

LÅR, UNDERBEN OG FOD · BICEPS FEMORIS

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Biceps femoris**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: knæhasen, bagsiden af låret.

Øvelsen

Sæt dig på kanten af stolen, stræk det ene ben med hælen i gulvet og bøj dig forover med lige ryg. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Ved langvarig siddende stilling må stolekanten ikke trykke på låret.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Semitendinosus og semimembranosus**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: nederste del af glutealregionen, bagsiden af låret, indersiden af knæhasen.

Øvelsen

Læg dig på ryggen, læg et håndklæde under fodsålen og løft langsomt det strakte ben, til du mærker et stræk bag på låret. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Opvarmning før løb.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

LÅR, UNDERBEN OG FOD · GASTROCNEMIUS

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Gastrocnemius**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: fodens svang, læggen, knæhasen.

Øvelsen

Stil dig foran en væg, sæt det ømme ben bagud med knæet strakt og hælen i gulvet, og støt dig til væggen. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Ved natlige kramper: udstrækning om aftenen; tilstrækkeligt væskeindtag.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Soleus**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: hælen, læggen, korsbenet (sjældent).

Øvelsen

Stil dig foran en væg, sæt det ømme ben bagud, bøj knæet let og hold hælen i gulvet. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Undgå sko med høje hæle.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

LÅR, UNDERBEN OG FOD · TIBIALIS ANTERIOR

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Tibialis anterior**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: forsiden af anklen, storetåen.

Øvelsen

Sid ned og placer foden under ballen med fodryggen mod gulvet. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Gradvis øgning af løbebelastningen; mindre løb på hårdt underlag.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Peroneus (fibularis) longus**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: den udvendige ankelknogle (lateral malleol), fodens yderside.

Øvelsen

Stå på ét ben i 30 sekunder, og hold fast i noget, hvis det er nødvendigt. 3 gange om dagen på hvert ben.

I hverdagen

Stabiliseringsøvelser for anklen på ét ben.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Tibialis posterior**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: akillessenen, hælen, fodsålen.

Øvelsen

Sid ned, læg et håndklæde under foden og træk det langsomt hen mod dig med tæerne. 1 minut.

I hverdagen

Passende støtte af fodbuen; ved platfod: specialist.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

LÅR, UNDERBEN OG FOD · EXTENSOR DIGITORUM LONGUS

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Extensor digitorum longus**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: fodryggen, de midterste tæer.

Øvelsen

Sid ned, bøj tæerne og foden nedad, til du mærker et stræk på fodryggen. 30 sekunder, 3 gange.

I hverdagen

Undgå stramme sko.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Flexor digitorum brevis**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: midt på fodsålen, roden af tæerne.

Øvelsen

Sid ned og rul langsomt en tennisbold frem og tilbage under fodsålen i 2 minutter. Én gang om dagen.

I hverdagen

Passende fodtøj; massage af fodsålen med en lille bold.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

LÅR, UNDERBEN OG FOD · ABDUCTOR HALLUCIS

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Abductor hallucis**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: hælens inderside, svangens inderkant.

Øvelsen

Sid ned, prøv at føre storetåen væk fra de andre tæer og hold 5 sekunder. 10 gange.

I hverdagen

Sko med bredere tåboks; styrkelse af storetåen.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Hjemmeøvelse

LÅR, UNDERBEN OG FOD · QUADRATUS PLANTAE

Hvorfor har du fået dette ark?

En del af dine smerter kan komme fra denne muskel: **Quadratus plantae**. Denne muskel refererer ofte smerte hertil: hælens underside.

Øvelsen

Sid ned og rul en frossen vandflaske under fodsålen i 2 minutter, især foran hælen.

I hverdagen

Massage af fodsålen med en lille bold, behagelige sko.

Sæt kryds, når du har lavet øvelsen

	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Uge 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uge 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Notat fra din behandler

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.