TRIGGERPUNKTATLAS

100+ visuelle kort over refereret smerte



Hoved · Skulder · Ryg · Bækken · Ben

FØR DU STARTER

SÅDAN BRUGER DU ATLASSET

OPBYGNING

102 kort fordelt på fem kropsregioner. Hvert kort viser én muskel: funktion, udspring, tilhæftning, innervation, triggerpunktets placering, refereret smertemønster, palpationsteknik og ledsagende symptomer.

HURTIG SØGNING

Brug det alfabetiske kliniske register, PDF'ens bogmærker i sidepanelet (hver muskel med ét klik) eller søgningen efter symptom: vælg, hvor smerten optræder, og se, hvilke muskler der er involveret.

SYMBOLER

Hvid cirkel med sort X: triggerpunkt. Kraftig rød: primært smerteområde. Lyserød med prikker: udbredelsesområde (spillover).

UDSKRIVNING

A4-format, optimeret til 300 DPI. Vælg «faktisk størrelse», når du udskriver.

VIGTIGT

Atlasset er lavet til studie og opslag. Det erstatter ikke en lægefaglig diagnose. Ved symptomer fra brystkassen, maven eller nervesystemet skal du altid først udelukke medicinske årsager.

INDHOLD

EFTER KROPSREGION

HOVED, ANSIGT OG NAKKE

1. Trapezius – øvre fibre · 2. Sternocleidomastoideus (SCM) · 3. Masseter · 4. Temporalis · 5. Pterygoideus lateralis · 6. Pterygoideus medialis · 7. Splenius capitis · 8. Splenius cervicis · 9. Suboccipitale muskler · 10. Semispinalis capitis · 11. Levator scapulae · 12. Scaleni · 13. Digastricus · 14. Occipitofrontalis · 15. Zygomaticus major · 16. Orbicularis oculi · 17. Platysma · 18. Longus colli

SKULDER, OVERARM, UNDERARM OG HÅND

19. Trapezius – midterste fibre · 20. Trapezius – nedre fibre · 21. Supraspinatus · 22. Infraspinatus · 23. Teres minor · 24. Teres major · 25. Subscapularis · 26. Deltoideus · 27. Latissimus dorsi · 28. Rhomboidei · 29. Pectoralis major · 30. Pectoralis minor · 31. Serratus anterior · 32. Subclavius · 33. Coracobrachialis · 34. Biceps brachii · 35. Brachialis · 36. Triceps brachii · 37. Anconeus · 38. Supinator · 39. Brachioradialis · 40. Extensor carpi radialis longus og brevis · 41. Extensor digitorum · 42. Flexor carpi radialis og ulnaris · 43. Pronator teres · 44. Palmaris longus · 45. Adductor pollicis · 46. Opponens pollicis · 47. Interossei (hånden)

RYG, RYGSØJLE OG TRUNCUS

48. Serratus posterior superior · 49. Serratus posterior inferior · 50. Iliocostalis thoracis · 51. Iliocostalis lumborum · 52. Longissimus thoracis · 53. Multifidus · 54. Rotatores og interspinales · 55. Quadratus lumborum · 56. Rectus abdominis · 57. Obliquus externus abdominis · 58. Intercostales · 59. Diaphragma · 60. Sternalis

BÆKKEN, HOFTE OG BALDER

61. Gluteus maximus · 62. Gluteus medius · 63. Gluteus minimus · 64. Piriformis · 65. Dybe udadrotatorer (gemelli og obturator internus) · 66. Quadratus femoris · 67. Tensor fasciae latae · 68. Iliopsoas · 69. Pectineus · 70. Adductor longus og brevis · 71. Adductor magnus · 72. Gracilis · 73. Sartorius · 74. Bækkenbundsmuskler

LÅR, UNDERBEN OG FOD

75. Rectus femoris · 76. Vastus medialis · 77. Vastus lateralis · 78. Vastus intermedius · 79. Biceps femoris · 80. Semitendinosus og semimembranosus · 81. Popliteus · 82. Gastrocnemius · 83. Soleus · 84. Plantaris · 85. Tibialis anterior · 86. Tibialis posterior · 87. Peroneus longus · 88. Peroneus brevis · 89. Peroneus tertius · 90. Extensor digitorum longus · 91. Extensor hallucis longus · 92. Flexor digitorum longus · 93. Flexor hallucis longus · 94. Extensor digitorum brevis · 95. Abductor hallucis · 96. Flexor digitorum brevis · 97. Quadratus plantae · 98. Abductor digiti minimi (fod) · 99. Interossei pedis · 100. Adductor hallucis · 101. Extensor hallucis brevis · 102. Flexor hallucis brevis

ALFABETISK REGISTER

98	Abductor digiti minimi (fod)	Lår
95	Abductor hallucis	Lår
100	Adductor hallucis	Lår
70	Adductor longus og brevis	Bækken
71	Adductor magnus	Bækken
45	Adductor pollicis	Skulder
37	Anconeus	Skulder
34	Biceps brachii	Skulder
79	Biceps femoris	Lår
35	Brachialis	Skulder
39	Brachioradialis	Skulder
74	Bækkenbundsmuskler	Bækken
33	Coracobrachialis	Skulder
26	Deltoideus	Skulder
59	Diaphragma	Ryg
13	Digastricus	Hoved
65	Dybe udadrotatorer (gemelli og obturator internus)	Bækken
40	Extensor carpi radialis longus og brevis	Skulder
41	Extensor digitorum	Skulder
94	Extensor digitorum brevis	Lår
90	Extensor digitorum longus	Lår
101	Extensor hallucis brevis	Lår
91	Extensor hallucis longus	Lår
42	Flexor carpi radialis og ulnaris	Skulder
96	Flexor digitorum brevis	Lår
92	Flexor digitorum longus	Lår
102	Flexor hallucis brevis	Lår
93	Flexor hallucis longus	Lår
82	Gastrocnemius	Lår
61	Gluteus maximus	Bækken
62	Gluteus medius	Bækken
63	Gluteus minimus	Bækken
72	Gracilis	Bækken
51	Iliocostalis lumborum	Ryg
50	Iliocostalis thoracis	Ryg
68	Iliopsoas	Bækken
22	Infraspinatus	Skulder
58	Intercostales	Ryg
47	Interossei (hånden)	Skulder
99	Interossei pedis	Lår
27	Latissimus dorsi	Skulder
11	Levator scapulae	Hoved
52	Longissimus thoracis	Ryg
18	Longus colli	Hoved
3	Masseter	Hoved
53	Multifidus	Ryg
57	Obliquus externus abdominis	Ryg
14	Occipitofrontalis	Hoved
46	Opponens pollicis	Skulder
16	Orbicularis oculi	Hoved
44	Palmaris longus	Skulder
69	Pectineus	Bækken
29	Pectoralis major	Skulder
30	Pectoralis minor	Skulder
88	Peroneus brevis	Lår
87	Peroneus longus	Lår

ALFABETISK REGISTER (FORTSAT)

89	Peroneus tertius	Lår
64	Piriformis	Bækken
84	Plantaris	Lår
17	Platysma	Hoved
81	Popliteus	Lår
43	Pronator teres	Skulder
5	Pterygoideus lateralis	Hoved
6	Pterygoideus medialis	Hoved
66	Quadratus femoris	Bækken
55	Quadratus lumborum	Ryg
97	Quadratus plantae	Lår
56	Rectus abdominis	Ryg
75	Rectus femoris	Lår
28	Rhomboidei	Skulder
54	Rotatores og interspinales	Ryg
73	Sartorius	Bækken
12	Scaleni	Hoved
10	Semispinalis capitis	Hoved
80	Semitendinosus og semimembranosus	Lår
31	Serratus anterior	Skulder
49	Serratus posterior inferior	Ryg
48	Serratus posterior superior	Ryg
83	Soleus	Lår
7	Splenius capitis	Hoved
8	Splenius cervicis	Hoved
60	Sternalis	Ryg
2	Sternocleidomastoideus (SCM)	Hoved
32	Subclavius	Skulder
9	Suboccipitale muskler	Hoved
25	Subscapularis	Skulder
38	Supinator	Skulder
21	Supraspinatus	Skulder
4	Temporalis	Hoved
67	Tensor fasciae latae	Bækken
24	Teres major	Skulder
23	Teres minor	Skulder
85	Tibialis anterior	Lår
86	Tibialis posterior	Lår
19	Trapezius – midterste fibre	Skulder
20	Trapezius – nedre fibre	Skulder
1	Trapezius – øvre fibre	Hoved
36	Triceps brachii	Skulder
78	Vastus intermedius	Lår
77	Vastus lateralis	Lår
76	Vastus medialis	Lår
15	Zygomaticus major	Hoved

SØGNING EFTER SYMPTOM

HVOR GØR DET ONDT?

Find, hvor smerten optræder: musklerne på listen er de hyppigste kilder til triggerpunkter.

Hovedpine ved tindingerne
Trapezius – øvre fibre (1), Temporalis (4), Sternocleidomastoideus (SCM) (2), Suboccipitale muskler (9), Semispinalis capitis (10)

Smerter i panden og omkring øjnene
Sternocleidomastoideus (SCM) (2), Occipitofrontalis (14), Orbicularis oculi (16), Zygomaticus major (15), Splenius cervicis (8)

Smerter på toppen af hovedet
Splenius capitis (7), Sternocleidomastoideus (SCM) (2)

Smerter i kæben og tænderne
Masseter (3), Temporalis (4), Pterygoideus lateralis (5), Pterygoideus medialis (6), Digastricus (13)

Stiv nakke
Levator scapulae (11), Trapezius – øvre fibre (1), Splenius capitis (7), Semispinalis capitis (10), Scaleni (12)

Svimmelhed
Sternocleidomastoideus (SCM) (2), Suboccipitale muskler (9)

Ondt i halsen og smerter ved synkning
Pterygoideus medialis (6), Digastricus (13), Longus colli (18)

Smerter mellem skulderbladene
Rhomboidei (28), Trapezius – midterste fibre (19), Scaleni (12), Serratus posterior superior (48), Levator scapulae (11)

Smerter foran på skulderen
Infraspinatus (22), Biceps brachii (34), Pectoralis major (29), Pectoralis minor (30), Deltoideus (26), Coracobrachialis (33)

Smerter bag på skulderen
Teres minor (23), Teres major (24), Subscapularis (25), Triceps brachii (36), Deltoideus (26), Latissimus dorsi (27)

Smerter ved løft af armen
Supraspinatus (21), Infraspinatus (22), Deltoideus (26), Subscapularis (25)

Smerter på ydersiden af albuen (tennisalbue)
Supinator (38), Extensor carpi radialis longus og brevis (40), Brachioradialis (39), Triceps brachii (36), Anconeus (37)

Smerter på indersiden af albuen (golfalbue)
Flexor carpi radialis og ulnaris (42), Pronator teres (43), Triceps brachii (36), Pectoralis major (29)

Smerter i håndled og hånd
Extensor digitorum (41), Flexor carpi radialis og ulnaris (42), Subscapularis (25), Scaleni (12), Pronator teres (43)

Smerter i tommelfingeren
Brachialis (35), Adductor pollicis (45), Opponens pollicis (46), Supinator (38), Scaleni (12)

Følelsesløshed i hånden
Scaleni (12), Pectoralis minor (30), Pronator teres (43), Subclavius (32), Coracobrachialis (33)

SØGNING EFTER SYMPTOM

HVOR GØR DET ONDT? (FORTSAT)

Find, hvor smerten optræder: musklerne på listen er de hyppigste kilder til triggerpunkter.

Brystsmerter (når medicinske årsager er udelukket)
Pectoralis major (29), Pectoralis minor (30), Sternalis (60), Scaleni (12), Intercostales (58)

Mavesmerter (når medicinske årsager er udelukket)
Rectus abdominis (56), Obliquus externus abdominis (57), Iliocostalis thoracis (50)

Lændesmerter
Quadratus lumborum (55), Iliopsoas (68), Iliocostalis lumborum (51), Longissimus thoracis (52), Multifidus (53), Gluteus medius (62)

Smerter i ballen
Gluteus maximus (61), Gluteus medius (62), Piriformis (64), Quadratus lumborum (55), Longissimus thoracis (52)

Iskiaslignende smerter
Gluteus minimus (63), Piriformis (64), Dybe udadrotatorer (gemelli og obturator internus) (65), Semitendinosus og semimembranosus (80), Biceps femoris (79)

Smerter i lysken
Iliopsoas (68), Pectineus (69), Adductor longus og brevis (70), Adductor magnus (71), Obliquus externus abdominis (57)

Smerter på ydersiden af hoften
Gluteus medius (62), Gluteus minimus (63), Tensor fasciae latae (67), Vastus lateralis (77), Quadratus lumborum (55)

Smerter foran på knæet
Rectus femoris (75), Vastus medialis (76), Vastus lateralis (77), Vastus intermedius (78), Adductor longus og brevis (70)

Smerter bag knæet
Popliteus (81), Gastrocnemius (82), Biceps femoris (79), Plantaris (84), Semitendinosus og semimembranosus (80)

Smerter og kramper i læggen
Gastrocnemius (82), Soleus (83), Tibialis posterior (86), Flexor digitorum longus (92)

Smerter i anklen
Peroneus longus (87), Peroneus brevis (88), Peroneus tertius (89), Tibialis anterior (85)

Smerter i hælen
Soleus (83), Quadratus plantae (97), Abductor hallucis (95), Tibialis posterior (86)

Smerter i foden
Flexor digitorum brevis (96), Adductor hallucis (100), Tibialis posterior (86), Gastrocnemius (82), Flexor digitorum longus (92)

Smerter i storetåen
Tibialis anterior (85), Extensor hallucis longus (91), Flexor hallucis longus (93), Flexor hallucis brevis (102)

KROPSREGION

HOVED, ANSIGT OG NAKKE

Kort 1–18 · 18 muskler

KORT 01 · HOVED, ANSIGT OG NAKKE

TRAPEZIUS – ØVRE FIBRE

Musculus trapezius, pars descendens

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Elevation og opadrotation af scapula
- Ipsilateral lateralfleksion af hoved og nakke
- Kontralateral rotation af hovedet
- Løft af skuldrene (skuldertræk)

UDSPRING

Linea nuchae superior, protuberantia occipitalis externa, ligamentum nuchae (C1–C6).

TILHÆFTNING

Laterale tredjedel af kravebenet (clavicula, pars acromialis).

INNERVATION

N. accessorius (XI. hjernenerve); proprioceptive fibre C3–C4.

TRIGGERPUNKT

I musklens øvre kant, i vinklen mellem nakke og skulder, midt mellem nakken og akromion; palperes nemt med pincetgreb.

REFERERET SMERTE

- Posterolaterale side af nakken
- Bag øret (processus mastoideus)
- Tindingen (hovedpine ved tindingen)
- Undertiden underkæbevinklen

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Siddende eller rygliggende, hovedet let bøjet til samme side
- Pincetgreb langs den øvre kant
- Rul vævet mellem fingrene for at finde det stramme bånd
- Trykket genskaber smerten ud mod tindingen

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Spændingshovedpine
- Stiv nakke, nedsat lateralfleksion
- Smerte efter lang tids siddende arbejde eller telefonsamtaler
- Løftede skuldre under stress

KLINISK TIP Tjek arbejdsstillingen, hvordan patienten bærer sin taske, og vejrtrækningsmønsteret: øvre trapezius overbelastes ofte af dårlig ergonomi.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 02 · HOVED, ANSIGT OG NAKKE

STERNOCLEIDOMASTOIDEUS (SCM)

Musculus sternocleidomastoideus

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Unilateralt: ipsilateral lateralfleksion og kontralateral rotation af hovedet
- Bilateralt: fleksion af nakken
- Accessorisk respirationsmuskel (løfter brystkassen)

UDSPRING

Caput sternale: forsiden af manubrium sterni. Caput claviculare: mediale tredjedel af kravebenet.

TILHÆFTNING

Processus mastoideus og laterale halvdel af linea nuchae superior.

INNERVATION

N. accessorius (XI. hjernenerve); sensoriske fibre C2–C3.

TRIGGERPUNKT

I hele længden af caput sternale og caput claviculare; undersøg med pincetgreb, med hovedet let roteret til samme side.

REFERERET SMERTE

- Panden og omkring øjet (orbitalregionen)
- Kinden og øret, bag øret
- Issen og baghovedet
- Øverste del af brystbenet

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende, hovedet bøjet til samme side for at afspænde musklen
- Tag fat om hvert hoved for sig med pincetgreb
- Arbejd dig fra kravebenet mod processus mastoideus
- Undgå dybt tryk tæt på arteria carotis

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Svimmelhed, balanceforstyrrelser
- Tåreflåd, sløret syn
- Hovedpine i panden eller omkring øjet
- Fornemmelse af susen i øret på samme side

KLINISK TIP Efter et «whiplash»-traume er sternocleidomastoideus ofte påvirket. Undersøg den sammen med øvre trapezius.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

MASSETER

Musculus masseter

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Lukning af munden (tygning, bid)
- Medvirker ved protrusion af underkæben

UDSPRING

Arcus zygomaticus og kindbenet (os zygomaticum).

TILHÆFTNING

Underkæbevinklen og ydersiden af ramus mandibulae.

INNERVATION

N. massetericus (n. mandibularis, V/3).

TRIGGERPUNKT

I det overfladiske lag under arcus zygomaticus og over underkæbevinklen; i det dybe lag foran kæbeleddet.

REFERERET SMERTE

- Øvre og nedre kindtænder
- Underkæbe og kind
- Over øjenbrynet
- Dybt i øret (kæbeledsområdet)

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Siddende stilling, munden let åben
- Pincetgreb: én finger inde i munden, den anden udenpå
- Bed patienten bide tænderne sammen: det stramme bånd bliver tydeligt

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Nedsat gabeevne
- Ømme tænder uden synlig tandårsag
- Tænderskæren (bruksisme)

KLINISK TIP Mål mundåbningen (normalt ca. 3 fingerbredder). Ved bruksisme: overvej en bideskinne om natten og stresshåndtering.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

TEMPORALIS

Musculus temporalis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Lukning af munden
- Retraktion af underkæben (bageste fibre)

UDSPRING

Fossa temporalis og fascia temporalis.

TILHÆFTNING

Processus coronoideus mandibulae.

INNERVATION

Nn. temporales profundi (n. mandibularis, V/3).

TRIGGERPUNKT

Over arcus zygomaticus i fire områder: forreste, midterste og to grupper af bageste fibre; palperes nemt under tygning.

REFERERET SMERTE

- Tinding og øjenbryn
- Fingerformet udbredelse på siden af hovedet
- Overtænder
- Undertiden bag øjet

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Siddende, tænderne let sammenbidte
- Flad palpation på tindingen over arcus zygomaticus
- Let efter ømme knuder på tværs af fibrene

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Hovedpine i tindingeregionen
- Tænder, der er følsomme over for varmt og koldt
- Træthed i kæben ved tygning

KLINISK TIP Temporalis og masseter er ofte påvirket sammen: behandl begge, og spørg til tænderskæren om natten.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

PTERYGOIDEUS LATERALIS

Musculus pterygoideus lateralis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



○ Triggerpunkt (X) ● Primært smerteområde ● Udbredelsesområde

FUNKTION

- Åbning af munden og protrusion af underkæben
- Sidelæns malebevægelse

UDSPRING

Ala major ossis sphenoidalis og lamina lateralis processus pterygoidei.

TILHÆFTNING

Kæbeleddets discus og collum mandibulae.

INNERVATION

N. pterygoideus lateralis (V/3).

TRIGGERPUNKT

Dybt under arcus zygomaticus; intraoralt bag de øvre kindtænder, op mod kraniet.

REFERERET SMERTE

- Dybt i kæbeleddet
- Kinden over kæbehulen
- Undertiden foran øret

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Intraoral palpation med handske, bag de øvre kindtænder
- Munden let åben
- Forsigtigt, langsomt tryk

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Klik i kæbeleddet
- Ændret fornemmelse af sammenbiddet
- Smerte ved tygning

KLINISK TIP Hyppig årsag til klik i kæbeleddet. Behandl kun den dybe muskel blidt; hvis bidet har ændret sig, så rådfør dig med en tandlæge.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 06 · HOVED, ANSIGT OG NAKKE

PTERYGOIDEUS MEDIALIS

Musculus pterygoideus medialis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Lukning af munden
- Protrusion og sidelæns bevægelse af underkæben

UDSPRING

Fossa pterygoidea (lamina medialis processus pterygoidei).

TILHÆFTNING

Indersiden af underkæbevinklen.

INNERVATION

N. pterygoideus medialis (V/3).

TRIGGERPUNKT

På indersiden af underkæbevinklen; udefra palperes den under vinklen med tryk opad.

REFERERET SMERTE

- Svælg og tungerod
- Under og foran øret (kæbeleddet)
- Svælgets bagvæg

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Palpér opad på indersiden af underkæbevinklen
- Hovedet let bøjet til samme side
- Smerten kan øges ved synkning

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte ved synkning
- Fornemmelse af ondt i halsen uden infektion
- Nedsat gabeevne

KLINISK TIP Hvis det gør ondt at synke, men halsen ikke er rød, så tænk på pterygoideus medialis.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 07 · HOVED, ANSIGT OG NAKKE

SPLENIUS CAPITIS

Musculus splenius capitis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



○ Triggerpunkt (X) ● Primært smerteområde ● Udbredelsesområde

FUNKTION

- Ekstension af hoved og nakke
- Ipsilateral rotation og lateralfleksion af hovedet

UDSPRING

Nederste halvdel af ligamentum nuchae, processus spinosi C7–Th3.

TILHÆFTNING

Processus mastoideus og laterale tredjedel af linea nuchae superior.

INNERVATION

Rami dorsales fra de cervikale spinalnerver (C3–C5).

TRIGGERPUNKT

Mellem trapezius og sternocleidomastoideus, ca. 2–3 cm under processus mastoideus.

REFERERET SMERTE

- Issen på samme side
- Undertiden baghovedet

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende, hovedet let roteret
- Flad palpation under processus mastoideus
- Rotation af hovedet mod modstand gør musklen tydelig

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte i issen
- Stiv nakke ved rotation
- Smerte efter at have sovet i en dårlig stilling

KLINISK TIP Spørg til pudens højde og sovestillingen: at sove på maven overbelaster ofte splenius-musklerne.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 08 · HOVED, ANSIGT OG NAKKE

SPLENIUS CERVICIS

Musculus splenius cervicis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Ekstension af nakken
- Ipsilateral rotation af nakken

UDSPRING

Processus spinosi Th3–Th6.

TILHÆFTNING

Tubercula posteriora på processus transversi C1–C3.

INNERVATION

Rami dorsales fra de cervikale spinalnerver (C4–C6).

TRIGGERPUNKT

Nederst i nakken ved siden af levator scapulae, i vinklen mellem nakke og skulder.

REFERERET SMERTE

- Dybt bag øjet
- Smerte, der breder sig til baghovedet
- Vinklen mellem nakke og skulder

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Maveliggende eller siddende
- Dyb palpation lateralt i højde med C7
- Mærk efter båndet, mens hovedet roteres

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte bag øjet
- Fornemmelse af sløret syn
- Stiv nakke

KLINISK TIP Smerte bag øjet behøver ikke have en øjenårsag; udelukk medicinske årsager, og undersøg derefter nakkemusklerne.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 09 · HOVED, ANSIGT OG NAKKE

SUBOCCIPITALE MUSKLER

Mm. recti capitis posteriores et obliqui capitis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Let ekstension og rotation af hovedet
- Finjustering af hovedets stilling (proprioception)

UDSPRING

Atlas og axis.

TILHÆFTNING

Os occipitale (linea nuchae inferior) og processus transversus atlantis.

INNERVATION

N. suboccipitalis (C1).

TRIGGERPUNKT

Lige under kraniebasen, mellem os occipitale og C2, i dybden.

REFERERET SMERTE

- Båndformet smerte fra baghovedet mod tindingen
- Bag øjet
- Undertiden helt frem til panden

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende, hovedet hviler i behandlerens hænder
- Fingerspidserne glider ind under kraniebasen
- Lad hovedets vægt give trykket

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Cervikogen hovedpine
- Hovedpine efter skærmarbejde
- Nedsat evne til at nikke med hovedet

KLINISK TIP Den vigtigste overbelastningsfaktor er fremskudt hovedholdning: tjek skærmens højde og brilletypen.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 10 · HOVED, ANSIGT OG NAKKE

SEMISPINALIS CAPITIS

Musculus semispinalis capitis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

○ Triggerpunkt (X) ● Primært smerteområde ● Udbredelsesområde

FUNKTION

- Ekstension af hovedet
- Opretholdelse af den cervikale lordose

UDSPRING

Processus transversi C4–Th6.

TILHÆFTNING

Os occipitale mellem linea nuchae superior og inferior.

INNERVATION

Rami dorsales fra de cervikale spinalnerver.

TRIGGERPUNKT

I tre niveauer: under kraniebasen, midt i nakken og nederst i nakken, ved siden af processus spinosi.

REFERERET SMERTE

- Bånd på siden af hovedet i højde med tindingen
- Baghovedet
- Bagsiden af nakken

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Maveliggende med støtte under panden
- Flad palpation under baghovedet, 1–2 cm fra midtlinjen
- Arbejd dig nedad niveau for niveau

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte rundt om hovedet
- Nakkesmerter ved ekstension
- Følelsesløshed i baghovedet (n. occipitalis major)

KLINISK TIP N. occipitalis major perforerer musklen: en stram semispinalis kan give følelsesløshed og en brændende fornemmelse i hovedbunden.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 11 · HOVED, ANSIGT OG NAKKE

LEVATOR SCAPULAE

Musculus levator scapulae

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Elevation af scapula
- Nedadrotation af scapula
- Ipsilateral lateralfleksion og rotation af nakken

UDSPRING

Processus transversi C1–C4.

TILHÆFTNING

Angulus superior scapulae og øverste del af margo medialis.

INNERVATION

N. dorsalis scapulae (C5) og C3–C4.

TRIGGERPUNKT

I vinklen mellem nakke og skulder og 1–2 cm over angulus superior scapulae.

REFERERET SMERTE

- Vinklen mellem nakke og skulder
- Langs skulderbladets mediale kant
- Bagsiden af skulderen

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Siddende, hovedet roteret til modsatte side
- Palpér under trapezius mod angulus superior scapulae
- Elevation af skulderen gør musklen tydelig

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- «Hold i nakken» (torticollis)
- Smertefuld rotation af hovedet til samme side
- Smerte efter lange telefonsamtaler

KLINISK TIP Den klassiske årsag til «jeg kan ikke dreje hovedet». Anbefal ikke at klemme telefonen fast mellem øre og skulder.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 12 · HOVED, ANSIGT OG NAKKE

SCALENI

Mm. scaleni anterior, medius et posterior

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Lateralfleksion af nakken
- Accessoriske respirationsmuskler (løfter de to øverste ribben)

UDSPRING

Processus transversi C2–C7.

TILHÆFTNING

1. ribben (anterior, medius) og
2. ribben (posterior).

INNERVATION

Rami ventrales fra de cervikale spinalnerver (C3–C8).

TRIGGERPUNKT

På siden af halsen over kravebenet, bag sternocleidomastoideus' bagkant.

REFERERET SMERTE

- Forreste del af brystkassen
- For- og bagsiden af overarmen
- Radialsiden af underarmen, tommel- og pegefinger
- Skulderbladets mediale kant

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende, hovedet let roteret til modsatte side
- Palpér bag sternocleidomastoideus, over kravebenet
- Obs: plexus brachialis løber her

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Følelsesløshed i hånden
- Smerter, der ligner karpaltunnelsyndrom
- Spænding i nakken, der øges ved indånding

KLINISK TIP Scaleni kan efterligne symptomer på «thoracic outlet»-syndrom. Vurder vejrtrækningsmønsteret: høj brystvejrtrækning overbelaster dem.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 13 · HOVED, ANSIGT OG NAKKE

DIGASTRICUS

Musculus digastricus

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



○ Triggerpunkt (X) ● Primært smerteområde ● Udbredelsesområde

FUNKTION

- Åbning af munden
- Løft af tungebenet ved synkning

UDSPRING

Venter posterior: incisura mastoidea; venter anterior: fossa digastrica mandibulae.

TILHÆFTNING

Mellemsenen på tungebenet (os hyoideum).

INNERVATION

Venter posterior: n. facialis (VII); venter anterior: n. mylohyoideus (V/3).

TRIGGERPUNKT

Venter posterior bag underkæbevinklen, venter anterior under hagen.

REFERERET SMERTE

- Nedre fortænder og hage
- Øverste del af halsen langs sternocleidomastoideus' forkant
- Under og bag øret

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende, hovedet let bagoverbøjet
- Blid palpation under hagen og bag underkæbevinklen
- Musklen spændes ved synkning

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Fornemmelse af synkebesvær
- Følsomme undertænder
- Fornemmelse af en klump i halsen

KLINISK TIP Fremskudt hovedholdning og mundånding overbelaster den. Tjek tungens hvilestilling (mod ganen).

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 14 · HOVED, ANSIGT OG NAKKE

OCCIPITOFRONTALIS

Musculus occipitofrontalis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Løft af øjenbrynene, rynkning af panden
- Bevægelse af hovedbunden

UDSPRING

Venter frontalis: huden ved øjenbrynene; venter occipitalis: linea nuchae suprema.

TILHÆFTNING

Galea aponeurotica.

INNERVATION

N. facialis (VII).

TRIGGERPUNKT

Venter frontalis over øjenbrynet, venter occipitalis øverst på baghovedet.

REFERERET SMERTE

- Panden
- Baghovedet
- Kan også brede sig dybt ind i øjet

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende
- Flad palpation over øjenbrynet og på baghovedet
- Bed patienten løfte øjenbrynene

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte i panden
- Smerte i baghovedet, der gør det svært at ligge på ryggen
- Strammende fornemmelse i hovedbunden

KLINISK TIP Rynkning af panden kan tyde på stress eller dårligt syn: spørg til briller og skærmtid.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 15 · HOVED, ANSIGT OG NAKKE

ZYGOMATICUS MAJOR

Musculus zygomaticus major

REFEREret SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Trækker mundvigen opad og udad (smil)

UDSPRING

Kindbenet (os zygomaticum).

TILHÆFTNING

Mundvigen (modiolus).

INNERVATION

N. facialis (VII).

TRIGGERPUNKT

Midt på musklen, mellem mundvigen og kindbenet; med pincetgreb inde i og uden på munden.

REFEREret SMERTE

- Siden af næsen
- Den indre øjenkrog
- Midt på panden

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Pincetgreb: én finger inde i munden, den anden på kinden
- Arbejd dig fra mundvigen mod kindbenet

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Ansigtssmerter
- Smerte på siden af næsen
- Undertiden en fornemmelse, der minder om bihulebetændelse

KLINISK TIP Når bihuleproblemer er udelukket, så tænk også på de mimiske muskler ved smerter midt i ansigtet.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 16 · HOVED, ANSIGT OG NAKKE

ORBICULARIS OCULI

Musculus orbicularis oculi

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Lukning af øjenlågene
- Knibning af øjnene

UDSPRING

Orbitas mediale rand og ligamentum palpebrale mediale.

TILHÆFTNING

Huden på øjenlågene og omkring øjet.

INNERVATION

N. facialis (VII).

TRIGGERPUNKT

Under øjenbrynet, over det øvre øjenlåg; med et meget blidt pincetgreb.

REFERERET SMERTE

- Næseryggen og siden af næsen
- Overlæben
- Omkring øjet

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Øjnene lukket, blidt pincetgreb under øjenbrynet
- Tryk aldrig på selve øjeæblet

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Trætte øjne
- Knibning af øjnene i skarpt lys
- Spænding omkring øjet

KLINISK TIP Skærmarbejde, læsning og skarpt lys overbelaster den: anbefal regelmæssige pauser og passende briller.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 17 · HOVED, ANSIGT OG NAKKE

PLATYSMA

Platysma

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) Primært smerteområde Udbredelsesområde

FUNKTION

- Trækker underlæben og mundvigen nedad
- Strammer huden på halsen

UDSPRING

Øverste del af brystkassen (fascia pectoralis og fascia deltoidea).

TILHÆFTNING

Underkæbens nedre rand og huden på den nederste del af ansigtet.

INNERVATION

N. facialis (VII), ramus colli.

TRIGGERPUNKT

Over kravebenet, i et tyndt lag over sternocleidomastoideus; med pincetgreb sammen med huden.

REFERERET SMERTE

- Prikkende smerte i underkæben
- Nederste del af ansigtet og hagen

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Pincetgreb sammen med huden
- Bed patienten trække mundvigene nedad: platysma spændes

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Prikken i hagen
- Stramhed på forsiden af halsen

KLINISK TIP Ofte aktiv sammen med triggerpunkter i sternocleidomastoideus; i den tynde muskel kan udstrækning og mobilisering af huden være nok.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 18 · HOVED, ANSIGT OG NAKKE

LONGUS COLLI

Musculus longus colli

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Fleksion og stabilisering af nakken
- Kontrol af den cervikale lordose

UDSPRING

Hvirvellegemer og processus transversi C3–Th3.

TILHÆFTNING

Tuberculum anterius atlantis og hvirvellegemerne C2–C6.

INNERVATION

Rami ventrales fra de cervikale spinalnerver (C2–C6).

TRIGGERPUNKT

Dybt ved siden af luftrøret, mellem sternocleidomastoideus og luftrøret; kun med forsigtig dyb palpation.

REFERERET SMERTE

- Forreste del af halsen (svælget)
- Smerte ved synkning
- Forsiden af nakken

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende, hovedet støttet
- Skub sternocleidomastoideus til side, og palpér forsigtigt ved siden af luftrøret
- Mærk carotispulsen, og hold dig væk fra den

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Fornemmelse af en klump i halsen
- Fornemmelse af ustabil nakke efter et whiplashtraume

KLINISK TIP Efter et whiplashtraume er den ofte hæmmet: træning af de dybe nakkefleksorer (nik i rygliggende) hjælper med at aktivere den.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KROPSREGION

SKULDER, OVERARM, UNDERARM OG HÅND

Kort 19–47 · 29 muskler

TRAPEZIUS – MIDTERSTE FIBRE

Musculus trapezius, pars transversa

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Adduktion af scapula ind mod columna
- Stabilisering af scapula

UDSPRING

Processus spinosi C7–Th3.

TILHÆFTNING

Akromion og overkanten af spina scapulae.

INNERVATION

N. accessorius (XI).

TRIGGERPUNKT

Mellem skulderbladets mediale kant og columna, i højde med spina scapulae.

REFERERET SMERTE

- Mellem skulderbladet og columna
- Brændende fornemmelse over akromion

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Maveliggende, armene langs siden
- Flad palpation på tværs af fibrene

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Brændende smerte mellem skulderbladene
- Træthed ved siddende arbejde

KLINISK TIP Er ofte svækket og overstrakt (fremskudte skuldre): styrketræning er lige så vigtig som behandlingen.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

TRAPEZIUS – NEDRE FIBRE

Musculus trapezius, pars ascendens

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Depression af scapula
- Opadrotation af scapula

UDSPRING

Processus spinosi Th4–Th12.

TILHÆFTNING

Mediale ende af spina scapulae.

INNERVATION

N. accessorius (XI).

TRIGGERPUNKT

I skulderbladets nedre mediale del, hvor fibrene når spina scapulae.

REFERERET SMERTE

- Øverst i nakken under kraniebasen
- Bagsiden af nakken
- Øverste del af skulderbladet

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Maveliggende
- Pincetgreb ved siden af angulus inferior scapulae

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Nakkesmerter med oprindelse i ryggen
- Smerte omkring skulderbladet

KLINISK TIP Nakkesmerter kan komme fra ryggen: hvis behandling af nakken ikke er nok, så undersøg nedre trapezius.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

SUPRASPINATUS

Musculus supraspinatus

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



○ Triggerpunkt (X) ● Primært smerteområde ● Udbredelsesområde

FUNKTION

- Initialfasen af abduktion af armen
- Stabilisering af caput humeri i cavitas glenoidalis

UDSPRING

Fossa supraspinata.

TILHÆFTNING

Øverste del af tuberculum majus humeri.

INNERVATION

N. suprascapularis (C5–C6).

TRIGGERPUNKT

I fossa supraspinata under trapezius; i den mediale og den laterale del.

REFERERET SMERTE

- Dybt midt i skulderen (deltoideusregionen)
- Ydersiden af overarmen
- Ydersiden af albuen

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Siddende, armen langs siden
- Palpér gennem trapezius over spina scapulae

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte ved løft af armen
- Murrende skuldersmerter om natten

KLINISK TIP Kan efterligne billedet af en rotator cuff-ruptur. Undersøg den sammen med infraspinatus.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

INFRASPINATUS

Musculus infraspinatus

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Udadrotation af armen
- Stabilisering af caput humeri

UDSPRING

Fossa infraspinata.

TILHÆFTNING

Midterste del af tuberculum majus humeri.

INNERVATION

N. suprascapularis (C5–C6).

TRIGGERPUNKT

Under spina scapulae, i øverste del af fossa infraspinata.

REFERERET SMERTE

- Dybt i forreste del af skulderen
- For- og ydersiden af overarmen
- Radialsiden af underarm og hånd

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Maveliggende eller siddende
- Flad palpation på skulderbladet under spina scapulae

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Kan ikke sove på den smertefulde side
- Svært ved at nå bagud (fx at rede håret)

KLINISK TIP Kilden til «smerter foran i skulderen» sidder ofte bagpå: undersøg altid infraspinatus.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

TERES MINOR

Musculus teres minor

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Udadrotation af armen
- Stabilisering af caput humeri

UDSPRING

Øverste to tredjedele af skulderbladets laterale kant.

TILHÆFTNING

Nederste del af tuberculum majus humeri.

INNERVATION

N. axillaris (C5–C6).

TRIGGERPUNKT

På skulderbladets laterale kant under infraspinatus.

REFERERET SMERTE

- Dyb, lokaliseret smerte bag på skulderen

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Maveliggende, armen let abduceret
- Pincetgreb langs skulderbladets laterale kant

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Punktformet smerte bag på skulderen
- Følelsesløshed i 4. og 5. finger (sjældent)

KLINISK TIP Viser sig ofte først efter behandling af infraspinatus.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

TERES MAJOR

Musculus teres major

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Indadrotation, adduktion og ekstension af armen

UDSPRING

Angulus inferior scapulae.

TILHÆFTNING

Crista tuberculi minoris humeri.

INNERVATION

N. subscapularis inferior (C5–C7).

TRIGGERPUNKT

I den bageste aksillefold, over angulus inferior scapulae.

REFERERET SMERTE

- Bagsiden af skulderen
- Bagsiden af overarmen
- Undertiden dorsalsiden af underarmen

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende, armen løftet
- Pincetgreb i den bageste aksillefold

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte ved at række op over hovedet
- Stiv skulder

KLINISK TIP Undersøg den sammen med latissimus dorsi: de to danner tilsammen armhulens bagvæg.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

SUBSCAPULARIS

Musculus subscapularis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Indadrotation af armen
- Anterior stabilisering af caput humeri

UDSPRING

Fossa subscapularis.

TILHÆFTNING

Tuberculum minus humeri.

INNERVATION

Nn. subscapulares (C5–C6).

TRIGGERPUNKT

I armhulen, på skulderbladets forside tæt ved den laterale kant.

REFERERET SMERTE

- Bagsiden af skulderen
- Skulderbladet
- Bagsiden af overarmen
- Båndformet smerte omkring håndleddet

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende, armen abduceret
- Palpér fra armhulen mod skulderbladets forside
- Langsomt og forsigtigt

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Bevægelsesindskrænkning som ved «frossen skulder»
- Smerter i håndleddet uden synlig årsag

KLINISK TIP I den tidlige fase af frossen skulder (frozen shoulder) spiller den ofte en afgørende rolle.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

DELTOIDEUS

Musculus deltoideus

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Abduktion af armen (midterste fibre)
- Fleksion (forreste fibre)
- Ekstension (bageste fibre)

UDSPRING

Laterale tredjedel af kravebenet, akromion, spina scapulae.

TILHÆFTNING

Tuberositas deltoidea humeri.

INNERVATION

N. axillaris (C5–C6).

TRIGGERPUNKT

I øverste tredjedel af overarmen, i de forreste, midterste og bageste fibre.

REFERERET SMERTE

- Lokal smerte i forreste, laterale eller bageste del af skulderen
- Øverste del af overarmen

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Siddende
- Pincetgreb eller flad palpation på fibrene

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte ved løft af armen
- Fornemmelse af svaghed i skulderen

KLINISK TIP Smerter fra deltoideus er lokale; hvis de breder sig længere ud, så led efter årsagen i rotator cuff.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

LATISSIMUS DORSI

Musculus latissimus dorsi

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Indadrotation, adduktion og ekstension af armen
- Trækbevægelser (pull-ups i bar)

UDSPRING

Processus spinosi Th7–L5, fascia thoracolumbalis, crista iliaca, nederste ribben.

TILHÆFTNING

Sulcus intertubercularis humeri.

INNERVATION

N. thoracodorsalis (C6–C8).

TRIGGERPUNKT

I den bageste aksillefold, med pincetgreb.

REFERERET SMERTE

- Omkring angulus inferior scapulae
- Posteromediale side af overarmen
- 4. og 5. finger

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende, armen over hovedet
- Pincetgreb i den bageste aksillefold

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Konstant murrende rygsmerte under skulderbladet
- Smerte ved at række op over hovedet

KLINISK TIP Hyppig hos svømmere, roere og klatrere. Tænk på den ved murrende rygsmerter, som patienten «ikke kan pege præcist på».

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

RHOMBOIDEI

Mm. rhomboidei major et minor

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Adduktion af scapula ind mod columna og elevation af den

UDSPRING

Processus spinosi C7–Th5.

TILHÆFTNING

Skulderbladets mediale kant.

INNERVATION

N. dorsalis scapulae (C4–C5).

TRIGGERPUNKT

Under trapezius, langs skulderbladets mediale kant.

REFERERET SMERTE

- Langs skulderbladets mediale kant
- Overfladisk, «jagende» smerte

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Maveliggende, armen hængende
- Palpér gennem trapezius på skulderbladets mediale kant

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte mellem skulderbladene
- Knasen ved bevægelse af skulderbladet

KLINISK TIP Overstrækkes ofte af stramme brystmuskler: arbejd ikke kun bagpå, men også fortil.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 29 · SKULDER, OVERARM, UNDERARM OG HÅND

PECTORALIS MAJOR

Musculus pectoralis major

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Adduktion og indadrotation af armen
- Fleksion (pars clavicularis)

UDSPRING

Mediale halvdel af kravebenet, sternum, 1.–6. ribbensbrusk.

TILHÆFTNING

Crista tuberculi majoris humeri.

INNERVATION

N. pectoralis medialis og lateralis (C5–Th1).

TRIGGERPUNKT

I pars clavicularis, pars sternalis og pars costalis; i den forreste aksillefold med pincetgreb.

REFERERET SMERTE

- Forreste del af skulderen
- Forreste del af brystkassen
- Indersiden af overarmen og albuen
- 4. og 5. finger

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende, armen let abduceret
- Pincetgreb i den forreste aksillefold
- Flad palpation ved siden af sternum

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Brystsmerter, der minder om hjertesmerter
- Fremskudte skuldre
- Smerte ved at række bagud

KLINISK TIP Ved brystsmerter skal du altid først udelukke medicinske (kardiale) årsager, før du overvejer en muskulær oprindelse.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 30 · SKULDER, OVERARM, UNDERARM OG HÅND

PECTORALIS MINOR

Musculus pectoralis minor

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Trækker scapula fremad og nedad
- Accessorisk respirationsmuskel

UDSPRING

3.–5. ribben.

TILHÆFTNING

Processus coracoideus.

INNERVATION

N. pectoralis medialis (C8–Th1).

TRIGGERPUNKT

Under processus coracoideus og over 3.–5. ribben, gennem pectoralis major.

REFERERET SMERTE

- Forreste del af skulderen
- Brystkassen
- Indersiden af overarmen og ulnarsiden af hånden

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende
- Palpér fra armhulen ind under brystmusklen mod processus coracoideus

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Fremskudt skulder
- Følelsesløshed i hånden (neurovaskulær kompression)

KLINISK TIP En stram pectoralis minor kan indsnævre passagen for plexus brachialis: undersøg den ved thoracic outlet-symptomer.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

SERRATUS ANTERIOR

Musculus serratus anterior

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Trækker scapula fremad og holder den ind mod brystkassen
- Opadrotation af scapula

UDSPRING

Ydersiden af 1.–9. ribben.

TILHÆFTNING

Skulderbladets mediale kant (forsiden).

INNERVATION

N. thoracicus longus (C5–C7).

TRIGGERPUNKT

I midtaksillærlinjen, i højde med 5.–6. ribben.

REFERERET SMERTE

- Siden af brystkassen
- Angulus inferior scapulae
- Indersiden af overarmen

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Sideliggende, armen strakt frem
- Palpér mellem ribbenene i aksillærlinjen

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- «Sidestik» ved løb
- Smerte, der øges ved dyb indånding

KLINISK TIP Svaghed i musklen giver scapula alata; varianter af armstrækninger hjælper i styrketræningen.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

SUBCLAVIUS

Musculus subclavius

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Stabilisering af kravebenet

UDSPRING

1. ribben og dets brusk.

TILHÆFTNING

Kravebenets underside.

INNERVATION

N. subclavius (C5–C6).

TRIGGERPUNKT

Under kravebenet i den midterste tredjedel, gennem pectoralis major.

REFERERET SMERTE

- Forsiden af overarmen
- Radialsiden af underarmen
- Tommel- og pegefinger

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende
- Palpér opad under kravebenet

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Følelsesløshed i fingrene
- Smerte foran i skulderen

KLINISK TIP Under kravebenet løber vena subclavia: undgå kraftigt tryk i længere tid.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

CORACOBRACHIALIS

Musculus coracobrachialis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Fleksion og adduktion af armen

UDSPRING

Processus coracoideus.

TILHÆFTNING

Midt på humerus' medialside.

INNERVATION

N. musculocutaneus (C6–C7).

TRIGGERPUNKT

På indersiden af overarmen tæt ved armhulen, bag biceps' caput breve.

REFERERET SMERTE

- Forreste del af skulderen
- Bagsiden af over- og underarm
- Håndryggen

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende, armen abduceret og udadroteret
- Palpér i armhulen ved siden af humerus

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte ved at strække armen bagud

KLINISK TIP N. musculocutaneus perforerer den: spænding i musklen kan give følelsesløshed på ydersiden af underarmen.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

BICEPS BRACHII

Musculus biceps brachii

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Fleksion af albuen
- Supination af underarmen

UDSPRING

Caput longum: tuberculum supraglenoidale; caput breve: processus coracoideus.

TILHÆFTNING

Tuberositas radii og aponeurosis bicipitalis.

INNERVATION

N. musculocutaneus (C5–C6).

TRIGGERPUNKT

I musklens distale tredjedel, i begge hoveder.

REFERERET SMERTE

- Forreste del af skulderen
- Forsiden af overarmen
- Albuebøjningen

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Siddende, albuen let bøjet
- Pincetgreb om muskelbugen

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte ved løft over hovedet
- Svaghed ved fleksion af albuen

KLINISK TIP Bag «smerter foran i skulderen» ligger ofte ikke senen, men et triggerpunkt i biceps.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

BRACHIALIS

Musculus brachialis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Fleksion af albuen (primær fleksor)

UDSPRING

Distale halvdel af humerus' forside.

TILHÆFTNING

Tuberositas ulnae og processus coronoideus.

INNERVATION

N. musculocutaneus (C5–C6), delvist n. radialis.

TRIGGERPUNKT

Et par centimeter over albuen, under biceps, lateralt.

REFERERET SMERTE

- Tommelfingerbasis (dorsalsiden)
- Albuebøjningen
- Forsiden af overarmen

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Siddende, albuen bøjet 90°
- Skub biceps til side, og palpér dybt ved siden af den

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte i tommelfingeren
- Smerte ved at bære noget tungt

KLINISK TIP Ved smerter i tommelfingeren skal du ikke kun lede i hånden: årsagen kan også være brachialis.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

TRICEPS BRACHII

Musculus triceps brachii

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Ekstension af albuen
- Ekstension af armen (caput longum)

UDSPRING

Caput longum: tuberculum infraglenoidale; caput laterale og mediale: bagsiden af humerus.

TILHÆFTNING

Olecranon.

INNERVATION

N. radialis (C6–C8).

TRIGGERPUNKT

I caput longum, i caput laterale og over albuen.

REFERERET SMERTE

- Bagsiden af skulderen
- Bagsiden af overarmen
- Albuen (epikondylerne)
- Dorsalsiden af underarmen

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Maveliggende eller siddende, armen hængende
- Pincetgreb om caput longum

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Albuesmerter, der minder om «tennisalbue»
- Smerte ved strakt arm

KLINISK TIP Kilden til smerter på ydersiden af albuen er ikke altid underarmen: undersøg også triceps' caput laterale.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

ANCONEUS

Musculus anconeus

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



○ Triggerpunkt (X) ● Primært smerteområde ● Udbredelsesområde

FUNKTION

- Medvirker ved ekstension af albuen
- Stabilisering af albueleddet

UDSPRING

Epicondylus lateralis humeri.

TILHÆFTNING

Ydersiden af olecranon og bagsiden af ulna.

INNERVATION

N. radialis (C7–C8).

TRIGGERPUNKT

Mellem olecranon og epicondylus lateralis.

REFERERET SMERTE

- Omkring epicondylus lateralis

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Siddende, albuen bøjet
- Flad palpation ved siden af olecranon

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Lokal smerte i albuen

KLINISK TIP Ved tennisalbue hjælper en præcis lokalisering med at skelne anconeus fra ekstensorerne.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

SUPINATOR

Musculus supinator

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Supination af underarmen

UDSPRING

Epicondylus lateralis humeri, ligamentum collaterale radiale, crista musculi supinatoris ulnae.

TILHÆFTNING

Proksimale tredjedel af radius.

INNERVATION

N. radialis profundus (C6–C7).

TRIGGERPUNKT

Under albuebøjningen lateralt, omkring caput radii.

REFERERET SMERTE

- Epicondylus lateralis
- Håndryggen mellem tommel- og pegefinger

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Siddende, underarmen supineret
- Palpér under caput radii

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Tennisalbue
- Smerte ved at skrue eller dreje et dørhåndtag

KLINISK TIP N. radialis profundus perforerer den: en stram supinator kan give svaghed i underarmen.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

BRACHIORADIALIS

Musculus brachioradialis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Fleksion af albuen med underarmen i neutralstilling

UDSPRING

Crista supracondylaris lateralis humeri.

TILHÆFTNING

Processus styloideus radii.

INNERVATION

N. radialis (C5–C6).

TRIGGERPUNKT

På radialsiden af underarmen, 1–2 cm under albuen.

REFERERET SMERTE

- Epicondylus lateralis
- Dorsalsiden af håndleddet
- Mellem tommel- og pegefinger

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Siddende, underarmen i neutralstilling
- Pincetgreb om underarmens radiale kant

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Albuesmerter ved greb
- Smerte på håndryggen

KLINISK TIP Med pincetgreb er den nem at skelne fra extensor carpi radialis.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

EXTENSOR CARPI RADIALIS LONGUS OG BREVIS

Mm. extensores carpi radiales longus et brevis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Ekstension og radialdeviation af håndleddet
- Stabilisering af grebet

UDSPRING

Crista supracondylaris lateralis og epicondylus lateralis humeri.

TILHÆFTNING

Basis af 2. og 3. metacarpalknogle.

INNERVATION

N. radialis (C6–C7).

TRIGGERPUNKT

I underarmens øverste tredjedel, dorsoradialt.

REFERERET SMERTE

- Epicondylus lateralis
- Håndryg og håndled

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Siddende, underarmen proneret
- Palpér på dorsalsiden under albuen

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Tennisalbue
- Nedsat gribekraft

KLINISK TIP Brug af mus og tastatur er en hyppig belastning: tjek håndleddets stilling under arbejdet.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

EXTENSOR DIGITORUM

Musculus extensor digitorum

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Ekstension af fingrene
- Medvirker ved ekstension af håndleddet

UDSPRING

Epicondylus lateralis humeri (fælles ekstensorsene).

TILHÆFTNING

Dorsalaponeurosen på 2.–5. finger.

INNERVATION

N. radialis profundus (C7–C8).

TRIGGERPUNKT

På dorsalsiden af underarmen, 3–4 cm under albuen.

REFERERET SMERTE

- Dorsalsiden af underarmen
- Håndryggen
- Lang- og ringfinger

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Siddende, underarmen proneret
- Bed patienten løfte fingrene én ad gangen: båndet kan mærkes

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Stive fingre
- Nedsat gribekraft

KLINISK TIP Hyppig hos musikere og hos dem, der skriver meget på tastatur; pauser og udstrækning af fingrene hjælper.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

FLEXOR CARPI RADIALIS OG ULNARIS

Mm. flexores carpi radialis et ulnaris

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Fleksion af håndleddet
- Henholdsvis radial- eller ulnardeviation

UDSPRING

Epicondylus medialis humeri (fælles fleksorsene).

TILHÆFTNING

Radialis: basis af 2. metacarpalknogle; ulnaris: os pisiforme, 5. metacarpalknogle.

INNERVATION

N. medianus (radialis), n. ulnaris (ulnaris).

TRIGGERPUNKT

På volarsiden af underarmen, i øverste tredjedel.

REFERERET SMERTE

- Volarsiden af håndleddet (radialt og ulnart)

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Siddende, underarmen supineret
- Bed om fleksion af håndleddet mod modstand

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Golfalbue
- Smerter i håndleddet ved greb

KLINISK TIP Ved golfalbue (medial epikondylitis) skal du undersøge den sammen med pronator teres.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

PRONATOR TERES

Musculus pronator teres

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Pronation af underarmen
- Medvirker ved fleksion af albuen

UDSPRING

Epicondylus medialis humeri og processus coronoideus ulnae.

TILHÆFTNING

Midt på radius' yderside.

INNERVATION

N. medianus (C6–C7).

TRIGGERPUNKT

Under albuebøjningen medialt, tæt ved epicondylus medialis.

REFERERET SMERTE

- Håndleddet og underarmens volarradiale side

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Siddende, underarmen supineret
- Palpér skråt under albuebøjningen

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte ved rotationsbevægelser
- Følelsesløshed i tommel- og pegefinger (n. medianus)

KLINISK TIP N. medianus perforerer den: pronator teres-syndrom kan efterligne karpaltunnelsyndrom.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

PALMARIS LONGUS

Musculus palmaris longus

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Strammer aponeurosis palmaris
- Medvirker ved fleksion af håndleddet

UDSPRING

Epicondylus medialis humeri.

TILHÆFTNING

Aponeurosis palmaris.

INNERVATION

N. medianus (C7–C8).

TRIGGERPUNKT

På volarsiden af underarmen, i øverste tredjedel.

REFERERET SMERTE

- Prikkende, nålestikslignende smerte i håndfladen

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Siddende
- Bed patienten føre tommelfingeren hen til lillefingeren: senen bliver synlig

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte i håndfladen ved greb om værktøj

KLINISK TIP Mangler hos ca. 15 % af befolkningen; hvis den mangler, så led efter en anden kilde til smerterne i håndfladen.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

ADDUCTOR POLLICIS

Musculus adductor pollicis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Adduktion af tommelfingeren (pincetgreb)

UDSPRING

3. metacarpalknogle og håndrodsknoglerne.

TILHÆFTNING

Tommelfingerens grundphalanx (ulnarsiden).

INNERVATION

N. ulnaris (C8–Th1).

TRIGGERPUNKT

I hudfolden mellem tommel- og pegefinger (første interdigitale rum).

REFERERET SMERTE

- Ydersiden af tommelfingeren
- Tommelfingerbasis

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Pincetgreb mellem tommel- og pegefinger

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Klodsethed ved finmotoriske bevægelser
- Smerte ved skrivning eller pincetgreb

KLINISK TIP Hyppig efter brug af mobiltelefon, skrivning og syning. Anbefal udstrækning af fingrene i pauserne.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

OPPONENS POLLICIS

Musculus opponens pollicis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Opposition af tommelfingeren

UDSPRING

Os trapezium og retinaculum flexorum.

TILHÆFTNING

Radialkanten af 1. metacarpalknogle.

INNERVATION

N. medianus (C8–Th1).

TRIGGERPUNKT

I thenar, på håndens radialside.

REFERERET SMERTE

- Volarsiden af tommelfingeren
- Volarradiale del af håndleddet

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Flad palpation i thenar
- Bed om opposition: tommelfingeren rører lillefingeren

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Nedsat gribekraft
- Smerte ved at åbne et syltetøjsglas

KLINISK TIP Ved karpaltunnelsyndrom kan thenarmusklerne blive svækket: vurder også kraften.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

INTEROSSEI (HÅNDEN)

Mm. interossei dorsales et palmares manus

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

○ Triggerpunkt (X) ● Primært smerteområde ● Udbredelsesområde

FUNKTION

- Abduktion og adduktion af fingrene
- Fleksion i MCP-leddene og ekstension i IP-leddene

UDSPRING

De modstående flader af metacarpalknoglerne.

TILHÆFTNING

Grundphalanger og fingrenes dorsalaponeurose.

INNERVATION

N. ulnaris (C8–Th1).

TRIGGERPUNKT

Mellem metacarpalknoglerne, dorsalt og volart.

REFERERET SMERTE

- Siderne af fingrene helt ud til yderleddene
- Området ved Heberdens knuder

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Pincetgreb mellem metacarpalknoglerne

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Stive fingre
- Smerte på siderne af fingrene

KLINISK TIP Fingersmerter ligner ofte ledsmerter, men kan være muskulære: palpér rummene mellem metacarpalknoglerne.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KROPSREGION

RYG, RYGSØJLE OG TRUNCUS

Kort 48–60 · 13 muskler

SERRATUS POSTERIOR SUPERIOR

Musculus serratus posterior superior

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Løfter de øvre ribben under indånding

UDSPRING

Processus spinosi C7–Th3.

TILHÆFTNING

2.–5. ribben.

INNERVATION

Interkostalnerver (Th2–Th5).

TRIGGERPUNKT

Under den øvre del af scapula; kun tilgængelig, når scapula trækkes frem.

REFERERET SMERTE

- Dybt under scapula
- Bagsiden af overarmen
- Lillefingeren

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Siddende, armene krydset foran brystet
- Palpér under scapulas mediale kant

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Dyb, konstant smerte under scapula
- Følelsesløshed i lillefingeren

KLINISK TIP Kan ikke palperes uden at flytte scapula: når armene krydses, kommer musklen frem.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

SERRATUS POSTERIOR INFERIOR

Musculus serratus posterior inferior

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Trækker de nedre ribben nedad og bagud

UDSPRING

Processus spinosi Th11–L2.

TILHÆFTNING

9.–12. ribben.

INNERVATION

Interkostalnerver (Th9–Th12).

TRIGGERPUNKT

Over de nedre ribben, lateralt for rygsøjlen.

REFERERET SMERTE

- Lokal, stikkende smerte over de nedre ribben

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Maveliggende
- Flad palpation over de nedre ribben

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Murrende smerte over ribbenene
- Smerte ved rotation

KLINISK TIP Kan gøre ondt, selv når lændeundersøgelsen er negativ: palpér over ribbenene.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 50 · RYG, RYGSØJLE OG TRUNCUS

ILIOCOSTALIS THORACIS

Musculus iliocostalis thoracis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Ekstension af rygsøjlen
- Ipsilateral lateralfleksion

UDSPRING

Angulus costae på de 6 nederste ribben.

TILHÆFTNING

Angulus costae på de 6 øverste ribben og processus transversus på C7.

INNERVATION

Bageste grene af spinalnerverne (rami dorsales).

TRIGGERPUNKT

I den midterste og nederste thorakalcolumna, lateralt for rygsøjlen.

REFERERET SMERTE

- Mod scapula
- Fortil, på samme side af maven

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Maveliggende
- Flad palpation langs ribbenenes anguli

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte i thorakalryggen
- Mavesmerter, der ligner viscerale smerter

KLINISK TIP Ved mavesmerter med negativ medicinsk udredning bør du også tænke på rygmusklerne.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 51 · RYG, RYGSØJLE OG TRUNCUS

ILIOCOSTALIS LUMBORUM

Musculus iliocostalis lumborum

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Ekstension og lateralfleksion af lænden

UDSPRING

Crista iliaca og sacrum.

TILHÆFTNING

Angulus costae på de 6 nederste ribben.

INNERVATION

Bageste grene af spinalnerverne (lumbale).

TRIGGERPUNKT

I højde med L1, lateralt for rygsøjlen.

REFERERET SMERTE

- Mod midten af ballen
- Nederste del af lænden

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Maveliggende, pude under maven
- Flad palpation i länderegionen

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Lændesmerter, der breder sig til ballen
- Smerte ved løft

KLINISK TIP En del lændesmerter kan brede sig til ballen uden at være iskias.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 52 · RYG, RYGSØJLE OG TRUNCUS

LONGISSIMUS THORACIS

Musculus longissimus thoracis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



○ Triggerpunkt (X) ● Primært smerteområde ● Udbredelsesområde

FUNKTION

- Ekstension af rygsøjlen
- Ipsilateral lateralfleksion

UDSPRING

Sacrum, crista iliaca, processus spinosi på lændehvirvlerne.

TILHÆFTNING

Processus transversi på brysthvirvlerne og ribbenene.

INNERVATION

Bageste grene af spinalnerverne (rami dorsales).

TRIGGERPUNKT

I højde med Th10–L1, 2–4 cm fra midtlinjen.

REFERERET SMERTE

- Længere nede, over glutealmusklen
- SI-leddsregionen

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Maveliggende
- Dyb flad palpation ved siden af midtlinjen

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte i nederste del af lænden og i ballen
- Stivhed efter lang tids stående

KLINISK TIP Smerten opstår nogle segmenter under triggerpunktet: let efter det højere oppe.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

MULTIFIDUS

Musculus multifidus

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Segmental stabilisering af hvirvlerne
- Ekstension og rotation af rygsøjlen

UDSPRING

Sacrum, spina iliaca, processus transversi.

TILHÆFTNING

Processus spinosi 2–4 niveauer højere oppe.

INNERVATION

Bageste grene af spinalnerverne (rami dorsales).

TRIGGERPUNKT

Lige ved siden af processus spinosi, i dybden.

REFERERET SMERTE

- Lokal smerte ved siden af rygsøjlen
- Sacrum og halebenet

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Maveliggende
- Dyb palpation lige ved siden af processus spinosus

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Segmental, punktformet rygsmerte
- Smerte i halebenet

KLINISK TIP Ved kroniske lændesmerter atrofierer den ofte: stabiliseringsøvelser er afgørende.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

ROTATORES OG INTERSPINALES

Mm. rotatores et interspinales

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

○ Triggerpunkt (X) ● Primært smerteområde ● Udbredelsesområde

FUNKTION

- Fin rotation og ekstension af hvirvlerne
- Proprioception

UDSPRING

Processus transversi (rotatores), processus spinosi (interspinales).

TILHÆFTNING

Processus spinosus på nabohvirvlen.

INNERVATION

Bageste grene af spinalnerverne (rami dorsales).

TRIGGERPUNKT

Dybt mellem processus spinosi.

REFERERET SMERTE

- Rygsøjlens midtlinje i det tilsvarende niveau

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Maveliggende
- Tryk mellem og ved siden af processus spinosi

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte i rygsøjlens midtlinje
- Hvirvel, der er øm ved perkussion

KLINISK TIP Ved midtlinjesmerter, der er ømme ved perkussion, skal du altid udelukke en knoglemæssig årsag (fx fraktur).

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

QUADRATUS LUMBORUM

Musculus quadratus lumborum

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Ipsilateral lateralfleksion af lænden
- Løfter bækkenet
- Stabiliserer 12. ribben under indånding

UDSPRING

Crista iliaca og ligamentum iliolumbale.

TILHÆFTNING

12. ribben og processus transversi L1–L4.

INNERVATION

Forreste grene Th12–L3.

TRIGGERPUNKT

Mellem 12. ribben og crista iliaca, lateralt for erector spinae.

REFERERET SMERTE

- SI-leddet
- Nederste del af ballen
- Crista iliaca
- Trochanter major

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Sideliggende, den øverste arm over hovedet
- Palpér under den laterale kant af erector spinae

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Kraftige lændesmerter ved løft
- Smerte ved hoste
- Kan ikke sove på siden

KLINISK TIP Hyppig årsag til akut «hold i ryggen». Tjek benlængdeforskel og bækkenets stilling.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

RECTUS ABDOMINIS

Musculus rectus abdominis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Fleksion af truncus
- Øger det intraabdominale tryk
- Kontrol af bækkenet

UDSPRING

Symphysis pubica og crista pubica.

TILHÆFTNING

Brusken på 5.–7. ribben og processus xiphoideus.

INNERVATION

Interkostalnerver (Th7–Th12).

TRIGGERPUNKT

Over navlen, ved siden af navlen og over skambenet.

REFERERET SMERTE

- Vandret bånd over ryggen
- Omkring navlen
- Nederste del af maven og lænden

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende, knæene bøjede
- Pincetgreb i kanten af mavemusklen
- Når hovedet løftes, spændes musklen

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Oppustethedsfornemmelse
- Smerte, der ligner mavekramper
- Lændesmerter med udgangspunkt fortil

KLINISK TIP Ved mavesmerter skal du altid udelukke indre årsager; først derefter undersøger du bugvæggen.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 57 · RYG, RYGSØJLE OG TRUNCUS

OBLIQUUS EXTERNUS ABDOMINIS

Musculus obliquus externus abdominis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Kontralateral rotation af truncus
- Fleksion af truncus
- Øger det intraabdominale tryk

UDSPRING

Ydersiden af 5.–12. ribben.

TILHÆFTNING

Crista iliaca, ligamentum inguinale, linea alba.

INNERVATION

Interkostalnerver (Th7–Th12), n. iliohypogastricus.

TRIGGERPUNKT

Langs de nedre ribben og nær lysken.

REFERERET SMERTE

- Epigastriet (ligner halsbrand)
- Lysken og nederste del af maven

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende
- Pincetgreb i den laterale bugvæg

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte, der ligner halsbrand
- Smerte i lysken

KLINISK TIP Hyppig hos idrætsudøvere (rotationsbevægelser). Udeluk indre årsager.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

INTERCOSTALES

Mm. intercostales externi et interni

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Løfter og sænker ribbenene under respiration
- Stabiliserer brystvæggen

UDSPRING

Nederste kant af ribbenet ovenover.

TILHÆFTNING

Øverste kant af ribbenet nedenunder.

INNERVATION

Interkostalnerver.

TRIGGERPUNKT

I interkostalrummene i det smertende niveau.

REFERERET SMERTE

- Lokal smerte langs interkostalrummet

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Flad palpation i interkostalrummet
- Dyb vejrtrækning øger ømheden

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Jag ved vejrtrækning
- Smerte efter hoste

KLINISK TIP Ved kraftig og afgrænset smerte skal du udelukke ribbensfraktur og et tidligt stadie af helvedesild.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

DIAPHRAGMA

Diaphragma

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Den vigtigste inspirationsmuskel

UDSPRING

Processus xiphoideus, de 6 nederste ribben, lændehvirvlerne.

TILHÆFTNING

Centrum tendineum.

INNERVATION

N. phrenicus (C3–C5).

TRIGGERPUNKT

Fortil under ribbenskurven (arcus costalis), med forsigtig palpation under udånding.

REFERERET SMERTE

- Langs arcus costalis
- Toppen af skulderen

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende, knæene bøjede
- Palpér under udånding opad under arcus costalis

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Jag i siden
- Smerte ved dyb vejrtrækning

KLINISK TIP Høj brystvejrtrækning viser, at diaphragma arbejder utilstrækkeligt: lær patienten abdominal (diafragmatisk) vejrtrækning.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

STERNALIS

Musculus sternalis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Ingen væsentlig funktion

UDSPRING

Sternum og forsiden af ribbensbruskene.

TILHÆFTNING

Brystfascien, varierende.

INNERVATION

Nn. pectorales eller interkostalnerver.

TRIGGERPUNKT

Over sternum, i midtlinjen.

REFERERET SMERTE

- Hele sternum
- Øverste del af brystkassen
- Indersiden af overarmen

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Flad palpation over sternum

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte bag sternum
- Trykken for brystet

KLINISK TIP Ved trykken for brystet FØRST lægeundersøgelse (hjertet). Musklen undersøger du først derefter.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KROPSREGION

BÆKKEN, HOFTE OG BALDER

Kort 61–74 · 14 muskler

GLUTEUS MAXIMUS

Musculus gluteus maximus

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Ekstension af hoften
- Udadrotation af låret
- Stabilisering af bækkenet

UDSPRING

Bageste del af os ilium, sacrum, halebenet.

TILHÆFTNING

Tuberositas glutea på femur og tractus iliotibialis.

INNERVATION

N. gluteus inferior (L5–S2).

TRIGGERPUNKT

Ved siden af sacrum, over tuber ischiadicum og i den nederste mediale del.

REFERERET SMERTE

- Sacrum og SI-leddet
- Hele glutealregionen
- Halebenet

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Side- eller maveliggende
- Flad palpation eller pincetgreb

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte ved siddende stilling
- Smerte ved gang op ad bakke

KLINISK TIP Hyppig efter lang tids siddende; pauser fra siddende arbejde og aktivering af hofteekstensorerne hjælper.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 62 · BÆKKEN, HOFTE OG BALDER

GLUTEUS MEDIUS

Musculus gluteus medius

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Abduktion af hoften
- Holder bækkenet vandret under gang

UDSPRING

Ydersiden af os ilium.

TILHÆFTNING

Trochanter major.

INNERVATION

N. gluteus superior (L4–S1).

TRIGGERPUNKT

Lige under crista iliaca, i tre punkter forfra og bagud.

REFERERET SMERTE

- Langs crista iliaca
- SI-leddet
- Midten og siden af glutealregionen

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Sideliggende
- Flad palpation under crista iliaca

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Lændesmerter ved gang
- Kan ikke ligge på den smertende side

KLINISK TIP Ved Trendelenburgs tegn (bækkenet falder) er den svag: styrk den med benløft i sideliggende.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

GLUTEUS MINIMUS

Musculus gluteus minimus

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Abduktion og indadrotation af hoften

UDSPRING

Ydersiden af os ilium (forreste del).

TILHÆFTNING

Forkanten af trochanter major.

INNERVATION

N. gluteus superior (L4–S1).

TRIGGERPUNKT

Dybt under gluteus medius, i den forreste og den bageste del.

REFERERET SMERTE

- Ydersiden af lår og underben ned til anklen
- Bagsiden af låret og læggen

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Sideliggende
- Dyb palpation under gluteus medius

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte, der ligner iskias
- Smerte og halten, når patienten rejser sig

KLINISK TIP Den hyppigste muskulære årsag til «pseudoiskias». Ved neurologiske tegn (følelsesløshed, tab af reflekser) er en lægeundersøgelse nødvendig.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

PIRIFORMIS

Musculus piriformis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Udadrotation af låret
- Abduktion, når hoften er flekteret

UDSPRING

Forsiden af sacrum.

TILHÆFTNING

Øverste kant af trochanter major.

INNERVATION

N. ad m. piriformem (S1–S2).

TRIGGERPUNKT

I den mediale og den laterale tredjedel af linjen mellem sacrum og trochanter major.

REFERERET SMERTE

- SI-leddsregionen
- Hele glutealregionen
- Bagsiden af låret

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Sideliggende, det øverste ben bøjet
- Dyb palpation gennem glutealmusklen

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte ved siddende stilling
- Følelsesløshed på bagsiden af benet (piriformissyndrom)

KLINISK TIP N. ischiadicus løber under eller gennem musklen: ved kompression kan der opstå iskiaslignende symptomer.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

DYBE UDADROTATORER (GEMELLI OG OBTURATOR INTERNUS)

Mm. gemelli et obturator internus

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Udadrotation af låret
- Stabilisering af caput femoris

UDSPRING

Spina ischiadica, indersiden af membrana obturatoria, tuber ischiadicum.

TILHÆFTNING

Medialsiden af trochanter major.

INNERVATION

N. ad m. obturatorium internum (L5–S2).

TRIGGERPUNKT

Under piriformis, bag trochanter major.

REFERERET SMERTE

- Dybt i den nederste del af glutealregionen
- Bagsiden af hoften

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Maveliggende, knæet bøjet
- Dyb palpation bag trochanteren

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Dyb glutealsmerte
- Ubehag ved siddende stilling

KLINISK TIP Er ofte påvirket sammen med piriformis; behandles med den samme udstrækning.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

QUADRATUS FEMORIS

Musculus quadratus femoris

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Udadrotation af låret

UDSPRING

Tuber ischiadicum.

TILHÆFTNING

Crista intertrochanterica.

INNERVATION

N. ad m. quadratum femoris (L4–S1).

TRIGGERPUNKT

Mellem tuber ischiadicum og trochanter major.

REFERERET SMERTE

- Omkring tuber ischiadicum
- Bagsiden af hoften

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Maveliggende
- Dyb palpation lateralt for tuber ischiadicum

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte i sædeknoglen, når patienten sidder

KLINISK TIP Ved smerte omkring tuber ischiadicum skal du skelne den fra et problem i hasemusklernes sener.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 67 · BÆKKEN, HOFTE OG BALDER

TENSOR FASCIAE LATAE

Musculus tensor fasciae latae

REFEREret SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Fleksion, abduktion og indadrotation af hoften
- Strammer tractus iliotibialis

UDSPRING

Spina iliaca anterior superior (SIAS).

TILHÆFTNING

Tractus iliotibialis.

INNERVATION

N. gluteus superior (L4–S1).

TRIGGERPUNKT

Under og bag spina iliaca anterior superior.

REFEREret SMERTE

- Ydersiden af hoften
- Ydersiden af låret ned til knæet

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Ryg- eller sideliggende
- Flad palpation under spina iliaca anterior superior

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Hoftesmerter
- Smerte ved hurtig gang

KLINISK TIP Hos løbere bør du undersøge den sammen med iliotibialbåndsyndrom (ITB-syndrom).

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

ILIOPSOAS

Musculus iliopsoas

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Fleksion af hoften
- Stabilisering af lænden

UDSPRING

Psoas: hvirvlerne Th12–L4; iliacus: fossa iliaca.

TILHÆFTNING

Trochanter minor.

INNERVATION

Plexus lumbalis (L1–L3), n. femoralis.

TRIGGERPUNKT

I lysken under ligamentum inguinale og gennem bugvæggen over psoas.

REFERERET SMERTE

- Lodret bånd langs rygsøjlen
- Sacrum
- Forsiden af låret

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende, knæene bøjede
- Palpér dybt og langsomt under udånding gennem bugvæggen
- Hold dig væk fra aorta abdominalis (puls)

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Lændesmerter, der forværres ved stående og lindres ved liggende
- Svært ved at rette sig op, når patienten rejser sig fra siddende

KLINISK TIP Lang tids siddende forkorter den: lær patienten udstrækning af hoftefleksorerne i udfaldsstilling.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

PECTINEUS

Musculus pectineus

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Adduktion og fleksion af låret

UDSPRING

Pecten ossis pubis.

TILHÆFTNING

Linea pectinea på femur.

INNERVATION

N. femoralis (L2–L3), nogle gange n. obturatorius.

TRIGGERPUNKT

Under lysken, i den øverste mediale del af låret.

REFERERET SMERTE

- Dybt i lysken

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende, benet let abduceret
- Palpér medialt for a. femoralis

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte i lysken
- Smerte ved siddende med krydsede ben

KLINISK TIP Ved lyskesmerter skal du først lede efter en muskulær årsag, når brok og årsager fra hofteleddet er udelukket.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

ADDUCTOR LONGUS OG BREVIS

Mm. adductores longus et brevis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Adduktion af låret
- Hjælper ved fleksion af hoften

UDSPRING

Skambenet (os pubis).

TILHÆFTNING

Linea aspera på femur.

INNERVATION

N. obturatorius (L2–L4).

TRIGGERPUNKT

I den øverste tredjedel af lårets inderside.

REFERERET SMERTE

- Lysken
- Indersiden af låret
- Indersiden af knæet og skinnebenet

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende, knæet bøjet og faldet ud til siden
- Pincetgreb på indersiden af låret

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Trækkende fornemmelse i lysken
- Smerte ved trappegang op

KLINISK TIP Hyppig hos fodboldspillere: forebygges med gradvis belastning og styrketræning af adduktorerne.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

ADDUCTOR MAGNUS

Musculus adductor magnus

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Adduktion af låret
- Ekstension af hoften (bageste fibre)

UDSPRING

Ramus inferior ossis pubis og tuber ischiadicum.

TILHÆFTNING

Linea aspera og tuberculum adductorium.

INNERVATION

N. obturatorius og n. ischiadicus (L2–L4).

TRIGGERPUNKT

På indersiden af låret, midt på og højt oppe.

REFERERET SMERTE

- Lysken
- Indersiden af låret
- Dybt i bækkenet

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende, benet abduceret
- Palpér på den posteromediale side af låret

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte på indersiden af låret
- Ubehag i bækkenet

KLINISK TIP Ved smerter inde i bækkenet skal du udelukke gynækologiske og urologiske årsager.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

GRACILIS

Musculus gracilis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Adduktion af låret
- Fleksion og indadrotation af knæet

UDSPRING

Ramus inferior ossis pubis.

TILHÆFTNING

Pes anserinus (medialsiden af tibia).

INNERVATION

N. obturatorius (L2–L3).

TRIGGERPUNKT

Midt på lårets inderside.

REFERERET SMERTE

- Brændende, overfladisk smerte på indersiden af låret

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende, benet abduceret
- Pincetgreb

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Brænden på indersiden af låret

KLINISK TIP Skeln den fra pes anserinus-bursitis: smerten fra gracilis breder sig over hele låret.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

SARTORIUS

Musculus sartorius

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Fleksion, abduktion og udadrotation af hoften
- Fleksion af knæet

UDSPRING

Spina iliaca anterior superior (SIAS).

TILHÆFTNING

Pes anserinus.

INNERVATION

N. femoralis (L2–L3).

TRIGGERPUNKT

I flere punkter langs musklens forløb.

REFERERET SMERTE

- Prikkende, overfladisk smerte, der løber skråt over forsiden af låret

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende
- Pincetgreb langs det skrå forløb

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Prikken i låret
- Følelsesløshed på ydersiden af låret (n. cutaneus femoris lateralis)

KLINISK TIP N. cutaneus femoris lateralis løber tæt på spina iliaca anterior superior: kan efterligne symptomer på meralgia paraesthetica.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 74 · BÆKKEN, HOFTE OG BALDER

BÆKKENBUNDSMUSKLER

Mm. levator ani et coccygeus

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Støtter bækkenorganerne
- Understøtter kontinensen

UDSPRING

Skambenet, arcus tendineus, spina ischiadica.

TILHÆFTNING

Halebenet og ligamentum anococcygeum.

INNERVATION

Plexus sacralis (S3–S4).

TRIGGERPUNKT

Ved siden af halebenet og på bækkenets indervæg; intern palpation udføres kun af en uddannet fagperson.

REFERERET SMERTE

- Halebenet
- Nederste del af sacrum
- Dybt i bækkenet

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Ekstern palpation ved siden af halebenet
- Intern undersøgelse er en opgave for en uddannet behandler

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte i halebenet ved siddende stilling
- Trykfornemmelse i bækkenet

KLINISK TIP Intern behandling må kun udføres af en bækkenbundsbehandler med passende uddannelse. En undersøgelse hos speciallæge anbefales.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KROPSREGION

LÅR, UNDERBEN OG FOD

Kort 75–102 · 28 muskler

KORT 75 · LÅR, UNDERBEN OG FOD

RECTUS FEMORIS

Musculus rectus femoris

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Ekstension af knæet
- Fleksion af hoften

UDSPRING

Spina iliaca anterior inferior.

TILHÆFTNING

Patella og tuberositas tibiae (ligamentum patellae).

INNERVATION

N. femoralis (L2–L4).

TRIGGERPUNKT

I den øverste del af låret under lysken.

REFERERET SMERTE

- Omkring patella og dybt i knæet

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende
- Flad palpation i den øverste forreste del af låret

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Knæsmerter ved trappegang ned
- Natlige knæsmerter

KLINISK TIP Kilden til smerter forrest i knæet sidder ofte højt oppe på låret: palpér længere oppe.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 76 · LÅR, UNDERBEN OG FOD

VASTUS MEDIALIS

Musculus vastus medialis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Ekstension af knæet
- Medial stabilisering af patella

UDSPRING

Labium mediale lineae asperae.

TILHÆFTNING

Patellas mediale kant og ligamentum patellae.

INNERVATION

N. femoralis (L2–L4).

TRIGGERPUNKT

Over patella medialt og midt på låret.

REFERERET SMERTE

- Indersiden af knæet
- Den mediale forreste del af låret

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende, knæet let bøjet
- Flad palpation over knæet medialt

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Knæet «giver efter» (buckling)
- Knæsmerter ved dybt squat

KLINISK TIP Når «knæet giver efter», skyldes det ofte ikke en ledbåndsskade, men et triggerpunkt i vastus medialis.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 77 · LÅR, UNDERBEN OG FOD

VASTUS LATERALIS

Musculus vastus lateralis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Ekstension af knæet

UDSPRING

Trochanter major, labium laterale lineae asperae.

TILHÆFTNING

Patellas laterale kant og ligamentum patellae.

INNERVATION

N. femoralis (L2–L4).

TRIGGERPUNKT

På ydersiden af låret, i hele musklens længde.

REFERERET SMERTE

- Ydersiden af låret
- Ydersiden af knæet
- Patellas laterale kant

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Sideliggende
- Flad palpation på ydersiden af låret

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Kan ikke ligge på den smertende side
- Patella «låser»

KLINISK TIP Kan trække patella lateralt: behandl den sammen med styrketræning af indersiden.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 78 · LÅR, UNDERBEN OG FOD

VASTUS INTERMEDIUS

Musculus vastus intermedius

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Ekstension af knæet

UDSPRING

Forsiden og ydersiden af femur.

TILHÆFTNING

Patellas øverste kant.

INNERVATION

N. femoralis (L2–L4).

TRIGGERPUNKT

Dybt under rectus femoris, i den øverste del af låret.

REFERERET SMERTE

- Midt på forsiden af låret

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende
- Skub rectus femoris til side og palpér dybt

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Svært ved at strække knæet helt
- Smerte, når patienten rejser sig

KLINISK TIP På grund af den dybe placering bliver den ofte overset ved undersøgelsen.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 79 · LÅR, UNDERBEN OG FOD

BICEPS FEMORIS

Musculus biceps femoris

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) Primært smerteområde Udbredelsesområde

FUNKTION

- Fleksion af knæet
- Ekstension af hoften (caput longum)

UDSPRING

Caput longum: tuber ischiadicum; caput breve: linea aspera.

TILHÆFTNING

Caput fibulae.

INNERVATION

N. ischiadicus (L5–S2).

TRIGGERPUNKT

I den nederste halvdel af lårets posterolaterale side.

REFERERET SMERTE

- Bag knæet
- Bagsiden af låret

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Maveliggende
- Pincetgreb på lårets posterolaterale side

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte bag knæet ved gang
- Smerte efter siddende stilling

KLINISK TIP Ved lang tids siddende kan stolekanten trykke på den: tjek siddehøjden.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 80 · LÅR, UNDERBEN OG FOD

SEMITENDINOSUS OG SEMIMEMBRANOSUS

Mm. semitendinosus et semimembranosus

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Fleksion og indadrotation af knæet
- Ekstension af hoften

UDSPRING

Tuber ischiadicum.

TILHÆFTNING

Medialsiden af tibia (pes anserinus) og condylus medialis.

INNERVATION

N. ischiadicus (L5–S2).

TRIGGERPUNKT

I den nederste halvdel af lårets posteromediale side.

REFERERET SMERTE

- Nederste del af glutealregionen
- Bagsiden af låret
- Indersiden af knæ og læg

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Maveliggende
- Pincetgreb på lårets posteromediale side

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte ved siddende stilling
- Smerte ved gang

KLINISK TIP Hasemusklerne er ofte spændte; ud over udstrækning beskytter excentrisk styrketræning mod skader.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

POPLITEUS

Musculus popliteus

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- «Låser» knæet op fra fuld ekstension (indadrotation)
- Bageste stabilisering af knæet

UDSPRING

Condylus lateralis femoris.

TILHÆFTNING

Bagsiden af tibia.

INNERVATION

N. tibialis (L4–S1).

TRIGGERPUNKT

I den nederste del af knæhasen (fossa poplitea), mellem gastrocnemius-hovederne, medialt.

REFERERET SMERTE

- Bag knæet

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Maveliggende, knæet let bøjet
- Dyb palpation i knæhasen (undgå tryk på karrene)

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte ved gang ned ad bakke
- Smerte ved dybt squat

KLINISK TIP Hvis knæhasen er hævet eller varm, skal du udelukke Bakers cyste og dyb venetrombose.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 82 · LÅR, UNDERBEN OG FOD

GASTROCNEMIUS

Musculus gastrocnemius

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Plantarfleksion af foden
- Hjælper ved fleksion af knæet

UDSPRING

Condylus medialis og lateralis femoris.

TILHÆFTNING

Tuber calcanei (akillessenen).

INNERVATION

N. tibialis (S1–S2).

TRIGGERPUNKT

I de to hoveder, i den øverste del af læggen.

REFERERET SMERTE

- Indersiden af fodbuen
- Bag knæet
- Læggen

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Maveliggende
- Pincetgreb på lægmusklens hoveder

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Natlige lægkramper
- Smerte ved gang op ad bakke

KLINISK TIP Bag natlige lægkramper ligger der ofte et triggerpunkt: udstrækning om aftenen anbefales.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

SOLEUS

Musculus soleus

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Plantarfleksion af foden (især med bøjet knæ)
- Venepumpe

UDSPRING

Caput fibulae og bagsiden af tibia.

TILHÆFTNING

Tuber calcanei (akillessenen).

INNERVATION

N. tibialis (S1–S2).

TRIGGERPUNKT

I den nederste del af læggen over akillessenen og højere oppe.

REFERERET SMERTE

- Hælen
- Læggen
- Sjældent SI-leddet

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Maveliggende, knæet bøjet 90°
- Pincetgreb under gastrocnemius

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Hælsmerter
- Smerte ved trappegang op

KLINISK TIP Kilden til hælsmerter er ikke altid foden: undersøg også soleus.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

PLANTARIS

Musculus plantaris

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Hjælper ved plantarfleksion af foden

UDSPRING

Linea supracondylaris lateralis femoris.

TILHÆFTNING

Tuber calcanei.

INNERVATION

N. tibialis (S1–S2).

TRIGGERPUNKT

I knæhasen lateralt, ved siden af gastrocnemius' laterale hoved.

REFERERET SMERTE

- Bag knæet
- Øverste del af læggen

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Maveliggende
- Palpér i den laterale del af knæhasen

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte bag knæet

KLINISK TIP Mangler ofte; undersøg også de andre smertekilder i knæhasen.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 85 · LÅR, UNDERBEN OG FOD

TIBIALIS ANTERIOR

Musculus tibialis anterior

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Dorsalfleksion af foden
- Supination af foden

UDSPRING

Ydersiden af tibia.

TILHÆFTNING

Os cuneiforme mediale og 1. metatarsalknogle.

INNERVATION

N. peroneus profundus (L4–L5).

TRIGGERPUNKT

I den øverste tredjedel af underbenets forside, lateralt for skinnebenet.

REFERERET SMERTE

- Forsiden af anklen
- Storetåen
- Skinnebenet

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende
- Flad palpation ved siden af skinnebenet

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Snublen, fornemmelse af «dropfod»
- Smerte ved skinnebenet efter løb

KLINISK TIP Ved «shin splints» bør du undersøge tibialis anterior og også tjekke løbeskoene.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 86 · LÅR, UNDERBEN OG FOD

TIBIALIS POSTERIOR

Musculus tibialis posterior

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Opretholder fodbuen
- Supination af foden

UDSPRING

Bagsiden af tibia og fibula, membrana interossea.

TILHÆFTNING

Tuberositas ossis navicularis og fodens knogler.

INNERVATION

N. tibialis (L4–L5).

TRIGGERPUNKT

Dybt under læggen; kan kun palperes indirekte.

REFERERET SMERTE

- Akillessenen
- Hele fodsålen
- Læggen

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Maveliggende
- Dyb indirekte palpation langs tibias bagkant

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Fodsmerter ved gang
- Platfod

KLINISK TIP Ved platfod overbelastes den ofte: egnede sko og indlæg er vigtige.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

PERONEUS LONGUS

Musculus fibularis (peroneus) longus

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Pronation af foden
- Plantarfleksion af foden
- Opretholder fodbuen

UDSPRING

Caput fibulae og ydersiden af fibula.

TILHÆFTNING

1. metatarsalknogle og os cuneiforme mediale.

INNERVATION

N. peroneus superficialis (L5–S1).

TRIGGERPUNKT

2–3 cm under caput fibulae.

REFERERET SMERTE

- Omkring og bag den laterale malleol
- Ydersiden af foden

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Sideliggende
- Flad palpation langs fibula

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Ustabilitetsfornemmelse i anklen
- Tilbagevendende smerte efter forstuvning

KLINISK TIP N. peroneus løber omkring caput fibulae: læg ikke kraftigt eller langvarigt tryk der.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

PERONEUS BREVIS

Musculus fibularis (peroneus) brevis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Pronation af foden
- Plantarfleksion af foden

UDSPRING

De nederste to tredjedele af fibula.

TILHÆFTNING

Tuberositas ossis metatarsalis V.

INNERVATION

N. peroneus superficialis (L5–S1).

TRIGGERPUNKT

I den nederste tredjedel af underbenets yderside.

REFERERET SMERTE

- Den laterale malleol
- Ydersiden af foden

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Sideliggende
- Flad palpation langs den nederste del af fibula

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Ustabilitet i anklen
- Smerte på ujævnt underlag

KLINISK TIP Efter en ankelforstuvning er styrketræning og balancetræning afgørende.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 89 · LÅR, UNDERBEN OG FOD

PERONEUS TERTIUS

Musculus fibularis (peroneus) tertius

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Dorsalfleksion af foden
- Pronation af foden

UDSPRING

Nederste tredjedel af fibula.

TILHÆFTNING

Basis af 5. metatarsalknogle (dorsalsiden).

INNERVATION

N. peroneus profundus (L5–S1).

TRIGGERPUNKT

I den nederste tredjedel af underbenets anterolaterale side.

REFERERET SMERTE

- Forsiden af anklen
- Ydersiden af hælen

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende
- Flad palpation ved siden af extensor digitorum longus

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte foran på anklen

KLINISK TIP Undersøg den sammen med extensor digitorum longus.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 90 · LÅR, UNDERBEN OG FOD

EXTENSOR DIGITORUM LONGUS

Musculus extensor digitorum longus

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Ekstension af 2.–5. tå
- Dorsalfleksion af foden

UDSPRING

Condylus lateralis tibiae, forsiden af fibula.

TILHÆFTNING

Dorsalaponeurosen på 2.–5. tå.

INNERVATION

N. peroneus profundus (L5–S1).

TRIGGERPUNKT

På underbenets anterolaterale side, ca. 8 cm under knæet.

REFERERET SMERTE

- Fodryggen
- De midterste tæer

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende
- Bed patienten løfte tæerne: båndet bliver mærkbart

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte på fodryggen
- Krampelignende fornemmelse fortil

KLINISK TIP Snævre sko og stramme snørebånd kan irritere den: tjek skoene.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 91 · LÅR, UNDERBEN OG FOD

EXTENSOR HALLUCIS LONGUS

Musculus extensor hallucis longus

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Ekstension af storetåen
- Dorsalfleksion af foden

UDSPRING

Midterste del af fibula.

TILHÆFTNING

Distale phalanx på storetåen.

INNERVATION

N. peroneus profundus (L5–S1).

TRIGGERPUNKT

I den midterste og nederste del af underbenets forside.

REFERERET SMERTE

- Fodryggen
- Storetåen

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende
- Bed patienten løfte storetåen

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte i storetåen
- Smerte efter løb

KLINISK TIP Udeluk en ledårsag: stiv storetå (hallux rigidus).

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

FLEXOR DIGITORUM LONGUS

Musculus flexor digitorum longus

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Fleksion af 2.–5. tå
- Plantarfleksion af foden

UDSPRING

Bagsiden af tibia.

TILHÆFTNING

Distale phalanger på 2.–5. tå.

INNERVATION

N. tibialis (L5–S2).

TRIGGERPUNKT

Dybt på indersiden af læggen, bag tibia.

REFERERET SMERTE

- Midt på fodsålen
- De små tæer

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Maveliggende
- Palpér bag tibias mediale kant

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Fodsmerter ved gang
- Kramper i tæerne

KLINISK TIP Ved platfod overbelastes den ofte.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 93 · LÅR, UNDERBEN OG FOD

FLEXOR HALLUCIS LONGUS

Musculus flexor hallucis longus

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Fleksion af storetåen
- Opretholder fodbuen

UDSPRING

Bagsiden af fibula.

TILHÆFTNING

Distale phalanx på storetåen.

INNERVATION

N. tibialis (L5–S2).

TRIGGERPUNKT

Dybt i den nederste del af læggen, lateralt.

REFERERET SMERTE

- Plantarsiden af storetåen
- Basis af storetåen

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Maveliggende
- Dyb palpation i den nederste del af læggen

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte i storetåen fra fodsålen
- Smerte ved stående på tæerne

KLINISK TIP Overbelastes ofte hos dansere og løbere.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

EXTENSOR DIGITORUM BREVIS

Musculus extensor digitorum brevis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Hjælper ved ekstension af 2.–4. tå

UDSPRING

Dorsalsiden af calcaneus.

TILHÆFTNING

Ekstensorsenerne til 2.–4. tå.

INNERVATION

N. peroneus profundus (L5–S1).

TRIGGERPUNKT

På fodryggen, foran den laterale malleol.

REFERERET SMERTE

- Lokal smerte på fodryggen

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende
- Flad palpation foran den laterale malleol

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte på fodryggen i skoen

KLINISK TIP En stram skotunge kan trykke på den: det hjælper at løsne snørebåndene.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 95 · LÅR, UNDERBEN OG FOD

ABDUCTOR HALLUCIS

Musculus abductor hallucis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Abduktion af storetåen
- Opretholder den mediale fodbue

UDSPRING

Tuber calcanei (processus medialis).

TILHÆFTNING

Proksimale phalanx på storetåen (medialt).

INNERVATION

N. plantaris medialis (S1–S2).

TRIGGERPUNKT

På fodens mediale kant, foran hælen.

REFERERET SMERTE

- Indersiden af hælen
- Den mediale fodbue

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende, foden drejet udad
- Flad palpation på fodens mediale kant

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte på indersiden af foden ved gang

KLINISK TIP Løber tæt på tarsaltunnelen: ved følelsesløshed bør du også undersøge n. tibialis.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 96 · LÅR, UNDERBEN OG FOD

FLEXOR DIGITORUM BREVIS

Musculus flexor digitorum brevis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Fleksion af 2.–5. tå
- Opretholder fodbuen

UDSPRING

Tuber calcanei.

TILHÆFTNING

Midterste phalanger på 2.–5. tå.

INNERVATION

N. plantaris medialis (S1–S2).

TRIGGERPUNKT

Midt på fodsålen, under plantarfascien.

REFERERET SMERTE

- Metatarsalhovederne (forfoden)

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Maveliggende
- Dyb palpation midt på fodsålen

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte i forfoden
- Smerte efter lang tids stående

KLINISK TIP Skeln den fra plantar fasciitis.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

QUADRATUS PLANTAE

Musculus quadratus plantae

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Korrigerer trækretningen for flexor digitorum longus

UDSPRING

Plantarsiden af calcaneus.

TILHÆFTNING

Senen fra flexor digitorum longus.

INNERVATION

N. plantaris lateralis (S1–S2).

TRIGGERPUNKT

Dybt foran hælen, midt på fodsålen.

REFERERET SMERTE

- Plantarsiden af hælen

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Maveliggende
- Dyb palpation foran hælen

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Hælsmerter om morgenen

KLINISK TIP Ved hælsmerter (hælspore) kan quadratus plantae også bidrage.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 98 · LÅR, UNDERBEN OG FOD

ABDUCTOR DIGITI MINIMI (FOD)

Musculus abductor digiti minimi pedis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Abduktion og fleksion af lilletåen

UDSPRING

Tuber calcanei.

TILHÆFTNING

Proksimale phalanx på lilletåen.

INNERVATION

N. plantaris lateralis (S1–S2).

TRIGGERPUNKT

På fodens laterale kant.

REFERERET SMERTE

- Fodens laterale kant
- Caput på 5. metatarsalknogle

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Sideliggende
- Pincetgreb på fodens laterale kant

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte på ydersiden af foden

KLINISK TIP Snævre sko kan trykke på fodens laterale kant.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 99 · LÅR, UNDERBEN OG FOD

INTEROSSEI PEDIS

Mm. interossei pedis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Abduktion og adduktion af tæerne
- Stabilisering af metatarsofalangealleddene

UDSPRING

Sideflader af metatarsalknoglerne.

TILHÆFTNING

Proksimale phalanger på tæerne.

INNERVATION

N. plantaris lateralis (S1–S2).

TRIGGERPUNKT

Mellem metatarsalknoglerne, på dorsal- og plantarsiden.

REFERERET SMERTE

- Siderne af tæerne
- Metatarsalregionen

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Palpér mellem metatarsalknoglerne

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte i tæerne
- Følelsesløshed mellem tæerne

KLINISK TIP Skeln dem fra Mortons neurom (følelsesløshed mellem tæerne).

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 100 · LÅR, UNDERBEN OG FOD

ADDUCTOR HALLUCIS

Musculus adductor hallucis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Adduktion af storetåen
- Opretholder den tværgående fodbue

UDSPRING

Basis af 2.–4. metatarsalknogle og tæernes ledkapsler.

TILHÆFTNING

Proksimale phalanx på storetåen (lateralt).

INNERVATION

N. plantaris lateralis (S1–S2).

TRIGGERPUNKT

Dybt under forfoden.

REFERERET SMERTE

- Forfoden under metatarsalhovederne

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Maveliggende
- Dyb palpation i forfoden

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte i forfoden
- Smerte i højhælede sko

KLINISK TIP Når den tværgående fodbue falder, overbelastes den ofte; tåøvelser (samle et håndklæde op med tæerne) hjælper.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

EXTENSOR HALLUCIS BREVIS

Musculus extensor hallucis brevis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Ekstension af storetåens metatarsofalangealled

UDSPRING

Dorsalsiden af calcaneus.

TILHÆFTNING

Proksimale phalanx på storetåen.

INNERVATION

N. peroneus profundus (L5–S1).

TRIGGERPUNKT

På fodryggen, medialt for extensor digitorum brevis.

REFERERET SMERTE

- Fodryggen over storetåens basis

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Rygliggende
- Flad palpation på fodryggen

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte på fodryggen over storetåen

KLINISK TIP Er ofte påvirket sammen med extensor digitorum brevis.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.

KORT 102 · LÅR, UNDERBEN OG FOD

FLEXOR HALLUCIS BREVIS

Musculus flexor hallucis brevis

REFERERET SMERTE OG TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primært smerteområde · Udbredelsesområde

FUNKTION

- Fleksion af storetåens metatarsofalangealled
- Opretholder den mediale fodbue

UDSPRING

Os cuboideum og os cuneiforme laterale.

TILHÆFTNING

Proksimale phalanx på storetåen (via sesamknoglerne).

INNERVATION

N. plantaris medialis (S1–S2).

TRIGGERPUNKT

På fodsålens mediale side, under 1. metatarsalknogle.

REFERERET SMERTE

- Caput på 1. metatarsalknogle
- Storetåen

PALPATION AF TRIGGERPUNKTET

- Maveliggende
- Palpér under 1. metatarsalknogle

LEDSAGENDE SYMPTOMER

- Smerte i afsætsfasen

KLINISK TIP Skeln den fra sesamoiditis.

Undervisningsmateriale til opslag. Erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller en undersøgelse hos en kvalificeret behandler.