SEGURIDAD CON CADA PACIENTE™

Momentos difíciles en sesión: 25 situaciones

Qué puedes hacer y qué evitar cuando el paciente llora, se encierra en el silencio, se enoja o dice algo totalmente inesperado.

Atlas Terapéutico Visual · Material educativo; no reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional de la salud habilitado.

Índice

1 · Principio fundamental

2 · 25 situaciones

Próximo paso

PARTE 1

Principio fundamental

Calma, curiosidad, seguridad.

1. Baja el ritmo: un momento difícil no es un fracaso, es una parte natural del trabajo.
2. Curiosidad en lugar de juicio.
3. Cuando está en juego la seguridad, todo lo demás pasa a segundo plano.
4. Lleva a supervisión lo que te resuena por dentro.

PARTE 2

25 situaciones

Qué pasa, qué puedes hacer, qué evitar.

1. El paciente se pone a llorar

momento difícil

QUÉ PASA

Aparece una emoción intensa, muchas veces señal de alivio o de seguridad.

QUÉ PUEDES HACER

- Mantén la calma, dale lugar y tiempo al silencio.
- Ofrece un pañuelo de papel, pero sin apuro.
- «Aquí puedes llorar con total tranquilidad».

QUÉ EVITAR

«No llores, no pasó nada».

2. Silencio prolongado

momento difícil

QUÉ PASA

El paciente está pensando, está bloqueado o le cuesta expresarse.

QUÉ PUEDES HACER

- Espera al menos 20–30 segundos.
- «¿En qué estás pensando en este momento?»
- «No tienes que responder enseguida».

QUÉ EVITAR

Cambiar de tema rápido por la propia incomodidad.

3. El paciente está enojado contigo

momento difícil

QUÉ PASA

El enojo aparece directamente en la relación, y eso es una valiosa oportunidad terapéutica.

QUÉ PUEDES HACER

- No te pongas a la defensiva enseguida.
- «Veo que estás enojado conmigo. Cuéntame qué pasó».
- Valida la parte en la que el paciente tiene razón.

QUÉ EVITAR

«No quise decir eso» (justificarse de inmediato).

4. Llega tarde o falta a las sesiones

momento difícil

QUÉ PASA

Resistencia, falta de recursos u obstáculos prácticos.

QUÉ PUEDES HACER

- Pregunta sin juzgar.
- «¿Qué hizo difícil llegar a horario?»
- Vuelvan a hablar del encuadre y de las reglas del proceso.

QUÉ EVITAR

Retar o hacer como si nada.

5. «Esto no funciona»

momento difícil

QUÉ PASA
Decepción o impaciencia con el proceso hasta ahora.

QUÉ PUEDES HACER
- Tómalo en serio.
- «¿Qué faltó respecto de lo que esperabas?»
- Revisen juntos los objetivos terapéuticos.

QUÉ EVITAR
«Solo tienes que tener un poco de paciencia».

6. Habla sin parar, no hay forma de intervenir

momento difícil

QUÉ PASA
Ansiedad, temas sin resolver o evitación de un contacto más profundo.

QUÉ PUEDES HACER
- Interrumpe el flujo con delicadeza.
- «Detengámonos un momento en este punto».
- Elijan un tema central para profundizar.

QUÉ EVITAR
Dejar toda la sesión librada a un flujo verbal continuo.

7. Habla solo de otras personas

momento difícil

QUÉ PASA
Dificultad para conectar con las propias experiencias y emociones.

QUÉ PUEDES HACER
- «¿Qué sentiste en ese momento?»
- Vuelve a llevar la atención a la experiencia interna del paciente.
- Acepta si en esta etapa todavía le resulta demasiado difícil.

QUÉ EVITAR
Juzgar o criticar a terceros junto con el paciente.

8. Te hace una pregunta personal

momento difícil

QUÉ PASA
Necesidad de conexión, curiosidad o deseo de correr el foco de sí mismo.

QUÉ PUEDES HACER
- Responde breve y con sinceridad, dentro de los límites profesionales.
- «¿Por qué es importante para ti esta pregunta en este momento?»
- Vuelve a llevar la atención al proceso del paciente.

QUÉ EVITAR
Una autorrevelación extensa sobre las propias experiencias personales.

9. Trae un regalo

momento difícil

QUÉ PASA
Gratitud, vínculo o intento de equilibrar la relación.

QUÉ PUEDES HACER
- Ten presentes tus lineamientos éticos.
- Agradece y explora, si corresponde, el significado del gesto.
- Si tienes dudas, llévalo a supervisión.

QUÉ EVITAR
Rechazar el regalo con frialdad y aire de superioridad.

10. Saca algo importante al final de la sesión

momento difícil

QUÉ PASA

Comunicación en la puerta: más tranquilizadora porque ya no hay tiempo para profundizar.

QUÉ PUEDES HACER

- Reconoce la importancia de lo que compartió.
- «Esto es fundamental. Empecemos por aquí en la próxima sesión».
- Si tiene que ver con la seguridad, abórdalo de inmediato.

QUÉ EVITAR

Extender la sesión por costumbre.

11. Se avergüenza de lo que dijo

momento difícil

QUÉ PASA

Repliegue defensivo después de mostrar una vulnerabilidad.

QUÉ PUEDES HACER

- «Gracias por compartir esto conmigo».
- Normaliza la experiencia, sin juicio ni evaluación.
- Pregúntale cómo se siente en este momento.

QUÉ EVITAR

Seguir adelante rápido, como si no hubiera pasado nada.

12. No hace las tareas para casa

momento difícil

QUÉ PASA

La tarea era excesiva, poco adecuada o apareció una resistencia.

QUÉ PUEDES HACER

- Explora la situación con curiosidad amable.
- «¿Qué se interpuso?»
- Reduce la tarea a un formato más simple.

QUÉ EVITAR

Culpabilizar y sermonear.

13. El mismo tema en cada sesión

momento difícil

QUÉ PASA

Estancamiento en un callejón sin salida, o el tema real todavía no se tocó.

QUÉ PUEDES HACER

- Nombra el patrón que se repite.
- «Noto que volvemos seguido a este punto. ¿A qué crees que se debe?»
- Busquen juntos una perspectiva nueva.

QUÉ EVITAR

Mostrar aburrimiento o impaciencia.

14. El paciente te idealiza

momento difícil

QUÉ PASA

Fuerte vínculo de apego que con el tiempo puede llevar a la decepción.

QUÉ PUEDES HACER

- Recíbelo, pero sin alimentar la admiración.
- Destaca el papel activo y el esfuerzo del paciente.
- Lleva el tema a supervisión.

QUÉ EVITAR

Complacerse en ser idealizado.

15. El paciente te desvaloriza

momento difícil

QUÉ PASA

Mecanismo de defensa, reactivación de heridas relacionales previas.

QUÉ PUEDES HACER

- No lo tomes como un ataque personal.
- «¿Qué te faltó hasta ahora en nuestro trabajo juntos?»
- Curiosidad en lugar de ponerte a la defensiva.

QUÉ EVITAR

Contraatacar u ofenderse.

16. Disociación durante la sesión

momento difícil

QUÉ PASA

El paciente «se ausenta», parece desconectado.

QUÉ PUEDES HACER

- Baja el ritmo.
- Anclaje: los pies bien apoyados en el suelo, nombrar objetos de la sala.
- No sigas con el tema emocionalmente exigente.

QUÉ EVITAR

Insistir en seguir con el tema difícil.

17. Ataque de pánico durante la sesión

momento difícil

QUÉ PASA

Síntomas somáticos fuertes de ansiedad aguda.

QUÉ PUEDES HACER

- Mantén la calma, habla con un tono tranquilizador y firme.
- Exhalaciones lentas y prolongadas juntos.
- Pide asistencia médica si los síntomas son inusuales o no ceden.

QUÉ EVITAR

«Cálmate, recupérate».

18. Refiere conductas autolesivas

momento difícil

QUÉ PASA

Cuestión de seguridad inmediata.

QUÉ PUEDES HACER

- Haz preguntas directas con un tono calmo.
- Evalúa el nivel de riesgo actual.
- Consulta la ficha Señales de alarma; ante un peligro inmediato, llama al número de emergencias de tu país.

QUÉ EVITAR

Evitar el tema por miedo a la confrontación.

19. Ideación peligrosa para sí o para otros

momento difícil

QUÉ PASA

Cuestión de seguridad inmediata.

QUÉ PUEDES HACER

- No te quedes solo para enfrentar esta situación.
- Sigue el procedimiento de derivación paso a paso.
- Ante un peligro inmediato, llama enseguida al número de emergencias de tu país.

QUÉ EVITAR

Prometer confidencialidad absoluta en cualquier circunstancia.

20. Llega a la sesión bajo el efecto de sustancias

momento difícil

QUÉ PASA

La sesión pierde eficacia y pueden aparecer riesgos para la seguridad.

QUÉ PUEDES HACER

- Nombra con calma lo que observas.
- Interrumpe la sesión y asegúrate de que el paciente vuelva a casa de forma segura.
- Retoma lo ocurrido en la sesión siguiente.

QUÉ EVITAR

Hacer sentir culpa y sermonear.

21. Quiere dejar la terapia

momento difícil

QUÉ PASA

Insatisfacción, mejoría en su funcionamiento o un momento de crisis en el proceso.

QUÉ PUEDES HACER

- Explora con respeto y apertura.
- «¿Qué te ayudaría a tomar la mejor decisión para ti?»
- Propón una sesión de cierre.

QUÉ EVITAR

Retenerlo a la fuerza apelando a la culpa.

22. Rechaza toda propuesta

momento difícil

QUÉ PASA

Necesidad de autonomía, mecanismo de resistencia.

QUÉ PUEDES HACER

- No entres en discusiones ni en luchas de poder.
- «¿Qué te parecería razonable hacer en esta situación?»
- Ofrece opciones concretas para elegir.

QUÉ EVITAR

Lucha de poder y necesidad de tener razón.

23. Quiere resolver todo ya

momento difícil

QUÉ PASA

Impaciencia, deseo de eliminar de inmediato las emociones difíciles.

QUÉ PUEDES HACER

- Valida la urgencia que siente el paciente.
- Planifica pasos pequeños y realistas.
- Hablen de cuál es un ritmo de cambio sostenible.

QUÉ EVITAR

Prometer soluciones rápidas.

24. Un familiar quiere participar de la sesión

momento difícil

QUÉ PASA

Cuestión de confianza y de encuadre terapéutico.

QUÉ PUEDES HACER

- Pregúntale al paciente a solas qué quiere realmente.
- Explica con claridad los límites de la confidencialidad y del secreto profesional.
- Tomen una decisión compartida.

QUÉ EVITAR

Tomar decisiones por encima del paciente.

25. El tema te toca en lo personal

momento difícil

QUÉ PASA

Experiencias personales del terapeuta todavía sin resolver.

QUÉ PUEDES HACER

- Registra tu reacción emocional.
- Mantén el foco en la historia del paciente.
- Lleva la situación a supervisión.

QUÉ EVITAR

Contar la propia historia a costa del paciente.

Próximo paso

Esta semana: marca las tres situaciones que te resultan más exigentes y reléelas antes de la próxima sesión.