SEGURIDAD CON CADA PACIENTE™

Señales de alarma: cuándo derivar al paciente a otro profesional

Síntomas ante los cuales los mapas no deberían ser el primer paso, y procedimiento de derivación paso a paso.

Atlas Terapéutico Visual · Material educativo; no reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional de la salud habilitado.

Índice

1 · Regla fundamental

2 · Por área

3 · Procedimiento de derivación

Próximo paso

PARTE 1

Regla fundamental

Si tienes dudas, no tomes decisiones solo.

Por qué es importante

Un profesional competente no resuelve todos los problemas solo: sabe reconocer cuándo la situación requiere otro tipo de ayuda. Derivar al servicio o al colega adecuado es un acto de cuidado, no un fracaso.

PARTE 2

Por área

Revísalo con cada paciente nuevo.

Siempre, sin importar el área

Si detectas estas señales: no te quedes solo, deriva al paciente a otro profesional

- [ ] Ideación suicida, planificación o intentos previos
- [ ] Autolesiones y autoagresión
- [ ] Violencia ejercida o sufrida (en especial si involucra a menores)
- [ ] Pérdida de contacto con la realidad (alucinaciones, delirios)
- [ ] Alteraciones graves del sueño, la alimentación o el funcionamiento sostenidas durante semanas

Ansiedad y estrés

Si detectas estas señales: no te quedes solo, deriva al paciente a otro profesional

- [ ] Síntomas somáticos sin explicación médica (dolor de pecho, desmayos)
- [ ] Uso de alcohol o ansiolíticos para calmar la ansiedad
- [ ] Aislamiento extremo: el paciente no sale de su casa

Ánimo y emociones

Si detectas estas señales: no te quedes solo, deriva al paciente a otro profesional

- [ ] Ánimo bajo constante durante varias semanas, anhedonia, sensación de impotencia
- [ ] Euforia inusual, menor necesidad de dormir, conductas de riesgo
- [ ] Explosiones de enojo descontrolado que representan un peligro

Vínculos y familia

Si detectas estas señales: no te quedes solo, deriva al paciente a otro profesional

- [ ] Señales de violencia en la pareja o en la familia
- [ ] Conductas de control o amenazas en el entorno del paciente
- [ ] Peligro para la protección o la seguridad de menores

Trauma y seguridad

Si detectas estas señales: no te quedes solo, deriva al paciente a otro profesional

- [ ] Síntomas agudos que aparecieron justo después de un hecho traumático reciente
- [ ] Estados disociativos frecuentes
- [ ] El paciente todavía vive en una situación de peligro inminente

Cuerpo y conducta alimentaria

Si detectas estas señales: no te quedes solo, deriva al paciente a otro profesional

- [ ] Pérdida de peso importante, rechazo de la comida, vómito autoinducido
- [ ] Actividad física compulsiva a pesar de lesiones y agotamiento
- [ ] Malestares físicos sin un control médico previo

Duelo y pérdida

Si detectas estas señales: no te quedes solo, deriva al paciente a otro profesional

- [ ] La persona en duelo expresa deseos de morir, quiere «reunirse» con quien falleció
- [ ] Deterioro persistente del funcionamiento diario durante varios meses
- [ ] Uso de alcohol o sustancias para anestesiar el dolor

PARTE 3

Procedimiento de derivación

Con calma, de forma directa y en colaboración activa con el paciente.

1. **Pregunta abiertamente.** Preguntar por la ideación suicida no aumenta el riesgo de que se concrete.
2. **Evalúa el nivel de riesgo actual:** ¿hay un plan, acceso a medios, un plazo definido o intentos previos?
3. **Ante un peligro inmediato:** llama al número de emergencias de tu país y no dejes al paciente sin supervisión.
4. **Si no hay peligro inmediato:** acuerda un plan de derivación junto con el paciente (médico de cabecera, servicio de salud mental, guardia hospitalaria).
5. **Toma nota y documenta** los síntomas observados, el desarrollo de la entrevista y las medidas acordadas.
6. **Lleva la situación a supervisión** y cuida tu propio espacio emocional.

Próximo paso

Hoy: imprime la versión de una página y cuélgala en un lugar visible de tu consultorio o lugar de trabajo.