Señales de alarma

Si detectas alguna de estas señales: no te quedes solo, deriva al paciente a otro profesional.

Ante un peligro inmediato: llama al número de emergencias de tu país. No dejes solo al paciente hasta que llegue la ayuda.

Siempre, sin importar el área

- Ideación suicida, planificación o intentos previos
- Autolesiones y autoagresión
- Violencia ejercida o sufrida (en especial si involucra a menores)
- Pérdida de contacto con la realidad (alucinaciones, delirios)
- Alteraciones graves del sueño, la alimentación o el funcionamiento sostenidas durante semanas

Ansiedad y estrés

- Síntomas somáticos sin explicación médica (dolor de pecho, desmayos)
- Uso de alcohol o ansiolíticos para calmar la ansiedad
- Aislamiento extremo: el paciente no sale de su casa

Ánimo y emociones

- Ánimo bajo constante durante varias semanas, anhedonia, sensación de impotencia
- Euforia inusual, menor necesidad de dormir, conductas de riesgo
- Explosiones de enojo descontrolado que representan un peligro

Vínculos y familia

- Señales de violencia en la pareja o en la familia
- Conductas de control o amenazas en el entorno del paciente
- Peligro para la protección o la seguridad de menores

Trauma y seguridad

- Síntomas agudos que aparecieron justo después de un hecho traumático reciente
- Estados disociativos frecuentes
- El paciente todavía vive en una situación de peligro inminente

Cuerpo y conducta alimentaria

- Pérdida de peso importante, rechazo de la comida, vómito autoinducido
- Actividad física compulsiva a pesar de lesiones y agotamiento
- Malestares físicos sin un control médico previo

Duelo y pérdida

- La persona en duelo expresa deseos de morir, quiere «reunirse» con quien falleció
- Deterioro persistente del funcionamiento diario durante varios meses
- Uso de alcohol o sustancias para anestesiar el dolor