REFERERAD SMÄRTA · BAKHUVUD OCH NACKE

Gör det ont i bakhuvudet eller nacken?

> *Smärtans källa sitter ofta inte där du känner den. De här musklerna kan referera smärta hit:*

Trapezius – övre fibrer

Var: Ovanför skuldergördeln, mitt emellan nacken och akromion, i den övre fria kanten.

Sternocleidomastoideus (SCM)

Var: Längs muskelbuken, särskilt i den sternala och den klavikulära delen; den ömmaste punkten ligger i mittersta tredjedelen.

Splenius cervicis

Var: I nackens nedre del, ovanför skulderbladets övre vinkel, bredvid levator scapulae.

Suboccipitala muskler

Var: Precis under nackbenet, till höger och vänster om mittlinjen, på djupet.

Semispinalis capitis

Var: I nacken, 2–3 cm från mittlinjen, nedanför nackknölen och mitt på nacken.

Fråga din terapeut vilken muskel som ger just dina besvär. Triggerpunktsatlas · utbildningsillustration, ersätter inte en läkarundersökning.

REFERERAD SMÄRTA · HUVUD: PANNA, TINNING, HJÄSSA

Har du ont i huvudet?

> *Smärtans källa sitter ofta inte där du känner den. De här musklerna kan referera smärta hit:*

Trapezius – övre fibrer

Var: Ovanför skuldergördeln, mitt emellan nacken och akromion, i den övre fria kanten.

Sternocleidomastoideus (SCM)

Var: Längs muskelbuken, särskilt i den sternala och den klavikulära delen; den ömmaste punkten ligger i mittersta tredjedelen.

Masseter

Var: I det ytliga lagret under arcus zygomaticus och ovanför underkäksvinkeln; i det djupa lagret framför käkleden.

Temporalis

Var: Ovanför arcus zygomaticus i fyra zoner, framifrån och bakåt; palperas lätt när patienten tuggar.

Splenius capitis

Var: På nackens bakre sida, mellan SCM och trapezius, cirka 2–3 fingerbredder nedanför protuberantia occipitalis externa.

Fråga din terapeut vilken muskel som ger just dina besvär. Triggerpunktsatlas · utbildningsillustration, ersätter inte en läkarundersökning.

REFERERAD SMÄRTA · ANSIKTE, TÄNDER OCH KÄKE

Gör det ont i tänderna eller käken?

> *Smärtans källa sitter ofta inte där du känner den. De här musklerna kan referera smärta hit:*

Trapezius – övre fibrer

Var: Ovanför skuldergördeln, mitt emellan nacken och akromion, i den övre fria kanten.

Sternocleidomastoideus (SCM)

Var: Längs muskelbuken, särskilt i den sternala och den klavikulära delen; den ömmaste punkten ligger i mittersta tredjedelen.

Masseter

Var: I det ytliga lagret under arcus zygomaticus och ovanför underkäksvinkeln; i det djupa lagret framför käkleden.

Temporalis

Var: Ovanför arcus zygomaticus i fyra zoner, framifrån och bakåt; palperas lätt när patienten tuggar.

Pterygoideus lateralis

Var: Djupt under arcus zygomaticus; intraoralt bakom de övre molarerna, uppåt och bakåt.

Fråga din terapeut vilken muskel som ger just dina besvär. Triggerpunktsatlas · utbildningsillustration, ersätter inte en läkarundersökning.

REFERERAD SMÄRTA · AXELNS FRAMSIDA OCH BRÖSTKORG

Gör det ont på framsidan av axeln?

> *Smärtans källa sitter ofta inte där du känner den. De här musklerna kan referera smärta hit:*

Skalenusmusklerna (scaleni)

Var: På sidan av halsen, bakom och nedanför SCM, ovanför nyckelbenet.

Infraspinatus

Var: På skulderbladets baksida, under spina scapulae, i mellersta och övre delen av fossa infraspinata.

Pectoralis major

Var: I bröstmuskelns laterala kant (främre armhålsvecket), under nyckelbenet och bredvid bröstbenet.

Pectoralis minor

Var: Under processus coracoideus, över 3:e–5:e revbenet, djupt under pectoralis major.

Biceps brachii

Var: I mittersta tredjedelen av överarmens framsida, i båda huvudena.

Fråga din terapeut vilken muskel som ger just dina besvär. Triggerpunktsatlas · utbildningsillustration, ersätter inte en läkarundersökning.

REFERERAD SMÄRTA · AXELNS BAKSIDA OCH SKULDERBLAD

Gör det ont vid skulderbladet eller på baksidan av axeln?

> *Smärtans källa sitter ofta inte där du känner den. De här musklerna kan referera smärta hit:*

Levator scapulae

Var: Strax medialt om och ovanför skulderbladets övre vinkel; på sidan av nacken, djupt under trapezius övre kant.

Skalenusmusklerna (scaleni)

Var: På sidan av halsen, bakom och nedanför SCM, ovanför nyckelbenet.

Supraspinatus

Var: Ovanför spina scapulae, i den mediala delen av fossa supraspinata och lateralt under akromion.

Teres minor

Var: Vid skulderbladets laterala kant, nedanför infraspinatus, ovanför det bakre armhålsvecket.

Subscapularis

Var: På skulderbladets framsida; du når den från armhålan, längs skulderbladets laterala kant.

Fråga din terapeut vilken muskel som ger just dina besvär. Triggerpunktsatlas · utbildningsillustration, ersätter inte en läkarundersökning.

REFERERAD SMÄRTA · ÖVERARM OCH ARMBÅGE

Gör det ont i armbågen eller överarmen?

> *Smärtans källa sitter ofta inte där du känner den. De här musklerna kan referera smärta hit:*

Skalenusmusklerna (scaleni)

Var: På sidan av halsen, bakom och nedanför SCM, ovanför nyckelbenet.

Infraspinatus

Var: På skulderbladets baksida, under spina scapulae, i mellersta och övre delen av fossa infraspinata.

Supraspinatus

Var: Ovanför spina scapulae, i den mediala delen av fossa supraspinata och lateralt under akromion.

Teres minor

Var: Vid skulderbladets laterala kant, nedanför infraspinatus, ovanför det bakre armhålsvecket.

Subscapularis

Var: På skulderbladets framsida; du når den från armhålan, längs skulderbladets laterala kant.

Fråga din terapeut vilken muskel som ger just dina besvär. Triggerpunktsatlas · utbildningsillustration, ersätter inte en läkarundersökning.

REFERERAD SMÄRTA · UNDERARM, HANDLED OCH HAND

Gör det ont i handleden eller handen?

> *Smärtans källa sitter ofta inte där du känner den. De här musklerna kan referera smärta hit:*

Skalenusmusklerna (scaleni)

Var: På sidan av halsen, bakom och nedanför SCM, ovanför nyckelbenet.

Infraspinatus

Var: På skulderbladets baksida, under spina scapulae, i mellersta och övre delen av fossa infraspinata.

Subscapularis

Var: På skulderbladets framsida; du når den från armhålan, längs skulderbladets laterala kant.

Pectoralis minor

Var: Under processus coracoideus, över 3:e–5:e revbenet, djupt under pectoralis major.

Latissimus dorsi

Var: I det bakre armhålsvecket, i höjd med skulderbladets nedre vinkel.

Fråga din terapeut vilken muskel som ger just dina besvär. Triggerpunktsatlas · utbildningsillustration, ersätter inte en läkarundersökning.

REFERERAD SMÄRTA · MELLERSTA RYGGEN OCH BUKEN

Gör det ont mitt i ryggen?

> *Smärtans källa sitter ofta inte där du känner den. De här musklerna kan referera smärta hit:*

Serratus anterior

Var: På bröstkorgens sida, under armhålan, i höjd med 5:e–6:e revbenet.

Trapezius – mellersta fibrer

Var: Mellan skulderbladets mediala kant och ryggraden, i höjd med spina scapulae, ytligt.

Iliocostalis thoracis

Var: Cirka 5–8 cm från ryggraden, i mellersta och nedre bröstryggen.

Iliocostalis lumborum

Var: I ländryggen, cirka 5–7 cm från ryggraden, nedanför de nedre revbenen.

Multifidus

Var: Precis intill taggutskotten, djupt, i valfritt segment av ryggraden (oftast i ländryggen).

Fråga din terapeut vilken muskel som ger just dina besvär. Triggerpunktsatlas · utbildningsillustration, ersätter inte en läkarundersökning.

REFERERAD SMÄRTA · SÄTE, HÖFT OCH LJUMSKE

Gör det ont i höften?

> *Smärtans källa sitter ofta inte där du känner den. De här musklerna kan referera smärta hit:*

Iliocostalis lumborum

Var: I ländryggen, cirka 5–7 cm från ryggraden, nedanför de nedre revbenen.

Longissimus thoracis

Var: 2–4 cm från ryggraden, i nedre bröstryggen och övre ländryggen.

Quadratus lumborum

Var: Mellan nedersta revbenet och höftbenskammen, vid erector spinaes laterala kant, djupt.

Gluteus maximus

Var: I den nedre mediala delen av sätesregionen, intill korsbenet och ovanför sittbensknölen.

Gluteus medius

Var: 2–5 cm nedanför höftbenskammen, i den övre laterala delen av sätesregionen.

Fråga din terapeut vilken muskel som ger just dina besvär. Triggerpunktsatlas · utbildningsillustration, ersätter inte en läkarundersökning.

REFERERAD SMÄRTA · LÄNDRYGG OCH KORSBEN

Gör det ont i ländryggen?

> *Smärtans källa sitter ofta inte där du känner den. De här musklerna kan referera smärta hit:*

Iliocostalis lumborum

Var: I ländryggen, cirka 5–7 cm från ryggraden, nedanför de nedre revbenen.

Longissimus thoracis

Var: 2–4 cm från ryggraden, i nedre bröstryggen och övre ländryggen.

Multifidus

Var: Precis intill taggutskotten, djupt, i valfritt segment av ryggraden (oftast i ländryggen).

Quadratus lumborum

Var: Mellan nedersta revbenet och höftbenskammen, vid erector spinaes laterala kant, djupt.

Rectus abdominis

Var: Ovanför och nedanför naveln, 2–4 cm från mittlinjen.

Fråga din terapeut vilken muskel som ger just dina besvär. Triggerpunktsatlas · utbildningsillustration, ersätter inte en läkarundersökning.

REFERERAD SMÄRTA · LÅR OCH KNÄ

Gör det ont i knät eller låret?

> *Smärtans källa sitter ofta inte där du känner den. De här musklerna kan referera smärta hit:*

Gluteus minimus

Var: Djupt under gluteus medius, mellan höftbenskammen och trochanter major.

Piriformis

Var: I mellersta och laterala tredjedelen av linjen mellan korsbenets laterala kant och spetsen av trochanter major.

Iliopsoas

Var: På lårets framsida nedanför ljumskligamentet (lateralt om femoralisartären) samt i buken, på höftbenets insida.

Tensor fasciae latae (TFL)

Var: På höftens främre laterala del, nedanför spina iliaca anterior superior.

Adductor longus och brevis

Var: På lårets insida, i den övre tredjedelen.

Fråga din terapeut vilken muskel som ger just dina besvär. Triggerpunktsatlas · utbildningsillustration, ersätter inte en läkarundersökning.

REFERERAD SMÄRTA · UNDERBEN, FOTLED OCH FOT

Gör det ont i hälen eller fotsulan?

> *Smärtans källa sitter ofta inte där du känner den. De här musklerna kan referera smärta hit:*

Gluteus minimus

Var: Djupt under gluteus medius, mellan höftbenskammen och trochanter major.

Gastrocnemius

Var: I vadens övre del, på det mediala och laterala huvudet, nedanför knävecket.

Soleus

Var: I vadens nedre del, djupt under gastrocnemius, ovanför hälsenan.

Tibialis anterior

Var: Precis lateralt om skenbenet, i underbenets övre tredjedel.

Peroneus (fibularis) longus

Var: På underbenets utsida, i den övre tredjedelen, 2–4 cm nedanför fibulahuvudet.

Fråga din terapeut vilken muskel som ger just dina besvär. Triggerpunktsatlas · utbildningsillustration, ersätter inte en läkarundersökning.