PATIENTEN FORTSÄTTER HEMMA™

4-veckors Egenvårdsplaner per Besvär

För vart och ett av de 10 vanligaste besvären: en fyraveckorsplan för hemmet som du ger patienten i slutet av behandlingen.

Innehåll

1 · För patienten

2 · 10 planer

Nästa steg

AVSNITT 1

För patienten

Så används planen.

Viktigt

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

AVSNITT 2

10 planer

Tre övningar, fyra veckor, ett tips för varje dag.

Spänningshuvudvärk

1. **Trapezius – övre fibrer:** Sitt rak, håll tag under stolen med handen på den sida som gör ont och luta långsamt huvudet åt andra hållet tills du känner en lätt stretch i sidan av nacken. Håll 30 sekunder, 3 gånger, två gånger om dagen.
2. **Suboccipitala muskler:** Ligg på rygg, lägg två tennisbollar i en strumpa under nacken och vila på dem i 2 minuter. Dra sedan hakan långsamt bakåt 10 gånger.
3. **Temporalis:** När du känner att huvudvärken börjar, massera båda tinningarna långsamt i cirklar i 1 minut och andas djupt.

VECKA	VAD DU GÖR
Vecka 1 · Bekanta dig	Den första övningen 1 gång om dagen. Lägg märke till när smärtan ökar.
Vecka 2 · Regelbundenhet	De två första övningarna 2 gånger om dagen, och följ det dagliga tipset.
Vecka 3 · Hela programmet	Alla tre övningarna 2 gånger om dagen.
Vecka 4 · Underhåll	Alla tre övningarna 1 gång om dagen; anteckna vad som hjälpte dig mest.

> **Varje dag**
> Skärmen i ögonhöjd, 1 minuts paus varje timme, avslappning på kvällen.

Smärta och stelhet i nacken

1. **Levator scapulae:** Vrid huvudet åt andra hållet och titta ner, mot din armhåla. Lägg handen på den sida som gör ont i nacken. Håll 30 sekunder, 3 gånger, två gånger om dagen.
2. **Trapezius – övre fibrer:** Sitt rak, håll tag under stolen med handen på den sida som gör ont och luta långsamt huvudet åt andra hållet tills du känner en lätt stretch i sidan av nacken. Håll 30 sekunder, 3 gånger, två gånger om dagen.

3. **Splenius cervicis:** En gång i timmen: dra hakan rakt bakåt (som om du gör en dubbelhaka) och håll 5 sekunder. 5 gånger.

VECKA	VAD DU GÖR
Vecka 1 · Bekanta dig	Den första övningen 1 gång om dagen. Lägg märke till när smärtan ökar.
Vecka 2 · Regelbundenhet	De två första övningarna 2 gånger om dagen, och följ det dagliga tipset.
Vecka 3 · Hela programmet	Alla tre övningarna 2 gånger om dagen.
Vecka 4 · Underhåll	Alla tre övningarna 1 gång om dagen; anteckna vad som hjälpte dig mest.

> **Varje dag**
> Lägre kudde, ingen mobil mellan axel och öra.

Smärta i käke och ansikte

1. **Masseter:** Massera med fingertopparna i cirklar i 1 minut på kinden, framför och nedanför örsnibben. Var uppmärksam under dagen: om du biter ihop, slappna av i käken och låt tungan vila mot gommen.

2. **Temporalis:** När du känner att huvudvärken börjar, massera båda tinningarna långsamt i cirklar i 1 minut och andas djupt.

3. **Pterygoideus medialis:** Kontrollera några gånger om dagen: tänderna nuddar inte varandra, läpparna är stängda, käken är avslappnad.

VECKA	VAD DU GÖR
Vecka 1 · Bekanta dig	Den första övningen 1 gång om dagen. Lägg märke till när smärtan ökar.
Vecka 2 · Regelbundenhet	De två första övningarna 2 gånger om dagen, och följ det dagliga tipset.
Vecka 3 · Hela programmet	Alla tre övningarna 2 gånger om dagen.
Vecka 4 · Underhåll	Alla tre övningarna 1 gång om dagen; anteckna vad som hjälpte dig mest.

> **Varje dag**
> Var uppmärksam på tandpressning, undvik tuggummi.

Skuldersmärta

1. **Infraspinatus:** Sträck armen som gör ont framför bröstet mot den andra axeln, fatta armbågen med andra handen och dra försiktigt. 30 sekunder, 3 gånger.
2. **Supraspinatus:** Låt armen hänga avslappnad och gör små cirklar fram och tillbaka som en pendel i 1 minut. Två gånger om dagen.
3. **Pectoralis minor:** Sitt ner och dra skulderbladen bakåt och nedåt, som om du vill stoppa dem i bakfickan. Håll 5 sekunder, 10 gånger.

VECKA	VAD DU GÖR
Vecka 1 · Bekanta dig	Den första övningen 1 gång om dagen. Lägg märke till när smärtan ökar.
Vecka 2 · Regelbundenhet	De två första övningarna 2 gånger om dagen, och följ det dagliga tipset.
Vecka 3 · Hela programmet	Alla tre övningarna 2 gånger om dagen.
Vecka 4 · Underhåll	Alla tre övningarna 1 gång om dagen; anteckna vad som hjälpte dig mest.

> **Varje dag**
> Ligg inte på den sida som gör ont, kudde under armen.

Smärta i armbåge och underarm

1. **Underarmens extensorer (ECRL, ECRB, extensor digitorum):** Sträck armen framåt med handflatan nedåt och böj handleden och fingrarna nedåt med andra handen. 30 sekunder, 3 gånger.
2. **Underarmens flexorer:** Sträck armen med handflatan uppåt och dra fingrarna nedåt och bakåt med andra handen. 30 sekunder, 3 gånger.
3. **Triceps brachii:** Lyft armen över huvudet, böj armbågen och tryck den försiktigt bakåt med andra handen. 30 sekunder, 3 gånger.

VECKA	VAD DU GÖR
Vecka 1 · Bekanta dig	Den första övningen 1 gång om dagen. Lägg märke till när smärtan ökar.
Vecka 2 · Regelbundenhet	De två första övningarna 2 gånger om dagen, och följ det dagliga tipset.
Vecka 3 · Hela programmet	Alla tre övningarna 2 gånger om dagen.

VECKA	VAD DU GÖR
Vecka 4 · Underhåll	Alla tre övningarna 1 gång om dagen; anteckna vad som hjälpte dig mest.

> **Varje dag**
> Stretcha underarmen varje timme på jobbet, lösare grepp.

Smärta mellan skulderbladen

1. **Rhomboideus (major och minor):** Krama dig själv som om du fryser och kuta med ryggen tills du känner en stretch mellan skulderbladen. 30 sekunder, 3 gånger.
2. **Trapezius – mellersta fibrer:** Krama om dig själv och runda ryggen. 30 sekunder, 3 gånger. Dra sedan skulderbladen bakåt 10 gånger.
3. **Pectoralis major:** Ställ dig i en dörröppning, lägg underarmen mot karmen i axelhöjd och ta långsamt ett steg framåt tills du känner en stretch i bröstet. 30 sekunder, 3 gånger.

VECKA	VAD DU GÖR
Vecka 1 · Bekanta dig	Den första övningen 1 gång om dagen. Lägg märke till när smärtan ökar.
Vecka 2 · Regelbundenhet	De två första övningarna 2 gånger om dagen, och följ det dagliga tipset.
Vecka 3 · Hela programmet	Alla tre övningarna 2 gånger om dagen.
Vecka 4 · Underhåll	Alla tre övningarna 1 gång om dagen; anteckna vad som hjälpte dig mest.

> **Varje dag**
> Rak sittställning, dra skulderbladen bakåt varje timme.

Ländryggssmärta

1. **Quadratus lumborum:** Stå upp, lyft armen över huvudet och luta dig långsamt åt motsatt sida medan bäckenet stannar på plats. 30 sekunder, 3 gånger.
2. **Iliopsoas:** Ställ dig på ett knä med det andra benet framför dig. Skjut långsamt bäckenet framåt tills du känner en sträckning på framsidan av det bakre låret. 30 sekunder, 3 gånger.
3. **Multifidus:** Stå på alla fyra, sträck ena armen framåt och motsatt ben bakåt och håll i 5 sekunder. 10 gånger per sida.

VECKA	VAD DU GÖR
Vecka 1 · Bekanta dig	Den första övningen 1 gång om dagen. Lägg märke till när smärtan ökar.
Vecka 2 · Regelbundenhet	De två första övningarna 2 gånger om dagen, och följ det dagliga tipset.
Vecka 3 · Hela programmet	Alla tre övningarna 2 gånger om dagen.
Vecka 4 · Underhåll	Alla tre övningarna 1 gång om dagen; anteckna vad som hjälpte dig mest.

> **Varje dag**
> Res dig upp varje timme, lyft med knäna.

Smärta från sätet som strålar ut i låret

1. **Piriformis:** Ligg på rygg, lägg fotleden på det ömma benet över det andra knät och dra det andra låret mot bröstet. 30 sekunder, 3 gånger.
2. **Gluteus minimus:** Ligg på rygg, lägg fotleden på det ömma benet över det andra knät och dra det andra låret mot bröstet. 30 sekunder, 3 gånger.
3. **Gluteus medius:** Stå upp, korsa det ömma benet bakom det andra och skjut höften åt sidan tills du känner en sträckning. 30 sekunder, 3 gånger.

VECKA	VAD DU GÖR
Vecka 1 · Bekanta dig	Den första övningen 1 gång om dagen. Lägg märke till när smärtan ökar.
Vecka 2 · Regelbundenhet	De två första övningarna 2 gånger om dagen, och följ det dagliga tipset.
Vecka 3 · Hela programmet	Alla tre övningarna 2 gånger om dagen.
Vecka 4 · Underhåll	Alla tre övningarna 1 gång om dagen; anteckna vad som hjälpte dig mest.

> **Varje dag**
> Ha inte plånboken i bakfickan, sitt inte med benen i kors.

Knäsmärta

1. **Rectus femoris:** Stå upp, håll i dig i något, ta tag i fotleden och dra hälen mot sätet med knäna bredvid varandra. 30 sekunder, 3 gånger.

2. **Vastus medialis:** Sitt på en stol, sträck långsamt ut knät, håll i 5 sekunder och sänk det. 10 gånger med varje ben.

3. **Vastus lateralis:** Stå upp, ta tag i fotleden och dra hälen mot sätet. 30 sekunder, 3 gånger.

VECKA	VAD DU GÖR
Vecka 1 · Bekanta dig	Den första övningen 1 gång om dagen. Lägg märke till när smärtan ökar.
Vecka 2 · Regelbundenhet	De två första övningarna 2 gånger om dagen, och följ det dagliga tipset.
Vecka 3 · Hela programmet	Alla tre övningarna 2 gånger om dagen.
Vecka 4 · Underhåll	Alla tre övningarna 1 gång om dagen; anteckna vad som hjälpte dig mest.

> **Varje dag**
> Ta trapporna lugnt, öka belastningen gradvis.

Smärta i hälen och fotsulan

1. **Soleus:** Stå framför en vägg, ta det ömma benet bakåt, böj knät lätt och håll hälen i golvet. 30 sekunder, 3 gånger.

2. **Gastrocnemius:** Stå framför en vägg, ta det ömma benet bakåt med knät rakt och hälen i golvet och stöd dig mot väggen. 30 sekunder, 3 gånger.

3. **Flexor digitorum brevis:** Sitt ner och rulla långsamt en tennisboll fram och tillbaka under fotsulan i 2 minuter. En gång om dagen.

VECKA	VAD DU GÖR
Vecka 1 · Bekanta dig	Den första övningen 1 gång om dagen. Lägg märke till när smärtan ökar.
Vecka 2 · Regelbundenhet	De två första övningarna 2 gånger om dagen, och följ det dagliga tipset.
Vecka 3 · Hela programmet	Alla tre övningarna 2 gånger om dagen.
Vecka 4 · Underhåll	Alla tre övningarna 1 gång om dagen; anteckna vad som hjälpte dig mest.

> **Varje dag**
> Bekväma skor, på kvällen massage av fotsulan med en boll.

Nästa steg

För terapeuten: skriv ut den plan som passar nästa patients besvär och boka en återkontroll i slutet av vecka 4.