🚩 Röda Flaggor på En Sida

Om det finns minst en: ingen behandling, remittera patienten till läkare. Sätt upp den här sidan bredvid britsen.

Allmänt

- Feber, frossa, oförklarlig viktnedgång
- Nattlig smärta som inte går över ens i vila
- Tidigare cancer
- Nyligt trauma, fall, skada
- Symtom som snabbt förvärras

Huvud och nacke

- Plötslig, livets värsta huvudvärk
- Störning av syn, tal eller sväljning, svaghet i ansiktet eller i armar och ben
- Nackstelhet med feber
- Verklig rotationskänsla (vertigo) med hörselnedsättning
- Yrsel eller illamående under behandlingen: avbryt omedelbart

Axel och arm

- Smärta i bröstet eller vänster arm vid ansträngning, andnöd, svettningar (hjärtat)
- Svag arm efter trauma
- Ihållande domning eller klumpighet i handen eller fingrarna
- Svullnad, lokal värme kring en led

Rygg och bål

- Domning eller svaghet som strålar ut i benet
- Påverkad urinering eller tarmfunktion, domning i perineum (ridbyxeanestesi): OMEDELBART till läkare
- Buksmärta med feber eller kräkningar
- Smärta i njurområdet med urinvägsbesvär
- Skarp bröstsmärta som är kopplad till andningen

Bäcken och höft

- Utbuktning i ljumsken vid hosta (bråck)
- Begränsad höftrotation, ljumsksmärta (artros)
- Besvär i lilla bäckenet eller gynekologiska besvär
- Graviditet (undvik behandling av buken och bäckenet)

Nedre extremitet

- Ensidig svullnad, lokal värme, rodnad i vaden (trombos): ingen massage
- Efter trauma kan foten inte bära vikt
- Punktformig ömhet i benet som ökar med belastning (stressfraktur)
- Sveda och domning i fotsulan (neurogent, diabetes)