TRYGG MED VARJE PATIENT™

Röda Flaggor: När du Ska Remittera Patienten till Läkare

Tecknen som visar att behandling av triggerpunkter inte är första steget. Per kroppsregion.

Innehåll

1 · Regeln

2 · Per kroppsregion

Nästa steg

AVSNITT 1

Regeln

Om du är osäker, remittera patienten till läkare.

Varför det är viktigt

Myofasciell smärta kan efterlikna många andra tillstånd, och tvärtom. En bra terapeut är inte bra för att hen behandlar allt, utan för att hen vet när ett fall ligger utanför hens kompetensområde.

AVSNITT 2

Per kroppsregion

Kontrollera dem hos varje ny patient.

Allmänt

Remittera till läkare när något av följande finns:

- [ ] Feber, frossa, oförklarlig viktnedgång
- [ ] Nattlig smärta som inte går över ens i vila
- [ ] Tidigare cancer
- [ ] Nyligt trauma, fall, skada
- [ ] Symtom som snabbt förvärras

Huvud och nacke

Remittera till läkare när något av följande finns:

- [ ] Plötslig, livets värsta huvudvärk
- [ ] Störning av syn, tal eller sväljning, svaghet i ansiktet eller i armar och ben
- [ ] Nackstelhet med feber
- [ ] Verklig rotationskänsla (vertigo) med hörselnedsättning
- [ ] Yrsel eller illamående under behandlingen: avbryt omedelbart

Axel och arm

Remittera till läkare när något av följande finns:

- [ ] Smärta i bröstet eller vänster arm vid ansträngning, andnöd, svettningar (hjärtat)
- [ ] Svag arm efter trauma
- [ ] Ihållande domning eller klumpighet i handen eller fingrarna
- [ ] Svullnad, lokal värme kring en led

Rygg och bål

Remittera till läkare när något av följande finns:

- [ ] Domning eller svaghet som strålar ut i benet
- [ ] Påverkad urinering eller tarmfunktion, domning i perineum (ridbyxeanestesi): OMEDELBART till läkare
- [ ] Buksmärta med feber eller kräkningar
- [ ] Smärta i njurområdet med urinvägsbesvär
- [ ] Skarp bröstsmärta som är kopplad till andningen

Bäcken och höft

Remittera till läkare när något av följande finns:

- [ ] Utbuktning i ljumsken vid hosta (bråck)
- [ ] Begränsad höftrotation, ljumsksmärta (artros)
- [ ] Besvär i lilla bäckenet eller gynekologiska besvär
- [ ] Graviditet (undvik behandling av buken och bäckenet)

Nedre extremitet

Remittera till läkare när något av följande finns:

- [ ] Ensidig svullnad, lokal värme, rodnad i vaden (trombos): ingen massage
- [ ] Efter trauma kan foten inte bära vikt
- [ ] Punktformig ömhet i benet som ökar med belastning (stressfraktur)
- [ ] Sveda och domning i fotsulan (neurogent, diabetes)

Nästa steg

I dag: skriv ut ensidesversionen och sätt upp den på din mottagning.