TRIGGERPUNKTSATLAS

100+ visuella kort över refererad smärta

Huvud · Skuldra · Rygg · Bäcken · Ben

INNAN DU BÖRJAR

SÅ ANVÄNDER DU ATLASEN

STRUKTUR

102 kort ordnade i fem kroppsregioner. Varje kort visar en muskel: funktion, ursprung, fäste, innervation, triggerpunktens läge, mönster för refererad smärta, palpationsteknik och associerade symtom.

SNABBSÖKNING

Använd det alfabetiska kliniska registret, PDF:ens bokmärken i sidopanelen (varje muskel med ett klick) eller sök efter symtom: välj var smärtan uppträder och se vilka muskler som är inblandade.

SYMBOLER

Vit cirkel med svart X: triggerpunkt. Kraftigt rött: primär smärtzon. Ljusrött med prickar: spridningszon (spillover).

UTSKRIFT

A4-format, optimerat för 300 DPI. Välj »faktisk storlek« när du skriver ut.

VIKTIGT

Atlasen är framtagen för studier och som referens. Den ersätter inte medicinsk diagnos. Vid bröst-, buk- eller neurologiska symtom ska du alltid först utesluta medicinska orsaker.

INNEHÅLL

PER KROPPSREGION

HUVUD, ANSIKTE OCH NACKE

1. Trapezius – övre fibrer · 2. Sternocleidomastoideus (SCM) · 3. Masseter · 4. Temporalis · 5. Pterygoideus lateralis · 6. Pterygoideus medialis · 7. Splenius capitis · 8. Splenius cervicis · 9. Suboccipitala muskler · 10. Semispinalis capitis · 11. Levator scapulae · 12. Skalenusmusklerna (scaleni) · 13. Digastricus · 14. Occipitofrontalis · 15. Zygomaticus major · 16. Orbicularis oculi · 17. Platysma · 18. Longus colli

SKULDRA, ÖVERARM, UNDERARM OCH HAND

19. Trapezius – mellersta fibrer · 20. Trapezius – nedre fibrer · 21. Supraspinatus · 22. Infraspinatus · 23. Teres minor · 24. Teres major · 25. Subscapularis · 26. Deltoideus · 27. Latissimus dorsi · 28. Rhomboideus (major och minor) · 29. Pectoralis major · 30. Pectoralis minor · 31. Serratus anterior · 32. Subclavius · 33. Coracobrachialis · 34. Biceps brachii · 35. Brachialis · 36. Triceps brachii · 37. Anconeus · 38. Supinator · 39. Brachioradialis · 40. Extensor carpi radialis (longus och brevis) · 41. Extensor digitorum · 42. Flexor carpi radialis och ulnaris · 43. Pronator teres · 44. Palmaris longus · 45. Adductor pollicis · 46. Opponens pollicis · 47. Interossei i handen

RYGG, RYGGRAD OCH BÅL

48. Serratus posterior superior · 49. Serratus posterior inferior · 50. Iliocostalis thoracis · 51. Iliocostalis lumborum · 52. Longissimus thoracis · 53. Multifidus · 54. Rotatores och interspinales · 55. Quadratus lumborum · 56. Rectus abdominis · 57. Obliquus externus abdominis · 58. Interkostalmusklerna · 59. Diafragma · 60. Sternalis

BÄCKEN, HÖFT OCH SÄTE

61. Gluteus maximus · 62. Gluteus medius · 63. Gluteus minimus · 64. Piriformis · 65. Djupa utåtrotatorer (gemelli och obturator internus) · 66. Quadratus femoris · 67. Tensor fasciae latae (TFL) · 68. Iliopsoas · 69. Pectineus · 70. Adductor longus och brevis · 71. Adductor magnus · 72. Gracilis · 73. Sartorius · 74. Bäckenbottenmuskulaturen

LÅR, UNDERBEN OCH FOT

75. Rectus femoris · 76. Vastus medialis · 77. Vastus lateralis · 78. Vastus intermedius · 79. Biceps femoris · 80. Semitendinosus och semimembranosus · 81. Popliteus · 82. Gastrocnemius · 83. Soleus · 84. Plantaris · 85. Tibialis anterior · 86. Tibialis posterior · 87. Peroneus (fibularis) longus · 88. Peroneus (fibularis) brevis · 89. Peroneus (fibularis) tertius · 90. Extensor digitorum longus · 91. Extensor hallucis longus · 92. Flexor digitorum longus · 93. Flexor hallucis longus · 94. Extensor digitorum brevis · 95. Abductor hallucis · 96. Flexor digitorum brevis · 97. Quadratus plantae · 98. Abductor digiti minimi (foten) · 99. Interossei i foten · 100. Adductor hallucis · 101. Extensor hallucis brevis · 102. Flexor hallucis brevis

ALFABETISKT KLINISKT REGISTER

98	Abductor digiti minimi (foten)	Lår
95	Abductor hallucis	Lår
100	Adductor hallucis	Lår
70	Adductor longus och brevis	Bäcken
71	Adductor magnus	Bäcken
45	Adductor pollicis	Skuldra
37	Anconeus	Skuldra
74	Bäckenbottenmuskulaturen	Bäcken
34	Biceps brachii	Skuldra
79	Biceps femoris	Lår
35	Brachialis	Skuldra
39	Brachioradialis	Skuldra
33	Coracobrachialis	Skuldra
26	Deltoideus	Skuldra
59	Diafragma	Rygg
13	Digastricus	Huvud
65	Djupa utåtrotatorer (gemelli och obturator internus)	Bäcken
40	Extensor carpi radialis (longus och brevis)	Skuldra
41	Extensor digitorum	Skuldra
94	Extensor digitorum brevis	Lår
90	Extensor digitorum longus	Lår
101	Extensor hallucis brevis	Lår
91	Extensor hallucis longus	Lår
42	Flexor carpi radialis och ulnaris	Skuldra
96	Flexor digitorum brevis	Lår
92	Flexor digitorum longus	Lår
102	Flexor hallucis brevis	Lår
93	Flexor hallucis longus	Lår
82	Gastrocnemius	Lår
61	Gluteus maximus	Bäcken
62	Gluteus medius	Bäcken
63	Gluteus minimus	Bäcken
72	Gracilis	Bäcken
51	Iliocostalis lumborum	Rygg
50	Iliocostalis thoracis	Rygg
68	Iliopsoas	Bäcken
22	Infraspinatus	Skuldra
58	Interkostalmusklerna	Rygg
99	Interossei i foten	Lår
47	Interossei i handen	Skuldra
27	Latissimus dorsi	Skuldra
11	Levator scapulae	Huvud
52	Longissimus thoracis	Rygg
18	Longus colli	Huvud
3	Masseter	Huvud
53	Multifidus	Rygg
57	Obliquus externus abdominis	Rygg
14	Occipitofrontalis	Huvud
46	Opponens pollicis	Skuldra
16	Orbicularis oculi	Huvud
44	Palmaris longus	Skuldra
69	Pectineus	Bäcken
29	Pectoralis major	Skuldra
30	Pectoralis minor	Skuldra
88	Peroneus (fibularis) brevis	Lår
87	Peroneus (fibularis) longus	Lår

ALFABETISKT KLINISKT REGISTER (FORTS.)

89	Peroneus (fibularis) tertius	Lår
64	Piriformis	Bäcken
84	Plantaris	Lår
17	Platysma	Huvud
81	Popliteus	Lår
43	Pronator teres	Skuldra
5	Pterygoideus lateralis	Huvud
6	Pterygoideus medialis	Huvud
66	Quadratus femoris	Bäcken
55	Quadratus lumborum	Rygg
97	Quadratus plantae	Lår
56	Rectus abdominis	Rygg
75	Rectus femoris	Lår
28	Rhomboideus (major och minor)	Skuldra
54	Rotatores och interspinales	Rygg
73	Sartorius	Bäcken
10	Semispinalis capitis	Huvud
80	Semitendinosus och semimembranosus	Lår
31	Serratus anterior	Skuldra
49	Serratus posterior inferior	Rygg
48	Serratus posterior superior	Rygg
12	Skalenusmusklerna (scaleni)	Huvud
83	Soleus	Lår
7	Splenius capitis	Huvud
8	Splenius cervicis	Huvud
60	Sternalis	Rygg
2	Sternocleidomastoideus (SCM)	Huvud
32	Subclavius	Skuldra
9	Suboccipitala muskler	Huvud
25	Subscapularis	Skuldra
38	Supinator	Skuldra
21	Supraspinatus	Skuldra
4	Temporalis	Huvud
67	Tensor fasciae latae (TFL)	Bäcken
24	Teres major	Skuldra
23	Teres minor	Skuldra
85	Tibialis anterior	Lår
86	Tibialis posterior	Lår
19	Trapezius – mellersta fibrer	Skuldra
20	Trapezius – nedre fibrer	Skuldra
1	Trapezius – övre fibrer	Huvud
36	Triceps brachii	Skuldra
78	Vastus intermedius	Lår
77	Vastus lateralis	Lår
76	Vastus medialis	Lår
15	Zygomaticus major	Huvud

SÖK EFTER SYMTOM

VAR GÖR DET ONT?

Hitta var smärtan uppträder: musklerna i listan är den vanligaste källan till triggerpunkter.

Huvudvärk vid tinningarna
Trapezius – övre fibrer (1), Temporalis (4), Sternocleidomastoideus (SCM) (2), Suboccipitala muskler (9), Semispinalis capitis (10)

Smärta i pannan och runt ögonen
Sternocleidomastoideus (SCM) (2), Occipitofrontalis (14), Orbicularis oculi (16), Zygomaticus major (15), Splenius cervicis (8)

Smärta på hjässan
Splenius capitis (7), Sternocleidomastoideus (SCM) (2)

Smärta i käken och tänderna
Masseter (3), Temporalis (4), Pterygoideus lateralis (5), Pterygoideus medialis (6), Digastricus (13)

Stel nacke
Levator scapulae (11), Trapezius – övre fibrer (1), Splenius capitis (7), Semispinalis capitis (10), Skalenusmusklerna (scaleni) (12)

Yrsel
Sternocleidomastoideus (SCM) (2), Suboccipitala muskler (9)

Halsont och smärta vid sväljning
Pterygoideus medialis (6), Digastricus (13), Longus colli (18)

Smärta mellan skulderbladen
Rhomboideus (major och minor) (28), Trapezius – mellersta fibrer (19), Skalenusmusklerna (scaleni) (12), Serratus posterior superior (48), Levator scapulae (11)

Smärta framtill i axeln
Infraspinatus (22), Biceps brachii (34), Pectoralis major (29), Pectoralis minor (30), Deltoideus (26), Coracobrachialis (33)

Smärta baktill i axeln
Teres minor (23), Teres major (24), Subscapularis (25), Triceps brachii (36), Deltoideus (26), Latissimus dorsi (27)

Smärta vid armlyft
Supraspinatus (21), Infraspinatus (22), Deltoideus (26), Subscapularis (25)

Smärta på armbågens utsida (tennisarmbåge)
Supinator (38), Extensor carpi radialis (longus och brevis) (40), Brachioradialis (39), Triceps brachii (36), Anconeus (37)

Smärta på armbågens insida (golfarmbåge)
Flexor carpi radialis och ulnaris (42), Pronator teres (43), Triceps brachii (36), Pectoralis major (29)

Smärta i handled och hand
Extensor digitorum (41), Flexor carpi radialis och ulnaris (42), Subscapularis (25), Skalenusmusklerna (scaleni) (12), Pronator teres (43)

Smärta i tummen
Brachialis (35), Adductor pollicis (45), Opponens pollicis (46), Supinator (38), Skalenusmusklerna (scaleni) (12)

Domningar i handen
Skalenusmusklerna (scaleni) (12), Pectoralis minor (30), Pronator teres (43), Subclavius (32), Coracobrachialis (33)

SÖK EFTER SYMTOM

VAR GÖR DET ONT? (FORTS.)

Hitta var smärtan uppträder: musklerna i listan är den vanligaste källan till triggerpunkter.

Bröstsmärta (efter att medicinska orsaker uteslutits)
Pectoralis major (29), Pectoralis minor (30), Sternalis (60), Skalenusmusklerna (scaleni) (12), Interkostalmusklerna (58)

Buksmärta (efter att medicinska orsaker uteslutits)
Rectus abdominis (56), Obliquus externus abdominis (57), Iliocostalis thoracis (50)

Ländryggssmärta
Quadratus lumborum (55), Iliopsoas (68), Iliocostalis lumborum (51), Longissimus thoracis (52), Multifidus (53), Gluteus medius (62)

Smärta i sätet
Gluteus maximus (61), Gluteus medius (62), Piriformis (64), Quadratus lumborum (55), Longissimus thoracis (52)

Ischiasliknande smärta
Gluteus minimus (63), Piriformis (64), Djupa utåtrotatorer (gemelli och obturator internus) (65), Semitendinosus och semimembranosus (80), Biceps femoris (79)

Smärta i ljumsken
Iliopsoas (68), Pectineus (69), Adductor longus och brevis (70), Adductor magnus (71), Obliquus externus abdominis (57)

Smärta på höftens utsida
Gluteus medius (62), Gluteus minimus (63), Tensor fasciae latae (TFL) (67), Vastus lateralis (77), Quadratus lumborum (55)

Smärta framtill i knät
Rectus femoris (75), Vastus medialis (76), Vastus lateralis (77), Vastus intermedius (78), Adductor longus och brevis (70)

Smärta i knävecket
Popliteus (81), Gastrocnemius (82), Biceps femoris (79), Plantaris (84), Semitendinosus och semimembranosus (80)

Smärta och kramp i vaden
Gastrocnemius (82), Soleus (83), Tibialis posterior (86), Flexor digitorum longus (92)

Smärta i fotleden
Peroneus (fibularis) longus (87), Peroneus (fibularis) brevis (88), Peroneus (fibularis) tertius (89), Tibialis anterior (85)

Smärta i hälen
Soleus (83), Quadratus plantae (97), Abductor hallucis (95), Tibialis posterior (86)

Smärta i foten
Flexor digitorum brevis (96), Adductor hallucis (100), Tibialis posterior (86), Gastrocnemius (82), Flexor digitorum longus (92)

Smärta i stortån
Tibialis anterior (85), Extensor hallucis longus (91), Flexor hallucis longus (93), Flexor hallucis brevis (102)

KROPPSREGION

HUVUD, ANSIKTE OCH NACKE

Kort 1–18 · 18 muskler

KORT 01 · HUVUD, ANSIKTE OCH NACKE

TRAPEZIUS – ÖVRE FIBRER

Musculus trapezius, pars descendens

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Elevation och uppåtrotation av skulderbladet
- Lateralflexion av huvud och nacke åt samma sida
- Rotation av huvudet åt motsatt sida
- Elevation av axlarna (axelryckning)

URSPRUNG

Linea nuchae superior, protuberantia occipitalis externa, ligamentum nuchae (C1–C6).

FÄSTE

Laterala tredjedelen av nyckelbenet (clavicula, pars acromialis).

INNERVATION

N. accessorius (kranialnerv XI); proprioceptiva fibrer C3–C4.

TRIGGERPUNKT

I muskelns övre kant, i vinkeln mellan nacke och skuldra, mitt emellan nacken och akromion; palperas lätt med pincettgrepp.

REFERERAD SMÄRTA

- Nackens posterolaterala sida
- Bakom örat (processus mastoideus)
- Tinningen (huvudvärk i tinningen)
- Ibland käkvinkeln

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Sittande eller ryggliggande, med huvudet lätt lutat åt samma sida
- Pincettgrepp längs den övre kanten
- Rulla vävnaden mellan fingrarna för att hitta det spända bandet
- Trycket återskapar smärtan mot tinningen

ASSOCIERADE SYMTOM

- Spänningshuvudvärk
- Stel nacke, begränsad lateralflexion
- Smärta efter långvarigt sittande eller telefonsamtal
- Uppdragna axlar vid stress

KLINISKT TIPS Kontrollera arbetsställningen, hur patienten bär väskan och andningsmönstret: övre trapezius överbelastas ofta av dålig ergonomi.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 02 · HUVUD, ANSIKTE OCH NACKE

STERNOCLEIDOMASTOIDEUS (SCM)

Musculus sternocleidomastoideus

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Unilateralt: lateralflexion åt samma sida och rotation av huvudet åt motsatt sida
- Bilateralt: flexion av nacken
- Accessorisk andningsmuskel (lyfter bröstkorgen)

URSPRUNG

Sternala huvudet: främre ytan av manubrium sterni. Klavikulära huvudet: mediala tredjedelen av nyckelbenet.

FÄSTE

Processus mastoideus och laterala halvan av linea nuchae superior.

INNERVATION

N. accessorius (kranialnerv XI); sensoriska fibrer C2–C3.

TRIGGERPUNKT

Längs hela det sternala och det klavikulära huvudet; undersök med pincettgrepp, med huvudet lätt roterat åt samma sida.

REFERERAD SMÄRTA

- Pannan och runt ögat (orbitalregionen)
- Kinden och örat, bakom örat
- Hjässan och nackhålan (occiput)
- Övre delen av bröstbenet

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande, huvudet lutat åt samma sida för avslappning
- Ta varje huvud för sig med pincettgrepp
- Arbeta dig från nyckelbenet mot processus mastoideus
- Undvik djupt tryck nära halspulsådern (a. carotis)

ASSOCIERADE SYMTOM

- Yrsel, balansstörning
- Tårflöde, dimsyn
- Huvudvärk i pannan eller runt ögat
- Känsla av sus i örat på samma sida

KLINISKT TIPS Efter ett whiplashtrauma påverkas sternocleidomastoideus ofta. Undersök den tillsammans med övre trapezius.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

MASSETER

Musculus masseter

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Stänger munnen (tuggning, bitning)
- Bidrar till protrusion av underkäken

URSPRUNG

Arcus zygomaticus och kindbenet (os zygomaticum).

FÄSTE

Käkvinkeln och utsidan av ramus mandibulae.

INNERVATION

N. massetericus (n. mandibularis, V/3).

TRIGGERPUNKT

I det ytliga lagret under arcus zygomaticus och ovanför käkvinkeln; i det djupa lagret framför käkleden.

REFERERAD SMÄRTA

- Övre och nedre molarer
- Underkäken och kinden
- Ovanför ögonbrynet
- Djupt i örat (käkledsområdet)

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Sittande, munnen lätt öppen
- Pincettgrepp: ett finger inne i munnen, det andra utanpå
- Be patienten bita ihop: det spända bandet blir tydligt

ASSOCIERADE SYMTOM

- Begränsad gapförmåga
- Ömmande tänder utan synlig dental orsak
- Tandgnissling (bruxism)

KLINISKT TIPS Mät gapförmågan (normalt cirka 3 fingerbredder). Vid bruxism, tänk på nattskena och stresshantering.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

TEMPORALIS

Musculus temporalis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Stänger munnen
- Retraktion av underkäken (bakre fibrer)

URSPRUNG

Fossa temporalis och fascia temporalis.

FÄSTE

Processus coronoideus på underkäken.

INNERVATION

Nn. temporales profundi (n. mandibularis, V/3).

TRIGGERPUNKT

Ovanför arcus zygomaticus i fyra områden: främre, mellersta och två grupper av bakre fibrer; palperas lätt vid tuggning.

REFERERAD SMÄRTA

- Tinningen och ögonbrynet
- Fingerliknande utstrålning på sidan av huvudet
- Övre tänderna
- Ibland bakom ögat

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Sittande, tänderna lätt sammanbitna
- Flat palpation i tinningen ovanför arcus zygomaticus
- Leta efter ömmande knutor tvärs mot fibrerna

ASSOCIERADE SYMTOM

- Huvudvärk i tinningsområdet
- Tänder som ömmar för varmt och kallt
- Trötthet i käken vid tuggning

KLINISKT TIPS Temporalis och masseter påverkas ofta tillsammans: behandla båda och fråga om nattlig tandgnissling.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

PTERYGOIDEUS LATERALIS

Musculus pterygoideus lateralis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Öppnar munnen och protraherar underkäken
- Sidoförskjutning (malrörelse)

URSPRUNG

Ala major ossis sphenoidalis och laterala skivan av processus pterygoideus.

FÄSTE

Käkledens disk och collum mandibulae.

INNERVATION

N. pterygoideus lateralis (V/3).

TRIGGERPUNKT

Djupt under arcus zygomaticus; intraoralt bakom de övre molarerna, mot kraniet.

REFERERAD SMÄRTA

- Djupt i käkleden
- Kinden över käkhålan
- Ibland framför örat

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Intraoral palpation med handske, bakom de övre molarerna
- Munnen lätt öppen
- Försiktigt, långsamt tryck

ASSOCIERADE SYMTOM

- Klickande käkled
- Förändrad känsla i bettet
- Smärta vid tuggning

KLINISKT TIPS Vanlig orsak till klickande käkled. Behandla den djupa muskeln endast varsamt; om bettet har förändrats, rådgör med tandläkare.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

PTERYGOIDEUS MEDIALIS

Musculus pterygoideus medialis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Stänger munnen
- Protrusion och sidoförskjutning av underkäken

URSPRUNG

Fossa pterygoidea (mediala skivan av processus pterygoideus).

FÄSTE

Insidan av käkvinkeln.

INNERVATION

N. pterygoideus medialis (V/3).

TRIGGERPUNKT

På insidan av käkvinkeln; utifrån palperas den under käkvinkeln med tryck uppåt.

REFERERAD SMÄRTA

- Halsen och tungroten
- Under och framför örat (käkleden)
- Svalgets bakre vägg

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Palpera uppåt på insidan av käkvinkeln
- Huvudet lätt lutat åt samma sida
- Smärtan kan öka vid sväljning

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta vid sväljning
- Känsla av halsont utan infektion
- Begränsad gapförmåga

KLINISKT TIPS Om det gör ont att svälja men halsen inte är röd, tänk på pterygoideus medialis.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 07 · HUVUD, ANSIKTE OCH NACKE

SPLENIUS CAPITIS

Musculus splenius capitis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Extension av huvud och nacke
- Rotation och lateralflexion av huvudet åt samma sida

URSPRUNG

Nedre halvan av ligamentum nuchae, processus spinosi C7–Th3.

FÄSTE

Processus mastoideus och laterala tredjedelen av linea nuchae superior.

INNERVATION

Dorsala grenar av cervikala spinalnerver (C3–C5).

TRIGGERPUNKT

Mellan trapezius och sternocleidomastoideus, cirka 2–3 cm under processus mastoideus.

REFERERAD SMÄRTA

- Hjässan på samma sida
- Ibland nackhålan (occiput)

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande, huvudet lätt roterat
- Flat palpation under processus mastoideus
- Rotation av huvudet mot motstånd gör muskeln tydlig

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta på hjässan
- Stel nacke vid rotation
- Smärta efter att ha sovit i dålig ställning

KLINISKT TIPS Fråga om kuddens höjd och sovställning: att sova på magen överbelastar ofta spleniusmusklerna.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 08 · HUVUD, ANSIKTE OCH NACKE

SPLENIUS CERVICIS

Musculus splenius cervicis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Extension av nacken
- Rotation av nacken åt samma sida

URSPRUNG

Processus spinosi Th3–Th6.

FÄSTE

Tubercula posteriora på processus transversi C1–C3.

INNERVATION

Dorsala grenar av cervikala spinalnerver (C4–C6).

TRIGGERPUNKT

I nedre delen av nacken intill levator scapulae, i vinkeln mellan nacke och skuldra.

REFERERAD SMÄRTA

- Djupt bakom ögat
- Smärta som strålar ut mot nackhålan (occiput)
- Vinkeln mellan nacke och skuldra

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Magliggande eller sittande
- Djup palpation lateralt i höjd med C7
- Känn efter bandet när huvudet roteras

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta bakom ögat
- Känsla av dimsyn
- Stel nacke

KLINISKT TIPS Smärta bakom ögat behöver inte ha en oftalmologisk orsak; uteslut medicinska orsaker och undersök sedan nackmusklerna.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 09 · HUVUD, ANSIKTE OCH NACKE

SUBOCCIPITALA MUSKLER

Mm. recti capitis posteriores et obliqui capitis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



○ Triggerpunkt (X) ● Primär smärtzon ● Spridningszon

FUNKTION

- Lätt extension och rotation av huvudet
- Finjustering av huvudets position (proprioception)

URSPRUNG

Atlas och axis.

FÄSTE

Nackbenet (linea nuchae inferior) och processus transversus på atlas.

INNERVATION

N. suboccipitalis (C1).

TRIGGERPUNKT

Precis under skallbasen, mellan nackbenet och C2, på djupet.

REFERERAD SMÄRTA

- Bandformad smärta från nackhålan (occiput) mot tinningen
- Bakom ögat
- Ibland ända till pannan

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande, huvudet vilar i terapeutens händer
- Fingertopparna placeras under skallbasen
- Låt huvudets egen tyngd stå för trycket

ASSOCIERADE SYMTOM

- Cervikogen huvudvärk
- Huvudvärk efter skärmarbete
- Begränsad nickrörelse

KLINISKT TIPS Den främsta överbelastande faktorn är framskjuten huvudhållning: kontrollera skärmhöjden och typen av glasögon.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

SEMISPINALIS CAPITIS

Musculus semispinalis capitis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Extension av huvudet
- Upprätthåller den cervikala lordosen

URSPRUNG

Processus transversi C4–Th6.

FÄSTE

Nackbenet mellan linea nuchae superior och inferior.

INNERVATION

Dorsala grenar av cervikala spinalnerver.

TRIGGERPUNKT

På tre nivåer: under skallbasen, mitt på och nedtill i nacken, intill processus spinosi.

REFERERAD SMÄRTA

- Ett band på sidan av huvudet i höjd med tinningen
- Nackhålan (occiput)
- Nackens baksida

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Magliggande, med stöd under pannan
- Flat palpation under nackbenet, 1–2 cm från mittlinjen
- Arbeta dig nedåt nivå för nivå

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta runt huvudet
- Nacksmärta vid extension
- Domningar i bakhuvudet (n. occipitalis major)

KLINISKT TIPS N. occipitalis major passerar genom muskeln: en spänd semispinalis kan ge domningar och brännande känsla i hårbotten.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

LEVATOR SCAPULAE

Musculus levator scapulae

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Elevation av skulderbladet
- Nedåtrotation av skulderbladet
- Lateralflexion och rotation av nacken åt samma sida

URSPRUNG

Processus transversi C1–C4.

FÄSTE

Angulus superior scapulae och övre delen av margo medialis.

INNERVATION

N. dorsalis scapulae (C5) och C3–C4.

TRIGGERPUNKT

I vinkeln mellan nacke och skuldra och 1–2 cm ovanför angulus superior scapulae.

REFERERAD SMÄRTA

- Vinkeln mellan nacke och skuldra
- Längs skulderbladets mediala kant
- Skulderns baksida

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Sittande, huvudet roterat åt motsatt sida
- Palpera under trapezius mot angulus superior scapulae
- Elevation av skuldran gör muskeln tydlig

ASSOCIERADE SYMTOM

- ”Nackspärr” (torticollis)
- Smärtsam rotation av huvudet åt samma sida
- Smärta efter långa telefonsamtal

KLINISKT TIPS Den klassiska orsaken till ”jag kan inte vrida på huvudet”. Råd patienten att inte hålla telefonen mellan örat och axeln.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 12 · HUVUD, ANSIKTE OCH NACKE

SKALENUSMUSKLERNA (SCALENI)

Mm. scaleni anterior, medius et posterior

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Lateralflexion av nacken
- Accessoriska andningsmuskler (lyfter de två första revbenen)

URSPRUNG

Processus transversi C2–C7.

FÄSTE

Första revbenet (anterior, medius) och andra revbenet (posterior).

INNERVATION

Ventrala grenar av cervikala spinalnerver (C3–C8).

TRIGGERPUNKT

På sidan av halsen ovanför nyckelbenet, bakom sternocleidomastoideus bakre kant.

REFERERAD SMÄRTA

- Främre delen av bröstkorgen
- Överarmens fram- och baksida
- Underarmens radiala sida, tummen och pekfingret
- Skulderbladets mediala kant

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande, huvudet lätt roterat åt motsatt sida
- Palpera bakom sternocleidomastoideus, ovanför nyckelbenet
- Obs: här passerar plexus brachialis

ASSOCIERADE SYMTOM

- Domningar i handen
- Smärta som liknar karpaltunnelsyndrom
- Spänning i nacken som ökar vid inandning

KLINISKT TIPS Skalenusmusklerna kan efterlikna symtom på thoracic outlet-syndrom. Bedöm andningsmönstret: övre bröstandning överbelastar dem.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

DIGASTRICUS

Musculus digastricus

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Öppnar munnen
- Lyfter tungbenet vid sväljning

URSPRUNG

Bakre buken: incisura mastoidea; främre buken: fossa digastrica på underkäken.

FÄSTE

Mellansena på tungbenet (os hyoideum).

INNERVATION

Bakre buken: n. facialis (VII); främre buken: n. mylohyoideus (V/3).

TRIGGERPUNKT

Den bakre buken bakom käkvinkeln, den främre buken under hakan.

REFERERAD SMÄRTA

- Nedre framtänderna och hakan
- Övre delen av halsen längs sternocleidomastoideus främre kant
- Under och bakom örat

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande, huvudet lätt bakåtlutat
- Mjuk palpation under hakan och bakom käkvinkeln
- Muskeln spänns vid sväljning

ASSOCIERADE SYMTOM

- Känsla av svårigheter att svälja
- Ömmande nedre tänder
- Klumpkänsla i halsen

KLINISKT TIPS Framskjuten huvudhållning och munandning överbelastar den. Kontrollera tungans viloläge (mot gommen).

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 14 · HUVUD, ANSIKTE OCH NACKE

OCCIPITOFRONTALIS

Musculus occipitofrontalis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Höjer ögonbrynen, rynkar pannan
- Rör hårbotten

URSPRUNG

Frontala buken: huden vid ögonbrynen; occipitala buken: linea nuchae suprema.

FÄSTE

Galea aponeurotica.

INNERVATION

N. facialis (VII).

TRIGGERPUNKT

Den frontala buken ovanför ögonbrynet, den occipitala buken i övre delen av bakhuvudet.

REFERERAD SMÄRTA

- Pannan
- Nackhålan (occiput)
- Kan även stråla djupt in i ögat

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande
- Flat palpation ovanför ögonbrynet och över bakhuvudet
- Be patienten höja ögonbrynen

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta i pannan
- Smärta i bakhuvudet som gör det svårt att ligga på rygg
- Känsla av stramhet i hårbotten

KLINISKT TIPS En rynkad panna kan tyda på stress eller nedsatt syn: fråga om glasögon och skärmtid.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

ZYGOMATICUS MAJOR

Musculus zygomaticus major

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Drar mungipan uppåt och utåt (leende)

URSPRUNG

Kindbenet (os zygomaticum).

FÄSTE

Mungipan (modiolus).

INNERVATION

N. facialis (VII).

TRIGGERPUNKT

I muskelns mittdel, mellan mungipan och kindbenet; med pincettgrepp inne i och utanför munnen.

REFERERAD SMÄRTA

- Sidan av näsan
- Inre ögonvrån
- Mitt på pannan

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Pincettgrepp: ett finger inne i munnen, det andra på kinden
- Arbeta dig från mungipan mot kindbenet

ASSOCIERADE SYMTOM

- Ansiktssmärta
- Smärta på sidan av näsan
- Ibland en känsla som påminner om bihåleinflammation

KLINISKT TIPS När bihåleproblem har uteslutits, tänk även på mimiska muskler vid smärta i mellersta delen av ansiktet.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 16 · HUVUD, ANSIKTE OCH NACKE

ORBICULARIS OCULI

Musculus orbicularis oculi

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Sluter ögonlocken
- Kisar med ögonen

URSPRUNG

Ögonhålans mediala kant och ligamentum palpebrale mediale.

FÄSTE

Huden på ögonlocken och runt ögat.

INNERVATION

N. facialis (VII).

TRIGGERPUNKT

Under ögonbrynet, ovanför det övre ögonlocket; med mycket mjukt pincettgrepp.

REFERERAD SMÄRTA

- Näsryggen och sidan av näsan
- Överläppen
- Runt ögat

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ögonen stängda, mjukt pincettgrepp under ögonbrynet
- Tryck aldrig på ögongloben

ASSOCIERADE SYMTOM

- Trötta ögon
- Kisar i starkt ljus
- Stramhet runt ögat

KLINISKT TIPS Skärmarbete, läsning och starkt ljus överbelastar den: rekommendera regelbundna pauser och lämpliga glasögon.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

PLATYSMA

Platysma

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Drar underläppen och mungipan nedåt
- Spänner huden på halsen

URSPRUNG

Övre delen av bröstkorgen (fascia pectoralis och deltoidea).

FÄSTE

Underkäkens nedre kant och huden på nedre delen av ansiktet.

INNERVATION

N. facialis (VII), ramus colli.

TRIGGERPUNKT

Ovanför nyckelbenet, som ett tunt lager över sternocleidomastoideus; med pincettgrepp tillsammans med huden.

REFERERAD SMÄRTA

- Stickande smärta i underkäken
- Nedre delen av ansiktet och hakan

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Pincettgrepp tillsammans med huden
- Be patienten dra mungiporna nedåt: platysma spänns

ASSOCIERADE SYMTOM

- Stickningar i hakan
- Stramhet på halsens framsida

KLINISKT TIPS Ofta aktiv tillsammans med triggerpunkter i sternocleidomastoideus; i den tunna muskeln kan stretching och mobilisering av huden räcka.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 18 · HUVUD, ANSIKTE OCH NACKE

LONGUS COLLI

Musculus longus colli

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Flexion och stabilisering av nacken
- Kontroll av den cervikala lordosen

URSPRUNG

Kotkroppar och processus transversi C3–Th3.

FÄSTE

Tuberculum anterius på atlas och kotkropparna C2–C6.

INNERVATION

Ventrala grenar av cervikala spinalnerver (C2–C6).

TRIGGERPUNKT

Djupt intill luftstrupen, mellan sternocleidomastoideus och luftstrupen; endast med försiktig djup palpation.

REFERERAD SMÄRTA

- Främre delen av halsen
- Smärta vid sväljning
- Nackens framsida

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande, huvudet stöttat
- För sternocleidomastoideus åt sidan och palpera försiktigt intill luftstrupen
- Känn halspulsådern (a. carotis) och håll dig borta från den

ASSOCIERADE SYMTOM

- Klumpkänsla i halsen
- Känsla av instabil nacke efter ett whiplashtrauma

KLINISKT TIPS Efter ett whiplashtrauma är den ofta hämmad: träning av de djupa nackflexorerna (nickning i ryggliggande) hjälper till att aktivera den.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KROPPSREGION

SKULDRA, ÖVERARM, UNDERARM OCH HAND

Kort 19–47 · 29 muskler

TRAPEZIUS – MELLERSTA FIBRER

Musculus trapezius, pars transversa

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Adduktion av skulderbladet mot ryggraden
- Stabilisering av skulderbladet

URSPRUNG

Processus spinosi C7–Th3.

FÄSTE

Akromion och övre kanten av spina scapulae.

INNERVATION

N. accessorius (XI).

TRIGGERPUNKT

Mellan skulderbladets mediala kant och ryggraden, i höjd med spina scapulae.

REFERERAD SMÄRTA

- Mellan skulderbladet och ryggraden
- Brännande känsla över akromion

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Magliggande, armarna längs sidorna
- Flat palpation vinkelrätt mot fibrerna

ASSOCIERADE SYMTOM

- Brännande smärta mellan skulderbladen
- Trötthet vid stillasittande arbete

KLINISKT TIPS Är ofta försvagad och uttänjd (framåtroterade axlar): styrketräning är lika viktig som behandlingen.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

TRAPEZIUS – NEDRE FIBRER

Musculus trapezius, pars ascendens

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Depression av skulderbladet
- Uppåtrotation av skulderbladet

URSPRUNG

Processus spinosi Th4–Th12.

FÄSTE

Mediala änden av spina scapulae.

INNERVATION

N. accessorius (XI).

TRIGGERPUNKT

I den nedre mediala delen av skulderbladet, där fibrerna når spina scapulae.

REFERERAD SMÄRTA

- Övre nacken nedanför skallbasen
- Baksidan av nacken
- Övre delen av skulderbladet

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Magliggande
- Pincettgrepp intill skulderbladets nedre vinkel

ASSOCIERADE SYMTOM

- Nacksmärta med ursprung i ryggen
- Smärta runt skulderbladet

KLINISKT TIPS Nacksmärta kan komma från ryggen: om behandlingen av nacken inte räcker, undersök nedre trapezius.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

SUPRASPINATUS

Musculus supraspinatus

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Inledande fas av armens abduktion
- Stabilisering av humerushuvudet i cavitas glenoidalis

URSPRUNG

Fossa supraspinata.

FÄSTE

Övre delen av tuberculum majus.

INNERVATION

N. suprascapularis (C5–C6).

TRIGGERPUNKT

I fossa supraspinata under trapezius; i den mediala och den laterala delen.

REFERERAD SMÄRTA

- Djupt mitt i skuldran (deltoideusområdet)
- Utsidan av överarmen
- Utsidan av armbågen

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Sittande, armen längs sidan
- Palpera genom trapezius ovanför spina scapulae

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta när armen lyfts
- Molande nattlig skuldersmärta

KLINISKT TIPS Kan efterlikna bilden av en rotatorkuffruptur. Undersök den tillsammans med infraspinatus.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

INFRASPINATUS

Musculus infraspinatus

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Utåtrotation av överarmen
- Stabilisering av humerushuvudet

URSPRUNG

Fossa infraspinata.

FÄSTE

Mittersta delen av tuberculum majus.

INNERVATION

N. suprascapularis (C5–C6).

TRIGGERPUNKT

Nedanför spina scapulae, i den övre delen av fossa infraspinata.

REFERERAD SMÄRTA

- Djupt i skulderns främre del
- Fram- och utsidan av överarmen
- Radialsidan av underarm och hand

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Magliggande eller sittande
- Flat palpation på skulderbladet nedanför spina scapulae

ASSOCIERADE SYMTOM

- Kan inte sova på den smärtande sidan
- Svårt att nå bakåt (t.ex. kamma håret)

KLINISKT TIPS Källan till ”smärta i skulderns framsida” sitter ofta baktill: undersök alltid infraspinatus.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

TERES MINOR

Musculus teres minor

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Utåtrotation av överarmen
- Stabilisering av humerushuvudet

URSPRUNG

Övre två tredjedelarna av skulderbladets laterala kant.

FÄSTE

Nedre delen av tuberculum majus.

INNERVATION

N. axillaris (C5–C6).

TRIGGERPUNKT

På skulderbladets laterala kant nedanför infraspinatus.

REFERERAD SMÄRTA

- Djup, lokaliserad smärta i skulderns bakre del

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Magliggande, överarmen i lätt abduktion
- Pincettgrepp längs skulderbladets laterala kant

ASSOCIERADE SYMTOM

- Punktformig smärta i skulderns bakre del
- Domningar i 4:e och 5:e fingret (sällsynt)

KLINISKT TIPS Visar sig ofta först efter att infraspinatus har behandlats.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

TERES MAJOR

Musculus teres major

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Inåtrotation, adduktion och extension av överarmen

URSPRUNG

Skulderbladets nedre vinkel.

FÄSTE

Crista tuberculi minoris.

INNERVATION

N. subscapularis inferior (C5–C7).

TRIGGERPUNKT

I bakre axillarvecket, ovanför skulderbladets nedre vinkel.

REFERERAD SMÄRTA

- Skulderns bakre del
- Baksidan av överarmen
- Ibland underarmens dorsalsida

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande, armen upp
- Pincettgrepp i bakre axillarvecket

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta när patienten sträcker sig över huvudet
- Stelhet i skuldran

KLINISKT TIPS Undersök den tillsammans med latissimus dorsi: tillsammans bildar de armhålans bakre vägg.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

SUBSCAPULARIS

Musculus subscapularis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Inåtrotation av överarmen
- Främre stabilisering av humerushuvudet

URSPRUNG

Fossa subscapularis.

FÄSTE

Tuberculum minus.

INNERVATION

Nn. subscapulares (C5–C6).

TRIGGERPUNKT

I armhålan, på skulderbladets framsida, nära den laterala kanten.

REFERERAD SMÄRTA

- Skulderns bakre del
- Skulderbladet
- Baksidan av överarmen
- Bandformad smärta runt handleden

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande, överarmen i abduktion
- Palpera från armhålan mot skulderbladets framsida
- Långsamt och försiktigt

ASSOCIERADE SYMTOM

- Rörelseinskränkning av typen ”frusen skuldra”
- Handledssmärta utan uppenbar orsak

KLINISKT TIPS I det tidiga stadiet av frusen skuldra (frozen shoulder) spelar den ofta en avgörande roll.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

DELTOIDEUS

Musculus deltoideus

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Abduktion av överarmen (mellersta fibrer)
- Flexion (främre fibrer)
- Extension (bakre fibrer)

URSPRUNG

Laterala tredjedelen av nyckelbenet, akromion, spina scapulae.

FÄSTE

Tuberositas deltoidea på humerus.

INNERVATION

N. axillaris (C5–C6).

TRIGGERPUNKT

I överarmens övre tredjedel, i de främre, mellersta och bakre fibrerna.

REFERERAD SMÄRTA

- Lokal smärta i skulderns främre, laterala eller bakre del
- Övre delen av överarmen

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Sittande
- Pincettgrepp eller flat palpation över fibrerna

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta när armen lyfts
- Svaghetskänsla i skuldran

KLINISKT TIPS Smärtan från deltoideus är lokal; om den sprider sig längre, sök orsaken i rotatorkuffen.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

LATISSIMUS DORSI

Musculus latissimus dorsi

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Inåtrotation, adduktion och extension av överarmen
- Dragrörelser (chins/pull-ups)

URSPRUNG

Processus spinosi Th7–L5, fascia thoracolumbalis, crista iliaca, nedre revbenen.

FÄSTE

Sulcus intertubercularis på humerus.

INNERVATION

N. thoracodorsalis (C6–C8).

TRIGGERPUNKT

I bakre axillarvecket, med pincettgrepp.

REFERERAD SMÄRTA

- Runt skulderbladets nedre vinkel
- Överarmens bakre-mediala sida
- 4:e och 5:e fingret

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande, armen över huvudet
- Pincettgrepp i bakre axillarvecket

ASSOCIERADE SYMTOM

- Konstant molande ryggsmärta nedanför skulderbladet
- Smärta när patienten sträcker sig över huvudet

KLINISKT TIPS Vanlig hos simmare, roddare och klättrare. Tänk på den vid molande ryggsmärta som patienten ”inte kan peka ut exakt”.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

RHOMBOIDEUS (MAJOR OCH MINOR)

Mm. rhomboidei major et minor

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Adduktion av skulderbladet mot ryggraden och elevation av det

URSPRUNG

Processus spinosi C7–Th5.

FÄSTE

Skulderbladets mediala kant.

INNERVATION

N. dorsalis scapulae (C4–C5).

TRIGGERPUNKT

Under trapezius, längs skulderbladets mediala kant.

REFERERAD SMÄRTA

- Längs skulderbladets mediala kant
- Ytlig, ”huggande” smärta

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Magliggande, armen hängande
- Palpera genom trapezius vid skulderbladets mediala kant

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta mellan skulderbladen
- Knastrande vid skulderbladets rörelse

KLINISKT TIPS Tänjs ofta ut av spända bröstmuskler: arbeta inte bara baktill utan även framtill.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

PECTORALIS MAJOR

Musculus pectoralis major

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Adduktion och inåtrotation av överarmen
- Flexion (pars clavicularis)

URSPRUNG

Mediala halvan av nyckelbenet, bröstbenet, 1:a–6:e revbensbrosket.

FÄSTE

Crista tuberculi majoris.

INNERVATION

N. pectoralis medialis och lateralis (C5–Th1).

TRIGGERPUNKT

I pars clavicularis, sternalis och costalis; i främre axillarvecket med pincettgrepp.

REFERERAD SMÄRTA

- Skulderns främre del
- Bröstkorgens främre del
- Insidan av överarmen, insidan av armbågen
- 4:e och 5:e fingret

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande, överarmen i lätt abduktion
- Pincettgrepp i främre axillarvecket
- Flat palpation intill bröstbenet

ASSOCIERADE SYMTOM

- Bröstsmärta som påminner om hjärtsmärta
- Framåtroterade axlar
- Smärta när patienten sträcker sig bakåt

KLINISKT TIPS Vid bröstsmärta: uteslut alltid medicinska (kardiella) orsaker innan du överväger muskulärt ursprung.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

PECTORALIS MINOR

Musculus pectoralis minor

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



○ Triggerpunkt (X) ● Primär smärtzon ● Spridningszon

FUNKTION

- Drar skulderbladet framåt och nedåt
- Accessorisk andningsmuskel

URSPRUNG

3:e–5:e revbenet.

FÄSTE

Processus coracoideus.

INNERVATION

N. pectoralis medialis (C8–Th1).

TRIGGERPUNKT

Nedanför processus coracoideus och över 3:e–5:e revbenet, genom pectoralis major.

REFERERAD SMÄRTA

- Skulderns främre del
- Bröstkorgen
- Insidan av överarmen och handens ulnarsida

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande
- Palpera från armhålans sida under bröstmuskeln, mot processus coracoideus

ASSOCIERADE SYMTOM

- Framåtroterad skuldra
- Domningar i handen (neurovaskulär kompression)

KLINISKT TIPS En spänd pectoralis minor kan göra passagen för plexus brachialis trängre: undersök den vid symtom på thoracic outlet.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

SERRATUS ANTERIOR

Musculus serratus anterior

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Drar skulderbladet framåt och fixerar det mot bröstkorgen
- Uppåtrotation av skulderbladet

URSPRUNG

Utsidan av 1:a–9:e revbenet.

FÄSTE

Skulderbladets mediala kant (framsidan).

INNERVATION

N. thoracicus longus (C5–C7).

TRIGGERPUNKT

I mellersta axillarlinjen, i höjd med 5:e–6:e revbenet.

REFERERAD SMÄRTA

- Sidan av bröstkorgen
- Skulderbladets nedre vinkel
- Insidan av överarmen

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Sidoliggande, armen utsträckt framåt
- Palpera mellan revbenen i axillarlinjen

ASSOCIERADE SYMTOM

- ”Håll i sidan” vid löpning
- Smärta som ökar vid djupandning

KLINISKT TIPS Svaghet i muskeln ger scapula alata; varianter av armhävningar hjälper vid styrketräningen.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

SUBCLAVIUS

Musculus subclavius

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Stabilisering av nyckelbenet

URSPRUNG

Första revbenet och dess brosk.

FÄSTE

Nyckelbenets undersida.

INNERVATION

N. subclavius (C5–C6).

TRIGGERPUNKT

Under nyckelbenet i mellersta tredjedelen, genom pectoralis major.

REFERERAD SMÄRTA

- Framsidan av överarmen
- Underarmens radialsida
- Tummen och pekfingret

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande
- Palpera uppåt under nyckelbenet

ASSOCIERADE SYMTOM

- Domningar i fingrarna
- Smärta i skulderns framsida

KLINISKT TIPS Under nyckelbenet löper v. subclavia: tryck inte hårt under lång tid.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

CORACOBRACHIALIS

Musculus coracobrachialis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Flexion och adduktion av överarmen

URSPRUNG

Processus coracoideus.

FÄSTE

Mitten av humerus mediala yta.

INNERVATION

N. musculocutaneus (C6–C7).

TRIGGERPUNKT

På överarmens insida nära armhålan, bakom bicepsens korta huvud.

REFERERAD SMÄRTA

- Skulderns främre del
- Baksidan av över- och underarmen
- Handryggen

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande, överarmen i abduktion och utåtrotation
- Palpera i armhålan intill humerus

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta när armen sträcks bakåt

KLINISKT TIPS N. musculocutaneus går igenom den: spänning i muskeln kan ge domningar på underarmens utsida.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

BICEPS BRACHII

Musculus biceps brachii

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Flexion i armbågen
- Supination av underarmen

URSPRUNG

Långa huvudet: tuberculum supraglenoidale; korta huvudet: processus coracoideus.

FÄSTE

Tuberositas radii och aponeurosis bicipitalis.

INNERVATION

N. musculocutaneus (C5–C6).

TRIGGERPUNKT

I muskelns distala tredjedel, i båda huvudena.

REFERERAD SMÄRTA

- Skulderns främre del
- Framsidan av överarmen
- Armbågsvecket

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Sittande, armbågen i lätt flexion
- Pincettgrepp om muskelbuken

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta vid lyft över huvudet
- Svaghet vid flexion i armbågen

KLINISKT TIPS Bakom ”smärta i skulderns framsida” ligger ofta inte senan utan en triggerpunkt i biceps.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

BRACHIALIS

Musculus brachialis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Flexion i armbågen (huvudflexor)

URSPRUNG

Distala halvan av humerus framsida.

FÄSTE

Tuberositas ulnae och processus coronoideus.

INNERVATION

N. musculocutaneus (C5–C6), delvis n. radialis.

TRIGGERPUNKT

Några centimeter ovanför armbågen, under biceps, lateralt.

REFERERAD SMÄRTA

- Tumbasen (dorsalsidan)
- Armbågsvecket
- Framsidan av överarmen

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Sittande, armbågen i 90° flexion
- För biceps åt sidan och palpera djupt intill den

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta i tummen
- Smärta vid bärande av tunga saker

KLINISKT TIPS Vid smärta i tummen: leta inte bara i handen; orsaken kan även vara brachialis.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

TRICEPS BRACHII

Musculus triceps brachii

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Extension i armbågen
- Extension av överarmen (långa huvudet)

URSPRUNG

Långa huvudet: tuberculum infraglenoidale; laterala och mediala huvudet: humerus baksida.

FÄSTE

Olekranon.

INNERVATION

N. radialis (C6–C8).

TRIGGERPUNKT

I långa huvudet, i laterala huvudet och ovanför armbågen.

REFERERAD SMÄRTA

- Skulderns bakre del
- Baksidan av överarmen
- Armbågen (epikondylerna)
- Underarmens dorsalsida

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Magliggande eller sittande, armen hängande
- Pincettgrepp om långa huvudet

ASSOCIERADE SYMTOM

- Armbågssmärta som påminner om ”tennisarmbåge”
- Smärta när armen sträcks ut

KLINISKT TIPS Källan till smärta på armbågens utsida är inte alltid underarmen: undersök även tricepsens laterala huvud.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

ANCONEUS

Musculus anconeus

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Bidrar till extension i armbågen
- Stabilisering av armbågsleden

URSPRUNG

Laterala epikondylen på humerus.

FÄSTE

Olekranons utsida och ulnas baksida.

INNERVATION

N. radialis (C7–C8).

TRIGGERPUNKT

Mellan olekranon och laterala epikondylen.

REFERERAD SMÄRTA

- Runt laterala epikondylen

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Sittande, armbågen i flexion
- Flat palpation intill olekranon

ASSOCIERADE SYMTOM

- Lokal armbågssmärta

KLINISKT TIPS Vid tennisarmbåge hjälper exakt lokalisering till att skilja anconeus från extensorerna.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

SUPINATOR

Musculus supinator

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Supination av underarmen

URSPRUNG

Laterala epikondylen på humerus, ligamentum collaterale radiale, crista musculi supinatoris på ulna.

FÄSTE

Proximala tredjedelen av radius.

INNERVATION

N. radialis profundus (C6–C7).

TRIGGERPUNKT

Nedanför armbågsvecket lateralt, runt caput radii.

REFERERAD SMÄRTA

- Laterala epikondylen
- Handryggen mellan tummen och pekfingret

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Sittande, underarmen i supination
- Palpera nedanför caput radii

ASSOCIERADE SYMTOM

- Tennisarmbåge
- Smärta vid skruvande eller när dörrhandtag vrids

KLINISKT TIPS N. radialis profundus går igenom den: en spänd supinator kan ge svaghet i underarmen.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

BRACHIORADIALIS

Musculus brachioradialis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Flexion i armbågen med underarmen i neutralläge

URSPRUNG

Laterala suprakondylära kanten på humerus.

FÄSTE

Processus styloideus radii.

INNERVATION

N. radialis (C5–C6).

TRIGGERPUNKT

På underarmens radialsida, 1–2 cm nedanför armbågen.

REFERERAD SMÄRTA

- Laterala epikondylen
- Handledens dorsalsida
- Mellan tummen och pekfingret

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Sittande, underarmen i neutralläge
- Pincettgrepp om underarmens radiala kant

ASSOCIERADE SYMTOM

- Armbågssmärta vid grepp
- Smärta på handryggen

KLINISKT TIPS Med pincettgrepp skiljer du den lätt från extensor carpi radialis.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

EXTENSOR CARPI RADIALIS (LONGUS OCH BREVIS)

Mm. extensores carpi radiales longus et brevis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



○ Triggerpunkt (X) ● Primär smärtzon ● Spridningszon

FUNKTION

- Extension och radialdeviation i handleden
- Stabilisering av greppet

URSPRUNG

Laterala suprakondylära kanten och laterala epikondylen på humerus.

FÄSTE

Basen av 2:a och 3:e metakarpalbenet.

INNERVATION

N. radialis (C6–C7).

TRIGGERPUNKT

I underarmens övre tredjedel, på den dorsoradiala sidan.

REFERERAD SMÄRTA

- Laterala epikondylen
- Handryggen och handleden

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Sittande, underarmen i pronation
- Palpera på dorsalsidan nedanför armbågen

ASSOCIERADE SYMTOM

- Tennisarmbåge
- Nedsatt greppstyrka

KLINISKT TIPS Musanvändning och tangentbordsskrivande är en vanlig belastning: kontrollera handledens ställning under arbetet.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

EXTENSOR DIGITORUM

Musculus extensor digitorum

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Extension av fingrarna
- Bidrar till extension i handleden

URSPRUNG

Laterala epikondylen på humerus (gemensamma extensorsenan).

FÄSTE

Dorsalaponeurosen på 2:a–5:e fingret.

INNERVATION

N. radialis profundus (C7–C8).

TRIGGERPUNKT

På underarmens dorsalsida, 3–4 cm nedanför armbågen.

REFERERAD SMÄRTA

- Underarmens dorsalsida
- Handryggen
- Långfingret och ringfingret

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Sittande, underarmen i pronation
- Be patienten lyfta fingrarna ett i taget: bandet blir kännbart

ASSOCIERADE SYMTOM

- Stelhet i fingrarna
- Nedsatt greppstyrka

KLINISKT TIPS Vanlig hos musiker och hos dem som skriver mycket på tangentbord; pauser och fingerstretching hjälper.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

FLEXOR CARPI RADIALIS OCH ULNARIS

Mm. flexores carpi radialis et ulnaris

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



○ Triggerpunkt (X) ● Primär smärtzon ● Spridningszon

FUNKTION

- Flexion i handleden
- Radial- respektive ulnardeviation

URSPRUNG

Mediala epikondylen på humerus (gemensamma flexorsenan).

FÄSTE

Radialis: basen av 2:a metakarpalbenet; ulnaris: os pisiforme, 5:e metakarpalbenet.

INNERVATION

N. medianus (radialis), n. ulnaris (ulnaris).

TRIGGERPUNKT

På underarmens volarsida, i övre tredjedelen.

REFERERAD SMÄRTA

- Handledens volarsida (radialt och ulnart)

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Sittande, underarmen i supination
- Be om flexion i handleden mot motstånd

ASSOCIERADE SYMTOM

- Golfarmbåge
- Handledssmärta vid grepp

KLINISKT TIPS Vid golfarmbåge (medial epikondylit): undersök den tillsammans med pronator teres.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

PRONATOR TERES

Musculus pronator teres

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Pronation av underarmen
- Bidrar till flexion i armbågen

URSPRUNG

Mediala epikondylen på humerus och processus coronoideus ulnae.

FÄSTE

Mitten av radius laterala yta.

INNERVATION

N. medianus (C6–C7).

TRIGGERPUNKT

Nedanför armbågsvecket medialt, nära mediala epikondylen.

REFERERAD SMÄRTA

- Handleden och underarmens volar-radiala sida

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Sittande, underarmen i supination
- Palpera snett nedanför armbågsvecket

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta vid vridrörelser
- Domningar i tummen och pekfingret (n. medianus)

KLINISKT TIPS N. medianus går igenom den: pronator teres-syndrom kan efterlikna karpaltunnelsyndrom.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

PALMARIS LONGUS

Musculus palmaris longus

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Spänner palmaraponeurosen
- Bidrar till flexion i handleden

URSPRUNG

Mediala epikondylen på humerus.

FÄSTE

Palmaraponeurosen.

INNERVATION

N. medianus (C7–C8).

TRIGGERPUNKT

På underarmens volarsida, i övre tredjedelen.

REFERERAD SMÄRTA

- Stickande, nålliknande smärta i handflatan

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Sittande
- Be patienten föra tummen mot lillfingret: senan blir synlig

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta i handflatan när patienten håller verktyg

KLINISKT TIPS Saknas hos cirka 15 % av människor; om den saknas, sök en annan källa till smärtan i handflatan.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

ADDUCTOR POLLICIS

Musculus adductor pollicis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Adduktion av tummen (pincettgrepp)

URSPRUNG

3:e metakarpalbenet och handlovsbenen.

FÄSTE

Tummens proximala falang (ulnarsidan).

INNERVATION

N. ulnaris (C8–Th1).

TRIGGERPUNKT

I hudvecket mellan tummen och pekfingret (första interdigitalrummet).

REFERERAD SMÄRTA

- Tummens utsida
- Tumbasen

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Pincettgrepp mellan tummen och pekfingret

ASSOCIERADE SYMTOM

- Klumpighet vid finmotoriska rörelser
- Smärta vid skrivande eller pincettgrepp

KLINISKT TIPS Vanlig efter mobilanvändning, skrivande och sömnad. Rekommendera fingerstretching i pauserna.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

OPPONENS POLLICIS

Musculus opponens pollicis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Opposition av tummen

URSPRUNG

Os trapezium och retinaculum flexorum.

FÄSTE

Radiala kanten av 1:a metakarpalbenet.

INNERVATION

N. medianus (C8–Th1).

TRIGGERPUNKT

I thenar, på handens radialsida.

REFERERAD SMÄRTA

- Tummens volarsida
- Handledens volar-radiala del

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Flat palpation i thenar
- Be om opposition: tummen nuddar lillfingret

ASSOCIERADE SYMTOM

- Nedsatt greppstyrka
- Smärta när patienten öppnar en burk

KLINISKT TIPS Vid karpaltunnelsyndrom kan thenarmusklerna försvagas: bedöm även styrkan.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

INTEROSSEI I HANDEN

Mm. interossei dorsales et palmares manus

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Abduktion och adduktion av fingrarna
- Flexion i MCP-lederna och extension i IP-lederna

URSPRUNG

Metakarpalbenens mot varandra vända ytor.

FÄSTE

Proximala falangerna och fingrarnas dorsalaponeuros.

INNERVATION

N. ulnaris (C8–Th1).

TRIGGERPUNKT

Mellan metakarpalbenen, på dorsal- och volarsidan.

REFERERAD SMÄRTA

- Fingrarnas sidor ut till de distala falangerna
- Området kring Heberdens noder

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Pincettgrepp mellan metakarpalbenen

ASSOCIERADE SYMTOM

- Stelhet i fingrarna
- Smärta på fingrarnas sidor

KLINISKT TIPS Fingersmärta liknar ofta ledsmärta men kan vara muskulär: palpera mellanrummen mellan metakarpalbenen.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KROPPSREGION

RYGG, RYGGRAD OCH BÅL

Kort 48–60 · 13 muskler

SERRATUS POSTERIOR SUPERIOR

Musculus serratus posterior superior

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Lyfter de övre revbenen vid inandning

URSPRUNG

Processus spinosi C7–Th3.

FÄSTE

2:a–5:e revbenet.

INNERVATION

Nn. intercostales (Th2–Th5).

TRIGGERPUNKT

Under övre delen av skulderbladet; åtkomlig endast när skulderbladet dras framåt.

REFERERAD SMÄRTA

- Djupt under skulderbladet
- Överarmens baksida
- Lillfingret

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Sittande, armarna korsade framför bröstet
- Palpera under skulderbladets mediala kant

ASSOCIERADE SYMTOM

- Djup, konstant smärta under skulderbladet
- Domningar i lillfingret

KLINISKT TIPS Den går inte att palpera utan att skulderbladet förs undan: när patienten korsar armarna blir muskeln åtkomlig.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

SERRATUS POSTERIOR INFERIOR

Musculus serratus posterior inferior

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Drar de nedre revbenen nedåt och bakåt

URSPRUNG

Processus spinosi Th11–L2.

FÄSTE

9:e–12:e revbenet.

INNERVATION

Nn. intercostales (Th9–Th12).

TRIGGERPUNKT

Över de nedre revbenen, lateralt om ryggraden.

REFERERAD SMÄRTA

- Lokal, molande smärta över de nedre revbenen

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Magliggande
- Flat palpation över de nedre revbenen

ASSOCIERADE SYMTOM

- Molande smärta över revbenen
- Smärta vid rotation

KLINISKT TIPS Den kan göra ont även när ländryggsundersökningen är negativ: palpera över revbenen.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 50 · RYGG, RYGGRAD OCH BÅL

ILIOCOSTALIS THORACIS

Musculus iliocostalis thoracis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Extension av ryggraden
- Lateralflexion åt samma sida

URSPRUNG

Revbensvinklarna på de 6 nedre revbenen.

FÄSTE

Revbensvinklarna på de 6 övre revbenen och processus transversus på C7.

INNERVATION

Dorsala grenar av spinalnerverna.

TRIGGERPUNKT

I mellersta och nedre bröstryggen, lateralt om ryggraden.

REFERERAD SMÄRTA

- Mot skulderbladet
- Framåt, mot buken på samma sida

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Magliggande
- Flat palpation längs revbensvinklarna

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta i bröstryggen
- Buksmärta som liknar visceral smärta

KLINISKT TIPS Vid buksmärta där den medicinska utredningen är utan anmärkning, tänk även på ryggmusklerna.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

ILIOCOSTALIS LUMBORUM

Musculus iliocostalis lumborum

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Extension och lateralflexion av ländryggen

URSPRUNG

Crista iliaca och korsbenet.

FÄSTE

Revbensvinklarna på de 6 nedre revbenen.

INNERVATION

Dorsala grenar av spinalnerverna (lumbala).

TRIGGERPUNKT

I höjd med L1, lateralt om ryggraden.

REFERERAD SMÄRTA

- Mot mitten av sätet
- Nedre delen av ländryggen

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Magliggande, kudde under magen
- Flat palpation i ländryggen

ASSOCIERADE SYMTOM

- Ländryggssmärta som strålar ut i sätet
- Smärta vid lyft

KLINISKT TIPS En del ländryggssmärta kan stråla ut i sätet utan att vara ischias.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 52 · RYGG, RYGGRAD OCH BÅL

LONGISSIMUS THORACIS

Musculus longissimus thoracis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Extension av ryggraden
- Lateralflexion åt samma sida

URSPRUNG

Korsbenet, crista iliaca, processus spinosi på ländkotorna.

FÄSTE

Processus transversi på bröstkotorna och revbenen.

INNERVATION

Dorsala grenar av spinalnerverna.

TRIGGERPUNKT

I höjd med Th10–L1, 2–4 cm från mittlinjen.

REFERERAD SMÄRTA

- Längre ned, över gluteusmuskulaturen
- Sakroiliakalområdet

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Magliggande
- Djup flat palpation intill mittlinjen

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta i nedre delen av ländryggen och i sätet
- Stelhet efter långvarigt stående

KLINISKT TIPS Smärtan uppträder några segment nedanför triggerpunkten: leta högre upp.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 53 · RYGG, RYGGRAD OCH BÅL

MULTIFIDUS

Musculus multifidus

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Segmentell stabilisering av kotorna
- Extension och rotation av ryggraden

URSPRUNG

Korsbenet, spina iliaca, processus transversi.

FÄSTE

Processus spinosi 2–4 nivåer högre upp.

INNERVATION

Dorsala grenar av spinalnerverna.

TRIGGERPUNKT

Precis intill processus spinosi, på djupet.

REFERERAD SMÄRTA

- Lokal smärta intill ryggraden
- Korsbenet och svanskotan

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Magliggande
- Djup palpation precis intill processus spinosus

ASSOCIERADE SYMTOM

- Segmentell, punktformig ryggsmärta
- Smärta i svanskotan

KLINISKT TIPS Vid långvarig ländryggssmärta atrofierar den ofta: stabiliseringsövningar är avgörande.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

ROTATORES OCH INTERSPINALES

Mm. rotatores et interspinales

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Fin rotation och extension av kotorna
- Proprioception

URSPRUNG

Processus transversi (rotatores), processus spinosi (interspinales).

FÄSTE

Processus spinosus på angränsande kota.

INNERVATION

Dorsala grenar av spinalnerverna.

TRIGGERPUNKT

Djupt mellan processus spinosi.

REFERERAD SMÄRTA

- Ryggradens mittlinje på motsvarande nivå

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Magliggande
- Tryck mellan och intill processus spinosi

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta i ryggradens mittlinje
- Kota som är öm vid perkussion

KLINISKT TIPS Vid smärta i mittlinjen som är öm vid perkussion ska du alltid utesluta en skelettorsak (t.ex. fraktur).

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

QUADRATUS LUMBORUM

Musculus quadratus lumborum

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Lateralflexion av ländryggen åt samma sida
- Höjer bäckenet
- Stabiliserar 12:e revbenet vid inandning

URSPRUNG

Crista iliaca och ligamentum iliolumbale.

FÄSTE

12:e revbenet och processus transversi L1–L4.

INNERVATION

Ventrala grenar Th12–L3.

TRIGGERPUNKT

Mellan 12:e revbenet och crista iliaca, lateralt om erector spinae.

REFERERAD SMÄRTA

- Sakroiliakalleden
- Nedre delen av sätet
- Crista iliaca
- Trochanter major

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Sidliggande, den övre armen ovanför huvudet
- Palpera under den laterala kanten av erector spinae

ASSOCIERADE SYMTOM

- Intensiv ländryggssmärta vid lyft
- Smärta vid hosta
- Svårt att sova i sidoläge

KLINISKT TIPS Vanlig orsak till akut ”ryggskott”. Kontrollera benlängdsskillnad och bäckenets ställning.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

RECTUS ABDOMINIS

Musculus rectus abdominis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Flexion av bålen
- Ökar det intraabdominella trycket
- Kontroll av bäckenet

URSPRUNG

Symfysen och crista pubica.

FÄSTE

Brosket på 5:e–7:e revbenet och processus xiphoideus.

INNERVATION

Nn. intercostales (Th7–Th12).

TRIGGERPUNKT

Ovanför naveln, intill naveln och ovanför blygdbenet.

REFERERAD SMÄRTA

- Ett horisontellt band över ryggen
- Runt naveln
- Nedre delen av buken och ländryggen

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande, knäna böjda
- Pincettgrepp i bukmuskelns kant
- När patienten lyfter huvudet spänns muskeln

ASSOCIERADE SYMTOM

- Uppblåsthetskänsla
- Smärta som liknar magkramper
- Ländryggssmärta med ursprung framifrån

KLINISKT TIPS Vid buksmärta ska du alltid utesluta inre orsaker; först därefter undersöker du bukväggen.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

OBLIQUUS EXTERNUS ABDOMINIS

Musculus obliquus externus abdominis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Rotation av bålen åt motsatt sida
- Flexion av bålen
- Ökar det intraabdominella trycket

URSPRUNG

Utsidan av 5:e–12:e revbenet.

FÄSTE

Crista iliaca, ligamentum inguinale, linea alba.

INNERVATION

Nn. intercostales (Th7–Th12), n. iliohypogastricus.

TRIGGERPUNKT

Längs de nedre revbenen och nära ljumsken.

REFERERAD SMÄRTA

- Epigastriet (liknar halsbränna)
- Ljumsken och nedre delen av buken

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande
- Pincettgrepp i den laterala bukväggen

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta som liknar halsbränna
- Smärta i ljumsken

KLINISKT TIPS Vanlig hos idrottare (rotationsrörelser). Uteslut inre orsaker.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

INTERKOSTALMUSKLERNA

Mm. intercostales externi et interni

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Höjer och sänker revbenen vid andning
- Stabiliserar bröstkorgsväggen

URSPRUNG

Nedre kanten av revbenet ovanför.

FÄSTE

Övre kanten av revbenet nedanför.

INNERVATION

Nn. intercostales.

TRIGGERPUNKT

I interkostalrummen på den smärtande nivån.

REFERERAD SMÄRTA

- Lokal smärta längs interkostalrummet

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Flat palpation i interkostalrummet
- Djup andning ökar ömheten

ASSOCIERADE SYMTOM

- Hugg vid andning
- Smärta efter hosta

KLINISKT TIPS Vid intensiv och avgränsad smärta, uteslut revbensfraktur och tidigt stadium av bältros.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

DIAFRAGMA

Diaphragma

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Den viktigaste inandningsmuskeln

URSPRUNG

Processus xiphoideus, de 6 nedre revbenen, ländkotorna.

FÄSTE

Centrum tendineum.

INNERVATION

N. phrenicus (C3–C5).

TRIGGERPUNKT

Framtill under revbensbågen, med försiktig palpation under utandning.

REFERERAD SMÄRTA

- Längs revbensbågen
- Skulderns topp

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande, knäna böjda
- Palpera uppåt under revbensbågen under utandning

ASSOCIERADE SYMTOM

- Håll i sidan
- Smärta vid djup andning

KLINISKT TIPS Övre bröstandning tyder på att diafragman arbetar otillräckligt: lär patienten buk- (diafragma-) andning.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

STERNALIS

Musculus sternalis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Ingen betydande funktion

URSPRUNG

Bröstbenet och främre ytan av revbensbrosken.

FÄSTE

Fascia pectoralis, varierande.

INNERVATION

Nn. pectorales eller nn. intercostales.

TRIGGERPUNKT

Över bröstbenet, i mittlinjen.

REFERERAD SMÄRTA

- Hela bröstbenet
- Övre delen av bröstkorgen
- Överarmens insida

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Flat palpation över bröstbenet

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta bakom bröstbenet
- Tryckkänsla i bröstet

KLINISKT TIPS Vid tryckkänsla i bröstet: FÖRST medicinsk undersökning (hjärtat). Muskeln undersöker du först därefter.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KROPPSREGION

BÄCKEN, HÖFT OCH SÄTE

Kort 61–74 · 14 muskler

GLUTEUS MAXIMUS

Musculus gluteus maximus

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Extension i höften
- Utåtrotation av låret
- Stabilisering av bäckenet

URSPRUNG

Bakre delen av os ilium, korsbenet, svanskotan.

FÄSTE

Tuberositas glutea på femur och tractus iliotibialis.

INNERVATION

N. gluteus inferior (L5–S2).

TRIGGERPUNKT

Intill korsbenet, ovanför sittbensknölen och i den nedre mediala delen.

REFERERAD SMÄRTA

- Korsbenet och iliosakralleden
- Hela sätesregionen
- Svanskotan

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Sidoliggande eller magliggande
- Flat palpation eller pincettgrepp

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta vid sittande
- Smärta vid gång i uppförsbacke

KLINISKT TIPS Vanlig efter långvarigt sittande; pauser från sittandet och aktivering av höftextensorerna hjälper.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 62 · BÄCKEN, HÖFT OCH SÄTE

GLUTEUS MEDIUS

Musculus gluteus medius

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Abduktion i höften
- Håller bäckenet vågrätt vid gång

URSPRUNG

Utsidan av os ilium.

FÄSTE

Trochanter major.

INNERVATION

N. gluteus superior (L4–S1).

TRIGGERPUNKT

Strax nedanför crista iliaca, på tre punkter framifrån och bakåt.

REFERERAD SMÄRTA

- Längs crista iliaca
- Iliosakralleden
- Mitten och sidan av sätesregionen

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Sidoliggande
- Flat palpation nedanför crista iliaca

ASSOCIERADE SYMTOM

- Ländryggssmärta vid gång
- Kan inte ligga på den smärtande sidan

KLINISKT TIPS Vid positivt Trendelenburgs tecken (bäckenet sjunker) är muskeln svag: stärk med benlyft i sidoliggande.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 63 · BÄCKEN, HÖFT OCH SÄTE

GLUTEUS MINIMUS

Musculus gluteus minimus

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Abduktion och inåtrotation i höften

URSPRUNG

Utsidan av os ilium (främre delen).

FÄSTE

Främre kanten av trochanter major.

INNERVATION

N. gluteus superior (L4–S1).

TRIGGERPUNKT

Djupt under gluteus medius, i den främre och den bakre delen.

REFERERAD SMÄRTA

- Utsidan av låret och underbenet ner till fotleden
- Baksidan av låret och vaden

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Sidoliggande
- Djup palpation under gluteus medius

ASSOCIERADE SYMTOM

- Ischiasliknande smärta
- Smärta och hälta när patienten reser sig

KLINISKT TIPS Den vanligaste muskulära orsaken till ”pseudoischias”. Vid neurologiska tecken (domningar, bortfall av reflexer) krävs läkarundersökning.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

PIRIFORMIS

Musculus piriformis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Utåtrotation av låret
- Abduktion när höften är flekterad

URSPRUNG

Framsidan av korsbenet.

FÄSTE

Övre kanten av trochanter major.

INNERVATION

N. piriformis (S1–S2).

TRIGGERPUNKT

I den mediala och den laterala tredjedelen av linjen mellan korsbenet och trochanter major.

REFERERAD SMÄRTA

- Området kring iliosakralleden
- Hela sätesregionen
- Baksidan av låret

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Sidoliggande, övre benet böjt
- Djup palpation genom gluteus maximus

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta vid sittande
- Domningar på baksidan av benet (piriformissyndrom)

KLINISKT TIPS Ischiasnerven passerar under eller genom muskeln: vid kompression kan ischiasliknande symtom uppstå.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

DJUPA UTÅTROTATORER (GEMELLI OCH OBTURATOR INTERNUS)

Mm. gemelli et obturator internus

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Utåtrotation av låret
- Stabilisering av lårbenshuvudet

URSPRUNG

Spina ischiadica, insidan av membrana obturatoria, sittbensknölen.

FÄSTE

Insidan av trochanter major.

INNERVATION

N. obturatorius internus (L5–S2).

TRIGGERPUNKT

Under piriformis, bakom trochanter major.

REFERERAD SMÄRTA

- Djupt i den nedre delen av sätesregionen
- Bakre delen av höften

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Magliggande, knät böjt
- Djup palpation bakom trochanter

ASSOCIERADE SYMTOM

- Djup sätessmärta
- Obehag vid sittande

KLINISKT TIPS Påverkas ofta tillsammans med piriformis; behandlas med samma stretch.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

QUADRATUS FEMORIS

Musculus quadratus femoris

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Utåtrotation av låret

URSPRUNG

Sittbensknölen.

FÄSTE

Crista intertrochanterica.

INNERVATION

N. quadratus femoris (L4–S1).

TRIGGERPUNKT

Mellan sittbensknölen och trochanter major.

REFERERAD SMÄRTA

- Runt sittbensknölen
- Bakre delen av höften

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Magliggande
- Djup palpation lateralt om sittbensknölen

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta vid sittbenet när patienten sitter

KLINISKT TIPS Vid smärta runt sittbensknölen: skilj den från problem i hamstringssenorna.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

TENSOR FASCIAE LATAE (TFL)

Musculus tensor fasciae latae

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



○ Triggerpunkt (X) ● Primär smärtzon ● Spridningszon

FUNKTION

- Flexion, abduktion och inåtrotation i höften
- Spänner tractus iliotibialis

URSPRUNG

Spina iliaca anterior superior.

FÄSTE

Tractus iliotibialis.

INNERVATION

N. gluteus superior (L4–S1).

TRIGGERPUNKT

Nedanför och bakom spina iliaca anterior superior.

REFERERAD SMÄRTA

- Utsidan av höften
- Utsidan av låret ner till knät

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande eller sidoliggande
- Flat palpation nedanför spina iliaca anterior superior

ASSOCIERADE SYMTOM

- Höftsmärta
- Smärta vid snabb gång

KLINISKT TIPS Hos löpare: undersök den tillsammans med iliotibialbandssyndrom (ITB-syndrom).

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

ILIOPSOAS

Musculus iliopsoas

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Flexion i höften
- Stabilisering av ländryggen

URSPRUNG

Psoas: kotorna Th12–L4; iliacus: fossa iliaca.

FÄSTE

Trochanter minor.

INNERVATION

Plexus lumbalis (L1–L3), n. femoralis.

TRIGGERPUNKT

I ljumsken nedanför ligamentum inguinale och genom bukväggen över psoas.

REFERERAD SMÄRTA

- Vertikalt band längs ryggraden
- Korsbenet
- Framsidan av låret

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande, knäna böjda
- Palpera djupt och långsamt, på utandning, genom bukväggen
- Håll dig borta från bukaorta (puls)

ASSOCIERADE SYMTOM

- Ländryggssmärta som ökar i stående och minskar i liggande
- Svårt att räta på sig när patienten reser sig från sittande

KLINISKT TIPS Långvarigt sittande förkortar den: lär patienten att stretcha höftflexorerna i utfallsställning.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

PECTINEUS

Musculus pectineus

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Adduktion och flexion av låret

URSPRUNG

Pecten ossis pubis.

FÄSTE

Linea pectinea på femur.

INNERVATION

N. femoralis (L2–L3), ibland n. obturatorius.

TRIGGERPUNKT

Nedanför ljumsken, i den övre mediala delen av låret.

REFERERAD SMÄRTA

- Djupt i ljumsken

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande, benet i lätt abduktion
- Palpera medialt om a. femoralis

ASSOCIERADE SYMTOM

- Ljumsksmärta
- Smärta vid sittande med benen i kors

KLINISKT TIPS Vid ljumsksmärta: leta efter en muskulär orsak först när bråck och orsaker i höftleden är uteslutna.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

ADDUCTOR LONGUS OCH BREVIS

Mm. adductores longus et brevis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Adduktion av låret
- Bidrar till flexion i höften

URSPRUNG

Blygdbenet.

FÄSTE

Linea aspera på femur.

INNERVATION

N. obturatorius (L2–L4).

TRIGGERPUNKT

I den övre tredjedelen av lårets insida.

REFERERAD SMÄRTA

- Ljumsken
- Insidan av låret
- Insidan av knät och underbenet

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande, knät böjt och fallet åt sidan
- Pincettgrepp på lårets insida

ASSOCIERADE SYMTOM

- Dragkänsla i ljumsken
- Smärta vid trappgång uppåt

KLINISKT TIPS Vanlig hos fotbollsspelare: förebyggs med gradvis belastningsökning och styrketräning av adduktorerna.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 71 · BÄCKEN, HÖFT OCH SÄTE

ADDUCTOR MAGNUS

Musculus adductor magnus

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Adduktion av låret
- Extension i höften (bakre fibrer)

URSPRUNG

Ramus inferior ossis pubis och sittbensknölen.

FÄSTE

Linea aspera och tuberculum adductorium.

INNERVATION

N. obturatorius och n. ischiadicus (L2–L4).

TRIGGERPUNKT

På lårets insida, mitt på och högt upp.

REFERERAD SMÄRTA

- Ljumsken
- Insidan av låret
- Djupt i bäckenet

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande, benet i abduktion
- Palpera på lårets bakre-mediala sida

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta på lårets insida
- Obehag i bäckenet

KLINISKT TIPS Vid smärta inne i bäckenet: uteslut gynekologiska och urologiska orsaker.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

GRACILIS

Musculus gracilis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Adduktion av låret
- Flexion och inåtrotation i knät

URSPRUNG

Ramus inferior ossis pubis.

FÄSTE

Pes anserinus (insidan av tibia).

INNERVATION

N. obturatorius (L2–L3).

TRIGGERPUNKT

I mittersta delen av lårets insida.

REFERERAD SMÄRTA

- Brännande, ytlig smärta på lårets insida

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande, benet i abduktion
- Pincettgrepp

ASSOCIERADE SYMTOM

- Sveda på lårets insida

KLINISKT TIPS Skilj den från pes anserinus-bursit: smärtan från gracilis sprider sig över hela låret.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

SARTORIUS

Musculus sartorius

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Flexion, abduktion och utåtrotation i höften
- Flexion i knät

URSPRUNG

Spina iliaca anterior superior.

FÄSTE

Pes anserinus.

INNERVATION

N. femoralis (L2–L3).

TRIGGERPUNKT

På flera punkter längs muskelns förlopp.

REFERERAD SMÄRTA

- Stickande, ytlig smärta som löper snett över lårets framsida

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande
- Pincettgrepp längs det sneda förloppet

ASSOCIERADE SYMTOM

- Stickningar i låret
- Domningar på lårets utsida (n. cutaneus femoris lateralis)

KLINISKT TIPS N. cutaneus femoris lateralis passerar nära spina iliaca anterior superior: kan efterlikna symtom på meralgia paraesthetica.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

BÄCKENBOTTENMUSKULATUREN

Mm. levator ani et coccygeus

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Stöd för bäckenorganen
- Bidrar till kontinensen

URSPRUNG

Blygdbenet, arcus tendineus, spina ischiadica.

FÄSTE

Svanskotan och ligamentum anococcygeum.

INNERVATION

Plexus sacralis (S3–S4).

TRIGGERPUNKT

Intill svanskotan och på bäckenets inre vägg; intern palpation utförs endast av utbildad behandlare.

REFERERAD SMÄRTA

- Svanskotan
- Nedre delen av korsbenet
- Djupt i bäckenet

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Extern palpation intill svanskotan
- Intern undersökning är en uppgift för utbildad terapeut

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta i svanskotan vid sittande
- Tryckkänsla i bäckenet

KLINISKT TIPS Intern behandling ska endast utföras av en terapeut med lämplig utbildning i bäckenbotten. Undersökning av specialistläkare rekommenderas.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KROPPSREGION

LÅR, UNDERBEN OCH FOT

Kort 75–102 · 28 muskler

KORT 75 · LÅR, UNDERBEN OCH FOT

RECTUS FEMORIS

Musculus rectus femoris

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Extension i knät
- Flexion i höften

URSPRUNG

Spina iliaca anterior inferior.

FÄSTE

Knäskålen och tuberositas tibiae (ligamentum patellae).

INNERVATION

N. femoralis (L2–L4).

TRIGGERPUNKT

I lårets övre del nedanför ljumsken.

REFERERAD SMÄRTA

- Runt knäskålen och djupt i knät

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande
- Flat palpation i lårets övre främre del

ASSOCIERADE SYMTOM

- Knäsmärta vid trappgång nedåt
- Nattlig knäsmärta

KLINISKT TIPS Källan till smärta i knäts framsida sitter ofta högt upp på låret: palpera längre upp.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 76 · LÅR, UNDERBEN OCH FOT

VASTUS MEDIALIS

Musculus vastus medialis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Extension i knät
- Medial stabilisering av knäskålen

URSPRUNG

Mediala läppen av linea aspera.

FÄSTE

Knäskålens mediala kant och ligamentum patellae.

INNERVATION

N. femoralis (L2–L4).

TRIGGERPUNKT

Ovanför knäskålen medialt och mitt på låret.

REFERERAD SMÄRTA

- Insidan av knät
- Lårets främre mediala del

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande, knät lätt böjt
- Flat palpation ovanför knät medialt

ASSOCIERADE SYMTOM

- Knät ”viker sig” (buckling)
- Knäsmärta vid djup knäböj

KLINISKT TIPS Att ”knät viker sig” beror ofta inte på en ligamentskada utan på en triggerpunkt i vastus medialis.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 77 · LÅR, UNDERBEN OCH FOT

VASTUS LATERALIS

Musculus vastus lateralis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Extension i knät

URSPRUNG

Trochanter major, laterala läppen av linea aspera.

FÄSTE

Knäskålens laterala kant och ligamentum patellae.

INNERVATION

N. femoralis (L2–L4).

TRIGGERPUNKT

På lårets utsida, längs hela muskeln.

REFERERAD SMÄRTA

- Utsidan av låret
- Utsidan av knät
- Knäskålens laterala kant

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Sidoliggande
- Flat palpation på lårets utsida

ASSOCIERADE SYMTOM

- Kan inte ligga på den smärtande sidan
- Knäskålen ”låser sig”

KLINISKT TIPS Kan dra knäskålen lateralt: behandla den tillsammans med styrketräning av den mediala sidan.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 78 · LÅR, UNDERBEN OCH FOT

VASTUS INTERMEDIUS

Musculus vastus intermedius

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Extension i knät

URSPRUNG

Femurs främre och laterala yta.

FÄSTE

Knäskålens övre kant.

INNERVATION

N. femoralis (L2–L4).

TRIGGERPUNKT

Djupt under rectus femoris, i lårets övre del.

REFERERAD SMÄRTA

- Lårets främre mellersta del

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande
- För rectus femoris åt sidan och palpera djupt

ASSOCIERADE SYMTOM

- Svårt att sträcka knät helt
- Smärta när patienten reser sig

KLINISKT TIPS På grund av sitt djupa läge missas den ofta vid undersökningen.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 79 · LÅR, UNDERBEN OCH FOT

BICEPS FEMORIS

Musculus biceps femoris

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) Primär smärtzon Spridningszon

FUNKTION

- Flexion i knät
- Extension i höften (långa huvudet)

URSPRUNG

Långa huvudet: sittbensknölen; korta huvudet: linea aspera.

FÄSTE

Caput fibulae.

INNERVATION

N. ischiadicus (L5–S2).

TRIGGERPUNKT

I nedre halvan av lårets bakre-laterala sida.

REFERERAD SMÄRTA

- Bakom knät
- Baksidan av låret

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Magliggande
- Pincettgrepp på lårets bakre-laterala sida

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta bakom knät vid gång
- Smärta efter sittande

KLINISKT TIPS Vid långvarigt sittande kan stolskanten trycka på den: kontrollera sitthöjden.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 80 · LÅR, UNDERBEN OCH FOT

SEMITENDINOSUS OCH SEMIMEMBRANOSUS

Mm. semitendinosus et semimembranosus

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Flexion och inåtrotation i knät
- Extension i höften

URSPRUNG

Sittbensknölen.

FÄSTE

Tibias mediala yta (pes anserinus) och mediala kondylen.

INNERVATION

N. ischiadicus (L5–S2).

TRIGGERPUNKT

I nedre halvan av lårets bakre-mediala sida.

REFERERAD SMÄRTA

- Nedre delen av sätesregionen
- Baksidan av låret
- Insidan av knät och vaden

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Magliggande
- Pincettgrepp på lårets bakre-mediala sida

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta vid sittande
- Smärta vid gång

KLINISKT TIPS Hamstrings är ofta spända; utöver stretching skyddar excentrisk styrketräning mot skador.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

POPLITEUS

Musculus popliteus

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- ”Låser upp” knät från full extension (inåtrotation)
- Bakre stabilisering av knät

URSPRUNG

Femurs laterala kondyl.

FÄSTE

Tibias baksida.

INNERVATION

N. tibialis (L4–S1).

TRIGGERPUNKT

I nedre delen av knävecket, mellan gastrocnemius huvuden, medialt.

REFERERAD SMÄRTA

- Bakom knät

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Magliggande, knät lätt böjt
- Djup palpation i knävecket (undvik tryck på kärlen)

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta i nedförsbacke
- Smärta vid djup knäböj

KLINISKT TIPS Om knävecket är svullet eller varmt: uteslut Bakers cysta och djup ventrombos.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 82 · LÅR, UNDERBEN OCH FOT

GASTROCNEMIUS

Musculus gastrocnemius

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Plantarflexion av foten
- Bidrar till flexion i knät

URSPRUNG

Femurs mediala och laterala kondyl.

FÄSTE

Tuber calcanei (hälsenan).

INNERVATION

N. tibialis (S1–S2).

TRIGGERPUNKT

I båda huvudena, i vadens övre del.

REFERERAD SMÄRTA

- Insidan av fotvalvet
- Bakom knät
- Vaden

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Magliggande
- Pincettgrepp om vadmuskelns huvuden

ASSOCIERADE SYMTOM

- Nattliga vadkramper
- Smärta vid gång i uppförsbacke

KLINISKT TIPS Bakom nattliga vadkramper ligger ofta en triggerpunkt: stretching på kvällen rekommenderas.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

SOLEUS

Musculus soleus

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Plantarflexion av foten (främst med böjt knä)
- Venpump

URSPRUNG

Caput fibulae och tibias baksida.

FÄSTE

Tuber calcanei (hälsenan).

INNERVATION

N. tibialis (S1–S2).

TRIGGERPUNKT

I vadens nedre del ovanför hälsenan och högre upp.

REFERERAD SMÄRTA

- Hälen
- Vaden
- I sällsynta fall iliosakralleden

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Magliggande, knät böjt 90°
- Pincettgrepp under gastrocnemius

ASSOCIERADE SYMTOM

- Hälsmärta
- Smärta vid trappgång uppåt

KLINISKT TIPS Källan till hälsmärta är inte alltid foten: undersök även soleus.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

PLANTARIS

Musculus plantaris

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Bidrar till plantarflexion av foten

URSPRUNG

Femurs laterala suprakondylära linje.

FÄSTE

Tuber calcanei.

INNERVATION

N. tibialis (S1–S2).

TRIGGERPUNKT

I knävecket lateralt, intill gastrocnemius laterala huvud.

REFERERAD SMÄRTA

- Bakom knät
- Vadens övre del

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Magliggande
- Palpera i knävecket lateralt

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta bakom knät

KLINISKT TIPS Saknas ofta; undersök även andra smärtkällor i knävecket.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 85 · LÅR, UNDERBEN OCH FOT

TIBIALIS ANTERIOR

Musculus tibialis anterior

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Dorsalflexion av foten
- Supination av foten

URSPRUNG

Tibias laterala yta.

FÄSTE

Os cuneiforme mediale och 1:a metatarsalbenet.

INNERVATION

N. peroneus profundus (L4–L5).

TRIGGERPUNKT

I övre tredjedelen av underbenets framsida, lateralt om skenbenet.

REFERERAD SMÄRTA

- Fotledens framsida
- Stortån
- Skenbenet

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande
- Flat palpation intill skenbenet

ASSOCIERADE SYMTOM

- Snubblande, känsla av ”droppfot”
- Smärta i skenbenet efter löpning

KLINISKT TIPS Vid ”shin splints”: undersök tibialis anterior och kontrollera även löparskorna.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 86 · LÅR, UNDERBEN OCH FOT

TIBIALIS POSTERIOR

Musculus tibialis posterior

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Upprätthåller fotvalvet
- Supination av foten

URSPRUNG

Tibias och fibulas baksida, membrana interossea.

FÄSTE

Tuberositas ossis navicularis och fotens ben.

INNERVATION

N. tibialis (L4–L5).

TRIGGERPUNKT

Djupt under vaden; kan bara palperas indirekt.

REFERERAD SMÄRTA

- Hälsenan
- Hela fotsulan
- Vaden

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Magliggande
- Djup indirekt palpation längs tibias bakre kant

ASSOCIERADE SYMTOM

- Fotsmärta vid gång
- Plattfot

KLINISKT TIPS Överbelastas ofta vid plattfot: lämpliga skor och inlägg är viktiga.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

PERONEUS (FIBULARIS) LONGUS

Musculus fibularis (peroneus) longus

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Pronation av foten
- Plantarflexion av foten
- Upprätthåller fotvalvet

URSPRUNG

Caput fibulae och fibulas laterala yta.

FÄSTE

1:a metatarsalbenet och os cuneiforme mediale.

INNERVATION

N. peroneus superficialis (L5–S1).

TRIGGERPUNKT

2–3 cm nedanför caput fibulae.

REFERERAD SMÄRTA

- Runt och bakom laterala malleolen
- Utsidan av foten

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Sidoliggande
- Flat palpation längs fibula

ASSOCIERADE SYMTOM

- Instabilitetskänsla i fotleden
- Återkommande smärta efter stukning

KLINISKT TIPS N. peroneus löper runt caput fibulae: tryck inte hårt eller länge där.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

PERONEUS (FIBULARIS) BREVIS

Musculus fibularis (peroneus) brevis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Pronation av foten
- Plantarflexion av foten

URSPRUNG

Nedre två tredjedelarna av fibula.

FÄSTE

Tuberositas ossis metatarsalis quinti.

INNERVATION

N. peroneus superficialis (L5–S1).

TRIGGERPUNKT

I nedre tredjedelen av underbenets utsida.

REFERERAD SMÄRTA

- Laterala malleolen
- Utsidan av foten

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Sidoliggande
- Flat palpation längs fibulas nedre del

ASSOCIERADE SYMTOM

- Instabil fotled
- Smärta på ojämnt underlag

KLINISKT TIPS Efter en fotledsstukning är styrke- och balansträning avgörande.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

PERONEUS (FIBULARIS) TERTIUS

Musculus fibularis (peroneus) tertius

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT



Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Dorsalflexion av foten
- Pronation av foten

URSPRUNG

Nedre tredjedelen av fibula.

FÄSTE

Basen av 5:e metatarsalbenet (dorsalsidan).

INNERVATION

N. peroneus profundus (L5–S1).

TRIGGERPUNKT

I nedre tredjedelen av underbenets främre-laterala sida.

REFERERAD SMÄRTA

- Fotledens framsida
- Utsidan av hälen

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande
- Flat palpation intill extensor digitorum longus

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta framtill i fotleden

KLINISKT TIPS Undersök den tillsammans med extensor digitorum longus.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 90 · LÅR, UNDERBEN OCH FOT

EXTENSOR DIGITORUM LONGUS

Musculus extensor digitorum longus

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Extension av 2:a–5:e tån
- Dorsalflexion av foten

URSPRUNG

Tibias laterala kondyl, fibulas framsida.

FÄSTE

Dorsalaponeurosen på 2:a–5:e tån.

INNERVATION

N. peroneus profundus (L5–S1).

TRIGGERPUNKT

På underbenets främre-laterala sida, cirka 8 cm nedanför knät.

REFERERAD SMÄRTA

- Fotryggen
- De mellersta tårna

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande
- Be patienten lyfta tårna: bandet blir kännbart

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta på fotryggen
- Krampliknande känsla framtill

KLINISKT TIPS Trånga skor och hårt knutna skosnören kan irritera den: kontrollera skorna.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

EXTENSOR HALLUCIS LONGUS

Musculus extensor hallucis longus

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Extension av stortån
- Dorsalflexion av foten

URSPRUNG

Mittersta delen av fibula.

FÄSTE

Stortåns distala falang.

INNERVATION

N. peroneus profundus (L5–S1).

TRIGGERPUNKT

I mellersta och nedre delen av underbenets framsida.

REFERERAD SMÄRTA

- Fotryggen
- Stortån

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande
- Be patienten lyfta stortån

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta i stortån
- Smärta efter löpning

KLINISKT TIPS Uteslut ledorsak: stel stortå (hallux rigidus).

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 92 · LÅR, UNDERBEN OCH FOT

FLEXOR DIGITORUM LONGUS

Musculus flexor digitorum longus

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Flexion av 2:a–5:e tån
- Plantarflexion av foten

URSPRUNG

Tibias baksida.

FÄSTE

Distala falangerna på 2:a–5:e tån.

INNERVATION

N. tibialis (L5–S2).

TRIGGERPUNKT

Djupt på vadens insida, bakom tibia.

REFERERAD SMÄRTA

- Mitten av fotsulan
- De små tårna

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Magliggande
- Palpera bakom tibias mediala kant

ASSOCIERADE SYMTOM

- Fotsmärta vid gång
- Kramper i tårna

KLINISKT TIPS Överbelastas ofta vid plattfot.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 93 · LÅR, UNDERBEN OCH FOT

FLEXOR HALLUCIS LONGUS

Musculus flexor hallucis longus

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) Primär smärtzon Spridningszon

FUNKTION

- Flexion av stortån
- Upprätthåller fotvalvet

URSPRUNG

Fibulas baksida.

FÄSTE

Stortåns distala falang.

INNERVATION

N. tibialis (L5–S2).

TRIGGERPUNKT

Djupt i vadens nedre del, lateralt.

REFERERAD SMÄRTA

- Stortåns plantarsida
- Stortåns bas

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Magliggande
- Djup palpation i vadens nedre del

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta i stortån från fotsulan
- Smärta vid tåstående

KLINISKT TIPS Överbelastas ofta hos dansare och löpare.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 94 · LÅR, UNDERBEN OCH FOT

EXTENSOR DIGITORUM BREVIS

Musculus extensor digitorum brevis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Bidrar till extension av 2:a–4:e tån

URSPRUNG

Calcaneus dorsala yta.

FÄSTE

Extensorsenorna till 2:a–4:e tån.

INNERVATION

N. peroneus profundus (L5–S1).

TRIGGERPUNKT

På fotryggen, framför laterala malleolen.

REFERERAD SMÄRTA

- Lokal smärta på fotryggen

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande
- Flat palpation framför laterala malleolen

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta på fotryggen inne i skon

KLINISKT TIPS En trång skotunga kan trycka på den: det hjälper att lossa på skosnörena.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 95 · LÅR, UNDERBEN OCH FOT

ABDUCTOR HALLUCIS

Musculus abductor hallucis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Abduktion av stortån
- Upprätthåller det mediala fotvalvet

URSPRUNG

Tuber calcanei (processus medialis).

FÄSTE

Stortåns proximala falang (medialt).

INNERVATION

N. plantaris medialis (S1–S2).

TRIGGERPUNKT

På fotens mediala kant, framför hälen.

REFERERAD SMÄRTA

- Hälens insida
- Det mediala fotvalvet

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande, foten vriden utåt
- Flat palpation på fotens mediala kant

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta på fotens insida vid gång

KLINISKT TIPS Löper nära tarsaltunneln: vid domningar, undersök även n. tibialis.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 96 · LÅR, UNDERBEN OCH FOT

FLEXOR DIGITORUM BREVIS

Musculus flexor digitorum brevis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Flexion av 2:a–5:e tån
- Upprätthåller fotvalvet

URSPRUNG

Tuber calcanei.

FÄSTE

Mellanfalangerna på 2:a–5:e tån.

INNERVATION

N. plantaris medialis (S1–S2).

TRIGGERPUNKT

Mitt i fotsulan, under plantarfascian.

REFERERAD SMÄRTA

- Metatarsalhuvudena (framfoten)

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Magliggande
- Djup palpation mitt i fotsulan

ASSOCIERADE SYMTOM

- Framfotssmärta
- Smärta efter långvarigt stående

KLINISKT TIPS Skilj den från plantarfasciit.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 97 · LÅR, UNDERBEN OCH FOT

QUADRATUS PLANTAE

Musculus quadratus plantae

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Korrigerar dragriktningen för flexor digitorum longus

URSPRUNG

Calcaneus plantara yta.

FÄSTE

Senan till flexor digitorum longus.

INNERVATION

N. plantaris lateralis (S1–S2).

TRIGGERPUNKT

Djupt framför hälen, mitt i fotsulan.

REFERERAD SMÄRTA

- Hälens plantarsida

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Magliggande
- Djup palpation framför hälen

ASSOCIERADE SYMTOM

- Hälsmärta på morgonen

KLINISKT TIPS Vid hälsmärta (hälsporre) kan även quadratus plantae bidra.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 98 · LÅR, UNDERBEN OCH FOT

ABDUCTOR DIGITI MINIMI (FOTEN)

Musculus abductor digiti minimi pedis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Abduktion och flexion av lilltån

URSPRUNG

Tuber calcanei.

FÄSTE

Lilltåns proximala falang.

INNERVATION

N. plantaris lateralis (S1–S2).

TRIGGERPUNKT

På fotens laterala kant.

REFERERAD SMÄRTA

- Fotens laterala kant
- Huvudet på 5:e metatarsalbenet

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Sidoliggande
- Pincettgrepp på fotens laterala kant

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta på fotens utsida

KLINISKT TIPS Trånga skor kan trycka mot fotens laterala kant.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 99 · LÅR, UNDERBEN OCH FOT

INTEROSSEI I FOTEN

Mm. interossei pedis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

○ Triggerpunkt (X) ● Primär smärtzon ● Spridningszon

FUNKTION

- Abduktion och adduktion av tårna
- Stabilisering av metatarsofalangealederna

URSPRUNG

Metatarsalbenens sidoytor.

FÄSTE

Tårnas proximala falanger.

INNERVATION

N. plantaris lateralis (S1–S2).

TRIGGERPUNKT

Mellan metatarsalbenen, på dorsal- och plantarsidan.

REFERERAD SMÄRTA

- Tårnas sidor
- Metatarsalområdet

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Palpera mellan metatarsalbenen

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta i tårna
- Domningar mellan tårna

KLINISKT TIPS Skilj dem från Mortons neurom (domningar mellan tårna).

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 100 · LÅR, UNDERBEN OCH FOT

ADDUCTOR HALLUCIS

Musculus adductor hallucis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Adduktion av stortån
- Upprätthåller det tvära fotvalvet

URSPRUNG

Baserna av 2:a–4:e metatarsalbenet och tårnas ledkapslar.

FÄSTE

Stortåns proximala falang (lateralt).

INNERVATION

N. plantaris lateralis (S1–S2).

TRIGGERPUNKT

Djupt under framfoten.

REFERERAD SMÄRTA

- Framfoten under metatarsalhuvudena

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Magliggande
- Djup palpation i framfoten

ASSOCIERADE SYMTOM

- Framfotssmärta
- Smärta vid användning av högklackade skor

KLINISKT TIPS Överbelastas ofta när det tvära fotvalvet sjunker; tåövningar (plocka upp en handduk med tårna) hjälper.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 101 · LÅR, UNDERBEN OCH FOT

EXTENSOR HALLUCIS BREVIS

Musculus extensor hallucis brevis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Extension i stortåns metatarsofalangealled

URSPRUNG

Calcaneus dorsala yta.

FÄSTE

Stortåns proximala falang.

INNERVATION

N. peroneus profundus (L5–S1).

TRIGGERPUNKT

På fotryggen, medialt om extensor digitorum brevis.

REFERERAD SMÄRTA

- Fotryggen ovanför stortåns bas

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Ryggliggande
- Flat palpation på fotryggen

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta på fotryggen ovanför stortån

KLINISKT TIPS Påverkas ofta tillsammans med extensor digitorum brevis.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.

KORT 102 · LÅR, UNDERBEN OCH FOT

FLEXOR HALLUCIS BREVIS

Musculus flexor hallucis brevis

REFERERAD SMÄRTA OCH TRIGGERPUNKT

Triggerpunkt (X) · Primär smärtzon · Spridningszon

FUNKTION

- Flexion i stortåns metatarsofalangealled
- Upprätthåller det mediala fotvalvet

URSPRUNG

Os cuboideum och os cuneiforme laterale.

FÄSTE

Stortåns proximala falang (via sesambenen).

INNERVATION

N. plantaris medialis (S1–S2).

TRIGGERPUNKT

På fotsulans mediala sida, under 1:a metatarsalbenet.

REFERERAD SMÄRTA

- Huvudet på 1:a metatarsalbenet
- Stortån

PALPATION AV TRIGGERPUNKTEN

- Magliggande
- Palpera under 1:a metatarsalbenet

ASSOCIERADE SYMTOM

- Smärta i frånskjutsfasen

KLINISKT TIPS Skilj den från sesamoidit.

Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos eller undersökning av behörig terapeut.