DOMAINE 6 · 10 CARTES

Stress, trauma et sécurité

10 cartes mentales des émotions, chacune sur 2 pages, avec la même structure en six étapes.

Atlas Thérapeutique Visuel · Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Réponse de lutte

Réponse de lutte

01 Comprendre

La réponse de lutte est l'une des réactions de défense automatiques du système nerveux face au danger : énergie, force et impulsion à l'affrontement. Elle est utile en cas de danger réel. Mais lorsqu'elle s'active dans des situations quotidiennes, elle conduit souvent à l'irritabilité, à la colère et aux conflits.

> La réponse de lutte n'est pas un défaut de caractère, mais une défense du système nerveux. Vous pouvez apprendre à l'apaiser.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Bouffées de chaleur, muscles tendus
- Mâchoires serrées, poings fermés
- Rythme cardiaque accéléré


DANS LES PENSÉES

- « Je ne me laisserai pas marcher sur les pieds. »
- « Je dois me défendre. »
- « On m'attaque. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Hausse le ton
- Se dispute, résiste
- Cherche à prendre le contrôle de la situation

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Critiques, injustices, sentiment de perte de contrôle.

Qu'est-ce qui le renforce ? La fatigue, le stress et des expériences difficiles passées.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait que le système nerveux ne fasse pas l'expérience d'une régulation rassurante et sûre.

Réponse de lutte

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Dans quelles situations la réponse de lutte s'active-t-elle en vous ?

2. Que ressentez-vous en premier dans votre corps à ces moments-là ?

3. Qu'essayez-vous de protéger ?

4. Qu'est-ce qui vous aide à retrouver le calme ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Respect
- Contrôle

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Si je n'attaque pas, on me blessera. »
- « La faiblesse est dangereuse. »
- « Je dois toujours rester sur mes gardes. »

Cartes associées : 11 · Colère, 56 · Fenêtre de tolérance, 57 · Hyperactivation

06 Prochaines étapes

→ Reconnaissez les signaux du corps et faites une courte pause.

→ Allongez l'expiration et relâchez les muscles.

→ Libérez l'énergie accumulée par le mouvement.

→ Revenez à la conversation quand vous vous sentez plus calme.

Si les souvenirs d'expériences difficiles vous submergent régulièrement ou vous gênent dans la vie quotidienne, il peut être utile de chercher le soutien d'un professionnel spécialisé dans le psychotraumatisme.

Réponse de fuite

Réponse de fuite

01 Comprendre

La réponse de fuite est une impulsion automatique du système nerveux à s'éloigner du danger. En situation d'urgence réelle, elle sauve la vie. Dans la vie quotidienne, elle peut se manifester par de l'anxiété, de l'évitement, de l'agitation ou une fuite dans une activité incessante.

> La réponse de fuite dit : « Ici, vous n'êtes pas en sécurité. » Cela vaut la peine de vérifier si c'est vrai, ici et maintenant.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Anxiété, difficulté à rester en place
- Respiration rapide
- Jambes tendues


DANS LES PENSÉES

- « Je dois partir d'ici. »
- « Je ne peux pas le supporter. »
- « Vite, je dois juste m'enfuir. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Quitte la situation
- Travaille trop ou est constamment en mouvement
- Évite les conversations difficiles

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Lieux bondés, conflits, proximité émotionnelle.

Qu'est-ce qui le renforce ? Des expériences passées où la fuite a garanti la sécurité.

Qu'est-ce qui le maintient ? L'évitement, qui empêche de nouvelles expériences de sécurité.

Réponse de fuite

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. De quelles situations avez-vous le plus souvent envie de fuir ?
2. Que vous signale votre corps à ces moments-là ?
3. Que se passerait-il si vous restiez juste une minute de plus ?
4. De quoi fuyez-vous vraiment : de la situation ou de l'émotion ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Liberté
- Calme

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Si je reste, quelque chose de terrible va arriver. »
- « Je ne supporte pas cette sensation désagréable. »
- « La fuite est la seule issue. »

Cartes associées : 6 · Évitement anxieux, 56 · Fenêtre de tolérance, 57 · Hyperactivation

06 Prochaines étapes

→ Remarquez l'impulsion de fuite et nommez-la.

→ Sentez vos pieds au sol et ralentissez votre respiration.

→ Restez dans la situation pendant une durée courte et fixée à l'avance.

→ Prévoyez à l'avance une voie de retrait sûre.

Si les souvenirs d'expériences difficiles vous submergent régulièrement ou vous gênent dans la vie quotidienne, il peut être utile de chercher le soutien d'un professionnel spécialisé dans le psychotraumatisme.

Réponse de figement

Réponse de figement

01 Comprendre

La réponse de figement se déclenche lorsque ni la lutte ni la fuite ne semblent possibles. Le corps se bloque, l'esprit se vide, la voix reste coincée dans la gorge. Ensuite, on ressent souvent de la honte (« Pourquoi n'ai-je rien fait ? »), alors qu'il s'agit d'une réaction automatique, non choisie.

> Se figer ne doit pas être confondu avec de la faiblesse ou un consentement : c'est la stratégie de survie du système nerveux.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Muscles raides, immobilité
- Respiration retenue
- Mains et pieds froids, fourmillements


DANS LES PENSÉES

- « J'ai la tête complètement vide. »
- « Je n'arrive pas à dire un mot. »
- « C'est comme si je n'étais pas là. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Ne réagit pas, se bloque complètement
- N'arrive pas à prendre de décision
- Se reproche les choses après coup

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Cris, conflits soudains, situations rappelant d'anciens traumatismes.

Qu'est-ce qui le renforce ? La honte et les autoreproches, qui surchargent encore le système nerveux.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait que le corps ne fasse pas l'expérience d'une sortie sûre de l'état de figement.

Réponse de figement

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Avez-vous déjà vécu l'expérience de vous bloquer complètement ?
2. Qu'avez-vous ressenti dans votre corps ensuite ?
3. Que vous dites-vous habituellement à propos de ces moments ?
4. Qu'est-ce qui vous aide à « revenir » dans votre corps ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Compréhension
- Acceptation de soi

CROYANCES FRÉQUENTES

- « J'ai été faible parce que je n'ai rien fait. »
- « C'était ma faute. »
- « Je ne peux pas faire confiance à mon corps. »

Cartes associées : 56 · Fenêtre de tolérance, 58 · Déconnexion et hypoactivation, 13 · Honte

06 Prochaines étapes

→ Dites-vous : « Mon corps m'a protégé du mieux qu'il pouvait. »

→ Bougez doucement les doigts des mains et des pieds.

→ Regardez autour de vous et nommez les couleurs présentes dans la pièce.

→ Si cela arrive souvent, demandez l'aide d'un thérapeute spécialisé dans le psychotraumatisme.

Si les souvenirs d'expériences difficiles vous submergent régulièrement ou vous gênent dans la vie quotidienne, il peut être utile de chercher le soutien d'un professionnel spécialisé dans le psychotraumatisme.

Réponse de complaisance

Réponse de complaisance

01 Comprendre

La réponse de complaisance (fawn) est une stratégie du système nerveux par laquelle nous cherchons à écarter le danger en cédant aux autres et en nous montrant conciliants. Elle se développe souvent dans l'enfance, quand c'était le seul moyen de préserver sa sécurité. À l'âge adulte, elle conduit à une adaptation excessive et à l'absence de limites.

> Se montrer complaisant a apporté de la sécurité par le passé. Aujourd'hui, cela ne laisse pas de place à vos besoins.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension à l'approche d'un conflit
- Un sourire qui cache la peur intérieure
- Épuisement


DANS LES PENSÉES

- « Pourvu qu'il ne se mette pas en colère. »
- « Qu'est-ce que l'autre personne veut entendre ? »
- « Mes besoins ne sont pas importants. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Dit oui à tout
- S'excuse avant même que quelque chose se soit produit
- Évite le mot « non »

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Expression du visage tendue, critiques, figures d'autorité.

Qu'est-ce qui le renforce ? Des expériences passées où s'opposer était dangereux.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait que la complaisance réduise réellement la tension à court terme.

Réponse de complaisance

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quand dites-vous oui alors que vous pensez non ?
2. Que craignez-vous qu'il se passe si vous refusez ?
3. Qui vous a appris que s'adapter garantissait la sécurité ?
4. Quel pourrait être un petit pas vers l'écoute de vos besoins ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Acceptation
- Sa propre voix

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Si je dis non, je suis en danger. »
- « Les sentiments des autres sont plus importants. »
- « Je ne mérite d'être aimé que lorsque je m'adapte. »

Cartes associées : 68 · Besoin de plaire, 72 · Difficulté à dire non, 71 · Limites personnelles

06 Prochaines étapes

→ Demandez un temps de réflexion avant de dire oui.

→ Entraînez-vous à dire un petit « non » dans des contextes sûrs.

→ Notez ce que vous voulez vraiment dans la situation donnée.

→ Remarquez les signaux du corps quand vous commencez à trop céder.

Si les souvenirs d'expériences difficiles vous submergent régulièrement ou vous gênent dans la vie quotidienne, il peut être utile de chercher le soutien d'un professionnel spécialisé dans le psychotraumatisme.

Déclencheurs émotionnels

Déclencheurs émotionnels

01 Comprendre

Les déclencheurs émotionnels sont des stimuli sensoriels – sons, mots, situations, odeurs – liés à une expérience douloureuse du passé, qui provoquent une réaction d'une intensité disproportionnée par rapport à la situation présente. La réaction appartient au passé, mais elle se manifeste dans le présent.

> Quand la réaction est plus forte que ce que la situation exige, c'est souvent une ancienne blessure qui se manifeste.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tachycardie soudaine
- Gorge serrée
- Fourmillements ou tremblements


DANS LES PENSÉES

- « Exactement comme cette fois-là. »
- « Ça recommence. »
- Une vague émotionnelle soudaine et submergeante

DANS LE COMPORTEMENT

- Explose brusquement ou se retire
- Évite les situations déclencheuses
- Ne comprend pas sa propre réaction après coup

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Ton de voix, expressions du visage, dates anniversaires, odeurs.

Qu'est-ce qui le renforce ? La fatigue et le stress, qui affaiblissent la résilience psychologique.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le manque de conscience de ses déclencheurs, qui fait que la réaction vous prend par surprise.

Déclencheurs émotionnels

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quelles situations suscitent en vous une forte réaction ?
2. Que vous rappelle cette situation ?
3. Quel âge avez-vous l'impression d'avoir dans un tel moment ?
4. Qu'est-ce qui peut vous aider à vous préparer avant ces occasions ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Prévisibilité
- Compréhension

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je suis hypersensible. »
- « Je n'arrive pas à contrôler mes réactions. »
- « Le passé ne me laissera jamais en paix. »

Cartes associées : 56 · Fenêtre de tolérance, 59 · Sentiment de sécurité, 89 · Déclencheurs du deuil

06 Prochaines étapes

→ Tenez un journal de vos déclencheurs et de vos réactions.

→ Dites-vous : « C'est une ancienne émotion, pas la situation d'ici et maintenant. »

→ Utilisez une technique d'ancrage (5-4-3-2-1).

→ Prévoyez à l'avance quoi faire quand vous rencontrez un déclencheur connu.

Si les souvenirs d'expériences difficiles vous submergent régulièrement ou vous gênent dans la vie quotidienne, il peut être utile de chercher le soutien d'un professionnel spécialisé dans le psychotraumatisme.

Fenêtre de tolérance

Fenêtre de tolérance

01 Comprendre

La fenêtre de tolérance (selon Daniel Siegel) est la zone optimale dans laquelle le niveau d'activation soutient l'attention sans perturber les capacités de réflexion. Dans cette zone, nous pouvons apprendre, créer des liens et prendre de bonnes décisions. Au-dessus de la fenêtre survient l'hyperactivation (anxiété, colère) ; en dessous, l'hypoactivation (vide, extinction émotionnelle).

> L'objectif n'est pas le calme à tout prix, mais d'élargir la fenêtre et d'apprendre les chemins pour y revenir.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Dans la fenêtre : respiration calme, muscles détendus
- Au-dessus de la fenêtre : tachycardie, tension
- En dessous de la fenêtre : extinction, lourdeur


DANS LES PENSÉES

- Dans la fenêtre : « Je peux gérer cette situation. »
- Au-dessus de la fenêtre : « C'est trop à supporter. »
- En dessous de la fenêtre : « Plus rien n'a d'importance. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Dans la fenêtre : cherche le contact, réfléchit
- Au-dessus de la fenêtre : explose, fuit
- En dessous de la fenêtre : se retire, se fige

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Stress, conflits, épuisement, anciens souvenirs.

Qu'est-ce qui le renforce ? Le manque de repos et l'isolement.

Qu'est-ce qui le maintient ? L'absence d'outils d'autorégulation bien établis qui facilitent le retour.

Fenêtre de tolérance

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Comment vous sentez-vous quand vous êtes dans votre fenêtre de tolérance ?
2. Comment remarquez-vous que vous êtes sur le point d'en sortir par le haut ?
3. Et comment remarquez-vous que vous glissez en dessous ?
4. Qu'est-ce qui vous aide à retrouver le chemin du retour ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Régulation
- Relation

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je n'ai aucun contrôle sur mon état intérieur. »
- « Je réagis toujours trop fort ou trop peu. »
- « La paix intérieure, c'est pour les autres. »

Cartes associées : 57 · Hyperactivation, 58 · Déconnexion et hypoactivation, 19 · Surcharge émotionnelle

06 Prochaines étapes

→ Dessinez votre fenêtre de tolérance et inscrivez-y vos signaux personnels.

→ Notez ce qui vous aide quand vous êtes au-dessus, et ce qui vous aide quand vous êtes en dessous.

→ Une minute par jour : où suis-je en ce moment par rapport à la fenêtre ?

→ Assurez-vous un repos régulier, de l'activité physique et du contact avec les autres.

Si les souvenirs d'expériences difficiles vous submergent régulièrement ou vous gênent dans la vie quotidienne, il peut être utile de chercher le soutien d'un professionnel spécialisé dans le psychotraumatisme.

Hyperactivation

Hyperactivation

01 Comprendre

L'hyperactivation (hyperarousal) est un état dans lequel le système nerveux fonctionne au-dessus de la fenêtre de tolérance : trop d'énergie, une vigilance excessive et des émotions submergeantes. Il devient difficile de penser clairement, de prendre des décisions ou de dormir. Après un stress prolongé ou un traumatisme, elle peut devenir chronique.

> En état d'hyperactivation, le corps a d'abord besoin d'être apaisé, pas d'arguments rationnels. Le calme commence toujours par le corps.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Cœur qui s'accélère, respiration superficielle
- Transpiration, tremblements
- Troubles du sommeil, nuits agitées


DANS LES PENSÉES

- « Quelque chose de terrible va arriver. »
- Surcharge de pensées
- Difficulté à se concentrer

DANS LE COMPORTEMENT

- Irritabilité, réactions précipitées
- Difficulté à ralentir
- Prend en charge trop d'engagements

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Conflits, échéances serrées, bruit, anciens souvenirs.

Qu'est-ce qui le renforce ? La caféine, un sommeil insuffisant et un manque chronique de récupération.

Qu'est-ce qui le maintient ? L'absence de méthodes quotidiennes pour évacuer la tension et retrouver le calme.

Hyperactivation

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Comment remarquez-vous que vous montez en régime ?
2. Qu'est-ce qui vous aide habituellement à ces moments-là ?
3. De combien de temps disposez-vous chaque jour pour vous reposer ?
4. À quoi pouvez-vous renoncer cette semaine ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Calme
- Repos
- Sécurité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Si je m'arrête, tout s'effondre. »
- « Se reposer, c'est du temps perdu. »
- « Je dois toujours être en alerte. »

Cartes associées : 56 · Fenêtre de tolérance, 51 · Réponse de lutte, 97 · Tension et état d'alerte

06 Prochaines étapes

→ Expiration prolongée : inspirez pendant 4 s, expirez pendant 7–8 s, répétez quelques fois.

→ De l'eau froide sur le visage ou sur les poignets.

→ Un mouvement régulier pour évacuer l'excès d'énergie.

→ Réduisez la caféine et gardez des horaires de sommeil réguliers.

Si les souvenirs d'expériences difficiles vous submergent régulièrement ou vous gênent dans la vie quotidienne, il peut être utile de chercher le soutien d'un professionnel spécialisé dans le psychotraumatisme.

Déconnexion et hypoactivation

Déconnexion et hypoactivation

01 Comprendre

L'hypoactivation (hypoarousal) est un état dans lequel le système nerveux fonctionne en dessous de la fenêtre de tolérance : vide, extinction émotionnelle, manque d'énergie et déconnexion du corps et des émotions. Elle apparaît souvent après un stress écrasant, quand le système passe en mode d'urgence.

> La déconnexion est une protection contre des stimuli sensoriels intolérables. Retrouver la connexion demande du temps et de petits pas sûrs.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Fatigue, membres lourds
- Absence de sensations, impression de froid
- Mouvements ralentis


DANS LES PENSÉES

- « Je ne ressens rien. »
- « C'est comme si j'étais dans le brouillard. »
- « Plus rien ne m'importe. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Se replie sur soi
- Dort sans cesse ou reste immobile devant un écran
- N'arrive pas à se mettre en mouvement

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Trop de stress, de conflits ou des vécus de perte.

Qu'est-ce qui le renforce ? L'isolement et le manque de mouvement.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le manque de stimuli sensoriels qui aident à revenir dans le corps en sécurité.

Déconnexion et hypoactivation

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quand vous sentez-vous « déconnecté » ?

2. Que s'était-il passé juste avant ?

3. Qu'est-ce qui vous aide à sentir de nouveau un peu votre corps ?

4. Qui vous procure un sentiment de soulagement par sa seule présence ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Contact
- Vitalité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Mieux vaut ne rien ressentir. »
- « De toute façon, je n'ai la force de rien faire. »
- « Rien ne changera, de toute façon. »

Cartes associées : 56 · Fenêtre de tolérance, 53 · Réponse de figement, 14 · Tristesse

06 Prochaines étapes

→ Commencez par des mouvements doux : étirements, une promenade, des mouvements rythmiques.

→ Utilisez des stimuli sensoriels plus marqués : eau froide, un parfum frais, une saveur prononcée.

→ Contactez quelqu'un, même par un court message.

→ Fixez-vous une tâche petite et tout à fait accessible.

Si les souvenirs d'expériences difficiles vous submergent régulièrement ou vous gênent dans la vie quotidienne, il peut être utile de chercher le soutien d'un professionnel spécialisé dans le psychotraumatisme.

Sentiment de sécurité

Sentiment de sécurité

01 Comprendre

Le sentiment de sécurité est un état du système nerveux dans lequel le corps et l'esprit savent qu'il n'y a aucun danger immédiat, ce qui rend possibles le repos, la curiosité et la proximité avec les autres. Il ne dépend pas seulement des circonstances extérieures : il se construit aussi à partir des signaux corporels, de bonnes relations et de ressources intérieures.

> La sécurité n'est pas seulement l'absence de danger, mais la présence de lien et de calme intérieur.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Respiration plus profonde et plus calme
- Muscles détendus
- Chaleur dans le corps


DANS LES PENSÉES

- « Ici et maintenant, je suis en sécurité. »
- « Je peux faire confiance à quelqu'un. »
- « J'ai tout mon temps. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Plus d'ouverture et de curiosité
- Plus de facilité à créer des liens
- Capacité à se reposer

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Une personne de confiance, un lieu sûr, un rituel rassurant.

Qu'est-ce qui le renforce ? Un repos régulier, des relations soutenantes et la prévisibilité.

Qu'est-ce qui le maintient ? La répétition : chaque expérience de sécurité renforce le système nerveux.

Sentiment de sécurité

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Où et avec qui vous sentez-vous le plus en sécurité ?
2. Que ressentez-vous dans votre corps à ces moments-là ?
3. Quels objets, odeurs et sons vous procurent un sentiment de sécurité ?
4. Comment pouvez-vous les intégrer à votre vie quotidienne ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Relation
- Prévisibilité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je ne suis en sécurité nulle part. »
- « Le calme ne dure jamais longtemps. »
- « Je ne mérite ni paix ni tranquillité. »

Cartes associées : 56 · Fenêtre de tolérance, 115 · Réseau de soutien, 117 · Ressources intérieures

06 Prochaines étapes

→ Créez une « liste de sécurité » : personnes, lieux, objets et activités.

→ Instaurez un rituel quotidien pour décrocher.

→ Visualisez un lieu sûr et retournez-y mentalement chaque jour.

→ Remarquez ce qui aide votre corps à se détendre complètement.

Si les souvenirs d'expériences difficiles vous submergent régulièrement ou vous gênent dans la vie quotidienne, il peut être utile de chercher le soutien d'un professionnel spécialisé dans le psychotraumatisme.

Stabilisation et rétablissement après des expériences difficiles

Stabilisation et rétablissement après des expériences difficiles

01 Comprendre

La stabilisation et le rétablissement après des événements douloureux sont un cheminement dans lequel on établit d'abord la sécurité et la stabilité au quotidien, pour ensuite élaborer ce qui s'est passé avec un soutien adapté. Le rétablissement n'est pas une ligne droite : périodes favorables et difficiles alternent.

> D'abord la sécurité, ensuite l'intégration des expériences. Le rythme est donné par votre sentiment de sécurité.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Niveau d'énergie fluctuant
- Changements du sommeil et de l'appétit
- Plus grande vulnérabilité corporelle


DANS LES PENSÉES

- « Quand vais-je redevenir moi-même ? »
- « Quelque chose en moi s'est brisé pour toujours. »
- « Avec le temps, les choses iront mieux. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Met en place des routines quotidiennes stables
- Alterne moments de retrait et moments de proximité
- Cherche du soutien

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Accidents, deuils, violences, crises.

Qu'est-ce qui le renforce ? La sécurité, des relations soutenantes et un accompagnement professionnel.

Qu'est-ce qui le maintient ? Se confronter au traumatisme trop tôt ou trop vite, au risque de se sentir de nouveau submergé.

Stabilisation et rétablissement après des expériences difficiles

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Qu'est-ce qui vous donne le plus de sécurité au quotidien en ce moment ?
2. Qui vous soutient pendant cette période ?
3. À quoi remarquez-vous que vous allez un peu mieux ?
4. De quoi avez-vous besoin pour faire le prochain pas ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Patience
- Soutien

CROYANCES FRÉQUENTES

- « À l'heure qu'il est, j'aurais déjà dû surmonter ça. »
- « Une rechute signifie que j'ai échoué. »
- « Je dois m'en sortir entièrement seul. »

Cartes associées : 56 · Fenêtre de tolérance, 59 · Sentiment de sécurité, 117 · Ressources intérieures

06 Prochaines étapes

→ Mettez en place des routines quotidiennes simples : sommeil, repas à heures régulières, mouvement.

→ Repérez les personnes et les lieux qui vous procurent un sentiment de sécurité.

→ Apprenez au moins deux techniques d'ancrage différentes.

→ Élaborez les expériences difficiles avec un professionnel spécialisé dans le psychotraumatisme.

Si les souvenirs d'expériences difficiles vous submergent régulièrement ou vous gênent dans la vie quotidienne, il peut être utile de chercher le soutien d'un professionnel spécialisé dans le psychotraumatisme.