ROTA 01

210 Yorumlu Veteriner Klinik Vaka

Rota 01 · Küçük Hayvanlar ve Klinik Akıl Yürütme · 40 vaka

5 Öğrenme Rotası · Küçük, büyük ve egzotik hayvanlar · Yorumlu çözümler

Vaka 001

Gastroenteroloji | Köpek

Vaka 001 · Kanlı ishal ve kusma olan aşısız yavru köpek

Hasta
- Köpek
- 6 aylık
- Erkek

Başvuru nedeni
- Şiddetli kusma
- Kanlı, kötü kokulu ishal
- Halsizlik ve iştahsızlık

Öykü ve bağlam
- Aşı programı tamamlanmamış
- Yeni sahiplenilmiş, parka götürülmüş

Fiziksel muayene
- Dehidratasyon (%8)
- Ateş: 40,1 °C
- Karın palpasyonunda ağrı

Ek bulgular
- Lökopeni: 1,8 ×10³/µL
- Dışkıda parvovirüs antijen testi pozitif



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Lökopeni bu tabloda neyi düşündürür?
2. Bu hastada önceliğiniz ne olmalı?
3. Diğer hayvanlar için hangi önlemler gerekir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kanin parvovirüs enteriti
- Hemorajik gastroenterit
- Yabancı cisim
- Paraziter enterit

Yorumlu çözüm
Aşısız yavruda kanlı ishal, kusma ve belirgin lökopeni parvovirüs enteritini güçlü şekilde düşündürür; antijen testi tanıyı destekler. Tedavi destekleyicidir: agresif sıvı tedavisi, elektrolit ve glikoz takibi, antiemetik, analjezi ve sekonder bakteriyel enfeksiyona karşı antibiyotik. Erken enteral beslenme bağırsak bütünlüğünü korur. Hasta izole edilmeli, ortam virüse etkili dezenfektanla temizlenmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Aşısız yavruda kanlı ishal = önce parvovirüs
- ✓ Lökopeni prognozu etkiler
- ✓ İzolasyon ve dezenfeksiyon tedavinin parçasıdır

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Gastroenteroloji | Köpek

Vaka 002 · Kusma ve karın ağrısı olan, oyuncak kemiren köpek

Hasta
- Köpek
- 3 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Tekrarlayan kusma
- İştahsızlık
- Dışkılama yok

Öykü ve bağlam
- Evdeki oyuncaklar parçalanmış
- Belirtiler 24 saattir var

Fiziksel muayene
- Hafif dehidratasyon
- Kranial karında ağrı
- Rektal muayenede dışkı yok

Ek bulgular
- Röntgende gaz dolu, genişlemiş ince bağırsak ansları
- Ultrasonda hiperekoik obje ve proksimal dilatasyon



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Görüntülemede obstrüksiyonu düşündüren bulgular nelerdir?
2. Kusma tipi lokalizasyon hakkında ne söyler?
3. Ne zaman cerrahi karar verilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İnce bağırsak yabancı cisim obstrüksiyonu
- İntussusepsiyon
- Akut gastroenterit
- Pankreatit

Yorumlu çözüm
Akut kusma, dışkılamanın durması ve segmental bağırsak dilatasyonu mekanik obstrüksiyonu düşündürür. Ultrasonda görülen yabancı cisim ve proksimal genişleme tanıyı güçlendirir. Sıvı ve elektrolit dengesi sağlandıktan sonra enterotomi veya gerekirse enterektomi yapılır. Bağırsak canlılığı operasyon sırasında değerlendirilmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kusma + dışkı yokluğu = obstrüksiyonu düşünün
- ✓ Önce stabilizasyon, sonra cerrahi
- ✓ Bağırsak canlılığı mutlaka kontrol edilir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Gastroenteroloji | Kedi

Vaka 003 · Kilo kaybı ve kronik kusma olan kedi

Hasta
- Kedi
- 9 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Haftada 2-3 kez kusma
- Son 3 ayda kilo kaybı

Öykü ve bağlam
- İç ve dış parazit uygulaması düzenli
- Mama değişikliği yapılmamış

Fiziksel muayene
- Vücut kondisyon skoru 3/9
- Bağırsak ansları palpasyonda kalın

Ek bulgular
- Kobalamin düşük
- Ultrasonda bağırsak duvarı hafif kalın, katmanlar korunmuş



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kronik kusmada hangi sistemleri ayırt etmelisiniz?
2. Düşük kobalamin neyi gösterir?
3. Kesin tanı için hangi yöntem gerekir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kronik enteropati (inflamatuvar)
- Küçük hücreli intestinal lenfoma
- Hipertiroidizm
- Pankreatit

Yorumlu çözüm
Yaşlı kedide kronik kusma ve kilo kaybı varsa önce sistemik nedenler (hipertiroidizm, böbrek hastalığı) dışlanmalıdır. Düşük kobalamin distal ince bağırsak tutulumunu gösterir. Katmanları korunmuş kalınlaşma inflamatuvar enteropati ile küçük hücreli lenfomayı ayırt etmez; ayrım için tam kat biyopsi ve histopatoloji gerekir. Kobalamin takviyesi tedavinin parçasıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kronik kusma her zaman 'normal' değildir
- ✓ Kobalamin hem tanı hem tedavi için önemlidir
- ✓ IBD ve lenfoma ayrımı biyopsiyle yapılır

Gastroenteroloji | Köpek

Vaka 004 · Yemekten sonra karın şişliği ve kusma girişimi olan büyük ırk köpek

Hasta
- Köpek
- 5 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Sonuçsuz kusma girişimi
- Karında hızlı şişlik
- Huzursuzluk

Öykü ve bağlam
- Yemekten hemen sonra koşmuş
- Büyük, derin göğüslü ırk

Fiziksel muayene
- Timpanik, gergin karın
- Taşikardi, zayıf nabız
- Soluk mukozalar, uzamış KDZ

Ek bulgular
- Sağ lateral röntgende 'çift kabarcık' görünümü
- Laktat: 6,8 mmol/L



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Bu hasta neden acil bir hastadır?
2. Röntgen bulgusu neyi gösterir?
3. Laktat değeri neden önemlidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Mide dilatasyonu-volvulus (GDV)
- Basit mide dilatasyonu
- Dalak torsiyonu

Yorumlu çözüm
Derin göğüslü köpekte sonuçsuz kusma girişimi ve hızlı karın şişliği GDV'nin klasik tablosudur. Şok tedavisi (sıvı), mide dekompresyonu ve en kısa sürede cerrahi derotasyon ile gastropeksi gerekir. Yüksek laktat doku perfüzyonunun bozulduğunu gösterir. Operasyon sonrası aritmiler açısından EKG takibi yapılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Sonuçsuz kusma + şişkin karın = GDV'yi düşünün
- ✓ Gastropeksi tekrarı önler
- ✓ Postoperatif aritmileri izleyin

Gastroenteroloji | Köpek

Vaka 005 · Kronik ishal ve kilo kaybına rağmen iştahı artmış köpek

Hasta
- Köpek
- 8 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Hacimli, açık renkli dışkı
- İştah artmış ama kilo kaybı

Öykü ve bağlam
- Belirtiler 2 aydır var
- Alman çoban köpeği

Fiziksel muayene
- Kas kaybı
- Tüylerde matlık

Ek bulgular
- Serum TLI: 1,2 µg/L (düşük)
- Folat yüksek, kobalamin düşük



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Polifaji ve kilo kaybı birlikte neyi düşündürür?
2. TLI testi neyi ölçer?
3. Tedavide neler eklenmelidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Ekzokrin pankreas yetmezliği (EPY)
- İnce bağırsak bakteriyel aşırı çoğalması
- Malabsorbsiyon

Yorumlu çözüm
Polifaji, kilo kaybı ve hacimli açık renkli dışkı maldigesyonu düşündürür; düşük TLI ekzokrin pankreas yetmezliğini doğrular. Tedavide her öğüne pankreatik enzim takviyesi ve kobalamin desteği verilir. Sekonder bağırsak flora değişikliği varsa ek tedavi gerekebilir. Yanıt genellikle birkaç hafta içinde kilo artışıyla görülür.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ İştah artışı + kilo kaybı = maldigesyonu düşünün
- ✓ TLI, EPY için en değerli testtir
- ✓ Kobalamin eksikliğini atlamayın

Gastroenteroloji | Kedi

Vaka 006 · Tüy yumağı sonrası ağız içinde ip bulunan kedi

Hasta
- Kedi
- 4 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kusma
- Yutkunma güçlüğü
- İştahsızlık

Öykü ve bağlam
- Evde dikiş ipi ile oynuyormuş

Fiziksel muayene
- Dil altında halka şeklinde ip
- Karın palpasyonunda bağırsaklar büzülmüş

Ek bulgular
- Röntgende pliseli (akordeon) bağırsak görünümü



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Ağız muayenesi neden kritik?
2. İpi çekmek neden tehlikelidir?
3. Hangi komplikasyonlar gelişebilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Lineer yabancı cisim
- İntussusepsiyon
- Gastroenterit

Yorumlu çözüm
Kedide kusma ile birlikte dil altında ip görülmesi lineer yabancı cismi düşündürür. Bağırsakların akordeon gibi toplanması tipiktir. İpi ağızdan çekmek bağırsak perforasyonuna yol açabilir; dil altındaki ip kesilir ve cerrahi değerlendirme yapılır. Gecikmede perforasyon ve peritonit gelişebilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kusan kedide dil altını mutlaka kontrol edin
- ✓ İpi asla çekmeyin
- ✓ Pliseli bağırsak = lineer yabancı cisim

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Gastroenteroloji | Köpek

Vaka 007 · Ağız kokusu ve sarılık görülen yaşlı köpek

Hasta
- Köpek
- 11 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Gözlerde sararma
- İştahsızlık
- Kilo kaybı

Öykü ve bağlam
- Daha önce karaciğer enzimleri hafif yüksekmiş

Fiziksel muayene
- İkterik sklera ve mukozalar
- Kranial karında hepatomegali

Ek bulgular
- Total bilirubin: 4,2 mg/dL
- ALT ve ALP belirgin yüksek
- Ultrasonda karaciğerde nodüller


Vaka 007

KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. İkterin prehepatik, hepatik ve posthepatik ayrımını nasıl yaparsınız?
2. Hematokrit neden önemlidir?
3. Kesin tanı için ne gerekir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hepatik neoplazi
- Kronik hepatit
- Ekstrahepatik safra yolu tıkanıklığı
- Hemolitik anemi

Yorumlu çözüm
İkter değerlendirmesinde önce hematokrit ile hemoliz dışlanır. Normal hematokrit ve yüksek karaciğer enzimleri hepatik veya posthepatik nedeni düşündürür. Ultrasonda safra yolları ve karaciğer parankimi değerlendirilir; nodüller için ince iğne aspirasyonu veya biyopsi gerekir. Pıhtılaşma testleri biyopsiden önce yapılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ İkterde ilk adım: hematokrit
- ✓ Ultrason safra yollarını değerlendirir
- ✓ Biyopsi öncesi koagülasyonu kontrol edin

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Gastroenteroloji | Köpek

Vaka 008 · Çöp karıştırdıktan sonra kanlı ishal ve kusma olan köpek


Hasta
- Köpek
- 2 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Akut kanlı, jöle kıvamında ishal
- Kusma

Öykü ve bağlam
- Aşıları tam
- Bir gün önce çöpe girmiş

Fiziksel muayene
- Hafif dehidratasyon
- Ateş yok
- Genel durum orta

Ek bulgular
- Hematokrit: %62
- Total protein normal
- Parvovirüs testi negatif



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Yüksek hematokrit ve normal protein neyi düşündürür?
2. Bu tablo parvovirüsten nasıl ayrılır?
3. Antibiyotik her zaman gerekli midir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Akut hemorajik diyare sendromu (AHDS)
- Diyetsel indiskresyon
- Parvovirüs enteriti

Yorumlu çözüm
Aşılı genç köpekte ani kanlı ishal, belirgin hemokonsantrasyon ve normal total protein akut hemorajik diyare sendromunu düşündürür. Temel tedavi sıvı tedavisidir; çoğu hasta 24-48 saatte iyileşir. Sepsis bulgusu yoksa antibiyotik rutin olarak gerekli değildir. Parvovirüs testi ayırıcı tanı için önemlidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Hematokrit ↑ + protein normal = AHDS'yi düşünün
- ✓ Sıvı tedavisi temeldir
- ✓ Antibiyotik sadece sepsis şüphesinde

Vaka 009

Dermatoloji | Köpek

Vaka 009 · Yoğun kaşıntı ve kulak kenarında kabuklanma olan köpek


Hasta
- Köpek
- 3 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Gece de devam eden kaşıntı
- Kulak kenarlarında kabuk

Öykü ve bağlam
- Evdeki diğer köpekte de kaşıntı
- Sahibinin kolunda kızarıklık

Fiziksel muayene
- Kulak kenarı, dirsek ve karında papül ve kabuk
- Pinnal-pedal refleks pozitif

Ek bulgular
- Derin deri kazıntısında Sarcoptes akarı


Vaka 009

KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Pinnal-pedal refleks neyi düşündürür?
2. Kazıntının negatif olması tanıyı dışlar mı?
3. Neden tüm temaslılar tedavi edilmeli?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Sarkoptik uyuz
- Atopik dermatit
- Pire alerjisi

Yorumlu çözüm
Yoğun kaşıntı, kulak kenarında kabuk, pozitif pinnal-pedal refleks ve temaslılarda belirti sarkoptik uyuzu düşündürür. Akar her zaman bulunamaz; negatif kazıntıda tedaviye yanıt denemesi yapılabilir. Uygun antiparaziter ile tüm temaslı hayvanlar tedavi edilmelidir. Zoonotik risk sahibine açıklanmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Negatif kazıntı uyuzu dışlamaz
- ✓ Tüm temaslılar tedavi edilir
- ✓ Sarkoptik uyuz zoonotiktir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Dermatoloji | Köpek

Vaka 010 · Mevsimsel pati yalama ve kulak iltihabı olan genç köpek

Hasta
- Köpek
- 2 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Patileri yalama
- Tekrarlayan kulak iltihabı

Öykü ve bağlam
- Belirtiler ilkbaharda artıyor
- Pire kontrolü düzenli

Fiziksel muayene
- Pati arası eritem ve tükürük boyanması
- Bilateral eritematöz otitis eksterna

Ek bulgular
- Kulak sitolojisinde Malassezia
- Eliminasyon diyetine rağmen belirtiler devam



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Atopik dermatit tanısı nasıl konur?
2. Sekonder enfeksiyonların rolü nedir?
3. Uzun vadeli yönetim neleri içerir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Atopik dermatit
- Besin alerjisi
- Pire alerjisi dermatiti

Yorumlu çözüm
Atopik dermatit dışlama tanısıdır: pire alerjisi, ektoparazitler ve besin alerjisi elendikten sonra klinik kriterlere göre konur. Mevsimsellik çevresel alerjenleri düşündürür. Sekonder Malassezia ve bakteriyel enfeksiyonlar tedavi edilmeli, kaşıntı kontrol altına alınmalıdır. Uzun vadede alerjen spesifik immünoterapi seçeneği değerlendirilebilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Atopi bir dışlama tanısıdır
- ✓ Sekonder enfeksiyonları atlamayın
- ✓ Yönetim ömür boyudur

Dermatoloji | Kedi

Vaka 011 · Yuvarlak tüy dökülmesi alanları olan yavru kedi

Hasta
- Kedi
- 1 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Başta ve patilerde yuvarlak tüysüz alanlar

Öykü ve bağlam
- Barınaktan yeni sahiplenilmiş
- Evdeki çocukta kızarık halka şeklinde lezyon

Fiziksel muayene
- Pullanmalı, kırık tüylü dairesel alopesi
- Kaşıntı hafif

Ek bulgular
- Wood lambasında bazı tüylerde yeşil floresan
- Trikogramda tüy şaftında artrospor



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Wood lambasının sınırlılıkları nelerdir?
2. Altın standart tanı yöntemi hangisidir?
3. Çevre neden tedavi edilmelidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Dermatofitoz (Microsporum canis)
- Demodikoz
- Psikojenik alopesi

Yorumlu çözüm
Yavru kedide dairesel alopesi ve evde zoonotik lezyon dermatofitozu düşündürür. Wood lambası sadece bazı Microsporum suşlarını gösterir; kesin tanı mantar kültürü veya PCR ile konur. Tedavi sistemik antifungal ile topikal tedaviyi birleştirir. Sporlar ortamda uzun süre yaşadığı için ev temizliği şarttır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kültür veya PCR tanıyı doğrular
- ✓ Topikal + sistemik tedavi birlikte
- ✓ Çevre dekontaminasyonu unutulmamalı

Dermatoloji | Köpek

Vaka 012 · Simetrik tüy dökülmesi ve kilo alımı olan köpek

Hasta
- Köpek
- 9 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Gövdede simetrik tüy kaybı
- Halsizlik, kilo alma

Öykü ve bağlam
- Soğuğa tahammülsüzlük
- Kaşıntı yok

Fiziksel muayene
- Gövdede bilateral simetrik alopesi
- Bradikardi
- Kuyrukta 'fare kuyruğu' görünümü

Ek bulgular
- Total T4 düşük, TSH yüksek
- Hiperkolesterolemi



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kaşıntısız simetrik alopesi neyi düşündürür?
2. Sadece T4 düşüklüğü tanı için yeterli mi?
3. Tedavi nasıl izlenir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hipotiroidizm
- Hiperadrenokortisizm
- Alopesi X

Yorumlu çözüm
Kaşıntısız simetrik alopesi, letarji, kilo alma ve bradikardi hipotiroidizmi düşündürür. Ötiroid hasta sendromu nedeniyle tek başına düşük T4 yeterli değildir; TSH ve gerekirse serbest T4 ile desteklenir. Levotiroksin ile tedavi edilir ve 4-6 hafta sonra ilaç sonrası T4 ölçümüyle doz ayarlanır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kaşıntısız simetrik alopesi = endokrin nedenleri düşünün
- ✓ Düşük T4 tek başına yetmez
- ✓ Doz, kontrol T4 ile ayarlanır

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Dermatoloji | Köpek

Vaka 013 · Gözlerin çevresinde ve patilerde tüy kaybı olan yavru köpek

Hasta
- Köpek
- 7 aylık
- Erkek

Başvuru nedeni
- Göz çevresinde tüysüz alanlar
- Ön patilerde kızarıklık

Öykü ve bağlam
- Kaşıntı yok
- Kardeşinde benzer belirti

Fiziksel muayene
- Periokuler ve pedal alopesi
- Hafif eritem ve komedonlar

Ek bulgular
- Derin deri kazıntısında çok sayıda Demodex canis



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Juvenil lokal demodikoz neden çoğu zaman kendiliğinden iyileşir?
2. Generalize form ne zaman düşünülür?
3. Yetişkinde demodikoz neyi araştırmayı gerektirir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Juvenil demodikoz
- Dermatofitoz
- Bakteriyel follikülit

Yorumlu çözüm
Genç köpekte kaşıntısız periokuler ve pedal alopesi ile derin kazıntıda Demodex demodikozu doğrular. Lokal formlar çoğunlukla bağışıklık olgunlaştıkça iyileşir; generalize formda izoksazolin grubu ilaçlarla tedavi edilir. Tedavi, ardışık iki negatif kazıntıya kadar sürdürülür. Yetişkin başlangıçlı demodikozda altta yatan hastalık araştırılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Demodikoz için derin kazıntı gerekir
- ✓ Tedavi negatif kazıntılara kadar sürer
- ✓ Yetişkinde altta yatan nedeni arayın

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Enfeksiyon hastalıkları | Köpek

Vaka 014 · Ateş, halsizlik, trombositopeni ve kene öyküsü olan köpek

Hasta
- Köpek
- 4 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Apati
- Ateş
- İştahsızlık

Öykü ve bağlam
- Kenelerin sık görüldüğü bölgede yaşıyor
- Düzensiz antiparaziter koruma

Fiziksel muayene
- Ateş: 40,2 °C
- Hafif soluk mukozalar
- Lenf düğümlerinde büyüme

Ek bulgular
- Trombosit: 45 ×10³/µL
- Hafif anemi
- Enfeksiyon süreciyle uyumlu değişiklikler



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kene öyküsü bu köpekte ne anlama geliyor?
2. Trombositopeninin anlamı nedir?
3. Hangi özel testler incelemeyi tamamlayabilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Köpek ehrlichiosisi
- Anaplazmoz
- Babesiyoz
- İmmün aracılı hastalık

Yorumlu çözüm
Kene öyküsüyle birlikte görülen ateş, trombositopeni ve hematolojik değişiklikler vektörle bulaşan hastalıkları düşündürür. Ancak eş zamanlı enfeksiyonlar da olasılık dışı değildir. Bu nedenle serolojik ve PCR testleriyle özgül tanı konulmalı, epidemiyolojik bağlam değerlendirilmelidir. Doksisiklin sık kullanılan bir tedavi seçeneğidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Epidemiyoloji tanının bir parçasıdır
- ✓ Trombositopeni tek başına bir hastalığı tanımlamaz
- ✓ Vektörle bulaşan hastalıklar benzer bulgular gösterebilir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Enfeksiyon hastalıkları | Köpek

Vaka 015 · Göz ve burun akıntısı, öksürük ve ardından kasılmalar görülen köpek

Hasta
- Köpek
- 1 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Mukopürülan burun ve göz akıntısı
- Öksürük
- Son günlerde çene kasılmaları

Öykü ve bağlam
- Aşı durumu bilinmiyor
- Sokaktan sahiplenilmiş

Fiziksel muayene
- Ateş
- Patilerde hiperkeratoz
- Çiğneme kaslarında miyoklonus

Ek bulgular
- Konjonktival yaymada inklüzyon cisimcikleri
- PCR: kanin distemper virüsü pozitif



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Çok sistemli tutulum hangi viral hastalığı düşündürür?
2. Nörolojik belirtilerin prognoza etkisi nedir?
3. Korunmada en önemli adım nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kanin distemper
- Kennel öksürüğü kompleksi
- Toksoplazmoz

Yorumlu çözüm
Solunum, göz ve ardından nörolojik belirtiler ile pati hiperkeratozu kanin distemperi düşündürür. Spesifik antiviral tedavi yoktur; destekleyici tedavi, sekonder enfeksiyonların kontrolü ve nöbet yönetimi yapılır. Nörolojik tutulum prognozu kötüleştirir. Aşılama en etkili korunma yöntemidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Solunum + nörolojik belirti = distemperi düşünün
- ✓ Tedavi destekleyicidir
- ✓ Aşılama temel korunmadır

Enfeksiyon hastalıkları | Kedi

Vaka 016 · Karında sıvı birikimi ve ateşi olan genç kedi

Hasta
- Kedi
- 2 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Karında büyüme
- İştahsızlık
- Kilo kaybı

Öykü ve bağlam
- Çok kedili evden geliyor
- Antibiyotiğe yanıt vermeyen ateş

Fiziksel muayene
- Karında dalgalanma
- Ateş: 39,9 °C
- Hafif sarılık

Ek bulgular
- Abdominal sıvı: saman sarısı, yapışkan, protein yüksek
- Albumin/globulin oranı: 0,4
- Sıvıda koronavirüs PCR pozitif



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Efüzyon analizi tanıda nasıl yardımcı olur?
2. Düşük A/G oranı neyi gösterir?
3. Bu hastalıkta güncel tedavi seçenekleri nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Efüzif kedi enfeksiyöz peritoniti (FIP)
- Septik peritonit
- Lenfoma
- Kalp yetmezliği

Yorumlu çözüm
Genç ve çok kedili ortamdan gelen kedide yüksek proteinli yapışkan efüzyon, ateş ve düşük A/G oranı efüzif FIP'i güçlü şekilde düşündürür. Efüzyonda koronavirüs RNA'sının gösterilmesi tanıyı destekler. Günümüzde antiviral tedavilerle önemli iyileşme oranları bildirilmektedir; tedavi süresi ve izlem veteriner hekim kontrolünde yapılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Efüzyon analizi en değerli adımdır
- ✓ Düşük A/G oranı FIP'i destekler
- ✓ Antiviral tedavi prognozu değiştirmiştir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Enfeksiyon hastalıkları | Kedi

Vaka 017 · Dişeti iltihabı ve tekrarlayan enfeksiyonları olan sokak kedisi

Hasta
- Kedi
- 5 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Ağız ağrısı
- Tekrarlayan solunum enfeksiyonları

Öykü ve bağlam
- Kısırlaştırılmamış, dışarı çıkıyor
- Kavga yaraları öyküsü

Fiziksel muayene
- Şiddetli gingivostomatit
- Lenfadenopati

Ek bulgular
- FIV antikor testi pozitif
- FeLV antijen testi negatif



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. FIV nasıl bulaşır?
2. Pozitif test her zaman hastalık anlamına gelir mi?
3. Yönetimde neler önemlidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- FIV enfeksiyonu ile ilişkili immünsüpresyon
- Kronik gingivostomatit
- FeLV enfeksiyonu

Yorumlu çözüm
Kavga yaraları olan dışarı çıkan erkek kedide tekrarlayan enfeksiyonlar ve stomatit FIV'i düşündürür; virüs başlıca ısırıkla bulaşır. Pozitif kedi uzun yıllar sağlıklı yaşayabilir; aşılı yavrularda testin yorumlanması dikkat gerektirir. Yönetim, sekonder enfeksiyonların erken tedavisi, kısırlaştırma ve kedinin evde tutulmasını içerir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ FIV başlıca ısırıkla bulaşır
- ✓ Pozitif kedi uzun süre iyi yaşayabilir
- ✓ Sekonder enfeksiyonları erken tedavi edin

Enfeksiyon hastalıkları | Köpek

Vaka 018 · Göl kenarından sonra böbrek yetmezliği ve sarılık gelişen köpek

Hasta
- Köpek
- 6 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kusma
- Az idrar yapma
- Sarılık

Öykü ve bağlam
- Kırsal alanda yaşıyor
- Durgun suyla temas

Fiziksel muayene
- İkter
- Böbrek bölgesinde ağrı
- Dehidratasyon

Ek bulgular
- Üre ve kreatinin yüksek
- Bilirubin yüksek
- MAT/PCR: Leptospira pozitif



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Böbrek ve karaciğer birlikte tutulduğunda neyi düşünürsünüz?
2. Klinik personel için hangi önlemler gerekir?
3. Tedavide temel ilaç nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Leptospiroz
- Toksik akut böbrek hasarı
- İmmün aracılı hemolitik anemi

Yorumlu çözüm
Durgun suyla temas eden köpekte akut böbrek hasarı ve ikter leptospirozu düşündürür. Tanı PCR ve seroloji ile desteklenir. Tedavide antibiyotik (önce penisilin türevleri veya doksisiklin) ve sıvı tedavisi yapılır; idrar çıkışı yakından izlenir. Hastalık zoonotiktir; idrarla temas eden personel eldiven kullanmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Böbrek + karaciğer tutulumu = leptospirozu düşünün
- ✓ İdrar çıkışını izleyin
- ✓ Zoonotiktir, koruyucu ekipman kullanın

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Nöroloji | Köpek

Vaka 019 · Arka bacaklarında ani felç gelişen kısa bacaklı köpek


Hasta
- Köpek
- 5 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Arka bacaklarda ani güçsüzlük
- Sırt ağrısı

Öykü ve bağlam
- Merdiven çıkarken ağlamış
- Dachshund ırkı

Fiziksel muayene
- Paraparezi, propriosepsiyon kaybı
- Torakolomber bölgede ağrı
- Derin ağrı duyusu mevcut

Ek bulgular
- MR'da T13-L1 arasında disk ekstrüzyonu ve omurilik basısı



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Derin ağrı duyusu neden en önemli prognostik bulgudur?
2. Lezyon yeri nörolojik muayeneyle nasıl belirlenir?
3. Cerrahi ne zaman önerilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İntervertebral disk hastalığı (Hansen tip I)
- Fibrokartilajinöz emboli
- Spinal travma

Yorumlu çözüm
Kondrodistrofik ırkta ani başlayan ağrılı paraparezi Hansen tip I disk ekstrüzyonunu düşündürür. Nörolojik muayene lezyonu T3-L3 segmentine yerleştirir. Derin ağrı duyusu korunmuşsa prognoz iyidir. Belirgin nörolojik açık veya kötüleşme varsa cerrahi dekompresyon (hemilaminektomi) önerilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Derin ağrı duyusu prognozu belirler
- ✓ Önce nöroanatomik lokalizasyon
- ✓ Kötüleşen hastada cerrahi geciktirilmez

Nöroloji | Köpek

Vaka 020 · Nöbetler arasında tamamen normal olan genç köpek

Hasta
- Köpek
- 2 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Ayda bir genel tonik-klonik nöbet

Öykü ve bağlam
- İlk nöbet 1 yaşında
- Toksin teması yok

Fiziksel muayene
- Nöbetler arası nörolojik muayene normal

Ek bulgular
- Hemogram ve biyokimya normal
- Safra asidi normal
- MR normal



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hangi yaş aralığı idiyopatik epilepsiyi destekler?
2. Tedaviye ne zaman başlanır?
3. Sahibine hangi bilgiler verilmelidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İdiyopatik epilepsi
- Yapısal beyin hastalığı
- Metabolik nöbet (portosistemik şant)

Yorumlu çözüm
6 ay-6 yaş arasında başlayan, nöbetler arası normal nörolojik muayene ve normal tetkiklerle seyreden tekrarlayan nöbetler idiyopatik epilepsiyi destekler. Sık nöbet, küme nöbet veya status epileptikus varsa antiepileptik tedavi başlanır. Sahibine nöbet günlüğü tutması ve ilacı düzenli vermesi öğretilmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Önce metabolik ve yapısal nedenleri dışlayın
- ✓ Tedavi kararı nöbet sıklığına göredir
- ✓ Nöbet günlüğü tedavinin parçasıdır

Nöroloji | Köpek

Vaka 021 · Ani baş eğikliği ve göz titremesi olan yaşlı köpek

Hasta
- Köpek
- 12 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Başı bir yana eğik
- Dengesizlik, yuvarlanma
- Kusma

Öykü ve bağlam
- Belirtiler sabah aniden başlamış

Fiziksel muayene
- Sola baş eğikliği
- Horizontal nistagmus
- Propriosepsiyon normal

Ek bulgular
- Otoskopide kulak zarı sağlam
- Kan tetkikleri normal



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Periferik ve santral vestibüler hastalık nasıl ayrılır?
2. Bu hastada prognoz nasıldır?
3. Hangi destekleyici tedaviler verilebilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İdiyopatik vestibüler sendrom
- Orta-iç kulak iltihabı
- Santral vestibüler hastalık (neoplazi, inme)

Yorumlu çözüm
Yaşlı köpekte ani baş eğikliği, horizontal nistagmus ve korunmuş propriosepsiyon periferik vestibüler hastalığı düşündürür; kulak muayenesi normal ise idiyopatik vestibüler sendrom olasıdır. Belirtiler genellikle günler içinde düzelir. Destekleyici tedavi antiemetik, sıvı ve güvenli ortamı içerir. Propriosepsiyon kaybı veya vertikal nistagmus santral lezyonu düşündürür.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Propriosepsiyon kaybı santral lezyonu düşündürür
- ✓ Kulak muayenesini atlamayın
- ✓ İdiyopatik form genelde kendiliğinden düzelir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Nöroloji | Kedi

Vaka 022 · Arka bacaklarında ani felç ve soğuk patileri olan kedi


Hasta
- Kedi
- 8 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Arka bacakları sürüme
- Şiddetli ağrı, bağırma

Öykü ve bağlam
- Belirtiler dakikalar içinde başlamış

Fiziksel muayene
- Femoral nabız alınamıyor
- Arka patiler soğuk, pedler soluk/siyanotik
- Kalpte galop ritmi

Ek bulgular
- Ekokardiyografide sol atriyum genişlemesi
- Arka patide glukoz, ön patiye göre belirgin düşük



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Bu tablo nörolojik mi, vasküler mi?
2. Altta yatan hastalık nedir?
3. Prognozu ne etkiler?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Aortik tromboemboli (kalp hastalığına bağlı)
- Spinal travma
- Disk hastalığı

Yorumlu çözüm
Kedide ani, ağrılı arka bacak felci, alınamayan femoral nabız ve soğuk patiler aortik tromboemboliyi düşündürür; çoğunlukla hipertrofik kardiyomiyopatiye bağlıdır. Tedavide güçlü analjezi, antitrombotik ilaç ve kalp yetmezliği yönetimi yer alır. Vücut ısısı, motor fonksiyonun kalması ve kalp durumu prognozu belirler.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Nabız yok + soğuk pati = tromboemboli
- ✓ Önce ağrı kontrolü
- ✓ Altta yatan kalp hastalığını arayın

Kardiyoloji · Köpek

Vaka 023 · Gece öksürüğü ve egzersiz intoleransı olan küçük ırk köpek

Hasta
- Köpek
- 10 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Gece artan öksürük
- Yürüyüşte çabuk yorulma

Öykü ve bağlam
- Kalpte üfürüm 2 yıldır biliniyor
- Cavalier King Charles ırkı

Fiziksel muayene
- Sol apikal sistolik üfürüm (5/6)
- Solunum sayısı istirahatte 48/dk
- Akciğerde krepitasyon

Ek bulgular
- Röntgende kardiyomegali ve perihiler ödem
- Ekokardiyografide miksomatöz mitral kapak dejenerasyonu



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. İstirahat solunum sayısı neden önemlidir?
2. Ödem ile kronik bronşit nasıl ayrılır?
3. Tedavinin temel ilaçları nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Mitral kapak hastalığına bağlı konjestif kalp yetmezliği
- Kronik bronşit
- Trakea kollapsı

Yorumlu çözüm
Küçük ırk yaşlı köpekte yüksek dereceli sol apikal üfürüm, artmış istirahat solunum sayısı ve perihiler ödem miksomatöz mitral kapak hastalığına bağlı sol kalp yetmezliğini gösterir. Tedavide diüretik (furosemid), pimobendan ve ACE inhibitörü kullanılır. Sahip evde uyurken solunum sayısını izlemelidir; 30/dk üzeri uyarı işaretidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ İstirahat solunum sayısı evde izlenir
- ✓ Röntgen ödemi doğrular
- ✓ Pimobendan + diüretik temel tedavidir

Kardiyoloji | Köpek

Vaka 024 · Bayılma ve karında sıvı birikimi olan dev ırk köpek


Hasta
- Köpek
- 7 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Egzersizde bayılma
- Karında şişlik
- Kilo kaybı

Öykü ve bağlam
- Doberman ırkı

Fiziksel muayene
- Düzensiz ritim, nabız açığı
- Asit
- Juguler venöz distansiyon

Ek bulgular
- EKG: atriyal fibrilasyon ve ventriküler erken atımlar
- Ekokardiyografi: sol ventrikül dilatasyonu, azalmış kasılma



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Bayılmanın kardiyak nedeni nasıl düşünülür?
2. Bu ırkta hangi kardiyomiyopati sık görülür?
3. Ritim bozukluğu neden önemlidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Dilate kardiyomiyopati
- Perikardiyal efüzyon
- Taurin eksikliği ile ilişkili DKM

Yorumlu çözüm
Dobermanda bayılma, aritmiler ve ventrikül dilatasyonu dilate kardiyomiyopatiyi düşündürür. Ani ölüm riski ventriküler aritmilerle ilişkilidir; Holter ile değerlendirme önerilir. Tedavi pimobendan, diüretik, ACE inhibitörü ve gerekirse antiaritmik ilaçları içerir. Diyetsel nedenler de sorgulanmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Bayılan dev ırk köpekte kalbi düşünün
- ✓ Holter aritmiyi gösterir
- ✓ Diyet öyküsünü sorgulayın

Kardiyoloji · Kedi

Vaka 025 · Ağız açık solunum yapan ve üfürümü olan kedi

Hasta
- Kedi
- 6 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Hızlı ve zorlu solunum
- Saklanma

Öykü ve bağlam
- Daha önce belirti yok
- Stresli taşınma sonrası başlamış

Fiziksel muayene
- Solunum: 72/dk, ağız açık
- Galop ritmi
- Hipotermi: 37,1 °C

Ek bulgular
- Odak ultrasonda (POCUS) plevral efüzyon
- Ekokardiyografide konsantrik sol ventrikül hipertrofisi, sol atriyum genişlemesi
- NT-proBNP yüksek



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Dispneik kedide ilk adım ne olmalı?
2. Torasentez ne zaman yapılır?
3. Uzun vadeli risk nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hipertrofik kardiyomiyopati ve kalp yetmezliği
- Astım
- Piyotoraks

Yorumlu çözüm
Dispneik kedide önce oksijen ve minimum stresle stabilizasyon yapılır; POCUS hızlı bilgi verir. Plevral efüzyon solunumu kısıtlıyorsa torasentez hem tanısal hem tedavidir. Ekokardiyografi hipertrofik kardiyomiyopatiyi gösterir; tedavide diüretik ve tromboemboli riski nedeniyle antitrombotik ilaç kullanılır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Dispneik kedide önce stabilizasyon
- ✓ POCUS ile efüzyonu hızla görün
- ✓ HCM'de tromboemboli riskini unutmayın

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Kardiyoloji | Köpek

Vaka 026 · Halsizlik ve boğuk kalp sesleri olan köpek


Hasta
- Köpek
- 9 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Ani halsizlik
- Karında hafif şişlik

Öykü ve bağlam
- Alman çoban köpeği

Fiziksel muayene
- Boğuk kalp sesleri
- Zayıf femoral nabız
- Pulsus paradoksus

Ek bulgular
- POCUS: perikardiyal efüzyon ve sağ atriyum kollapsı
- Sağ atriyum aurikulasında kitle



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kardiyak tamponat nasıl tanınır?
2. Perikardiyosentez neden acildir?
3. Kitle neyi düşündürür?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hemanjiyosarkoma bağlı perikardiyal efüzyon
- İdiyopatik perikardiyal efüzyon
- Kemodektoma

Yorumlu çözüm
Boğuk kalp sesleri, zayıf nabız ve sağ atriyum kollapsı kardiyak tamponatı gösterir; acil perikardiyosentez hayat kurtarıcıdır. Sağ atriyum aurikulasında kitle büyük ırk köpekte en çok hemanjiyosarkomu düşündürür. Prognoz ve tedavi seçenekleri sahiple dürüstçe konuşulmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Tamponatta perikardiyosentez acildir
- ✓ Sağ atriyum kitlesi = hemanjiyosarkomu düşünün
- ✓ POCUS hızlı tanı sağlar

Kardiyoloji · Köpek

Vaka 027 · Öksürük ve egzersiz intoleransı olan, korunmasız köpek


Hasta
- Köpek
- 4 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kuru öksürük
- Çabuk yorulma

Öykü ve bağlam
- Sivrisineklerin yoğun olduğu bölge
- Kalp kurdu koruması yapılmamış

Fiziksel muayene
- Hafif dispne
- Sağ tarafta üfürüm

Ek bulgular
- Dirofilaria immitis antijen testi pozitif
- Mikrofilarya görüldü
- Röntgende genişlemiş pulmoner arterler



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kalp kurdu nasıl bulaşır?
2. Tedavi sırasında egzersiz neden kısıtlanır?
3. Korunma nasıl sağlanır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Dirofilariozis (kalp kurdu hastalığı)
- Kronik bronşit
- Pulmoner hipertansiyon

Yorumlu çözüm
Sivrisinekle bulaşan Dirofilaria immitis pulmoner arterlerde hasara ve sağ kalp yükünün artmasına yol açar. Tedavi kurallara uygun adultisit protokol, doksisiklin ve makrosiklik laktonları içerir. Ölen kurtlar tromboemboliye yol açabileceğinden tedavi boyunca katı egzersiz kısıtlaması gerekir. Düzenli koruyucu ilaç en iyi önlemdir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Antijen testi tanıda temeldir
- ✓ Tedavide egzersiz kısıtlaması şart
- ✓ Koruma tedaviden kolaydır

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Endokrinoloji | Köpek

Vaka 028 · Çok su içen, çok idrar yapan ve kilo kaybeden köpek


Hasta
- Köpek
- 9 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Poliüri ve polidipsi
- İştah artmış, kilo kaybı

Öykü ve bağlam
- Kısırlaştırılmamış
- Belirtiler 1 aydır var

Fiziksel muayene
- Bilateral katarakt başlangıcı
- Kondisyon düşük

Ek bulgular
- Kan glukozu: 420 mg/dL
- Glukozüri
- Fruktozamin yüksek
- Keton negatif



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Fruktozamin neden önemlidir?
2. Kısırlaştırma bu hastada neden önerilir?
3. İnsülin dozu nasıl ayarlanır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Diabetes mellitus
- Hiperadrenokortisizm
- Böbrek glukozürisi

Yorumlu çözüm
Poliüri, polidipsi, polifaji ve kilo kaybı ile kalıcı hiperglisemi ve glukozüri diabetes mellitusu gösterir; fruktozamin kronik hiperglisemiyi doğrular. Tedavi insülin, düzenli öğün ve egzersizi içerir. Dişide diöstrus insülin direncine yol açabildiğinden kısırlaştırma önerilir. Doz, glukoz eğrisi veya sürekli glukoz izlemiyle ayarlanır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Fruktozamin kronik hiperglisemiyi gösterir
- ✓ Kısırlaştırma insülin direncini azaltır
- ✓ Doz, glukoz eğrisiyle ayarlanır

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Endokrinoloji | Kedi

Vaka 029 · İştahı artmasına rağmen kilo kaybeden hiperaktif yaşlı kedi

Hasta
- Kedi
- 13 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Kilo kaybı
- Aşırı iştah
- Huzursuzluk ve gece miyavlama

Öykü ve bağlam
- Belirtiler 4 aydır var

Fiziksel muayene
- Taşikardi: 240/dk
- Palpe edilebilen tiroid bezi
- Mat tüyler

Ek bulgular
- Total T4: 9,8 µg/dL (yüksek)
- ALT hafif yüksek
- Kreatinin normal sınırda



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hipertiroidizm böbrek değerlerini nasıl etkiler?
2. Tedavi seçenekleri nelerdir?
3. Hipertansiyon neden kontrol edilmelidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hipertiroidizm
- Diabetes mellitus
- Kronik enteropati

Yorumlu çözüm
Yaşlı kedide polifaji, kilo kaybı, taşikardi ve palpe edilebilen tiroid bezi hipertiroidizmi düşündürür; yüksek T4 tanıyı doğrular. Hipertiroidizm glomerüler filtrasyonu artırarak böbrek hastalığını maskeleyebilir; tedavi sonrası böbrek değerleri yeniden kontrol edilmelidir. Seçenekler: antitiroid ilaç, radyoaktif iyot, diyet veya cerrahi. Kan basıncı ölçülmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Hipertiroidizm böbrek hastalığını maskeleyebilir
- ✓ Tedavi sonrası kreatinini tekrar ölçün
- ✓ Kan basıncını kontrol edin

Endokrinoloji | Köpek

Vaka 030 · Göbekli görünüm, tüy dökülmesi ve aşırı su içme olan köpek

Hasta
- Köpek
- 10 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Poliüri, polidipsi
- Karında sarkma
- İnce deri ve tüy kaybı

Öykü ve bağlam
- Aşırı nefes nefese kalma

Fiziksel muayene
- Sarkık karın
- Hepatomegali
- İnce deri, komedonlar

Ek bulgular
- ALP belirgin yüksek
- İdrar dansitesi düşük
- ACTH stimülasyon testinde abartılı kortizol yanıtı



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hangi testler hiperadrenokortisizmi destekler?
2. Hipofiz ve adrenal kaynaklı form nasıl ayrılır?
3. Tedavi nasıl izlenir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hiperadrenokortisizm (Cushing)
- Diabetes mellitus
- Hipotiroidizm

Yorumlu çözüm
Poliüri-polidipsi, sarkık karın, alopesi ve yüksek ALP hiperadrenokortisizmi düşündürür. Tanı düşük doz deksametazon supresyon veya ACTH stimülasyon testiyle desteklenir; adrenal ultrasonografi ve endojen ACTH ayrım için kullanılır. Tedavide trilostan sık tercih edilir ve klinik belirtiler ile kortizol ölçümleriyle izlenir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Klinik şüphe olmadan test yapmayın
- ✓ Ultrason hipofiz/adrenal ayrımına yardım eder
- ✓ Trilostan dozu klinikle birlikte izlenir

Endokrinoloji | Köpek

Vaka 031 · Dalgalı seyirli kusma, halsizlik ve bradikardi olan genç köpek

Hasta
- Köpek
- 4 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Aralıklı kusma ve ishal
- Halsizlik
- Ani kollaps

Öykü ve bağlam
- Belirtiler aylardır gelip gidiyor

Fiziksel muayene
- Dehidratasyon
- Bradikardi: 50/dk
- Zayıf nabız

Ek bulgular
- Sodyum: 128 mmol/L, potasyum: 7,4 mmol/L
- Na/K oranı: 17
- ACTH stimülasyon testinde kortizol yanıtı yok


Vaka 031

II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Stresli hastada bradikardi neden alarm işaretidir?
2. Na/K oranı neyi düşündürür?
3. Acil tedavide öncelikler nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hipoadrenokortisizm (Addison)
- Akut böbrek hasarı
- Gastroenterit

Yorumlu çözüm
Dalgalı gastrointestinal belirtiler, kollaps, bradikardi ve düşük Na/K oranı Addison krizini düşündürür; ACTH stimülasyon testi tanıyı doğrular. Hiperkalemi hayatı tehdit eder: sıvı tedavisi, hiperkalemi yönetimi ve glukokortikoid uygulaması önceliklidir. Uzun dönemde mineralokortikoid ve glukokortikoid takviyesi gerekir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Şoktaki hastada bradikardi = hiperkalemiyi düşünün
- ✓ Na/K < 27 şüphe uyandırır
- ✓ Tanı ACTH testiyle konur

Endokrinoloji | Köpek

Vaka 032 · Egzersiz sonrası titreme ve bayılma olan köpek

Hasta
- Köpek
- 8 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Egzersiz veya açlıkta titreme
- Kısa süreli bayılmalar

Öykü ve bağlam
- Yemekten sonra belirtiler düzeliyor

Fiziksel muayene
- Muayene normal

Ek bulgular
- Açlık glukozu: 42 mg/dL
- Eş zamanlı insülin normal-yüksek
- Ultrasonda pankreasta küçük nodül



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hipoglisemide insülinin normal olması neden anlamlıdır?
2. Ayırıcı tanıda neler var?
3. Tedavi seçenekleri nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İnsülinoma
- Hepatik yetmezlik
- Sepsis
- Paraneoplastik hipoglisemi

Yorumlu çözüm
Hipoglisemi varken insülinin baskılanmamış olması uygunsuz insülin salgısını, yani insülinomayı düşündürür. Ultrason ve gerekirse BT ile kitle ve metastaz araştırılır. Tedavi cerrahi rezeksiyon veya medikal yönetimdir (sık ve az öğün, glukokortikoid). Akut krizde dikkatli glukoz uygulanmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Hipoglisemide normal insülin = uygunsuz salgı
- ✓ Sık, küçük öğünler belirtileri azaltır
- ✓ Glukozu dikkatli verin

Gastroenteroloji | Kedi

Vaka 033 · İştahsızlık sonrası sarılık gelişen şişman kedi

Hasta
- Kedi
- 6 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- 5 gündür hiç yememe
- Gözlerde sararma

Öykü ve bağlam
- Obez
- Evde yeni köpek gelmiş (stres)

Fiziksel muayene
- İkter
- Hepatomegali
- Dehidratasyon

Ek bulgular
- ALP ve bilirubin yüksek, GGT normal
- İnce iğne aspirasyonunda hepatositlerde yoğun yağ vakuolleri



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Obez kedide kısa süreli iştahsızlık neden tehlikelidir?
2. GGT'nin normal olması neyi düşündürür?
3. Tedavinin en önemli parçası nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hepatik lipidoz
- Kolanjit
- Pankreatit

Yorumlu çözüm
Obez kedide birkaç günlük iştahsızlık sonrası ikter ve yüksek ALP ile normal GGT hepatik lipidozu düşündürür; sitoloji yağ birikimini gösterir. Tedavinin temeli yeterli enteral beslenmedir; çoğu zaman beslenme tüpü gerekir. Altta yatan neden (stres, pankreatit, diğer hastalıklar) araştırılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Şişman kedide iştahsızlık acil durumdur
- ✓ Beslenme tüpü hayat kurtarır
- ✓ Altta yatan nedeni arayın

Dermatoloji | Köpek

Vaka 034 · Kuyruk kökünde kaşıntı ve tüy kaybı olan köpek


Hasta
- Köpek
- 5 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kuyruk kökünü ısırma
- Arka bölgede tüy kaybı

Öykü ve bağlam
- Yaz aylarında kötüleşiyor
- Pire uygulaması düzensiz

Fiziksel muayene
- Lumbosakral bölgede papül, kabuk ve alopesi
- Tüylerde pire dışkısı

Ek bulgular
- Islak kâğıt testinde kırmızı-kahverengi lekeler



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Lezyonların dağılımı neyi düşündürür?
2. Pire görülmemesi tanıyı dışlar mı?
3. Kontrol programı nasıl olmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Pire alerjisi dermatiti
- Atopik dermatit
- Sarkoptik uyuz

Yorumlu çözüm
Lumbosakral bölgede yoğunlaşan kaşıntı ve pire dışkısı pire alerjisi dermatitini düşündürür. Alerjik köpeklerde birkaç pire ısırığı bile yeterlidir; pire görülmemesi tanıyı dışlamaz. Evdeki tüm hayvanlara düzenli pire koruması ve çevre kontrolü uygulanmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kuyruk kökü kaşıntısı = önce pireyi düşünün
- ✓ Pire görülmemesi tanıyı dışlamaz
- ✓ Tüm evcil hayvanlar tedavi edilir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Nöroloji | Köpek

Vaka 035 · Ön bacaklarda yürüme bozukluğu ve boyun ağrısı olan küçük ırk köpek

Hasta
- Köpek
- 3 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Boynu hareket ettirmek istememe
- Dört bacakta dengesizlik

Öykü ve bağlam
- Yorkshire terrier

Fiziksel muayene
- Tetraparezi, propriosepsiyon eksikliği
- Boyun palpasyonunda ağrı

Ek bulgular
- Röntgen ve BT: atlantoaksiyal instabilite



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hangi omurilik segmenti etkilenmiştir?
2. Boyun manipülasyonunda neden dikkatli olunmalı?
3. Tedavi seçenekleri nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Atlantoaksiyal subluksasyon
- Servikal disk hastalığı
- Meningoensefalit

Yorumlu çözüm
Küçük ırk genç köpekte boyun ağrısı ve tetraparezi kranial servikal lezyonu düşündürür; görüntüleme atlantoaksiyal instabiliteyi gösterir. Muayene ve görüntüleme sırasında boyun fleksiyonundan kaçınılmalıdır; omurilik basısı ağırlaşabilir. Tedavi cerrahi stabilizasyon veya hafif vakalarda boyunluk ve kısıtlı aktivitedir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Boyun ağrısı + tetraparezi = servikal lezyon
- ✓ Boyun fleksiyonundan kaçının
- ✓ Cerrahi stabilizasyon sık gerekir

Enfeksiyon hastalıkları | Kedi

Vaka 036 · Gözlerde akıntı, hapşırma ve ağızda ülser olan yavru kedi

Hasta
- Kedi
- 3 aylık
- Erkek

Başvuru nedeni
- Hapşırma
- Göz akıntısı
- Salya ve yememe

Öykü ve bağlam
- Barınaktan alınmış, aşıları başlamamış

Fiziksel muayene
- Konjonktivit
- Dilde ülserler
- Ateş: 39,8 °C

Ek bulgular
- Orofaringeal PCR: kedi herpesvirüsü ve kalisivirüs pozitif



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hangi virüsler kedi üst solunum yolu hastalığında öne çıkar?
2. Dil ülseri hangi etkeni düşündürür?
3. Destek tedavide neler önemlidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kedi üst solunum yolu enfeksiyonu kompleksi
- Klamidiya
- Mikoplazma

Yorumlu çözüm
Yavru kedide hapşırma, konjonktivit ve dil ülserleri kedi herpesvirüsü ve kalisivirüs enfeksiyonunu düşündürür; ülserler daha çok kalisivirüsle ilişkilidir. Tedavi destekleyicidir: sıvı, burun temizliği, nemlendirme, iştahı destekleme, gerekirse sekonder enfeksiyon için antibiyotik. Aşılama ve barınak hijyeni korunmada önemlidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Dil ülseri = kalisivirüsü düşünün
- ✓ Koku alamayan kedi yemez: burnu temizleyin
- ✓ Aşılama ve hijyen korunmanın temelidir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Kardiyoloji | Köpek

Vaka 037 · Sürekli 'makine sesi' benzeri üfürümü olan yavru köpek

Hasta
- Köpek
- 5 aylık
- Dişi

Başvuru nedeni
- Rutin aşı muayenesinde üfürüm

Öykü ve bağlam
- Kardeşlerinden küçük
- Belirti yok

Fiziksel muayene
- Sol kalp tabanında sürekli üfürüm
- Sıçrayan (hiperkinetik) nabız

Ek bulgular
- Ekokardiyografide aorta ile pulmoner arter arasında akım
- Sol kalp boşluklarında genişleme



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Sürekli üfürüm hangi konjenital hastalığı düşündürür?
2. Neden erken düzeltme önerilir?
3. Hangi tedavi yöntemleri var?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Patent duktus arteriozus (PDA)
- Ventriküler septal defekt
- Aort stenozu

Yorumlu çözüm
Yavru köpekte sol kalp tabanında duyulan sürekli 'makine sesi' üfürümü ve sıçrayan nabız soldan sağa şantlı PDA'yı düşündürür. Tedavi edilmezse sol kalp yetmezliği gelişebilir. Kateterle oklüzyon veya cerrahi ligasyon ile kapatma önerilir; erken müdahale ile prognoz çok iyidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Sürekli üfürüm = PDA'yı düşünün
- ✓ Erken kapatma kalp yetmezliğini önler
- ✓ Her yavru dikkatle oskülte edilmeli

Nefroloji ve üroloji | Köpek

Vaka 038 · İdrarda kan, idrar yaparken ağrı ve sızlama olan köpek


Hasta
- Köpek
- 7 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Gözle görülür kan
- Sık ve az miktarda idrar
- İdrar yaparken zorlanma

Öykü ve bağlam
- Son aylarda benzer ataklar
- Daha önce idrarında kan yok

Fiziksel muayene
- Karın bölgesinde hassasiyet
- Mesane palpasyonunda hafif ağrı

Ek bulgular
- İdrar tahlili: hematüri, piyüri
- İdrar kültürü (sistosentez)
- İdrar sedimentinin mikroskobik incelemesi
- Mesane ve prostat ultrasonu



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Sorun alt idrar yolunda mı, üst idrar yolunda mı?
2. Gerçek hematüriyi nasıl doğrular ve kaynağını nasıl ararız?
3. Hastanın yaşı ve cinsiyeti göz önüne alındığında en olası nedenler nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Bakteriyel sistit
- Ürolitiazis
- Prostatit
- Üriner neoplazi

Yorumlu çözüm
Pollakiüri, stranguri ve hematüri alt idrar yolu hastalığını gösterir. Erkek köpekte bakteriyel sistit, ürolitiazis, prostat hastalıkları ve neoplazi ayırıcı tanıda yer alır. İdrar tahlili, sistosentezle alınan kültür ve ultrasonografi tanıyı doğrulamak ve uygun tedaviyi planlamak için temel araçlardır. Tekrarlayan ataklarda altta yatan neden (taş, prostat) mutlaka araştırılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ İdrar tahlili birçok ayırıcı tanıda yol gösterir
- ✓ Kültür için sistosentez tercih edilir
- ✓ Erkek köpekte prostatı mutlaka değerlendirin

Nefroloji ve üroloji | Kedi

Vaka 039 · Kum kabında ıkınan ama idrar yapamayan erkek kedi

Hasta
- Kedi
- 4 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kum kabına sık gidip idrar yapamama
- Ağlama, penisi yalama

Öykü ve bağlam
- Kuru mama ile besleniyor
- Az su içiyor

Fiziksel muayene
- Büyük, sert ve ağrılı mesane
- Bradikardi

Ek bulgular
- Potasyum: 7,8 mmol/L
- Kreatinin yüksek
- İdrarda struvit kristalleri



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Bu tablo neden acildir?
2. Bradikardi neyi gösterir?
3. Tekrarı önlemek için ne yapılmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Üretral obstrüksiyon (idiyopatik sistit, tıkaç)
- Ürolitiazis
- Bakteriyel sistit

Yorumlu çözüm
Erkek kedide idrar yapamama ve büyük, sert mesane üretral tıkanıklığı gösterir ve acildir. Hiperkalemi ve bradikardi hayatı tehdit eder; önce sıvı ve hiperkalemi tedavisi, ardından sedasyon altında sonda ile tıkanıklık açılır. Tekrarı önlemek için ıslak mama, su tüketimini artırma ve stres yönetimi önerilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ İdrar yapamayan erkek kedi acildir
- ✓ Önce hiperkalemi, sonra sonda
- ✓ Su tüketimi ve stres yönetimi tekrarı azaltır

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Nefroloji ve üroloji | Kedi

Vaka 040 · Kilo kaybı, ağız kokusu ve çok su içen yaşlı kedi

Hasta
- Kedi
- 15 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Çok su içme
- Kilo kaybı
- Ara sıra kusma

Öykü ve bağlam
- Yıllardır belirti yok

Fiziksel muayene
- Dehidratasyon
- Küçük, düzensiz böbrekler
- Ağızda üremik koku

Ek bulgular
- Kreatinin: 3,4 mg/dL, SDMA yüksek
- İdrar dansitesi: 1,012
- Proteinüri ve kan basıncı ölçülmeli



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. IRIS evrelemesi neden önemlidir?
2. Proteinüri ve hipertansiyon neden araştırılır?
3. Diyetin rolü nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kronik böbrek hastalığı
- Hipertiroidizm
- Diabetes mellitus

Yorumlu çözüm
Yaşlı kedide poliüri-polidipsi, kilo kaybı, küçük böbrekler ve azotemi ile birlikte düşük idrar dansitesi kronik böbrek hastalığını gösterir. IRIS evrelemesi kreatinin/SDMA, proteinüri ve kan basıncına göre yapılır ve tedaviyi yönlendirir. Böbrek diyeti, sıvı desteği, fosfor kontrolü ve gerekirse antihipertansif tedavi uygulanır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Azotemi + düşük dansite = böbrek kaynaklı
- ✓ IRIS evrelemesi tedaviyi yönlendirir
- ✓ Böbrek diyeti yaşam süresini uzatır

Yalnızca eğitim amaçlıdır