ROTA 03

210 Yorumlu Veteriner Klinik Vaka

Rota 03 · Acil Durumlar, Toksikoloji ve Anestezi · 40 vaka

5 Öğrenme Rotası · Küçük, büyük ve egzotik hayvanlar · Yorumlu çözümler

Acil · Köpek

Vaka 096 · Araba çarpması sonrası şokta gelen köpek

Hasta
- Köpek
- 3 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Araba çarpması
- Kalkamıyor

Öykü ve bağlam
- 15 dakika önce olmuş

Fiziksel muayene
- Soluk mukozalar, KDZ 3 sn
- Taşikardi, zayıf nabız
- Ekstremitelerde soğukluk

Ek bulgular
- Laktat: 5,2 mmol/L
- T-FAST/A-FAST: az miktarda abdominal sıvı



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Travmalı hastada ilk değerlendirme sırası nedir?
2. Şokun hangi tipi düşünülmeli?
3. Sıvı tedavisi nasıl planlanır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hipovolemik (hemorajik) şok
- Pnömotoraks
- Kafa travması

Yorumlu çözüm
Travmalı hastada ABC (hava yolu, solunum, dolaşım) sırasıyla hızlı birincil değerlendirme yapılır. Soluk mukozalar, uzamış KDZ ve yüksek laktat hipovolemik şoku gösterir. Damar yolu açılır, kristaloid bolusları küçük dozlarla verilir ve yanıt değerlendirilir. POCUS iç kanama ve pnömotoraksı hızlıca tarar.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Önce ABC
- ✓ Laktat perfüzyonu gösterir
- ✓ Sıvıyı bolus ve yeniden değerlendirme ile verin

Acil | Kedi

Vaka 097 · Balkondan düşen ve burnu kanayan kedi

Hasta

- Kedi
- 2 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni

- Yüksekten düşme
- Burun kanaması
- Nefes darlığı

Öykü ve bağlam

- 5. kattan düşmüş

Fiziksel muayene

- Sert damak yarığı
- Takipne
- Bir arka bacakta şişlik

Ek bulgular

- Toraks röntgeni: pnömotoraks ve akciğer kontüzyonu
- Arka bacakta tibia kırığı



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları

1. 'Yüksekten düşme sendromu'nun tipik bulguları nelerdir?
2. Hangi yaralanma önce tedavi edilir?
3. Torasentez ne zaman yapılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar

- Yüksekten düşme sendromu
- Diyafram hernisi
- Kafa travması

Yorumlu çözüm

Yüksekten düşen kedilerde göğüs travması (pnömotoraks, kontüzyon), sert damak yarığı ve ekstremite kırıkları tipiktir. Önce solunum stabilize edilir: oksijen ve gerekirse torasentez. Kırıklar hasta stabil hâle gelince tedavi edilir; ağrı kontrolü baştan sağlanmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar

- ✓ Önce solunum, sonra kırıklar
- ✓ Damak yarığını kontrol edin
- ✓ Ağrı kontrolü erken başlar

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Acil | Köpek

Vaka 098 · Arı soktuktan sonra yüz şişliği ve kollaps

Hasta
- Köpek
- 6 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Yüzde ani şişlik
- Kusma
- Kollaps

Öykü ve bağlam
- Bahçede arı sokması

Fiziksel muayene
- Hipotansiyon
- Ürtiker
- Solunum sıkıntısı yok

Ek bulgular
- POCUS: safra kesesi duvarında 'halo' görünümü



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Anafilaksinin köpekte hedef organı nedir?
2. İlk ilaç hangisidir?
3. Hasta ne kadar izlenmelidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Anafilaksi
- Septik şok
- Anjiyoödem

Yorumlu çözüm
Arı sokması sonrası kusma, kollaps ve hipotansiyon anafilaksiyi gösterir; köpeklerde karaciğer ve gastrointestinal sistem başlıca hedef organdır ve safra kesesi duvarında ödem görülebilir. İlk ilaç adrenalindir; ardından sıvı, antihistaminik ve gerekirse kortikosteroid verilir. Bifazik reaksiyon riski nedeniyle hasta saatlerce izlenmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Anafilakside ilk ilaç adrenalin
- ✓ Köpekte safra kesesi halo işareti
- ✓ Bifazik reaksiyona karşı izleyin

Acil · Köpek

Vaka 099 · Sıcak günde koşu sonrası kollaps

Hasta
- Köpek
- 4 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kollaps
- Kusma, kanlı ishal

Öykü ve bağlam
- Öğle sıcağında koşu
- Brakisefalik ırk

Fiziksel muayene
- Rektal ısı: 41,8 °C
- Hiperemik mukozalar
- Zihinsel durum bozuk

Ek bulgular
- Trombositopeni
- PT uzamış
- Glukoz düşük



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Soğutma nasıl yapılmalı?
2. Hangi komplikasyonlar gelişebilir?
3. Neden soğutma 39,5 °C'de durdurulur?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Sıcak çarpması
- Kötü huylu hipertermi
- Septik şok

Yorumlu çözüm
Sıcak ortamda egzersiz sonrası çok yüksek vücut ısısı ve kollaps sıcak çarpmasını gösterir. Soğutma ılık su ve hava akımıyla yapılır; buzlu su vazokonstriksiyonla ısı kaybını azaltır. Rebound hipotermiyi önlemek için 39,5 °C civarında durdurulur. DIC, akut böbrek hasarı ve beyin ödemi açısından izlenmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Ilık su ile soğutun, buzlu su değil
- ✓ 39,5 °C'de soğutmayı durdurun
- ✓ DIC ve böbreği izleyin

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Acil · Köpek

Vaka 100 · Ani nefes darlığı ve inspiratuvar stridor olan köpek

Hasta
- Köpek
- 9 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Gürültülü nefes alma
- Ses değişikliği
- Sıcakta kötüleşme

Öykü ve bağlam
- Labrador retriever
- Belirtiler aylardır yavaş artıyor

Fiziksel muayene
- İnspiratuvar stridor
- Siyanoz eğilimi
- Hipertermi

Ek bulgular
- Sedasyon altında larinks muayenesi: aritenoidler inspirasyonda açılmıyor



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. İnspiratuvar stridor hava yolunun hangi kısmını gösterir?
2. Acil yönetim nasıl olmalı?
3. Kalıcı tedavi nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Larinks paralizisi
- Larinks kitlesi
- Brakisefalik sendrom

Yorumlu çözüm
İnspiratuvar stridor ve ses değişikliği üst hava yolu, özellikle larinks sorununu gösterir. Yaşlı büyük ırkta larinks paralizisi sıktır. Akut krizde sedasyon, oksijen ve soğutma yapılır; gerekirse entübasyon veya geçici trakeostomi gerekir. Kalıcı tedavi tek taraflı aritenoid lateralizasyondur; aspirasyon pnömonisi riski konuşulmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ İnspiratuvar stridor = üst hava yolu
- ✓ Sedasyon ve soğutma krizi rahatlatır
- ✓ Cerrahi sonrası aspirasyon riski var

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Acil | Kedi

Vaka 101 · Ani gelişen göğüs travması olmayan pnömotoraks

Hasta
- Kedi
- 7 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Hızlı ve yüzeysel solunum
- Saklanma

Öykü ve bağlam
- Travma öyküsü yok
- Kronik öksürük öyküsü

Fiziksel muayene
- Dorsal akciğer alanlarında sesler azalmış
- Takipne

Ek bulgular
- POCUS: kayma işareti (lung sliding) kayıp
- Torasentezde bol hava



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Spontan pnömotoraksın nedenleri nelerdir?
2. Torasentez neden hem tanısal hem tedavidir?
3. Ne zaman cerrahi gerekir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Spontan pnömotoraks (büllöz hastalık, astım)
- Akciğer neoplazisi
- Travma

Yorumlu çözüm
Travma olmadan gelişen pnömotoraks altta yatan akciğer hastalığını (büller, astım, neoplazi, parazit) düşündürür. Torasentez solunumu hızla rahatlatır. Tekrarlayan hava birikiminde göğüs tüpü takılır; devam eden kaçakta BT ile lezyon araştırılıp cerrahi düşünülür.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Dorsal sessizlik = havayı düşünün
- ✓ Torasentez hayat kurtarır
- ✓ Tekrarlıyorsa BT ve cerrahi

Acil · Köpek

Vaka 102 · Sürekli nöbet geçiren köpek (status epileptikus)

Hasta
- Köpek
- 5 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- 30 dakikadır durmayan nöbet

Öykü ve bağlam
- Bilinen epilepsi
- İlaç dozunu atlamış

Fiziksel muayene
- Generalize tonik-klonik aktivite
- Hipertermi: 41,0 °C

Ek bulgular
- Glukoz normal
- Elektrolitler normal



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Status epileptikus tanımı nedir?
2. İlk basamak ilaç hangisidir?
3. Hangi komplikasyonlar izlenmelidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İdiyopatik epilepside status epileptikus (ilaç uyumsuzluğu)
- Toksin
- Metabolik nöbet

Yorumlu çözüm
5 dakikadan uzun süren nöbet veya arada bilinç dönmeden tekrarlayan nöbetler status epileptikustur. İlk basamak benzodiazepindir (IV, rektal veya intranazal); yanıt yoksa ikinci basamak antiepileptik veya infüzyon kullanılır. Hipertermi, hipoglisemi, aspirasyon ve beyin ödemi açısından izlenmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ 5 dakika üzeri nöbet acildir
- ✓ İlk ilaç benzodiazepin
- ✓ Hipertermi ve beyin ödemini izleyin

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Acil | Köpek

Vaka 103 · Ani kollaps ve karında sıvı ile gelen köpek: hemoabdomen

Hasta
- Köpek
- 8 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Ani kollaps
- Soluk dişetleri

Öykü ve bağlam
- Belirti yokken aniden

Fiziksel muayene
- Karında sıvı dalgası
- Taşikardi
- Zayıf nabız

Ek bulgular
- Abdominosentez: pıhtılaşmayan kan
- Sıvıdaki hematokrit periferikle benzer



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Pıhtılaşmayan kan neyi gösterir?
2. Permissif hipotansiyon nedir?
3. Otolog transfüzyon ne zaman düşünülür?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Rüptüre abdominal kitle
- Koagülopati
- Travma

Yorumlu çözüm
Abdominosentezde pıhtılaşmayan kan aktif olmayan, önceden olmuş iç kanamayı gösterir; damar içinden yanlışlıkla alınan kan pıhtılaşır. Stabilizasyonda permissif hipotansiyon hedeflenir, aşırı sıvı kanamayı artırabilir. Kan ürünleri hazırlanır; kaynak kontrolü için cerrahi planlanır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Pıhtılaşmayan kan = boşluk içi kanama
- ✓ Aşırı sıvı vermekten kaçının
- ✓ Kan ürünlerini hazırlayın

Acil | Kedi

Vaka 104 · Dövüş sonrası ateş ve göğüs boşluğunda irin birikimi

Hasta
- Kedi
- 3 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Nefes darlığı
- Ateş
- İştahsızlık

Öykü ve bağlam
- Dışarı çıkan, kavgacı kedi

Fiziksel muayene
- Ventral göğüste boğuk sesler
- Ateş: 40,1 °C

Ek bulgular
- Torasentez: kötü kokulu, bulanık sıvı
- Sitoloji: dejenere nötrofiller, karışık bakteriler



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Piyotoraks nasıl tanınır?
2. Tedavide göğüs tüpünün rolü nedir?
3. Hangi bakteriler sıktır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Piyotoraks
- Şilotoraks
- FIP efüzyonu

Yorumlu çözüm
Kötü kokulu septik efüzyon piyotoraksı gösterir; kedilerde genellikle ağız florasından anaerob karışık bakteriler sorumludur. Tedavide göğüs tüpleri ile drenaj ve lavaj, geniş spektrumlu antibiyotik ve destekleyici tedavi yapılır. Erken ve agresif tedaviyle prognoz iyidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kötü koku anaerobu düşündürür
- ✓ Drenaj tedavinin temelidir
- ✓ Geniş spektrumlu antibiyotik başlayın

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Acil | Köpek

Vaka 105 · Göğüs kafesine kitle baskısı olmadan ani dispne: kardiyojenik ödem

Hasta
- Köpek
- 10 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Gece başlayan nefes darlığı
- Pembe köpüklü burun akıntısı

Öykü ve bağlam
- Bilinen mitral kapak hastalığı, ilaçları kesilmiş

Fiziksel muayene
- Ortopne
- Akciğerlerde yaygın krepitasyon
- Sol apikal üfürüm

Ek bulgular
- POCUS: B-çizgileri yaygın, sol atriyum büyük



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Dispneik hastada röntgen ne zaman çekilmeli?
2. Akut tedavide hangi ilaçlar verilir?
3. Sahip neyi takip etmeli?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Akut kardiyojenik pulmoner ödem
- Pnömoni
- Akut solunum sıkıntısı sendromu

Yorumlu çözüm
Bilinen kalp hastalığı olan köpekte akut dispne, pembe köpüklü akıntı ve yaygın B-çizgileri kardiyojenik ödemi gösterir. Stresli hastada röntgen stabilizasyondan sonra çekilir. Oksijen, IV/IM furosemid, pimobendan ve gerekirse sedasyon (butorfanol) verilir. Sahip evde istirahat solunum sayısını izlemelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Önce stabilizasyon, sonra röntgen
- ✓ Furosemid + oksijen ilk adımdır
- ✓ İlaçların kesilmesi krize yol açabilir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Zehirlenmeler | Köpek

Vaka 106 · Bitter çikolata yedikten sonra huzursuzluk ve taşikardi

Hasta
- Köpek
- 3 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Huzursuzluk
- Kusma
- Çok su içme

Öykü ve bağlam
- 2 saat önce yaklaşık 100 g bitter çikolata yemiş
- Vücut ağırlığı 8 kg

Fiziksel muayene
- Taşikardi: 190/dk
- Tremor
- Hipertermi

Ek bulgular
- EKG: sinüs taşikardisi, ventriküler erken atımlar



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Toksik maddenin adı ve etkisi nedir?
2. Kusturma ne zaman uygundur?
3. Tedavide hangi önlemler alınır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Metilksantin (teobromin) zehirlenmesi
- Amfetamin zehirlenmesi
- Kafein zehirlenmesi

Yorumlu çözüm
Çikolatadaki teobromin ve kafein (metilksantinler) köpekte uyarılma, kusma, taşikardi, aritmi ve tremor yapar; bitter çikolata en tehlikelisidir. Erken dönemde kusturma ve aktif kömür (tekrarlanan dozlar) uygulanır. Sıvı tedavisi, aritmi ve tremor kontrolü yapılır; mesane sık boşaltılmalıdır (geri emilim).

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Bitter çikolata en toksiktir
- ✓ Aktif kömür tekrarlanabilir
- ✓ Mesaneyi boş tutun

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Zehirlenmeler | Kedi

Vaka 107 · Köpeğe ait pire damlası uygulanan kedide tremor

Hasta
- Kedi
- 4 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kasılmalar, titreme
- Salya

Öykü ve bağlam
- Sahip köpek için olan spot-on'u kediye sürmüş

Fiziksel muayene
- Generalize tremor
- Hipertermi
- Midriyazis

Ek bulgular
- Glukoz normal



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hangi etken madde kediler için toksiktir?
2. Dekontaminasyon nasıl yapılır?
3. Tremor nasıl kontrol edilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Permetrin zehirlenmesi
- Organofosfat zehirlenmesi
- Epilepsi

Yorumlu çözüm
Köpeğe özel pire ürünlerindeki permetrin kedilerde ciddi nörotoksisiteye yol açar. Hasta stabilize edildikten sonra ılık su ve bulaşık deterjanı ile yıkanır. Tremor metokarbamol ile, nöbetler benzodiazepinle kontrol edilir; IV lipid emülsiyonu düşünülebilir. Vücut ısısı izlenmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Köpek ürünlerini kedide kullanmayın
- ✓ Yıkama dekontaminasyondur
- ✓ Metokarbamol tremoru azaltır

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Zehirlenmeler | Köpek

Vaka 108 · Üzüm yedikten sonra kusma ve az idrar yapma


Hasta
- Köpek
- 5 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kusma
- İdrar azalması

Öykü ve bağlam
- 2 gün önce kuru üzüm yemiş

Fiziksel muayene
- Dehidratasyon
- Böbrek bölgesinde ağrı

Ek bulgular
- Kreatinin: 4,8 mg/dL
- Fosfor ve kalsiyum yüksek
- İdrar çıkışı düşük



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Üzüm toksisitesinde doz-yanıt ilişkisi nasıldır?
2. Erken dönemde hangi önlemler alınır?
3. Oligüri neden prognozu kötüleştirir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Üzüm/kuru üzüm toksisitesi (akut böbrek hasarı)
- Leptospiroz
- Etilen glikol zehirlenmesi

Yorumlu çözüm
Üzüm ve kuru üzüm köpeklerde öngörülemeyen şekilde akut böbrek hasarına yol açabilir; güvenli doz yoktur. Erken dönemde kusturma, aktif kömür ve 48-72 saat sıvı diürezi önerilir. Oligüri gelişirse prognoz kötüleşir; diüretik, sıvı dengesi ve gerekirse diyaliz değerlendirilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Üzümde güvenli doz yoktur
- ✓ Erken diürez böbreği korur
- ✓ İdrar çıkışını ölçün

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Zehirlenmeler | Kedi

Vaka 109 · Zambak çiçeği kemirdikten sonra kusma

Hasta
- Kedi
- 2 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Kusma
- Salya
- İştahsızlık

Öykü ve bağlam
- Evdeki buket zambak içeriyor

Fiziksel muayene
- Hafif dehidratasyon

Ek bulgular
- Başlangıçta böbrek değerleri normal
- İdrarda tübüler silendirler



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Zambak kediler için ne kadar toksiktir?
2. Böbrek değerleri normal diye taburcu edilir mi?
3. Tedavi ne kadar sürer?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Zambak (Lilium) zehirlenmesi
- Gastrit
- Etilen glikol zehirlenmesi

Yorumlu çözüm
Lilium ve Hemerocallis türlerinin tüm parçaları, polen ve vazodaki su dahil, kedilerde akut böbrek hasarı yapar. Başlangıçta böbrek değerleri normal olabilir; silendirüri erken bir ipucudur. Erken dekontaminasyon ve en az 48 saat agresif sıvı diürezi uygulanmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Zambakta polen bile toksiktir
- ✓ Normal kreatinin güvence değildir
- ✓ Erken diürez hayat kurtarır

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Zehirlenmeler | Köpek

Vaka 110 · Ağrı kesici (ibuprofen) yutan köpekte kusma

Hasta
- Köpek
- 7 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kanlı kusma
- Karın ağrısı

Öykü ve bağlam
- Sahibin ilaç kutusunu çiğnemiş

Fiziksel muayene
- Kranial karın ağrısı
- Hafif dehidratasyon

Ek bulgular
- Üre ve kreatinin hafif yüksek
- Hematokrit hafif düşük



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. NSAİİ zehirlenmesinde hangi organlar etkilenir?
2. Doza göre klinik tablo nasıl değişir?
3. Gastroprotektif tedavi neleri içerir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İbuprofen (NSAİİ) zehirlenmesi
- Gastrik yabancı cisim
- Gastrit

Yorumlu çözüm
İnsan NSAİİ'leri köpeklerde gastrointestinal ülserasyon, akut böbrek hasarı ve yüksek dozlarda nörolojik belirtiler yapar. Dekontaminasyon sonrası gastroprotektif ilaçlar (proton pompası inhibitörü, sukralfat) ve böbrek koruyucu sıvı tedavisi uygulanır. Böbrek değerleri birkaç gün izlenir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Doz klinik tabloyu belirler
- ✓ Mide ve böbreği koruyun
- ✓ Böbrek değerlerini izleyin

Zehirlenmeler · Kedi

Vaka 111 · Parasetamol verilen kedide kahverengi mukoza ve yüz ödemi

Hasta
- Kedi
- 1 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Nefes darlığı
- Yüz ve patilerde şişlik

Öykü ve bağlam
- Sahip ateşi düşsün diye parasetamol vermiş

Fiziksel muayene
- Kahverengi-siyanotik mukozalar
- Yüz ödemi
- Takipne

Ek bulgular
- Kan çikolata kahvesi renginde
- Eritrositlerde Heinz cisimcikleri
- Methemoglobin yüksek



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kedi neden parasetamole duyarlıdır?
2. Methemoglobinemi nasıl tanınır?
3. Antidot nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Parasetamol zehirlenmesi
- Soğan zehirlenmesi
- Kardiyojenik dispne

Yorumlu çözüm
Kediler glukuronidasyon kapasitesi düşük olduğu için parasetamolü metabolize edemez; methemoglobinemi, Heinz cisimciği anemisi ve yüz ödemi gelişir. Antidot N-asetilsisteindir; oksijen, destekleyici tedavi ve gerekirse transfüzyon yapılır. Sahiplere insan ilaçlarının kedilerde kullanılmaması anlatılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Parasetamol kedide çok toksiktir
- ✓ Kahverengi kan = methemoglobin
- ✓ Antidot N-asetilsistein

Zehirlenmeler | Köpek

Vaka 112 · Tarım ilacı temasından sonra salya, kusma ve kas titremesi


Hasta
- Köpek
- 4 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Aşırı salya
- Kusma, ishal
- Kas seğirmesi

Öykü ve bağlam
- Bahçede ilaçlama yapılmış

Fiziksel muayene
- Miyozis
- Bradikardi
- Bronkore

Ek bulgular
- Kolinesteraz aktivitesi düşük



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Muskarinik ve nikotinik belirtiler nelerdir?
2. Atropinin rolü nedir?
3. Personel nasıl korunmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Organofosfat / karbamat zehirlenmesi
- Permetrin zehirlenmesi
- Mantar zehirlenmesi

Yorumlu çözüm
Salya, gözyaşı, idrar, dışkılama, kusma (SLUDGE), miyozis ve bradikardi muskarinik; kas seğirmesi ve güçsüzlük nikotinik etkilerdir. Kolinesteraz inhibisyonu tanıyı destekler. Atropin muskarinik belirtileri kontrol eder; organofosfatlarda erken dönemde pralidoksim düşünülebilir. Dekontaminasyonda personel eldiven kullanmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ SLUDGE + miyozis = kolinerjik kriz
- ✓ Atropin muskarinik etkileri durdurur
- ✓ Yıkama sırasında koruyucu ekipman

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Zehirlenmeler | Köpek

Vaka 113 · Esrarlı yiyecek yedikten sonra ataksi ve idrar kaçırma


Hasta
- Köpek
- 2 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Sendeleme
- İdrar kaçırma
- Aşırı ses ve harekete tepki

Öykü ve bağlam
- Evde misafir varmış

Fiziksel muayene
- Ataksi
- Hiperestezi
- Bradikardi

Ek bulgular
- Glukoz normal



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. THC zehirlenmesinin tipik bulguları nelerdir?
2. Çikolatalı yiyeceklerde ek risk nedir?
3. Tedavi destekleyici midir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- THC (kenevir) zehirlenmesi
- İvermektin zehirlenmesi
- Vestibüler hastalık

Yorumlu çözüm
Ataksi, idrar kaçırma, uyaranlara aşırı tepki ve bradikardi THC zehirlenmesini düşündürür. Ürün çikolatalıysa metilksantin toksisitesi de eklenir. Tedavi genelde destekleyicidir: sessiz ortam, ısı kontrolü, sıvı ve gerekirse IV lipid emülsiyonu. Sahiple yargılamadan konuşmak doğru öyküyü almayı kolaylaştırır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ İdrar kaçırma + hiperestezi tipiktir
- ✓ Çikolata içeriğini sorgulayın
- ✓ Yargılamadan öykü alın

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Zehirlenmeler | Köpek

Vaka 114 · Ormanda yürüyüş sonrası ağızda şişlik ve dil nekrozu


Hasta
- Köpek
- 6 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Aşırı salya
- Dilde şişlik
- Ağzını patileme

Öykü ve bağlam
- Çam ağaçlarının olduğu bölgede yürüyüş
- İlkbahar

Fiziksel muayene
- Dilde ödem ve renk değişikliği
- Yüzde ödem

Ek bulgular
- Çevrede kese şeklinde tırtıl yuvaları görülmüş



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Çam kese böceği tırtılı nasıl zarar verir?
2. İlk müdahalede ne yapılmamalı?
3. Uzun dönem komplikasyonlar nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Çam kese böceği tırtılı teması
- Anafilaksi
- Yanık

Yorumlu çözüm
İlkbaharda çam ormanında yürüyüş sonrası ağızda ödem ve dil renk değişikliği çam kese böceği tırtılının kıllarındaki toksinle teması düşündürür. Bölge ovulmadan bol suyla yıkanır; kortikosteroid, antihistaminik ve analjezi verilir. Dilde nekroz ve doku kaybı gelişebilir; hasta günlerce izlenmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Ovmayın, bol suyla yıkayın
- ✓ Dil nekrozu gelişebilir
- ✓ Mevsim ve ortam öyküsü önemlidir

Akut değişiklikler | Köpek

Vaka 115 · Ani gelişen akut böbrek hasarı ve oligüri

Hasta
- Köpek
- 12 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kusma
- İdrar yapmama (12 saattir)

Öykü ve bağlam
- Kronik hastalık öyküsü yok

Fiziksel muayene
- Dehidratasyon düzeltildikten sonra idrar çıkışı < 0,5 mL/kg/saat

Ek bulgular
- Kreatinin: 6,2 mg/dL
- Potasyum: 7,0 mmol/L
- İdrar dansitesi: 1,012



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Prerenal ve renal azotemi nasıl ayrılır?
2. Oligüri nasıl ölçülür?
3. Diyaliz ne zaman gerekir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Akut böbrek hasarı (toksik / iskemik / enfeksiyöz)
- Postrenal obstrüksiyon
- Prerenal azotemi

Yorumlu çözüm
Rehidratasyona rağmen düşük idrar çıkışı ve izostenüriye yakın dansiteyle azotemi renal kaynaklı akut böbrek hasarını gösterir. İdrar çıkışı sonda ile saatlik ölçülür. Hiperkalemi ve sıvı yüklenmesi kontrol edilir; tedaviye yanıt yoksa diyaliz düşünülür. Leptospiroz ve toksinler araştırılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ İdrar çıkışını saatlik ölçün
- ✓ Sıvı yüklenmesinden kaçının
- ✓ Nedeni araştırın: toksin, enfeksiyon, iskemi

Akut değişiklikler | Köpek

Vaka 116 · Ameliyat sonrası hipotansiyon ve taşikardi: sepsis mi?

Hasta
- Köpek
- 7 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Ameliyat sonrası ikinci gün halsizlik
- Ateş

Öykü ve bağlam
- İki gün önce bağırsak rezeksiyonu yapılmış

Fiziksel muayene
- Hiperemik mukozalar, hızlı KDZ
- Taşikardi
- Karında ağrı

Ek bulgular
- Abdominal sıvıda dejenere nötrofil ve hücre içi bakteri
- Sıvı glukozu kan glukozundan 20 mg/dL düşük



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Septik peritonit nasıl doğrulanır?
2. Sepsisin erken (hiperdinamik) fazının bulguları nelerdir?
3. Tedavide zaman neden kritiktir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Anastomoz kaçağına bağlı septik peritonit
- Postoperatif ağrı
- Pankreatit

Yorumlu çözüm
Bağırsak ameliyatı sonrası ateş, karın ağrısı ve hiperdinamik bulgular anastomoz kaçağını düşündürür. Sıvıda hücre içi bakteri ve sıvı-kan glukoz farkı septik peritoniti destekler. Erken antibiyotik, sıvı resüsitasyonu ve acil cerrahi kaynak kontrolü hayatta kalmayı belirler.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Anastomoz kaçağı 2-5. günlerde görülür
- ✓ Sıvı analizi hızlı tanı sağlar
- ✓ Erken kaynak kontrolü şart

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Akut değişiklikler | Kedi

Vaka 117 · Kalp yetmezliği tedavisi sırasında hipokalemi ve kas güçsüzlüğü


Hasta
- Kedi
- 10 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Boynunu bükük tutma
- Güçsüzlük

Öykü ve bağlam
- Yüksek doz diüretik kullanıyor
- Kronik böbrek hastalığı

Fiziksel muayene
- Ventrofleksiyon (boyun eğik)
- Kas güçsüzlüğü

Ek bulgular
- Potasyum: 2,6 mmol/L
- CK yüksek



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hipokaleminin kedilerdeki tipik bulgusu nedir?
2. Hangi ilaçlar hipokalemi yapar?
3. Potasyum takviyesinde dikkat edilecekler nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hipokalemik miyopati
- Tiamin eksikliği
- Miyastenia gravis

Yorumlu çözüm
Kedilerde ventrofleksiyon ve kas güçsüzlüğü hipokalemik miyopatinin tipik bulgusudur; diüretikler ve kronik böbrek hastalığı potasyum kaybını artırır. Potasyum oral veya IV olarak takviye edilir; IV infüzyon hızı 0,5 mEq/kg/saati geçmemelidir. Diüretik dozu gözden geçirilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Ventrofleksiyon = potasyumu ölçün
- ✓ IV potasyum hızına dikkat
- ✓ Diüretik dozunu gözden geçirin

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Akut değişiklikler | Köpek

Vaka 118 · Ani karın şişliği olmadan solukluk ve sağ kalp yetmezliği

Hasta
- Köpek
- 9 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Halsizlik
- Karında hafif şişlik
- Bayılma

Öykü ve bağlam
- Kronik öksürük ve kalp kurdu öyküsü

Fiziksel muayene
- Juguler venöz pulsasyon
- Asit
- Sağ apikal üfürüm

Ek bulgular
- Ekokardiyografi: pulmoner arter genişlemesi, sağ ventrikül hipertrofisi
- Triküspit yetmezliği hızı yüksek



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Pulmoner hipertansiyonun nedenleri nelerdir?
2. Sağ kalp yetmezliği hangi bulgularla tanınır?
3. Tedavide hangi ilaç kullanılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Pulmoner hipertansiyon (kalp kurdu ilişkili)
- Perikardiyal efüzyon
- Dilate kardiyomiyopati

Yorumlu çözüm
Juguler venöz distansiyon ve asit sağ kalp yetmezliğini gösterir; ekokardiyografideki yüksek triküspit yetmezliği hızı pulmoner hipertansiyonu destekler. Kalp kurdu, kronik akciğer hastalığı ve tromboemboli nedenler arasındadır. Altta yatan neden tedavi edilir, sildenafil kullanılır ve asit gerekirse boşaltılır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Juguler distansiyon + asit = sağ kalp
- ✓ Altta yatan nedeni tedavi edin
- ✓ Sildenafil pulmoner basıncı düşürür

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Akut değişiklikler | Köpek

Vaka 119 · Kanayan, pıhtılaşma testleri uzamış ve trombositi düşen septik köpek

Hasta
- Köpek
- 6 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Venöz ponksiyon yerlerinden sızıntı
- Peteşi

Öykü ve bağlam
- Piyometra nedeniyle opere olmuş, septik

Fiziksel muayene
- Peteşi ve ekimozlar
- Hipotansiyon

Ek bulgular
- Trombosit düşüyor
- PT ve aPTT uzamış
- D-dimer yüksek, fibrinojen düşük



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. DIC'nin tetikleyicileri nelerdir?
2. Tedavinin temeli nedir?
3. Plazma ne zaman verilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Yaygın damar içi pıhtılaşma (DIC)
- Rodentisit zehirlenmesi
- İmmün trombositopeni

Yorumlu çözüm
Sepsis gibi ağır sistemik hastalıklarda pıhtılaşma sistemi aşırı aktive olur; faktörler ve trombositler tükenir ve kanama gelişir. Trombositopeni, uzamış PT/aPTT, yüksek D-dimer ve düşük fibrinojen DIC'yi destekler. Tedavide altta yatan neden kontrol edilir, perfüzyon desteklenir ve aktif kanamada taze donmuş plazma verilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ DIC her zaman ikincildir
- ✓ Altta yatan nedeni tedavi edin
- ✓ Plazma faktörleri yerine koyar

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Akut değişiklikler | Kedi

Vaka 120 · Ani gelişen anizokori ve davranış değişikliği: kafa travması

Hasta
- Kedi
- 8 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Sendeleme
- Bilinç bulanıklığı

Öykü ve bağlam
- Dolabın üstünden düşmüş

Fiziksel muayene
- Anizokori
- Bilinç: stupor
- Bradikardi ve hipertansiyon

Ek bulgular
- Glukoz hafif yüksek



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Modifiye Glasgow Koma Skalası nasıl kullanılır?
2. Bradikardi + hipertansiyon neyi gösterir?
3. Tedavide öncelikler nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kafa travması ve kafa içi basınç artışı
- İntrakraniyal kanama
- Hipoglisemi

Yorumlu çözüm
Kafa travması sonrası bilinç değişikliği, anizokori ve bradikardi ile hipertansiyon (Cushing refleksi) kafa içi basınç artışını gösterir. Öncelik oksijenasyon ve normotansiyondur; başın 15-30 derece yükseltilmesi ve hiperozmolar tedavi (mannitol veya hipertonik salin) kullanılır. MGKS ile seri değerlendirme yapılır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Cushing refleksi = acil
- ✓ Oksijen ve kan basıncı beynin yakıtıdır
- ✓ Seri nörolojik skor tutun

Anestezi | Köpek

Vaka 121 · Brakisefalik köpekte anestezi planlaması

Hasta
- Köpek
- 3 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Yumuşak damak operasyonu için anestezi

Öykü ve bağlam
- İngiliz bulldog
- Uykuda horlama, sıcak intoleransı

Fiziksel muayene
- Darlaşmış burun delikleri
- Stridor

Ek bulgular
- Preoperatif muayene ve kan tahlili normal



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Brakisefalik hastada en riskli dönem hangisidir?
2. Premedikasyon nasıl seçilir?
3. Ekstübasyon ne zaman yapılmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Brakisefalik obstrüktif hava yolu sendromu (BOAS)

Yorumlu çözüm
BOAS'lı köpeklerde indüksiyon ve özellikle derlenme dönemi hava yolu tıkanması açısından en riskli dönemlerdir. Preoksijenasyon, hızlı indüksiyon ve entübasyon için hazırlık yapılır; mide koruyucu ilaçlar regürjitasyon riskini azaltır. Ekstübasyon hasta başını kaldırıp yutkunduğunda, mümkün olduğunca geç yapılır ve hasta yakından izlenir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Derlenme en riskli dönemdir
- ✓ Preoksijenasyon şart
- ✓ Ekstübasyonu geciktirin

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Anestezi | Köpek

Vaka 122 · Diş operasyonu sırasında hipotansiyon

Hasta
- Köpek
- 12 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Diş temizliği ve çekim

Öykü ve bağlam
- Hafif mitral kapak hastalığı

Fiziksel muayene
- İzofluran altında ortalama arter basıncı: 52 mmHg
- Kalp hızı normal

Ek bulgular
- Anestezi monitörü: SpO2 normal, EtCO2 normal



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Anestezide hipotansiyon nasıl tanımlanır?
2. İlk müdahale adımları nelerdir?
3. İnhalasyon anesteziğinin rolü nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İnhalasyon anesteziğine bağlı vazodilatasyon
- Hipovolemi
- Bradikardi

Yorumlu çözüm
Ortalama arter basıncının 60 mmHg altına düşmesi hipotansiyondur ve böbrek gibi organların perfüzyonunu tehlikeye atar. İlk adım inhalasyon anestezik konsantrasyonunu azaltmaktır; ardından kalp hızı değerlendirilir, gerekirse kristaloid bolusu ve inotrop/vazopresör verilir. Kalp hastalarında sıvı dikkatle verilmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ OAB < 60 mmHg = hipotansiyon
- ✓ Önce anestezik derinliğini azaltın
- ✓ Kalp hastasında sıvıya dikkat

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Anestezi | Kedi

Vaka 123 · Kısırlaştırma anestezisinde apne ve bradikardi


Hasta
- Kedi
- 2 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Rutin ovariohisterektomi

Öykü ve bağlam
- Sağlıklı genç kedi

Fiziksel muayene
- İndüksiyondan sonra apne
- Kalp hızı: 110/dk
- SpO2 düşüyor

Ek bulgular
- EtCO2 ölçülemiyor (solunum yok)



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. İndüksiyon sonrası apnenin nedeni nedir?
2. İlk müdahale nedir?
3. Kedide entübasyonda nelere dikkat edilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İndüksiyon ajanına bağlı apne
- Laringospazm
- Hatalı entübasyon

Yorumlu çözüm
Propofol gibi ajanların hızlı verilmesi apneye yol açabilir. Hemen entübasyon ve %100 oksijenle pozitif basınçlı ventilasyon (dakikada 8-12 nefes) yapılır; kapnografi doğru yerleşimi doğrular. Kedilerde laringospazm sık olduğundan topikal lidokain ve nazik entübasyon önerilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Apnede hemen ventilasyon
- ✓ Kapnografi tüp yerini doğrular
- ✓ Kedide laringospazma dikkat

Anestezi | Köpek

Vaka 124 · Anestezi sonrası uzamış derlenme ve hipoglisemi

Hasta
- Köpek
- 8 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Ameliyat sonrası uyanamama

Öykü ve bağlam
- Küçük ırk, düşük kilolu
- Uzun ameliyat açlığı

Fiziksel muayene
- Uyuşukluk, hipotermi

Ek bulgular
- Glukoz: 48 mg/dL
- Vücut ısısı: 35,5 °C



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Uzamış derlenmenin nedenleri nelerdir?
2. Hipotermi ilaç metabolizmasını nasıl etkiler?
3. Önleme için neler yapılmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hipoglisemi ve hipotermiye bağlı uzamış derlenme
- Aşırı doz
- Nörolojik hastalık

Yorumlu çözüm
Küçük ırk hastalarda uzun açlık ve uzun operasyon hipoglisemi ve hipotermiye yol açar; ikisi de derlenmeyi uzatır. Hipotermi ilaç metabolizmasını yavaşlatır. Tedavide aktif ısıtma ve glukoz takviyesi yapılır. Önlemek için açlık süresi kısa tutulur, ameliyat boyunca ısı desteği ve glukoz izlemi yapılır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Glukoz ve ısıyı ölçün
- ✓ Küçük hastalar hızlı soğur
- ✓ Açlık süresi kısa olmalı

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Anestezi | Köpek

Vaka 125 · Göğüs ameliyatı sonrası ağrı yönetimi

Hasta
- Köpek
- 5 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Lateral torakotomi sonrası

Öykü ve bağlam
- Akciğer lobektomisi yapılmış

Fiziksel muayene
- Hızlı ve yüzeysel solunum
- Dokunmaya aşırı tepki
- Glasgow ağrı skoru yüksek

Ek bulgular
- SpO2: %93
- Göğüs tüpünden az miktarda sıvı



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Ağrı solunumu nasıl etkiler?
2. Multimodal analjezi nedir?
3. İnterplevral blok nasıl yapılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Postoperatif ağrıya bağlı hipoventilasyon
- Pnömotoraks
- Akciğer ödemi

Yorumlu çözüm
Torakotomi çok ağrılıdır; ağrı yüzeysel solunuma ve hipoventilasyona yol açar. Multimodal analjezi (opioid infüzyonu, NSAİİ uygunsa, lokal anestezik bloklar) önerilir. Göğüs tüpünden interplevral bupivakain veya interkostal bloklar ek rahatlama sağlar. Ağrı skorları düzenli değerlendirilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Ağrı solunumu bozar
- ✓ Multimodal analjezi kullanın
- ✓ Ağrıyı skorlayarak izleyin

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Anestezi · Kedi

Vaka 126 · Anestezi sırasında hipotermi gelişen kedi

Hasta
- Kedi
- 3 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Uzun süren karın ameliyatı

Öykü ve bağlam
- Vücut ısısında düşme
- Anesteziden daha uzun sürede uyanma

Fiziksel muayene
- Küçük vücut yapısı
- Açık ağız solunumu
- Uzamış iyileşme süresi
- Soğuk ekstremiteler

Ek bulgular
- Vücut ısısı 180 dakikada 36,8 °C'den 33,6 °C'ye düştü
- Ağırlık: 3,2 kg



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hayvanın küçük vücut yapısı neden daha fazla ısı kaybetmesine yol açar?
2. Hipoterminin ilaçlara etkisi nasıl olur?
3. Önleyici yöntemler nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Anesteziye bağlı hipotermi
- Hipoglisemi
- Aşırı anestezik doz

Yorumlu çözüm
Anestezi, ısı düzenlemesini azaltır ve ısı kaybını artırır. Küçük hastalarda yüzey alanı/hacim oranı yüksektir. Bu nedenle, ameliyat öncesi ve sırasında özel önlemler almak, nihai prosedür sırasında hipotermiyi ciddi ölçüde azaltır. Hipotermi ilaç metabolizmasını yavaşlatır, pıhtılaşmayı ve yara iyileşmesini olumsuz etkiler.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Vücut ısısının izlenmesi gerekir
- ✓ Isıtma sürecini planlayın
- ✓ Riskleri en aza indiren hipotermi önlenmelidir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Anestezi | Köpek

Vaka 127 · Anestezi altında bradikardi ve ikinci derece AV blok

Hasta
- Köpek
- 10 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Rutin kitle operasyonu

Öykü ve bağlam
- Premedikasyonda alfa-2 agonist kullanılmış

Fiziksel muayene
- Kalp hızı: 42/dk
- OAB: 70 mmHg

Ek bulgular
- EKG: P dalgalarının bir kısmını QRS izlemiyor (ikinci derece AV blok)



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Alfa-2 agonistlerin kalp üzerine etkisi nedir?
2. Ne zaman antikolinerjik verilir?
3. Bradikardi her zaman tedavi gerektirir mi?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İlaca bağlı bradiaritmi
- Vagal tonus artışı
- Hiperkalemi

Yorumlu çözüm
Alfa-2 agonistler periferik vazokonstriksiyon ve refleks bradikardi, bazen AV blok yapar. Kan basıncı yeterliyse yalnızca izlem yeterli olabilir; hipotansiyon eşlik ediyorsa antagonist veya dikkatle antikolinerjik düşünülür. Hiperkalemi gibi diğer nedenler dışlanmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Bradikardi + normal basınç = izleyin
- ✓ Hipotansiyon varsa müdahale edin
- ✓ İlaç etkisini her zaman düşünün

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Komplikasyonlar | Köpek

Vaka 128 · Kısırlaştırma sonrası karın içi kanama

Hasta
- Köpek
- 4 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Ameliyattan 6 saat sonra halsizlik
- Soluk mukozalar

Öykü ve bağlam
- Rutin ovariohisterektomi

Fiziksel muayene
- Taşikardi
- Karında genişleme

Ek bulgular
- Hematokrit düşüyor
- POCUS: serbest abdominal sıvı, kan



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Postoperatif kanamanın en sık kaynağı nedir?
2. Hangi bulgular tekrar ameliyat gerektirir?
3. Koagülasyon testleri neden yapılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Ligatür kayması (ovaryan pedikül kanaması)
- Koagülopati
- Dalak yaralanması

Yorumlu çözüm
Ovariohisterektomi sonrası erken dönemde gelişen hemoabdomen çoğunlukla ovaryan pedikül veya uterus damarlarından ligatür kaymasına bağlıdır. Hematokrit düşüşü ve hemodinamik bozulma devam ederse acil eksploratif laparotomi gerekir. Koagülasyon testleri altta yatan pıhtılaşma bozukluğunu dışlar.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Erken postoperatif hemoabdomen = ligatürü düşünün
- ✓ Hemodinamik bozulmada tekrar ameliyat
- ✓ Koagülasyonu kontrol edin

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Komplikasyonlar | Kedi

Vaka 129 · Yara yerinde açılma (dehisens) ve akıntı

Hasta
- Kedi
- 6 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kesi hattından sıvı gelmesi
- Kesi açılmış

Öykü ve bağlam
- 5 gün önce karın ameliyatı
- Yaka takılmamış, yarayı yalamış

Fiziksel muayene
- Kesi hattında açılma, kızarıklık
- Ateş yok

Ek bulgular
- Sitoloji: dejenere nötrofiller, bakteri



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Dehisensin risk faktörleri nelerdir?
2. Sadece deri mi, karın duvarı mı açılmış?
3. Tedavide neler yapılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Yara enfeksiyonuna bağlı dehisens
- Seroma
- Evantrasyon

Yorumlu çözüm
Yarayı yalama, enfeksiyon, gerginlik ve uygun olmayan sütür materyali dehisense yol açar. Karın duvarının açılıp açılmadığı mutlaka değerlendirilmelidir; evantrasyon acil cerrahi gerektirir. Yüzeysel dehisenste debridman, kültür, uygun antibiyotik ve sekonder kapama veya yeniden sütür uygulanır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Yaka yara korumasıdır
- ✓ Karın duvarı bütünlüğünü kontrol edin
- ✓ Kültür alın

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Komplikasyonlar | Köpek

Vaka 130 · Uzun süreli yatan hastada aspirasyon pnömonisi


Hasta
- Köpek
- 9 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Ameliyat sonrası öksürük
- Ateş

Öykü ve bağlam
- Megaözofagus tanısı var
- Anestezide regürjitasyon

Fiziksel muayene
- Takipne
- Kranioventral krepitasyon

Ek bulgular
- Röntgen: sağ orta lobda alveoler patern
- Lökositoz



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Aspirasyon riski taşıyan hastalar kimlerdir?
2. Sağ orta lob neden sık etkilenir?
3. Önleme için neler yapılabilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Aspirasyon pnömonisi
- Kardiyojenik ödem
- Akciğer kontüzyonu

Yorumlu çözüm
Megaözofagus, larinks paralizisi ve anestezi sırasında regürjitasyon aspirasyon riskini artırır. Yerçekimi ve bronş anatomisi nedeniyle sağ orta lob sık etkilenir. Tedavide oksijen, antibiyotik, nebülizasyon ve fizyoterapi uygulanır. Önlemde dik pozisyonda besleme ve antiemetik/prokinetik ilaçlar yardımcıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Megaözofagus aspirasyon riskidir
- ✓ Sağ orta lobu kontrol edin
- ✓ Dik pozisyonda besleyin

Komplikasyonlar | Köpek

Vaka 131 · Kan transfüzyonu sırasında ateş ve kusma


Hasta
- Köpek
- 7 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Transfüzyonun 20. dakikasında huzursuzluk

Öykü ve bağlam
- Daha önce transfüzyon almış
- Bu sefer çapraz eşleştirme yapılmamış

Fiziksel muayene
- Ateş
- Kusma
- Taşikardi

Ek bulgular
- Plazma pembe renkte (hemoliz)
- Hemoglobinüri



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Transfüzyon reaksiyonları nelerdir?
2. Daha önce transfüzyon almış köpekte neden çapraz eşleştirme gerekir?
3. Reaksiyonda ilk adım nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu
- Ateşli non-hemolitik reaksiyon
- Bakteriyel kontaminasyon

Yorumlu çözüm
Daha önce transfüzyon almış köpekte antikor gelişmiş olabilir; çapraz eşleştirme yapılmadan verilen kan akut hemolitik reaksiyona yol açabilir. İlk adım transfüzyonu durdurmaktır; destekleyici tedavi ve böbrek fonksiyonu izlenir. Kan grubu tayini ve çapraz eşleştirme reaksiyonları önler.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Reaksiyonda transfüzyonu durdurun
- ✓ Tekrar transfüzyonda çapraz eşleştirme
- ✓ İlk 15 dakika yavaş verin ve izleyin

Komplikasyonlar | Kedi

Vaka 132 · Sıvı tedavisi sırasında akciğer ödemi gelişen kedi

Hasta
- Kedi
- 9 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Sıvı tedavisinin ikinci günü hızlı solunum

Öykü ve bağlam
- Kronik böbrek hastalığı için yüksek hızda sıvı verilmiş
- Fark edilmemiş kalp hastalığı

Fiziksel muayene
- Takipne
- Krepitasyon
- Kilo artışı: %8 (24 saatte)

Ek bulgular
- POCUS: B-çizgileri, plevral efüzyon



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Sıvı yüklenmesinin erken bulguları nelerdir?
2. Kediler neden daha hassastır?
3. Önleme için neler izlenir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İatrojenik sıvı yüklenmesi
- Kardiyojenik ödem
- Pnömoni

Yorumlu çözüm
Kedilerde kan hacmi küçüktür ve gizli kalp hastalığı sıktır; agresif sıvı tedavisi pulmoner ödem ve plevral efüzyona yol açabilir. Erken bulgular kilo artışı, seröz burun akıntısı, kemozis ve solunum sayısında artıştır. Sıvı durdurulur, oksijen ve diüretik verilir. Sıvı tedavisinde kilo ve solunum düzenli izlenmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kiloyu günde iki kez tartın
- ✓ Kedi kalbi gizli hasta olabilir
- ✓ Kemozis erken işarettir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Komplikasyonlar | Köpek

Vaka 133 · Ortopedi ameliyatı sonrası bandaj komplikasyonu

Hasta
- Köpek
- 6 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Bandajlı bacakta şişlik ve koku

Öykü ve bağlam
- Kırık sonrası bandaj, 7 gündür kontrol edilmemiş

Fiziksel muayene
- Ayak parmaklarında ödem ve soğukluk
- Bandaj altında nemli deri, basınç yaraları

Ek bulgular
- Sitoloji: bakteri ve nötrofiller



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Bandaj komplikasyonlarının erken işaretleri nelerdir?
2. Bandaj ne sıklıkla kontrol edilmelidir?
3. Sahibe hangi uyarılar yapılmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Bandaj basınç yaraları ve enfeksiyon
- Kompartman sendromu
- Osteomiyelit

Yorumlu çözüm
Sıkı veya ıslanmış bandaj dolaşım bozukluğu, basınç nekrozu ve enfeksiyona yol açabilir. Parmakların ayrılması, şişlik, koku, ıslaklık ve hayvanın bandajı çiğnemesi uyarı işaretleridir. Bandaj hemen değiştirilir, yaralar tedavi edilir. Sahibe günlük kontrol ve kuru tutma öğretilmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Parmaklar ayrık ve sıcak olmalı
- ✓ Islak bandaj değiştirilir
- ✓ Sahip eğitimi komplikasyonu önler

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Zehirlenmeler | Köpek

Vaka 134 · Kaçırılan ivermektin dozu sonrası körlük ve tremor

Hasta
- Köpek
- 3 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Sendeleme
- Görme kaybı
- Tremor

Öykü ve bağlam
- At için olan antiparaziter macun yemiş
- Collie melezi

Fiziksel muayene
- Midriyazis
- Ataksi
- Bilinç bulanıklığı

Ek bulgular
- MDR1 (ABCB1) gen mutasyonu testi pozitif



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. MDR1 mutasyonu ne anlama gelir?
2. Hangi ırklar risk altındadır?
3. Tedavide neler yapılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İvermektin (makrosiklik lakton) zehirlenmesi
- THC zehirlenmesi
- Ensefalit

Yorumlu çözüm
MDR1 mutasyonu olan köpeklerde P-glikoprotein eksikliği nedeniyle ivermektin beyne geçer ve nörotoksisite yapar; çoban ırkları risk altındadır. Tedavi destekleyicidir: aktif kömür (erken dönemde), sıvı, beslenme, göz koruması ve gerekirse mekanik ventilasyon. IV lipid emülsiyonu kullanılabilir; iyileşme haftalar alabilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Çoban ırklarında MDR1'i düşünün
- ✓ At ürünleri çok yüksek dozludur
- ✓ İyileşme uzun sürebilir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Acil | Köpek

Vaka 135 · Köpek ısırığı sonrası göğüs yaralanması

Hasta
- Köpek
- 5 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Başka köpekle kavga
- Göğüste delinme yaraları

Öykü ve bağlam
- Küçük köpek, büyük köpek ısırmış

Fiziksel muayene
- Göğüs duvarında hava kaçağı sesi
- Takipne
- Deri altı amfizem

Ek bulgular
- Röntgen: kosta kırıkları, pnömotoraks



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Isırık yaralarında 'buzdağı etkisi' nedir?
2. Açık pnömotoraksa ilk müdahale nedir?
3. Neden cerrahi eksplorasyon gerekebilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Penetran göğüs travması (ısırık)
- Akciğer kontüzyonu
- Yelken göğüs

Yorumlu çözüm
Isırık yaralarında derideki küçük delikler altta ciddi doku hasarını gizleyebilir ('buzdağı etkisi'). Açık pnömotoraksta yara steril bir kapamayla örtülür ve torasentez yapılır. Kosta kırığı, akciğer hasarı ve kirlenme nedeniyle çoğu zaman cerrahi eksplorasyon, debridman ve antibiyotik gerekir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Küçük delik büyük hasarı gizler
- ✓ Açık yarayı hemen kapatın
- ✓ Eksplorasyon ve debridman sık gerekir

Yalnızca eğitim amaçlıdır