ROTA 05

# 210 Yorumlu Veteriner Klinik Vaka

Rota 05 · Büyük Hayvanlar, Üretim, Egzotikler ve Halk Sağlığı · 40 vaka

5 Öğrenme Rotası · Küçük, büyük ve egzotik hayvanlar · Yorumlu çözümler

Atlar · At

# Vaka 171 · Yerde yuvarlanan ve karnına bakan at: kolik değerlendirmesi


## Hasta
- At
- 9 yaş
- Aygır

## Başvuru nedeni
- Yerde yuvarlanma
- Karnına bakma
- Dışkılama yok

## Öykü ve bağlam
- Belirtiler 4 saattir
- Yem değişikliği yapılmış

## Fiziksel muayene
- Kalp hızı: 64/dk
- Mukozalar kırmızı, KDZ 3 sn
- Bağırsak sesleri azalmış

## Ek bulgular
- Rektal muayene: genişlemiş ince bağırsak ansları
- Nazogastrik sonda: 8 L reflü
- Periton sıvısı serosanguinöz




**KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Kolikte cerrahi kararını hangi bulgular belirler?
2. Nazogastrik reflü neyi gösterir?
3. Periton sıvısının rengi ne anlatır?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Strangüle ince bağırsak (cerrahi kolik)
- Basit kabızlık (impaksiyon)
- Proksimal enterit

## Yorumlu çözüm
Yüksek kalp hızı, ağrının kontrol edilememesi, nazogastrik reflü, rektal muayenede gergin ince bağırsak ve serosanguinöz periton sıvısı strangülasyonu düşündürür ve cerrahi gerektirir. Nazogastrik sonda mide rüptürünü önlemek için hayati önemdedir. Hızlı sevk prognozu belirler.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kontrol edilemeyen ağrı = cerrahi kolik
- ✓ Reflü varsa sondayı bırakın
- ✓ Periton sıvısı rengi bağırsak canlılığını gösterir

Atlar · At

# Vaka 172 · Uzun ve kıvırcık tüyler, kas kaybı ve laminit öyküsü olan yaşlı at


## Hasta
- At
- 14 yaş
- Kısrak

## Başvuru nedeni
- Yazın tüy dökmeme
- Kas kaybı
- Tekrarlayan laminit

## Öykü ve bağlam
- Su tüketimi artmış

## Fiziksel muayene
- Uzun, kıvırcık tüy (hirsutizm)
- Sırt kaslarında atrofi
- Supraorbital yağ birikimi

## Ek bulgular
- Endojen ACTH yüksek
- İnsülin yüksek




**KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. PPID nasıl tanınır?
2. Laminit ile ilişkisi nedir?
3. Tedavide hangi ilaç kullanılır?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hipofiz pars intermedia disfonksiyonu (PPID)
- Equine metabolik sendrom
- Kronik kilo kaybı nedenleri

## Yorumlu çözüm
Yaşlı atta hirsutizm, kas kaybı ve tekrarlayan laminit PPID'yi (equine Cushing) düşündürür; yüksek endojen ACTH tanıyı destekler (mevsim etkisi dikkate alınmalı). Hiperinsülinemi laminit riskini artırır. Tedavide pergolid kullanılır; diş bakımı, tırnak bakımı ve parazit kontrolü önemlidir.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Hirsutizm PPID'nin en tipik bulgusudur
- ✓ ACTH mevsime göre yorumlanır
- ✓ Pergolid temel tedavidir



Yalnızca eğitim amaçlıdır

Atlar · At

# Vaka 173 · Burun akıntısı ve çene altında apseleşen lenf düğümleri

## Hasta

- At
- 6 yaş
- Kısrak

## Başvuru nedeni

- Ateş
- Pürülan burun akıntısı
- Yutkunma güçlüğü

## Öykü ve bağlam

- Ahıra yeni at gelmiş

## Fiziksel muayene

- Ateş: 40,2 °C
- Submandibular lenf düğümlerinde apse

## Ek bulgular

- Apse sıvısından Streptococcus equi subsp. equi PCR pozitif




**KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları

1. Gurm (atlarda boğaz apsesi) nasıl bulaşır?
2. Apseler nasıl yönetilir?
3. Ahırda karantina neden şarttır?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar

- Gurm (Strangles)
- Viral solunum yolu enfeksiyonu
- Diş apsesi

## Yorumlu çözüm

Ateş, pürülan burun akıntısı ve submandibular lenf düğüm apseleri gurmu (Streptococcus equi) düşündürür. Hastalık burun akıntısı ve ortak ekipmanla bulaşır. Olgunlaşan apseler drene edilir; antibiyotik kullanımı vakaya göre değerlendirilir. Hasta atlar izole edilir, taşıyıcılar guttural kese endoskopisi ile taranır.

## Akılda tutulacak noktalar

- ✓ Ahırda karantina yayılmayı önler
- ✓ Apseleri drene edin
- ✓ Taşıyıcıları guttural kesede arayın



Yalnızca eğitim amaçlıdır

Atlar · At

# Vaka 174 · Ön ayakta ani şiddetli topallık ve tırnakta sıcaklık

## Hasta

- At
- 7 yaş
- İğdiş

## Başvuru nedeni

- Ön ayağa basmama

## Öykü ve bağlam

- Islak ve çamurlu padok

## Fiziksel muayene

- Tek tırnakta sıcaklık ve güçlü dijital nabız
- Tırnak pensinde lokal ağrı

## Ek bulgular

- Tabanın açılmasıyla siyah irin çıkışı




**KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları

1. Tek tırnakta ani ve şiddetli topallığın en sık nedeni nedir?
2. Laminitten nasıl ayrılır?
3. Tedavi nedir?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar

- Tırnak apsesi
- Laminit
- Kemik kırığı (tırnak kemiği)

## Yorumlu çözüm

Tek tırnakta ani şiddetli topallık, lokal ağrı ve güçlü dijital nabız en sık tırnak apsesinden kaynaklanır; laminit genellikle iki ön ayağı birlikte tutar. Tabanda apse drene edilir, tırnak ıslatılıp temiz bandajla korunur ve tetanoz koruması kontrol edilir.

## Akılda tutulacak noktalar

- ✓ Tek tırnak = önce apseyi düşünün
- ✓ Drenaj rahatlama sağlar
- ✓ Tetanoz aşısını kontrol edin



Yalnızca eğitim amaçlıdır

Atlar · At

# Vaka 175 · Toz ortamında öksürük ve egzersiz intoleransı olan at

## Hasta
- At
- 12 yaş
- İğdiş

## Başvuru nedeni
- Kronik öksürük
- Burun deliklerinde genişleme
- Performans düşüklüğü

## Öykü ve bağlam
- Kapalı ahırda kuru saman ile besleniyor

## Fiziksel muayene
- İstirahatte artmış abdominal solunum ('heave line')
- Wheeze

## Ek bulgular
- Bronkoalveoler lavaj: nötrofil oranı yüksek




**KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Equine astımın tetikleyicileri nelerdir?
2. BAL neden tanıda önemlidir?
3. Çevresel yönetim nasıl olmalı?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Equine astım (ağır form)
- Bakteriyel pnömoni
- Akciğer kurdu

## Yorumlu çözüm
Tozlu ortamda kronik öksürük, ekspiratuvar efor ve BAL'da nötrofil artışı ağır equine astımı gösterir. Tedavinin temeli çevresel değişikliktir: ıslatılmış veya buharlanmış ot, tozsuz altlık, merada tutma. Kriz döneminde kortikosteroid ve bronkodilatörler kullanılır.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Çevre yönetimi ilaçtan önemlidir
- ✓ BAL tanıyı doğrular
- ✓ Islatılmış ot tozu azaltır

Sığırlar | Sığır

# Vaka 176 · Doğumdan 3 hafta sonra süt veriminde düşüş ve aseton kokusu

## Hasta
- Sığır
- 4 yaş
- Dişi

## Başvuru nedeni
- Süt veriminde düşüş
- Kesif yem yememe

## Öykü ve bağlam
- Yüksek verimli
- Doğum sonrası 3. hafta

## Fiziksel muayene
- Nefeste aseton kokusu
- Kilo kaybı
- Rumen hareketleri hafif azalmış

## Ek bulgular
- Kan beta-hidroksibütirat: 2,4 mmol/L
- İdrar keton pozitif




**II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Ketozun subklinik ve klinik formları nasıl ayrılır?
2. Tedavide hangi ürünler kullanılır?
3. Sürü düzeyinde nasıl önlenir?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Primer ketoz
- Abomazum deplasmanı (sekonder ketoz)
- Metrit

## Yorumlu çözüm
Laktasyonun başında enerji açığı yağ mobilizasyonu ve ketozla sonuçlanır. Kan BHB değeri tanıyı koyar; 1,2 mmol/L üzeri subklinik ketoz kabul edilir. Tedavide oral propilen glikol ve gerekirse IV glukoz verilir. Sekonder nedenler (abomazum deplasmanı, metrit) araştırılmalı; kuru dönem beslenmesi ve kondisyon yönetimi önleyicidir.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ BHB tanıyı koyar
- ✓ Propilen glikol ilk tedavidir
- ✓ Sekonder nedenleri arayın



Yalnızca eğitim amaçlıdır

Sığırlar | Sığır

# Vaka 177 · Sol karında 'ping' sesi olan süt ineği

## Hasta
- Sığır
- 5 yaş
- Dişi

## Başvuru nedeni
- İştah azalması
- Süt verimi düşüşü
- Dışkı azalmış

## Öykü ve bağlam
- Doğumdan 2 hafta sonra

## Fiziksel muayene
- Sol tarafta perküsyonla oskültasyonda metalik 'ping' sesi (9-13. kostalar)

## Ek bulgular
- Kan ketonu yüksek
- Hipokalsemi hafif




**KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Sol abomazum deplasmanı nasıl oluşur?
2. Ping sesi başka hangi durumlarda duyulur?
3. Tedavi seçenekleri nelerdir?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Sol abomazum deplasmanı
- Rumen timpanisi
- Pnömoperitoneum

## Yorumlu çözüm
Doğum sonrası hipokalsemi ve düşük yem tüketimi abomazum motilitesini azaltır; gazla dolan abomazum sola kayar. Sol taraftaki 'ping' sesi tipiktir. Tedavide cerrahi (omentopeksi veya abomazopeksi) veya rulo yöntemi uygulanır; eşlik eden ketoz ve hipokalsemi tedavi edilir.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Ping sesi = gaz dolu organ
- ✓ Doğum sonrası ilk ay risklidir
- ✓ Ketoz ve hipokalsemiyi düzeltin

Sığırlar | Sığır

# Vaka 178 · Memede sertlik ve sütte pıhtılar

## Hasta
- Sığır
- 3 yaş
- Dişi

## Başvuru nedeni
- Sütte pıhtılar
- Bir meme lobunda şişlik

## Öykü ve bağlam
- Sağım ekipmanı eski

## Fiziksel muayene
- Bir lobda sıcak, sert ve ağrılı meme
- Ateş: 39,8 °C

## Ek bulgular
- California mastitis testi (CMT) güçlü pozitif
- Süt kültürü: Staphylococcus aureus




**KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Klinik ve subklinik mastit nasıl ayrılır?
2. CMT neyi ölçer?
3. Staphylococcus aureus mastiti neden zor tedavi edilir?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Klinik mastit (S. aureus)
- Koliform mastit
- Meme ödemi

## Yorumlu çözüm
Sütte gözle görülür değişiklik ve memede inflamasyon klinik mastittir; CMT somatik hücre artışını gösterir. S. aureus meme dokusunda kalıcı enfeksiyonlar yapar ve tedavi başarısı düşüktür. Kültüre göre tedavi, sağım hijyeni, sağım makinesinin bakımı ve kronik ineklerin ayrılması önemlidir. İlaç kalıntı süreleri sütte uygulanmalıdır.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ CMT somatik hücreyi gösterir
- ✓ Kültüre göre tedavi edin
- ✓ Kalıntı süresine uyun



Yalnızca eğitim amaçlıdır

Sığırlar | Buzağı

# Vaka 179 · Sulu ishal ve şiddetli dehidratasyon olan buzağı

## Hasta
- Buzağı
- 10 günlük
- Erkek

## Başvuru nedeni
- Sarı, sulu ishal
- Emmeme
- Ayağa kalkamama

## Öykü ve bağlam
- Aynı haftada başka buzağılarda da ishal

## Fiziksel muayene
- Gözler çökük (dehidratasyon %10-12)
- Emme refleksi zayıf
- Hipotermi

## Ek bulgular
- Metabolik asidoz
- Dışkı testi: rotavirüs ve Cryptosporidium pozitif




**II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Dehidratasyon derecesi klinikte nasıl tahmin edilir?
2. Hangi durumda IV sıvı gerekir?
3. Bikarbonat neden önemlidir?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Neonatal buzağı ishali (rotavirüs, Cryptosporidium)
- E. coli (ETEC)
- Salmonelloz

## Yorumlu çözüm
Göz çöküklüğü ve deri kıvrımının geç düzelmesi dehidratasyon derecesini gösterir. Emme refleksi kaybolmuş ve ayağa kalkamayan buzağıda IV sıvı ve bikarbonat ile asidoz düzeltilir. Süt kesilmez, oral elektrolit ile birlikte verilir. Kolostrum yönetimi, hijyen ve aşılama salgınları önler.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Emme refleksi kaybı = IV sıvı
- ✓ Asidozu düzeltin
- ✓ Sütü kesmeyin



Yalnızca eğitim amaçlıdır

Sığırlar | Sığır

# Vaka 180 · Besi danasında ateş, burun akıntısı ve öksürük


## Hasta
- Sığır
- 2 yaş
- Erkek

## Başvuru nedeni
- Ateş
- Burun akıntısı
- Öksürük, iştahsızlık

## Öykü ve bağlam
- İki hafta önce farklı sürülerden toplanıp nakledilmiş

## Fiziksel muayene
- Ateş: 41,0 °C
- Takipne
- Kranioventral akciğerde krepitasyon

## Ek bulgular
- Nazal sürüntü: Mannheimia haemolytica ve BRSV pozitif




**II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Sığır solunum hastalığı kompleksinin risk faktörleri nelerdir?
2. Nakil stresi neden önemlidir?
3. Sürü düzeyinde nasıl önlenir?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Sığır solunum hastalığı kompleksi (BRD)
- Enzootik pnömoni
- Akciğer kurdu

## Yorumlu çözüm
Farklı kaynaklardan toplanma, nakil stresi ve viral enfeksiyonlar bakteriyel pnömoniye zemin hazırlar ('nakil humması'). Erken tanı (ateş, iştahsızlık) ve uygun antibiyotik ile antiinflamatuvar tedavi başarıyı artırır. Önlemede aşılama, nakil öncesi hazırlık ve havalandırma önemlidir.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Nakil stresi BRD'yi tetikler
- ✓ Erken tedavi kritiktir
- ✓ Havalandırma ve aşı önleyicidir



Yalnızca eğitim amaçlıdır

Sığırlar | Sığır

# Vaka 181 · Ateş, ağızda yaralar ve topallık görülen sürü

## Hasta

- Sığır
- 6 yaş
- Dişi

## Başvuru nedeni

- Aşırı salya
- Topallık
- Süt veriminde ani düşüş

## Öykü ve bağlam

- Sürüde birden çok hayvanda benzer belirti

## Fiziksel muayene

- Dil ve dişetlerinde patlamış veziküller
- Tırnak arasında yaralar
- Ateş

## Ek bulgular

- Resmi laboratuvar testi bekleniyor




**II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları

1. Bu tablo hangi ihbarı zorunlu hastalığı düşündürür?
2. Klinik ekip ne yapmalı?
3. Benzer veziküler hastalıklar nelerdir?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar

- Şap hastalığı
- Sığır viral diyaresi (mukozal hastalık)
- Veziküler stomatit

## Yorumlu çözüm

Sürüde salya, ağız ve ayaklarda veziküller ve topallık şap hastalığını düşündürür; ihbarı zorunlu bir hastalıktır. Veteriner hekim hayvan hareketlerini durdurmalı, resmi makamlara hemen bildirmeli ve biyogüvenlik önlemleri almalıdır. Tanı resmi laboratuvarlarda konur; kontrol, aşılama ve hareket kısıtlamasıyla yapılır.

## Akılda tutulacak noktalar

- ✓ Şap ihbarı zorunlu hastalıktır
- ✓ Hayvan hareketini durdurun, bildirin
- ✓ Biyogüvenlik ekibi korur



Yalnızca eğitim amaçlıdır

Sığırlar | Sığır

# Vaka 182 · Ani yatıp kalkamama ve kas titremesi: otlakta otlayan inek


## Hasta
- Sığır
- 5 yaş
- Dişi

## Başvuru nedeni
- Kas titremesi
- Sendeleme
- Kasılmalar

## Öykü ve bağlam
- İlkbaharda taze, gübreli meraya çıkarılmış

## Fiziksel muayene
- Hiperestezi
- Tetanik kasılmalar

## Ek bulgular
- Serum magnezyumu düşük




**KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Çayır tetanisinin nedeni nedir?
2. Tedavide neler verilir?
3. Nasıl önlenir?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hipomagnezemi (çayır tetanisi)
- Hipokalsemi
- Kurşun zehirlenmesi

## Yorumlu çözüm
Hızlı büyüyen, potasyumu yüksek ve magnezyumu düşük taze meralar hipomagnezemiye yol açar. Tedavi yavaş IV kalsiyum-magnezyum çözeltisi ve deri altı magnezyumdur; uyarılmış hayvanda dikkatli olunmalıdır. Önlemede magnezyum takviyeli yem veya tuz blokları kullanılır.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Taze mera risk faktörüdür
- ✓ Magnezyumu yavaş verin
- ✓ Takviye önleyicidir



Yalnızca eğitim amaçlıdır

Koyunlar | Koyun

# Vaka 183 · Soluk göz mukozası ve çene altında ödem olan koyunlar

## Hasta
- Koyun
- 3 yaş
- Dişi

## Başvuru nedeni
- Halsizlik
- Çene altında şişlik
- Kilo kaybı

## Öykü ve bağlam
- Yaz sonu, ıslak mera
- Antiparaziter uygulama yapılmamış

## Fiziksel muayene
- FAMACHA skoru 4-5 (çok soluk)
- Submandibular ödem

## Ek bulgular
- Hematokrit: %14
- Dışkıda yüksek strongylid yumurta sayısı




**KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. FAMACHA yöntemi nasıl kullanılır?
2. Hangi parazit anemi yapar?
3. Antiparaziter direnç nasıl önlenir?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Haemonchus contortus enfestasyonu
- Karaciğer kelebeği
- Beslenme yetersizliği

## Yorumlu çözüm
Haemonchus contortus kan emen bir abomazum kurdudur; anemi ve hipoproteinemiye bağlı çene altı ödemi yapar. FAMACHA skoru ile sadece anemik hayvanlar seçici olarak ilaçlanır, bu da direnç gelişimini yavaşlatır. Mera rotasyonu ve dışkı yumurta sayımıyla izlem önemlidir.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ FAMACHA seçici tedavi sağlar
- ✓ Çene altı ödemi hipoproteinemiyi gösterir
- ✓ Direnç gelişimini önleyin



Yalnızca eğitim amaçlıdır

Koyunlar | Koyun

# Vaka 184 · Daireler çizen ve bir yöne dönen koyun

## Hasta
- Koyun
- 2 yaş
- Dişi

## Başvuru nedeni
- Daireler çizme
- Başını bir yana eğme
- Yüz felci

## Öykü ve bağlam
- Silaj ile besleniyor
- Kış ayları

## Fiziksel muayene
- Tek taraflı yüz felci (kulak düşük, göz kapağı kapanmıyor)
- Salya

## Ek bulgular
- Beyin omurilik sıvısında mononükleer hücre artışı




**II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Bu nörolojik tablo hangi bakteriyel hastalığı düşündürür?
2. Silajın rolü nedir?
3. Zoonotik risk nedir?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Listeriyoz
- Serebrokortikal nekroz
- Koenuroz

## Yorumlu çözüm
Kötü kaliteli silajla beslenen koyunda daireler çizme ve tek taraflı kranial sinir felci Listeria monocytogenes'e bağlı beyin sapı ensefalitini düşündürür. Erken dönemde yüksek doz penisilin ve destekleyici tedavi uygulanır. Kalitesiz silaj kullanılmamalıdır. Listeria zoonotiktir; özellikle gebe kadınlar dikkatli olmalıdır.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Silaj kalitesi önemlidir
- ✓ Erken antibiyotik prognozu iyileştirir
- ✓ Listeria zoonotiktir



Yalnızca eğitim amaçlıdır

Koyunlar | Koyun

# Vaka 185 · Tırnak arasında kötü koku ve sürüde yaygın topallık


## Hasta
- Koyun
- 4 yaş
- Koç

## Başvuru nedeni
- Topallık
- Diz üstünde otlama

## Öykü ve bağlam
- Islak mera
- Sürüye yeni hayvan katılmış

## Fiziksel muayene
- Tırnak arası deride iltihap, tırnak tabanının ayrılması
- Kötü koku

## Ek bulgular
- Sürüntüde Dichelobacter nodosus




**KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Ayak çürüğü nasıl yayılır?
2. Sürü düzeyinde kontrol nasıl yapılır?
3. Ayak banyosunun rolü nedir?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Bulaşıcı ayak çürüğü
- Tırnak arası dermatit
- Tırnak apsesi

## Yorumlu çözüm
Bulaşıcı ayak çürüğü Dichelobacter nodosus ile ıslak koşullarda yayılır; tırnak tabanının ayrılması ve kötü koku tipiktir. Tedavide hasta hayvanlar ayrılır, sistemik antibiyotik verilir ve ayak banyoları kullanılır. Sürüye yeni katılan hayvanlar karantinaya alınmalı, aşı düşünülebilir.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Islak koşullar yayılımı artırır
- ✓ Hastaları ayırın
- ✓ Yeni hayvana karantina



Yalnızca eğitim amaçlıdır

Koyunlar | Koyun

# Vaka 186 · Sürüde ani ölümler: mera değişikliği sonrası

## Hasta
- Koyun
- 1 yaş
- Dişi

## Başvuru nedeni
- Gece ani ölümler
- Bazılarında ishal ve kasılma

## Öykü ve bağlam
- Daha verimli meraya geçilmiş
- Aşılama yapılmamış

## Fiziksel muayene
- Ölü hayvanlarda karın şişliği
- Hasta hayvanlarda nörolojik belirtiler

## Ek bulgular
- Nekropside 'pulpy kidney' (yumuşak böbrek)
- İdrarda glukoz




**KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Ani ölüm nedenleri nelerdir?
2. Enterotoksemi nasıl tetiklenir?
3. Koruyucu yöntem nedir?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Enterotoksemi (Clostridium perfringens tip D)
- Şarbon
- Zehirli bitki

## Yorumlu çözüm
Zengin yeme ani geçiş bağırsakta Clostridium perfringens tip D çoğalmasına ve toksin üretimine yol açar; ani ölüm, nörolojik belirti ve glukozüri tipiktir. Nekropside yumuşak böbrek görülebilir. Klostridyal aşılama ve rasyon değişikliklerinin kademeli yapılması temel korunma yöntemleridir. Ani ölümlerde şarbon mutlaka dışlanmalıdır.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Ani yem değişikliği risklidir
- ✓ Klostridyal aşılama koruyucudur
- ✓ Ani ölümde önce şarbonu dışlayın

Koyunlar | Keçi

# Vaka 187 · Keçide bacak eklemlerinde şişlik ve kilo kaybı

## Hasta
- Keçi
- 3 yaş
- Dişi

## Başvuru nedeni
- Diz eklemlerinde şişlik
- Kilo kaybı
- Süt veriminde azalma

## Öykü ve bağlam
- Sürüde birçok yetişkin keçide benzer
- Oğlaklar havuz kolostrumla besleniyor

## Fiziksel muayene
- Karpal eklemlerde büyüme
- Sert meme ('taş meme')

## Ek bulgular
- CAEV serolojisi pozitif




**II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. CAE nasıl bulaşır?
2. Sürü kontrol programı nasıl olmalı?
3. Tedavi var mı?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Keçi artriti-ensefaliti (CAE)
- Mikoplazma artriti
- Septik artrit

## Yorumlu çözüm
Keçi artriti-ensefaliti virüsü başlıca kolostrum ve sütle bulaşır; yetişkinlerde artrit ve indüratif mastit yapar. Tedavisi yoktur. Kontrol için oğlaklar doğumdan hemen sonra ayrılır, ısıl işlem görmüş kolostrum ve pastörize süt verilir, düzenli seroloji ile pozitifler ayrılır.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kolostrum ana bulaş yoludur
- ✓ Tedavisi yoktur, kontrol esastır
- ✓ Düzenli serolojik tarama

Kanatlılar | Tavuk

# Vaka 188 · Köy tavuklarında ani ölümler, solunum ve nörolojik belirtiler

## Hasta
- Tavuk
- 20 haftalık
- Dişi

## Başvuru nedeni
- Ani ölümler
- Hırıltılı solunum
- Boyun bükülmesi

## Öykü ve bağlam
- Aşılanmamış küçük sürü
- Komşu köyde ölümler

## Fiziksel muayene
- Tortikolis
- Yeşil ishal
- Yumurta veriminde düşüş

## Ek bulgular
- Resmi laboratuvara örnek gönderilmiş




**KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Bu tablo hangi ihbarı zorunlu hastalıkları düşündürür?
2. Örnek alma ve gönderme nasıl olmalı?
3. Biyogüvenlik önlemleri nelerdir?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Newcastle hastalığı
- Yüksek patojenli kuş gribi
- Enfeksiyöz bronşit

## Yorumlu çözüm
Aşılanmamış sürüde ani ölümler, solunum ve nörolojik belirtiler Newcastle hastalığı ve kuş gribini düşündürür; ikisi de ihbarı zorunludur ve kuş gribi zoonotiktir. Resmi makamlara bildirilir, kişisel koruyucu ekipmanla örnek alınır, hareketler durdurulur. Aşılama ve yabani kuşlarla temasın önlenmesi korunmada esastır.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Ani ölümlerde ihbar zorunlu hastalıkları düşünün
- ✓ Koruyucu ekipman kullanın
- ✓ Yabani kuş temasını önleyin

Kanatlılar | Muhabbet kuşu

# Vaka 189 · Kabarık duran, burun deliği akıntısı olan muhabbet kuşu

## Hasta
- Muhabbet kuşu
- 5 yaş
- Erkek

## Başvuru nedeni
- Kabarık durma
- Burun akıntısı
- Yeşil dışkı

## Öykü ve bağlam
- Yeni kuş alınmış, karantina yapılmamış

## Fiziksel muayene
- Konjonktivit
- Tüyler kabarık, uyuşukluk

## Ek bulgular
- PCR: Chlamydia psittaci pozitif




**KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Psittakoz neden önemlidir?
2. Kuş sahibine hangi uyarılar yapılmalı?
3. Tedavi ne kadar sürer?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Psittakoz (klamidiyoz)
- Aspergilloz
- Hava keseleri akarı

## Yorumlu çözüm
Kabarık duruş, solunum belirtileri ve yeşil dışkı kuşlarda sistemik hastalığı gösterir; PCR Chlamydia psittaci'yi doğrular. Psittakoz zoonotiktir ve insanlarda pnömoniye yol açabilir; sahibe kafes temizliğinde maske ve eldiven kullanması, grip benzeri belirtide hekime başvurması söylenmelidir. Doksisiklin ile uzun süreli tedavi edilir.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kabarık kuş hasta kuştur
- ✓ Psittakoz zoonotiktir
- ✓ Yeni kuşa karantina uygulayın



Yalnızca eğitim amaçlıdır

Kanatlılar | Papağan

# Vaka 190 · Kendi tüylerini yolan gri papağan

## Hasta
- Papağan
- 12 yaş
- Dişi

## Başvuru nedeni
- Göğüs ve kanat altında tüy yolma

## Öykü ve bağlam
- Gün boyu yalnız
- Beslenme ağırlıklı ayçiçeği çekirdeği

## Fiziksel muayene
- Göğüste tüysüz alanlar, deri sağlıklı
- Baş tüyleri normal

## Ek bulgular
- Kan tahlili ve tetkikler normal




**II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Tüy yolmanın tıbbi ve davranışsal nedenleri nelerdir?
2. Baş tüylerinin normal olması neyi düşündürür?
3. Çevre zenginleştirme nasıl yapılır?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Davranışsal tüy yolma
- Beslenme yetersizliği
- Psittacine beak and feather disease

## Yorumlu çözüm
Baş tüyleri normal, gaganın ulaşabildiği yerlerde tüy kaybı kuşun kendisinin yoluyor olduğunu gösterir. Önce tıbbi nedenler (beslenme, enfeksiyon, parazit, ağrı) dışlanır. Yalnızlık, can sıkıntısı ve yetersiz beslenme sık nedenlerdir; çevre zenginleştirme, sosyal etkileşim ve dengeli diyet önerilir.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Baş tüyleri normal = kendi yoluyor
- ✓ Önce tıbbi nedenleri dışlayın
- ✓ Çevre zenginleştirme tedavinin parçasıdır



Yalnızca eğitim amaçlıdır

Kanatlılar | Tavuk

# Vaka 191 · Yumurtlayan tavukta karın şişliği ve penguen duruşu

## Hasta
- Tavuk
- 40 haftalık
- Dişi

## Başvuru nedeni
- Yumurtlamayı bırakma
- Penguen gibi dik duruş
- Karında şişlik

## Öykü ve bağlam
- Yüksek verimli yumurta tavuğu

## Fiziksel muayene
- Karında dalgalanan şişlik

## Ek bulgular
- Ultrason: karın içi serbest yumurta materyali ve sıvı




**KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Yumurta peritoniti nasıl gelişir?
2. Yumurta bağlanması ile nasıl ayrılır?
3. Tedavi seçenekleri nelerdir?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Yumurta sarısı peritoniti
- Yumurta bağlanması (yumurta tıkanıklığı)
- Neoplazi

## Yorumlu çözüm
Yumurta sarısının ovidukt yerine karın boşluğuna düşmesi peritonite yol açar; penguen duruşu ve karın şişliği tipiktir. Ultrason ve gerekirse abdominosentez tanıyı destekler. Tedavide antibiyotik, antiinflamatuvar, sıvı ve yumurtlamayı baskılayan hormonal uygulamalar; ağır olgularda cerrahi yapılır.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Penguen duruşu karın içi sorunu gösterir
- ✓ Yumurtlamayı baskılamak tekrarı azaltır
- ✓ Ağır olguda cerrahi

Sürüngenler | Kaplumbağa

# Vaka 192 · Kış uykusundan sonra gözlerini açamayan kaplumbağa

## Hasta
- Kaplumbağa
- 15 yaş
- Dişi

## Başvuru nedeni
- Gözlerde şişlik
- Yememe

## Öykü ve bağlam
- Beslenme sadece marul
- UVB lambası yok

## Fiziksel muayene
- Göz kapakları şiş ve kapalı
- Kabukta yumuşaklık

## Ek bulgular
- Kan kalsiyumu düşük




**KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Hipovitaminoz A göz kapaklarını nasıl etkiler?
2. UVB neden gereklidir?
3. Doğru bakım koşulları nelerdir?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- A vitamini eksikliği ve metabolik kemik hastalığı
- Bakteriyel konjonktivit
- Orta kulak apsesi

## Yorumlu çözüm
Tek tip beslenme A vitamini eksikliğine yol açar; göz kapağı ve epitel değişiklikleri ile göz şişliği görülür. UVB eksikliği ve düşük kalsiyum metabolik kemik hastalığı yapar. Tedavide dikkatli A vitamini takviyesi, kalsiyum, UVB ışığı, doğru sıcaklık ve çeşitli bitkisel beslenme gerekir.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Sürüngen hastalıklarının çoğu bakım hatasıdır
- ✓ UVB ve kalsiyum kemik sağlığı için şart
- ✓ Tek tip beslenmeden kaçının



Yalnızca eğitim amaçlıdır

Sürüngenler | İguana

# Vaka 193 · Çenesi yumuşak ve bacakları şiş iguana

## Hasta
- İguana
- 2 yaş
- Erkek

## Başvuru nedeni
- Yemek yiyememe
- Bacaklarda şişlik
- Titremeler

## Öykü ve bağlam
- UVB lambası yok
- Beslenme ağırlıklı meyve

## Fiziksel muayene
- Yumuşak, 'lastik' çene
- Uzun kemiklerde kalınlaşma
- Kas seğirmeleri

## Ek bulgular
- Röntgen: kemik yoğunluğunda azalma, patolojik kırıklar




**KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Beslenme kaynaklı sekonder hiperparatiroidizm nasıl gelişir?
2. Kas seğirmeleri neyi gösterir?
3. Tedavi ve bakım düzeltmesi nasıl yapılır?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Metabolik kemik hastalığı
- Kırık
- Böbrek hastalığı

## Yorumlu çözüm
UVB eksikliği ve düşük kalsiyum/yüksek fosfor diyet D vitamini ve kalsiyum eksikliğine, paratiroid hormonun artmasına ve kemik yıkımına yol açar. Kas seğirmeleri hipokalsemiyi gösterir. Tedavide kalsiyum takviyesi, UVB ve uygun ısı sağlanır, beslenme yeşil yapraklı sebzelere ağırlık verecek şekilde düzenlenir. Kırıklar dikkatle desteklenmelidir.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ UVB + kalsiyum = sağlam kemik
- ✓ Hipokalsemiye dikkat
- ✓ Bakım düzeltilmeden ilaç işe yaramaz


Yalnızca eğitim amaçlıdır

Sürüngenler | Yılan

# Vaka 194 · Ağız açık nefes alan ve salgısı olan yılan


## Hasta
- Yılan
- 6 yaş
- Dişi

## Başvuru nedeni
- Ağız açık solunum
- Burun ve ağızda köpüklü salgı

## Öykü ve bağlam
- Terraryum sıcaklığı düşük

## Fiziksel muayene
- Hırıltı
- Başı yukarıda tutma

## Ek bulgular
- Trakeal yıkama: Gram negatif bakteri




**II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Sürüngenlerde solunum enfeksiyonunda ortam sıcaklığının rolü nedir?
2. Neden bağışıklık sistemi zayıflar?
3. Tedavi planı nedir?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Bakteriyel solunum yolu enfeksiyonu
- Viral enfeksiyon
- Parazitler

## Yorumlu çözüm
Ektotermik sürüngenlerde düşük ortam sıcaklığı bağışıklık sistemini baskılar ve solunum enfeksiyonlarını kolaylaştırır. Tedavide önce tercih edilen optimum sıcaklık sağlanır, kültüre göre antibiyotik, nemlendirme ve destekleyici bakım yapılır. Terraryum hijyeni ve sıcaklık gradyanı kontrol edilmelidir.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Önce sıcaklığı düzeltin
- ✓ Kültüre göre antibiyotik
- ✓ Terraryum koşullarını sorgulayın



Yalnızca eğitim amaçlıdır

Zoonozlar | Köpek

# Vaka 195 · Bilinmeyen bir köpek tarafından ısırılmış, aşısı bilinmeyen köpek

## Hasta
- Köpek
- 3 yaş
- Erkek

## Başvuru nedeni
- Davranış değişikliği
- Saldırganlık
- Yutkunma güçlüğü

## Öykü ve bağlam
- 2 hafta önce sokak köpeğiyle kavga
- Kuduz aşısı yok

## Fiziksel muayene
- Salya
- Çene düşüklüğü
- Ses değişikliği

## Ek bulgular
- Hasta karantinada, tanı resmi laboratuvarda konacak




**II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Kuduz şüphesinde veteriner hekimin yasal yükümlülükleri nelerdir?
2. Temaslı insanlar için ne yapılmalı?
3. Neden canlı hayvanda kesin tanı zordur?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kuduz
- Distemper
- Yabancı cisim (ağızda)

## Yorumlu çözüm
Aşısız köpekte davranış değişikliği, salya ve yutkunma güçlüğü kuduzu düşündürür; ihbarı zorunlu ve öldürücü bir zoonozdur. Hayvan karantinaya alınır, resmi makamlara bildirilir; temaslı kişiler hemen sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Muayene minimum temasla ve koruyucu ekipmanla yapılmalıdır. Aşılama en etkili korunmadır.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kuduz şüphesi ihbar zorunludur
- ✓ Temaslı insanlar hemen hekime
- ✓ Ağız muayenesinde son derece dikkatli olun



Yalnızca eğitim amaçlıdır

Zoonozlar | Sığır

# Vaka 196 · Sürüde yavru atma ve çobanda dalgalı ateş


## Hasta
- Sığır
- 5 yaş
- Dişi

## Başvuru nedeni
- Gebeliğin son döneminde yavru atma
- Plasenta retansiyonu

## Öykü ve bağlam
- Sürüde birden fazla abort
- Çobanda uzun süreli ateş ve eklem ağrısı

## Fiziksel muayene
- Abort sonrası genel durum iyi

## Ek bulgular
- Rose Bengal ve ELISA testleri pozitif


Vaka 196

**KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Bruselloz neden önemli bir halk sağlığı sorunudur?
2. Abort materyali nasıl ele alınmalı?
3. Kontrol programı nelerdir?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Bruselloz
- Leptospiroz
- Neosporoz

## Yorumlu çözüm
Sürüde geç dönem abortlar ve insanlarda dalgalı ateş brusellozu düşündürür; ihbarı zorunlu bir zoonozdur ve çiğ süt/süt ürünleri ile abort materyali temasıyla bulaşır. Abort materyali eldivenle toplanıp imha edilir, alan dezenfekte edilir, resmi makamlara bildirilir. Kontrol aşılama, test ve pozitif hayvanların ayrılması ile yapılır.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Bruselloz ihbarı zorunludur
- ✓ Abort materyaline korumasız dokunmayın
- ✓ Çiğ süt tüketimi risktir

Zoonozlar | Köpek

# Vaka 197 · Koyun sürüsüyle yaşayan çoban köpeğinde parazit kontrolü

## Hasta
- Köpek
- 8 yaş
- Erkek

## Başvuru nedeni
- Rutin kontrol
- Belirti yok

## Öykü ve bağlam
- Kesilen koyunların iç organlarıyla besleniyor
- Antiparaziter uygulaması düzensiz

## Fiziksel muayene
- Muayene normal

## Ek bulgular
- Dışkıda tenya yumurtaları (Echinococcus şüphesi)




**KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Kistik ekinokokkozun yaşam döngüsü nasıldır?
2. İnsanlar nasıl enfekte olur?
3. Köpeklerde kontrol nasıl yapılır?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Echinococcus granulosus enfestasyonu
- Taenia türleri
- Dipylidium caninum

## Yorumlu çözüm
Köpekler, ara konaktaki (koyun) kistli organları yiyerek Echinococcus granulosus ile enfekte olur; dışkıyla yumurta saçarlar. İnsanlar bu yumurtaları yutarak karaciğer ve akciğerde kist hidatik geliştirir. Köpeklere düzenli prazikuantel verilmesi ve kesim artıklarının köpeklere verilmemesi en etkili kontrol yöntemidir.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kesim artığı köpeğe verilmez
- ✓ Prazikuantel düzenli uygulanır
- ✓ Kist hidatik ciddi bir halk sağlığı sorunudur



Yalnızca eğitim amaçlıdır

Zoonozlar | Kedi

# Vaka 198 · Gebe sahibi olan genç kedide toksoplazma kaygısı

## Hasta
- Kedi
- 1 yaş
- Dişi

## Başvuru nedeni
- Sahip gebe, danışmak istiyor

## Öykü ve bağlam
- Kedi evde yaşıyor, kuru mama ile besleniyor

## Fiziksel muayene
- Muayene normal

## Ek bulgular
- Seroloji: Toxoplasma IgG pozitif, IgM negatif




**KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Kediden insana bulaş nasıl olur?
2. IgG pozitifliği ne anlama gelir?
3. Gebe sahibe hangi öneriler verilmeli?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Geçirilmiş (eski) toksoplazmoz
- Aktif enfeksiyon
- Seronegatif kedi

## Yorumlu çözüm
Kediler Toxoplasma ookistlerini sadece ilk enfeksiyondan sonraki kısa süre içinde dışkıyla atar; ookistler 1-5 gün içinde enfektif hâle gelir. IgG pozitif, IgM negatif kedi büyük olasılıkla daha önce enfekte olmuştur. Gebe sahiplere kum kabının her gün başkası tarafından temizlenmesi, eldiven, el yıkama ve çiğ et tüketmemesi önerilir. İnsanlarda en sık kaynak az pişmiş et ve yıkanmamış sebzelerdir.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kum kabını her gün temizleyin
- ✓ Çiğ et ana risk kaynağıdır
- ✓ Kediyi evden uzaklaştırmak gerekmez



Yalnızca eğitim amaçlıdır

Zoonozlar | Köpek

# Vaka 199 · Kum sineklerinin yaygın olduğu bölgede kilo kaybı ve deri lezyonları


## Hasta
- Köpek
- 6 yaş
- Dişi

## Başvuru nedeni
- Kilo kaybı
- Göz çevresinde tüy kaybı
- Tırnaklarda uzama

## Öykü ve bağlam
- Akdeniz kıyısında yaşıyor
- Sivrisinek/kum sineği koruması yok

## Fiziksel muayene
- Periokuler alopesi, pul pul deri
- Lenfadenopati
- Onikogrifoz

## Ek bulgular
- Hiperglobulinemi
- Proteinüri
- Leishmania serolojisi yüksek




**KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Leishmaniasis nasıl bulaşır?
2. Böbrek tutulumu neden prognozu belirler?
3. Korunma yöntemleri nelerdir?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Leishmaniasis
- Ehrlichiosis
- Lupus

## Yorumlu çözüm
Kum sineğiyle bulaşan Leishmania infantum kronik sistemik hastalık yapar; deri lezyonları, lenfadenopati, tırnak uzaması ve hiperglobulinemi tipiktir. Glomerülonefrit ve proteinüri prognozu belirler. Tedavide leishmanisidal ve leishmaniostatik ilaçlar kullanılır. Repellent tasmalar ve aşılama korunmada önemlidir; hastalık zoonotiktir.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Proteinüri prognozu belirler
- ✓ Repellent korunmada esastır
- ✓ Endemik bölgede tarama yapın



Yalnızca eğitim amaçlıdır

Zoonozlar | Kedi

# Vaka 200 · Kedi tırmığı sonrası sahibinde lenf düğümü şişliği


## Hasta
- Kedi
- 2 yaş
- Erkek

## Başvuru nedeni
- Sahip kolunda tırmık sonrası lenf düğümü şişliği yaşamış

## Öykü ve bağlam
- Kedide pire var
- Yavruyken sokaktan alınmış

## Fiziksel muayene
- Kedi sağlıklı görünüyor
- Pire dışkısı mevcut

## Ek bulgular
- Kedide Bartonella henselae serolojisi pozitif




**KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Kedi tırmığı hastalığının etkeni nedir?
2. Pirenin bulaşmadaki rolü nedir?
3. Hangi kişiler daha fazla risk altındadır?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Bartonelloz (kedi tırmığı hastalığı)
- Toksoplazmoz
- Mantar enfeksiyonu

## Yorumlu çözüm
Bartonella henselae kedilerde genellikle belirti vermez; pire dışkısıyla kedi tırnaklarına bulaşır ve tırmık veya ısırıkla insana geçer. İnsanlarda lenfadenopati yapar; bağışıklığı baskılanmış kişilerde ağır seyredebilir. En önemli önlem düzenli pire kontrolüdür; tırmık yarası hemen yıkanmalıdır.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Pire kontrolü bulaşmayı önler
- ✓ Kedi genellikle belirtisizdir
- ✓ Bağışıklığı zayıf kişiler risk altındadır



Yalnızca eğitim amaçlıdır

Halk sağlığı | Sığır

# Vaka 201 · Kesimhanede akciğerde nodüller bulunan inek

## Hasta
- Sığır
- 7 yaş
- Dişi

## Başvuru nedeni
- Kesim sonrası muayenede bulgu

## Öykü ve bağlam
- Canlıyken hafif kronik öksürük ve kilo kaybı

## Fiziksel muayene
- Akciğer ve bölgesel lenf düğümlerinde peynirimsi nodüller

## Ek bulgular
- Örnekler resmi laboratuvara gönderilmiş
- Sürüde tüberkülin testi planlanıyor




**II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Bu bulgular hangi hastalığı düşündürür?
2. Et muayenesinde veteriner hekimin rolü nedir?
3. Sürüde nasıl kontrol edilir?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Sığır tüberkülozu
- Akciğer apsesi
- Neoplazi

## Yorumlu çözüm
Kesim sırasında akciğer ve lenf düğümlerinde kazeöz nodüller sığır tüberkülozunu (Mycobacterium bovis) düşündürür; ihbarı zorunlu bir zoonozdur ve çiğ sütle insana bulaşabilir. Etkilenen organ veya karkas mevzuata göre imha edilir, sürü tüberkülin testiyle taranır, pozitifler ayrılır. Et muayenesi halk sağlığının önemli bir güvencesidir.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Et muayenesi halk sağlığı kalkanıdır
- ✓ Tüberküloz ihbarı zorunludur
- ✓ Pastörize olmayan süt risk taşır

Halk sağlığı | Sığır

# Vaka 202 · Antibiyotik tedavisi sonrası sütün satışa verilmesi

## Hasta
- Sığır
- 4 yaş
- Dişi

## Başvuru nedeni
- Mastit tedavisi tamamlanmış
- Çiftçi sütü hemen satmak istiyor

## Öykü ve bağlam
- İntramamer antibiyotik kullanılmış

## Fiziksel muayene
- Meme normal görünüyor

## Ek bulgular
- Süt kalıntı testi pozitif




**KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. İlaç bekleme süresi nedir?
2. Kalıntılar neden halk sağlığı sorunudur?
3. Çiftçiye nasıl danışmanlık verilmeli?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Bekleme süresi tamamlanmamış süt (kalıntı)
- Yanlış pozitif test
- Diğer ilaç kalıntıları

## Yorumlu çözüm
Her ilacın etiketinde süt ve et için bekleme süresi bulunur; bu süre dolmadan elde edilen ürünler gıda zincirine girmemelidir. Kalıntılar alerjiye ve antimikrobiyal direncin artmasına katkıda bulunur. Çiftçi tedavi kayıtlarını tutmalı, tedavi edilen hayvanları işaretlemeli ve kalıntı testlerini kullanmalıdır.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Bekleme süresi yasal zorunluluktur
- ✓ Kalıntı direnci artırır
- ✓ Tedavi kaydı ve hayvan işaretleme şart

Halk sağlığı | Tavuk

# Vaka 203 · Etlik piliç sürüsünde Salmonella izlemesi

## Hasta
- Tavuk
- 6 haftalık
- Karışık

## Başvuru nedeni
- Rutin izleme
- Belirti yok

## Öykü ve bağlam
- Kesim öncesi dönem

## Fiziksel muayene
- Sürü sağlıklı

## Ek bulgular
- Çizme süründüsünde Salmonella Enteritidis pozitif


Vaka 203

**KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Belirtisiz sürüde Salmonella neden önemlidir?
2. Gıda zinciri boyunca hangi önlemler alınır?
3. Tüketiciye hangi öneriler verilir?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Salmonella taşıyıcılığı
- Çevresel kontaminasyon
- Yem kaynaklı kontaminasyon

## Yorumlu çözüm
Kanatlılar Salmonella'yı belirti göstermeden taşıyabilir ve gıda kaynaklı salgınlara yol açabilir. Pozitif sürülerde mevzuata uygun önlemler alınır, kümes temizliği ve dezenfeksiyonu yapılır, yem ve su kaynağı araştırılır. Tüketicilere tavuk etinin iyi pişirilmesi ve çapraz bulaşmanın önlenmesi önerilir.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Sağlıklı görünen sürü taşıyıcı olabilir
- ✓ Çiftlikten sofraya kontrol gerekir
- ✓ Çapraz bulaşmayı önleyin



Yalnızca eğitim amaçlıdır

Atlar · At

# Vaka 204 · Sert yürüyüş, çene kilitlenmesi ve üçüncü göz kapağı çıkması

## Hasta
- At
- 10 yaş
- İğdiş

## Başvuru nedeni
- Sert yürüme
- Yem yiyememe
- Seslere aşırı tepki

## Öykü ve bağlam
- 2 hafta önce tırnakta çivi batması
- Aşı durumu bilinmiyor

## Fiziksel muayene
- Testere ata benzer duruş
- Üçüncü göz kapağının prolapsusu
- Kuyruk havada sert

## Ek bulgular
- Tanı klinik




**KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Tetanoz nasıl gelişir?
2. Tedavide neler yapılır?
3. Neden bütün atlar aşılanmalıdır?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Tetanoz
- Hipokalsemi
- Ensefalit

## Yorumlu çözüm
Clostridium tetani sporları derin, oksijensiz yaralarda çoğalır ve toksin sinir sisteminde inhibitör nöronları bloke eder; kas sertliği ve uyarılara aşırı tepki gelişir. Tedavide yara debride edilir, tetanoz antitoksini ve penisilin verilir, karanlık ve sessiz ortam, kas gevşeticiler ve destekleyici bakım uygulanır. Atlarda düzenli aşılama hayat kurtarır.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Atlar tetanoza çok duyarlıdır
- ✓ Yara + aşısızlık = risk
- ✓ Sessiz, karanlık ortam tedavinin parçası



Yalnızca eğitim amaçlıdır

Sığırlar | Sığır

# Vaka 205 · Çivi ya da tel yuttuğu düşünülen ve yürümek istemeyen inek

## Hasta
- Sığır
- 3 yaş
- Dişi

## Başvuru nedeni
- İştahsızlık
- Sırtı kambur durma
- Yürümek istememe

## Öykü ve bağlam
- Yemlikte tel parçaları bulunmuş

## Fiziksel muayene
- Ateş: 39,7 °C
- Ksifoid bölgesine baskıda ağrı (inleme)

## Ek bulgular
- Metal dedektörü pozitif
- Lökositoz, fibrinojen yüksek




**KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Travmatik retikülo-peritonit nasıl oluşur?
2. Hangi testler ağrıyı ortaya koyar?
3. Önlemede mıknatısın rolü nedir?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Travmatik retikülo-peritonit
- Abomazum ülseri
- Pnömoni

## Yorumlu çözüm
Sığırlar seçici beslenmediği için metal cisimleri yutabilir; bunlar retikulum duvarını delerek peritonite yol açar. Ksifoid bölgesi baskısında inleme ve kambur duruş tipiktir. Tedavide mıknatıs, antibiyotik ve hareket kısıtlaması uygulanır; ağır olgularda rumenotomi gerekir. Yemlerde metal kontrolü ve profilaktik mıknatıs önleyicidir.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kambur duruş + inleme = retikülo-peritonit
- ✓ Mıknatıs koruyucudur
- ✓ Yem hijyeni önemlidir

Koyunlar | Koyun

# Vaka 206 · Sürüde göz bulanıklığı ve sulanma

## Hasta
- Koyun
- 2 yaş
- Dişi

## Başvuru nedeni
- Gözlerde sulanma ve bulanıklık
- Bazı koyunlar kör gibi

## Öykü ve bağlam
- Yazın sinek yoğunluğu
- Sürü kalabalık

## Fiziksel muayene
- Kornea ödemi ve ülseri
- Konjonktivit

## Ek bulgular
- Göz sürüntüsü: Mycoplasma / Chlamydia


Vaka 206

**KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Bulaşıcı keratokonjonktivit nasıl yayılır?
2. Kör koyunlar neden risk altındadır?
3. Tedavi ve kontrol nasıl yapılır?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Bulaşıcı keratokonjonktivit
- Yabancı cisim
- Entropiyon

## Yorumlu çözüm
Bulaşıcı keratokonjonktivit sinekler ve yakın temasla yayılır; kornea bulanıklığı ve ülser görülür. Kör hayvanlar yem ve suya ulaşamayabilir ve kaza riski taşır; gölgeli, güvenli bir alana ayrılmalıdır. Topikal veya sistemik tetrasiklin ile tedavi edilir; sinek kontrolü yayılmayı azaltır.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Sinekler yayılımı artırır
- ✓ Kör hayvanları ayırın
- ✓ Tetrasiklin etkilidir

Kanatlılar | Tavuk

# Vaka 207 · Köy tavuklarında ayaklarda kabuklanma ve bacak pullarında kalkma


## Hasta
- Tavuk
- 1 yaş
- Dişi

## Başvuru nedeni
- Bacak pullarında kalkma ve kalınlaşma
- Topallık

## Öykü ve bağlam
- Eski, temizlenmeyen kümes

## Fiziksel muayene
- Bacak pullarının altında beyaz kabuklu birikim

## Ek bulgular
- Kazıntıda Knemidocoptes akarları




**KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Bacak uyuzu nasıl yayılır?
2. Tedavi nasıl yapılır?
3. Kümes hijyeni neden önemlidir?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Bacak uyuzu (Knemidocoptes)
- Travma
- Vitamin eksikliği

## Yorumlu çözüm
Knemidocoptes akarları bacak pullarının altına yerleşerek kabuklanma ve deformasyon yapar; temasla yayılır. Tedavide ivermektin gibi ilaçlar uygun dozda ve tavuk yumurta bekleme süreleri dikkate alınarak kullanılır; bacaklar yumuşatılıp kabuklar nazikçe temizlenir. Kümesin temizliği ve tüm sürünün tedavisi gerekir.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Tüm sürü tedavi edilir
- ✓ Yumurta bekleme süresine uyun
- ✓ Kümes temizliği tekrarı önler

Sürüngenler | Su kaplumbağası

# Vaka 208 · Su kaplumbağasında kabukta yumuşama ve beyaz lekeler

## Hasta
- Su kaplumbağası
- 4 yaş
- Erkek

## Başvuru nedeni
- Kabukta beyaz lekeler
- Kötü koku

## Öykü ve bağlam
- Akvaryum filtresi yok
- Güneşlenme alanı yok

## Fiziksel muayene
- Plastronda yumuşak, çukur lezyonlar
- Altında nekrotik doku

## Ek bulgular
- Lezyon sürüntüsü: bakteri ve mantar




**KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Kabuk çürüğü nasıl gelişir?
2. Güneşlenme alanının rolü nedir?
3. Tedavide neler yapılır?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kabuk çürüğü (ülseratif kabuk hastalığı)
- Metabolik kemik hastalığı
- Travma

## Yorumlu çözüm
Kirli su, yetersiz filtrasyon ve kuruyup güneşlenebileceği bir alanın olmaması kabukta bakteriyel ve mantar enfeksiyonuna yol açar. Lezyonlar debride edilir, antiseptikle temizlenir; hayvan tedavi süresince günün bir kısmında kuru tutulur. Su kalitesi, filtre, UVB ve güneşlenme alanı düzenlenmelidir.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kuru güneşlenme alanı şarttır
- ✓ Su kalitesi sağlığı belirler
- ✓ Debridman ve kuru tutma tedavidir



Yalnızca eğitim amaçlıdır

Halk sağlığı | Köpek

# Vaka 209 · Sahipsiz köpek popülasyonunda kuduz ve parazit kontrol programı

## Hasta

- Köpek
- Bilinmiyor
- Erkek

## Başvuru nedeni

- Belediye barınağına alınan sokak köpekleri

## Öykü ve bağlam

- Mahallede ısırık vakaları bildirilmiş

## Fiziksel muayene

- Genel durum orta, dış parazitler var

## Ek bulgular

- Bölgede kuduz riski




**II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları

1. Tek Sağlık yaklaşımı nedir?
2. Sahipsiz hayvan programında hangi uygulamalar yapılır?
3. Veteriner hekimin halk sağlığındaki rolü nedir?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar

- Kuduz riski
- Ekinokokkoz ve diğer paraziter zoonozlar
- Leishmaniasis

## Yorumlu çözüm

Tek Sağlık yaklaşımı insan, hayvan ve çevre sağlığının birbirine bağlı olduğunu kabul eder. Sahipsiz hayvan programlarında kuduz aşılaması, iç-dış parazit uygulaması, kısırlaştırma, kimliklendirme ve gözlem esastır. Isırık vakaları sağlık kuruluşlarıyla birlikte değerlendirilir. Veteriner hekim zoonozların kontrolünde ön saftadır.

## Akılda tutulacak noktalar

- ✓ Tek Sağlık: insan-hayvan-çevre
- ✓ Kuduz aşılaması en etkili önlemdir
- ✓ Kısırlaştırma popülasyonu kontrol eder



Yalnızca eğitim amaçlıdır

Halk sağlığı | Kedi

# Vaka 210 · Barınakta yayılan kedi uyuzu: çalışanlarda da kaşıntı

## Hasta
- Kedi
- 3 yaş
- Dişi

## Başvuru nedeni
- Kulak kenarında ve yüzde kabuklanma
- Yoğun kaşıntı

## Öykü ve bağlam
- Barınakta birçok kedide benzer
- Çalışanlarda kolda kaşıntılı lezyonlar

## Fiziksel muayene
- Kulak kenarları ve yüzde gri-sarı kabuklar

## Ek bulgular
- Deri kazıntısı: Notoedres cati




**KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.**

## Analiz soruları
1. Notoedres uyuzu nasıl yayılır?
2. Barınakta kontrol nasıl yapılır?
3. Çalışanlar için hangi önlemler gerekir?

## Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Notoedrik uyuz
- Dermatofitoz
- Otodektes

## Yorumlu çözüm
Notoedres cati son derece bulaşıcıdır; kulak kenarı ve yüzde yoğun kaşıntılı kabuklanma yapar ve insanlarda geçici kaşıntılı lezyonlara yol açabilir. Barınaktaki tüm kediler tedavi edilir, yeni gelenler karantinaya alınır, ortam temizlenir. Çalışanlar eldiven kullanmalı, el hijyenine uymalı ve lezyon olursa hekime başvurmalıdır.

## Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Barınakta tüm hayvanlar tedavi edilir
- ✓ Karantina yeni salgınları önler
- ✓ Çalışan sağlığı da korunmalı



Yalnızca eğitim amaçlıdır