TAM KÜTÜPHANE

210 Yorumlu Veteriner Klinik Vaka

Belirtileri, tetkikleri ve tanıyı birbirine bağlamak için adım adım düzenlenmiş görsel ve yorumlu vakalar.

5 Öğrenme Rotası · Küçük, büyük ve egzotik hayvanlar · Yorumlu çözümler

Bu kitap nasıl kullanılır?

1

Hastayı gözlemleyin

Başvuru nedeni, öykü ve bağlamla başlayın. Henüz çözüme bakmayın.

2

İpuçlarını düzenleyin

Fiziksel muayene ve ek bulguları birbiriyle ilişkilendirin. Hangi veri gerçekten önemli?

3

Durun ve düşünün

«Klinik durak» kutusunda durun: analiz sorularını yanıtlayın ve kendi ayırıcı tanı listenizi yazın.

4

Akıl yürütmenizi karşılaştırın

Yorumlu çözümü okuyun; öncelikleri, sınırları ve sonraki adımları kendi cevabınızla karşılaştırın.

Vakalar 5 rotada düzenlenmiştir. Sırayla ilerleyebilir veya sınavınıza, dersinize ya da stajınıza göre ilgili rotayı seçebilirsiniz. Her vakanın sonundaki «Akılda tutulacak noktalar» hızlı tekrar için tasarlanmıştır.

Önemli: Bu materyal yalnızca akademik çalışma ve eğitim amaçlıdır. Bir hastanın değerlendirilmesinin, öğretim üyesi denetiminin veya bir veteriner hekimin yönlendirmesinin yerine geçmez. İlaç dozları ve protokoller için güncel kaynaklara ve klinik danışmana başvurun.

İçindekiler

Rota 01 · Küçük Hayvanlar ve Klinik Akıl Yürütme

001 Kanlı ishal ve kusma olan aşısız yavru köpek
002 Kusma ve karın ağrısı olan, oyuncak kemiren köpek
003 Kilo kaybı ve kronik kusma olan kedi
004 Yemekten sonra karın şişliği ve kusma girişimi olan büyük ırk köpek
005 Kronik ishal ve kilo kaybına rağmen iştahı artmış köpek
006 Tüy yumağı sonrası ağız içinde ip bulunan kedi
007 Ağız kokusu ve sarılık görülen yaşlı köpek
008 Çöp karıştırdıktan sonra kanlı ishal ve kusma olan köpek
009 Yoğun kaşıntı ve kulak kenarında kabuklanma olan köpek
010 Mevsimsel pati yalama ve kulak iltihabı olan genç köpek
011 Yuvarlak tüy dökülmesi alanları olan yavru kedi
012 Simetrik tüy dökülmesi ve kilo alımı olan köpek
013 Gözlerin çevresinde ve patilerde tüy kaybı olan yavru köpek
014 Ateş, halsizlik, trombositopeni ve kene öyküsü olan köpek
015 Göz ve burun akıntısı, öksürük ve ardından kasılmalar görülen köpek
016 Karında sıvı birikimi ve ateşi olan genç kedi
017 Dişeti iltihabı ve tekrarlayan enfeksiyonları olan sokak kedisi
018 Göl kenarından sonra böbrek yetmezliği ve sarılık gelişen köpek
019 Arka bacaklarında ani felç gelişen kısa bacaklı köpek
020 Nöbetler arasında tamamen normal olan genç köpek
021 Ani baş eğikliği ve göz titremesi olan yaşlı köpek
022 Arka bacaklarında ani felç ve soğuk patileri olan kedi
023 Gece öksürüğü ve egzersiz intoleransı olan küçük ırk köpek
024 Bayılma ve karında sıvı birikimi olan dev ırk köpek
025 Ağız açık solunum yapan ve üfürümü olan kedi
026 Halsizlik ve boğuk kalp sesleri olan köpek
027 Öksürük ve egzersiz intoleransı olan, korunmasız köpek
028 Çok su içen, çok idrar yapan ve kilo kaybeden köpek
029 İştahı artmasına rağmen kilo kaybeden hiperaktif yaşlı kedi
030 Göbekli görünüm, tüy dökülmesi ve aşırı su içme olan köpek
031 Dalgalı seyirli kusma, halsizlik ve bradikardi olan genç köpek
032 Egzersiz sonrası titreme ve bayılma olan köpek
033 İştahsızlık sonrası sarılık gelişen şişman kedi
034 Kuyruk kökünde kaşıntı ve tüy kaybı olan köpek
035 Ön bacaklarda yürüme bozukluğu ve boyun ağrısı olan küçük ırk köpek
036 Gözlerde akıntı, hapşırma ve ağızda ülser olan yavru kedi
037 Sürekli 'makine sesi' benzeri üfürümü olan yavru köpek
038 İdrarda kan, idrar yaparken ağrı ve sızlama olan köpek
039 Kum kabında ıkınan ama idrar yapamayan erkek kedi
040 Kilo kaybı, ağız kokusu ve çok su içen yaşlı kedi

Rota 02 · Tetkikler ve Tanısal Yorumlama

041 Soluk mukozalar ve sarılık olan, aniden halsizleşen köpek
042 Halsizlik ve rejeneratif olmayan anemisi olan yaşlı kedi
043 Lökositozu çok yüksek, kemik iliği şüphesi olan köpek
044 Peteşiler ve burun kanaması olan köpek
045 Fare zehiri yediği düşünülen ve topallayan köpek
046 Anemi ve eritrositlerde parazit görülen kedi
047 Kronik kan kaybı ve mikrositik anemi olan köpek
048 Ateş ve şiddetli nötropeni olan yavru kedi
049 Sürekli yüksek hematokrit ve kırmızı mukozaları olan köpek
050 Sepsiste lökosit tablosunun yorumlanması
051 Yüksek kalsiyum ve çok su içme şikâyeti olan köpek
052 Yemekten sonra şaşkınlık ve büyüme geriliği olan yavru köpek
053 Hipoalbuminemi ve karında sıvı birikimi olan köpek
054 Antifriz içtiği şüphelenilen ve kusan kedi
055 Rutin kontrolde ALP yüksekliği bulunan köpek
056 Ksilitollü sakız yedikten sonra titreme ve kollaps
057 Diyabetik kedide kusma, dehidratasyon ve aseton kokusu
058 Kronik böbrek hastalığında SDMA ve kreatinin yorumlanması
059 Kusma sonrası hipokloremik metabolik alkaloz
060 Yaz aylarında yeşil meraya çıkınca topallayan, aşırı kilolu kısrak
061 Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ve idrarda kristaller
062 İdrar dansitesi düşük, çok su içen ve kan değerleri normal köpek
063 İdrar kültürü pozitif ama belirtisi olmayan kedi
064 Dalmaçyalı köpekte idrarda urat kristalleri ve taşlar
065 Deride hızla büyüyen kitle ve ince iğne aspirasyonu
066 Tüm lenf düğümleri büyümüş ama genel durumu iyi köpek
067 Bağırsak duvarı kalınlaşması olan kedi: ultrasonografi ve kilo kaybı
068 Topallık ve uzun kemikte litik lezyon olan dev ırk köpek
069 Ani dispne ve göğüs röntgeninde yaygın opasite
070 Öksürük ve göğüs röntgeninde bronşiyal patern olan kedi
071 Ultrasonda dalakta kitle bulunan, ani kollaps geçiren köpek
072 Arka bacakta topallık ve diz eklemi röntgeni

073 Kalça displazisi değerlendirmesi ve röntgen yorumu
074 Ultrasonda böbrekleri asimetrik olan yaşlı kedi
075 Kronik öksürük ve toraks röntgeninde nodüller
076 Laboratuvar 'normal' ama klinik tablo ağır olan köpek
077 Stres hiperglisemisi ile diyabeti ayırt etme
078 Hemolizli kan örneğinde yanıltıcı sonuçlar
079 Ateş, nötrofili ve bacakta şişlik: sepsisin kaynağını arama
080 Hipertiroidizm tedavisi sonrası ortaya çıkan böbrek yetmezliği
081 Meme zincirinde birden fazla kitle olan kısırlaştırılmamış köpek
082 Kulak akıntısı ve kulak sitolojisinin yorumu
083 Göğüs boşluğunda süt rengi sıvı birikimi
084 Burnunda şişlik ve ülserasyon olan dışarı çıkan kedi
085 Eklem sıvısı analizi ile çoklu eklem ağrısı
086 İdrar yapma güçlüğü ve ultrasonda büyümüş prostat
087 Trafik kazası sonrası dispne ve göğüs röntgeni
088 Kas hasarı ve CK yüksekliği: nöbet sonrası mı, miyopati mi?
089 Pansitopeni ve kanayan dişetleri olan yaşlı köpek
090 Hiperglisemisi olmadan glukozüri görülen kedi
091 Pozitif kalp kurdu testi ama belirti olmayan köpek: sonuçları birleştirme
092 Pankreatik lipazı yüksek olan köpek
093 Kusma ve ultrasonda 'hedef' görünümü olan genç köpek
094 Adrenal bezde kitle ve yüksek kan basıncı
095 Ani körlük ve yüksek kan basıncı olan kedi

Rota 03 · Acil Durumlar, Toksikoloji ve Anestezi

096 Araba çarpması sonrası şokta gelen köpek
097 Balkondan düşen ve burnu kanayan kedi
098 Arı soktuktan sonra yüz şişliği ve kollaps
099 Sıcak günde koşu sonrası kollaps
100 Ani nefes darlığı ve inspiratuvar stridor olan köpek
101 Ani gelişen göğüs travması olmayan pnömotoraks
102 Sürekli nöbet geçiren köpek (status epileptikus)
103 Ani kollaps ve karında sıvı ile gelen köpek: hemoabdomen
104 Dövüş sonrası ateş ve göğüs boşluğunda irin birikimi
105 Göğüs kafesine kitle baskısı olmadan ani dispne: kardiyojenik ödem
106 Bitter çikolata yedikten sonra huzursuzluk ve taşikardi
107 Köpeğe ait pire damlası uygulanan kedide tremor
108 Üzüm yedikten sonra kusma ve az idrar yapma
109 Zambak çiçeği kemirdikten sonra kusma
110 Ağrı kesici (ibuprofen) yutan köpekte kusma
111 Parasetamol verilen kedide kahverengi mukoza ve yüz ödemi
112 Tarım ilacı temasından sonra salya, kusma ve kas titremesi
113 Esrarlı yiyecek yedikten sonra ataksi ve idrar kaçırma
114 Ormanda yürüyüş sonrası ağızda şişlik ve dil nekrozu
115 Ani gelişen akut böbrek hasarı ve oligüri
116 Ameliyat sonrası hipotansiyon ve taşikardi: sepsis mi?
117 Kalp yetmezliği tedavisi sırasında hipokalemi ve kas güçsüzlüğü
118 Ani karın şişliği olmadan solukluk ve sağ kalp yetmezliği
119 Kanayan, pıhtılaşma testleri uzamış ve trombositi düşen septik köpek
120 Ani gelişen anizokori ve davranış değişikliği: kafa travması
121 Brakisefalik köpekte anestezi planlaması
122 Diş operasyonu sırasında hipotansiyon
123 Kısırlaştırma anestezisinde apne ve bradikardi
124 Anestezi sonrası uzamış derlenme ve hipoglisemi
125 Göğüs ameliyatı sonrası ağrı yönetimi
126 Anestezi sırasında hipotermi gelişen kedi
127 Anestezi altında bradikardi ve ikinci derece AV blok
128 Kısırlaştırma sonrası karın içi kanama
129 Yara yerinde açılma (dehisens) ve akıntı
130 Uzun süreli yatan hastada aspirasyon pnömonisi
131 Kan transfüzyonu sırasında ateş ve kusma
132 Sıvı tedavisi sırasında akciğer ödemi gelişen kedi
133 Ortopedi ameliyatı sonrası bandaj komplikasyonu
134 Kaçırılan ivermektin dozu sonrası körlük ve tremor
135 Köpek ısırığı sonrası göğüs yaralanması

Rota 04 · Cerrahi, Üreme ve Neonatoloji

136 Skrotumda tek testis olan genç köpek
137 Göz kapağında içe dönme ve göz akıntısı
138 Arka bacağını aralıklı kaldıran küçük ırk köpek: patella luksasyonu
139 Meme bölgesinde ülserleşen kitle olan kısırlaştırılmamış kedi
140 Ön bacakta açık kırık olan köpek
141 Perianal bölgede şişlik ve dışkılama güçlüğü
142 Tekrarlayan tıkanma sonrası perineal üretrostomi kararı
143 Splenektomi sonrası ventriküler aritmi
144 Çiftleşme sonrası gebelik tanısı ve yavru sayısı
145 Kızgınlıktan 2 ay sonra süt gelmesi ve yuvalama davranışı
146 Gebeliğin son haftasında kasılmalar ve halsizlik
147 Gebelikte vajinal akıntı ve yavru kaybı
148 Normal doğumun takibi: ne zaman müdahale edilmeli?
149 1 saattir güçlü ıkınan ama yavru doğurmayan köpek
150 İki yavru doğduktan sonra kasılmaları duran kedi
151 İlk doğumunu yapan düvede güç doğum
152 Doğumdan bir hafta sonra ateş ve kötü kokulu akıntı
153 Emziren kedide sert, sıcak ve ağrılı meme
154 Doğumdan sonra yatar hâlde kalkamayan süt ineği
155 Göbek fıtığı olan yavru köpek
156 Emmeyen, soğuk ve sürekli ağlayan yeni doğan yavru
157 Doğumdan sonra hızla zayıflayan ve sarılık gelişen yavru kedi
158 Burnundan süt gelen yavru köpek

159 Kolostrum alıp almadığı bilinmeyen halsiz buzağı
160 İshal ve dehidratasyon gelişen kuzu
161 Kısırlaştırma sonrası idrar kaçırma
162 Perineal bölgede şişlik ve dışkılama güçlüğü olan kısırlaştırılmamış köpek
163 Gebeliğin sonunda körlük, sendeleme ve yatma
164 Doğumdan sonra 3 saat geçmesine rağmen düşmeyen eş (plasenta)
165 Ayağa kalkamayan ve emmeyen yeni doğan tay
166 Kısırlaştırılmamış tavşanda vajinal kanama
167 Kızgınlıktan sonra vulvadan çıkan kitle
168 Yavruda göz kapakları açılmadan şişlik ve akıntı
169 Gebeliğin 50. gününde karın büyümesi duran kedi
170 Doğumdan sonra rahmin dışarı çıkması

Rota 05 · Büyük Hayvanlar, Üretim, Egzotikler ve Halk Sağlığı

171 Yerde yuvarlanan ve karnına bakan at: kolik değerlendirmesi
172 Uzun ve kıvırcık tüyler, kas kaybı ve laminit öyküsü olan yaşlı at
173 Burun akıntısı ve çene altında apseleşen lenf düğümleri
174 Ön ayakta ani şiddetli topallık ve tırnakta sıcaklık
175 Toz ortamında öksürük ve egzersiz intoleransı olan at
176 Doğumdan 3 hafta sonra süt veriminde düşüş ve aseton kokusu
177 Sol karında 'ping' sesi olan süt ineği
178 Memede sertlik ve sütte pıhtılar
179 Sulu ishal ve şiddetli dehidratasyon olan buzağı
180 Besi danasında ateş, burun akıntısı ve öksürük
181 Ateş, ağızda yaralar ve topallık görülen sürü
182 Ani yatıp kalkamama ve kas titremesi: otlakta otlayan inek
183 Soluk göz mukozası ve çene altında ödem olan koyunlar
184 Daireler çizen ve bir yöne dönen koyun
185 Tırnak arasında kötü koku ve sürüde yaygın topallık
186 Sürüde ani ölümler: mera değişikliği sonrası
187 Keçide bacak eklemlerinde şişlik ve kilo kaybı
188 Köy tavuklarında ani ölümler, solunum ve nörolojik belirtiler
189 Kabarık duran, burun deliği akıntısı olan muhabbet kuşu
190 Kendi tüylerini yolan gri papağan
191 Yumurtlayan tavukta karın şişliği ve penguen duruşu
192 Kış uykusundan sonra gözlerini açamayan kaplumbağa
193 Çenesi yumuşak ve bacakları şiş iguana
194 Ağız açık nefes alan ve salgısı olan yılan
195 Bilinmeyen bir köpek tarafından ısırılmış, aşısı bilinmeyen köpek
196 Sürüde yavru atma ve çobanda dalgalı ateş
197 Koyun sürüsüyle yaşayan çoban köpeğinde parazit kontrolü
198 Gebe sahibi olan genç kedide toksoplazma kaygısı
199 Kum sineklerinin yaygın olduğu bölgede kilo kaybı ve deri lezyonları
200 Kedi tırmığı sonrası sahibinde lenf düğümü şişliği
201 Kesimhanede akciğerde nodüller bulunan inek
202 Antibiyotik tedavisi sonrası sütün satışa verilmesi
203 Etlik piliç sürüsünde Salmonella izlemesi
204 Sert yürüyüş, çene kilitlenmesi ve üçüncü göz kapağı çıkması
205 Çivi ya da tel yuttuğu düşünülen ve yürümek istemeyen inek
206 Sürüde göz bulanıklığı ve sulanma
207 Köy tavuklarında ayaklarda kabuklanma ve bacak pullarında kalkma
208 Su kaplumbağasında kabukta yumuşama ve beyaz lekeler
209 Sahipsiz köpek popülasyonunda kuduz ve parazit kontrol programı
210 Barınakta yayılan kedi uyuzu: çalışanlarda da kaşıntı

Gastroenteroloji | Köpek

Vaka 001 · Kanlı ishal ve kusma olan aşısız yavru köpek


Hasta
- Köpek
- 6 aylık
- Erkek

Başvuru nedeni
- Şiddetli kusma
- Kanlı, kötü kokulu ishal
- Halsizlik ve iştahsızlık

Öykü ve bağlam
- Aşı programı tamamlanmamış
- Yeni sahiplenilmiş, parka götürülmüş

Fiziksel muayene
- Dehidratasyon (%8)
- Ateş: 40,1 °C
- Karın palpasyonunda ağrı

Ek bulgular
- Lökopeni: 1,8 ×10³/µL
- Dışkıda parvovirüs antijen testi pozitif



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Lökopeni bu tabloda neyi düşündürür?
2. Bu hastada önceliğiniz ne olmalı?
3. Diğer hayvanlar için hangi önlemler gerekir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kanin parvovirüs enteriti
- Hemorajik gastroenterit
- Yabancı cisim
- Paraziter enterit

Yorumlu çözüm
Aşısız yavruda kanlı ishal, kusma ve belirgin lökopeni parvovirüs enteritini güçlü şekilde düşündürür; antijen testi tanıyı destekler. Tedavi destekleyicidir: agresif sıvı tedavisi, elektrolit ve glikoz takibi, antiemetik, analjezi ve sekonder bakteriyel enfeksiyona karşı antibiyotik. Erken enteral beslenme bağırsak bütünlüğünü korur. Hasta izole edilmeli, ortam virüse etkili dezenfektanla temizlenmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Aşısız yavruda kanlı ishal = önce parvovirüs
- ✓ Lökopeni prognozu etkiler
- ✓ İzolasyon ve dezenfeksiyon tedavinin parçasıdır

Gastroenteroloji | Köpek

Vaka 002 · Kusma ve karın ağrısı olan, oyuncak kemiren köpek


Hasta
- Köpek
- 3 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Tekrarlayan kusma
- İştahsızlık
- Dışkılama yok

Öykü ve bağlam
- Evdeki oyuncaklar parçalanmış
- Belirtiler 24 saattir var

Fiziksel muayene
- Hafif dehidratasyon
- Kranial karında ağrı
- Rektal muayenede dışkı yok

Ek bulgular
- Röntgende gaz dolu, genişlemiş ince bağırsak ansları
- Ultrasonda hiperekoik obje ve proksimal dilatasyon



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Görüntülemede obstrüksiyonu düşündüren bulgular nelerdir?
2. Kusma tipi lokalizasyon hakkında ne söyler?
3. Ne zaman cerrahi karar verilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İnce bağırsak yabancı cisim obstrüksiyonu
- İntussusepsiyon
- Akut gastroenterit
- Pankreatit

Yorumlu çözüm
Akut kusma, dışkılamanın durması ve segmental bağırsak dilatasyonu mekanik obstrüksiyonu düşündürür. Ultrasonda görülen yabancı cisim ve proksimal genişleme tanıyı güçlendirir. Sıvı ve elektrolit dengesi sağlandıktan sonra enterotomi veya gerekirse enterektomi yapılır. Bağırsak canlılığı operasyon sırasında değerlendirilmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kusma + dışkı yokluğu = obstrüksiyonu düşünün
- ✓ Önce stabilizasyon, sonra cerrahi
- ✓ Bağırsak canlılığı mutlaka kontrol edilir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Gastroenteroloji | Kedi

Vaka 003 · Kilo kaybı ve kronik kusma olan kedi


Hasta
- Kedi
- 9 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Haftada 2-3 kez kusma
- Son 3 ayda kilo kaybı

Öykü ve bağlam
- İç ve dış parazit uygulaması düzenli
- Mama değişikliği yapılmamış

Fiziksel muayene
- Vücut kondisyon skoru 3/9
- Bağırsak ansları palpasyonda kalın

Ek bulgular
- Kobalamin düşük
- Ultrasonda bağırsak duvarı hafif kalın, katmanlar korunmuş



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kronik kusmada hangi sistemleri ayırt etmelisiniz?
2. Düşük kobalamin neyi gösterir?
3. Kesin tanı için hangi yöntem gerekir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kronik enteropati (inflamatuvar)
- Küçük hücreli intestinal lenfoma
- Hipertiroidizm
- Pankreatit

Yorumlu çözüm
Yaşlı kedide kronik kusma ve kilo kaybı varsa önce sistemik nedenler (hipertiroidizm, böbrek hastalığı) dışlanmalıdır. Düşük kobalamin distal ince bağırsak tutulumunu gösterir. Katmanları korunmuş kalınlaşma inflamatuvar enteropati ile küçük hücreli lenfomayı ayırt etmez; ayrım için tam kat biyopsi ve histopatoloji gerekir. Kobalamin takviyesi tedavinin parçasıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kronik kusma her zaman 'normal' değildir
- ✓ Kobalamin hem tanı hem tedavi için önemlidir
- ✓ IBD ve lenfoma ayrımı biyopsiyle yapılır

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Gastroenteroloji | Köpek

Vaka 004 · Yemekten sonra karın şişliği ve kusma girişimi olan büyük ırk köpek


Hasta
- Köpek
- 5 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Sonuçsuz kusma girişimi
- Karında hızlı şişlik
- Huzursuzluk

Öykü ve bağlam
- Yemekten hemen sonra koşmuş
- Büyük, derin göğüslü ırk

Fiziksel muayene
- Timpanik, gergin karın
- Taşikardi, zayıf nabız
- Soluk mukozalar, uzamış KDZ

Ek bulgular
- Sağ lateral röntgende 'çift kabarcık' görünümü
- Laktat: 6,8 mmol/L



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Bu hasta neden acil bir hastadır?
2. Röntgen bulgusu neyi gösterir?
3. Laktat değeri neden önemlidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Mide dilatasyonu-volvulus (GDV)
- Basit mide dilatasyonu
- Dalak torsiyonu

Yorumlu çözüm
Derin göğüslü köpekte sonuçsuz kusma girişimi ve hızlı karın şişliği GDV'nin klasik tablosudur. Şok tedavisi (sıvı), mide dekompresyonu ve en kısa sürede cerrahi derotasyon ile gastropeksi gerekir. Yüksek laktat doku perfüzyonunun bozulduğunu gösterir. Operasyon sonrası aritmiler açısından EKG takibi yapılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Sonuçsuz kusma + şişkin karın = GDV'yi düşünün
- ✓ Gastropeksi tekrarı önler
- ✓ Postoperatif aritmileri izleyin

Gastroenteroloji | Köpek

Vaka 005 · Kronik ishal ve kilo kaybına rağmen iştahı artmış köpek


Hasta
- Köpek
- 8 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Hacimli, açık renkli dışkı
- İştah artmış ama kilo kaybı

Öykü ve bağlam
- Belirtiler 2 aydır var
- Alman çoban köpeği

Fiziksel muayene
- Kas kaybı
- Tüylerde matlık

Ek bulgular
- Serum TLI: 1,2 µg/L (düşük)
- Folat yüksek, kobalamin düşük



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Polifaji ve kilo kaybı birlikte neyi düşündürür?
2. TLI testi neyi ölçer?
3. Tedavide neler eklenmelidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Ekzokrin pankreas yetmezliği (EPY)
- İnce bağırsak bakteriyel aşırı çoğalması
- Malabsorbsiyon

Yorumlu çözüm
Polifaji, kilo kaybı ve hacimli açık renkli dışkı maldigesyonu düşündürür; düşük TLI ekzokrin pankreas yetmezliğini doğrular. Tedavide her öğüne pankreatik enzim takviyesi ve kobalamin desteği verilir. Sekonder bağırsak flora değişikliği varsa ek tedavi gerekebilir. Yanıt genellikle birkaç hafta içinde kilo artışıyla görülür.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ İştah artışı + kilo kaybı = maldigesyonu düşünün
- ✓ TLI, EPY için en değerli testtir
- ✓ Kobalamin eksikliğini atlamayın

Gastroenteroloji | Kedi

Vaka 006 · Tüy yumağı sonrası ağız içinde ip bulunan kedi


Hasta
- Kedi
- 4 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kusma
- Yutkunma güçlüğü
- İştahsızlık

Öykü ve bağlam
- Evde dikiş ipi ile oynuyormuş

Fiziksel muayene
- Dil altında halka şeklinde ip
- Karın palpasyonunda bağırsaklar büzülmüş

Ek bulgular
- Röntgende pliseli (akordeon) bağırsak görünümü



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Ağız muayenesi neden kritik?
2. İpi çekmek neden tehlikelidir?
3. Hangi komplikasyonlar gelişebilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Lineer yabancı cisim
- İntussusepsiyon
- Gastroenterit

Yorumlu çözüm
Kedide kusma ile birlikte dil altında ip görülmesi lineer yabancı cismi düşündürür. Bağırsakların akordeon gibi toplanması tipiktir. İpi ağızdan çekmek bağırsak perforasyonuna yol açabilir; dil altındaki ip kesilir ve cerrahi değerlendirme yapılır. Gecikmede perforasyon ve peritonit gelişebilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kusan kedide dil altını mutlaka kontrol edin
- ✓ İpi asla çekmeyin
- ✓ Pliseli bağırsak = lineer yabancı cisim

Vaka 007

Gastroenteroloji | Köpek

Vaka 007 · Ağız kokusu ve sarılık görülen yaşlı köpek


Hasta
- Köpek
- 11 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Gözlerde sararma
- İştahsızlık
- Kilo kaybı

Öykü ve bağlam
- Daha önce karaciğer enzimleri hafif yüksekmiş

Fiziksel muayene
- İkterik sklera ve mukozalar
- Kranial karında hepatomegali

Ek bulgular
- Total bilirubin: 4,2 mg/dL
- ALT ve ALP belirgin yüksek
- Ultrasonda karaciğerde nodüller



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. İkterin prehepatik, hepatik ve posthepatik ayrımını nasıl yaparsınız?
2. Hematokrit neden önemlidir?
3. Kesin tanı için ne gerekir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hepatik neoplazi
- Kronik hepatit
- Ekstrahepatik safra yolu tıkanıklığı
- Hemolitik anemi

Yorumlu çözüm
İkter değerlendirmesinde önce hematokrit ile hemoliz dışlanır. Normal hematokrit ve yüksek karaciğer enzimleri hepatik veya posthepatik nedeni düşündürür. Ultrasonda safra yolları ve karaciğer parankimi değerlendirilir; nodüller için ince iğne aspirasyonu veya biyopsi gerekir. Pıhtılaşma testleri biyopsiden önce yapılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ İkterde ilk adım: hematokrit
- ✓ Ultrason safra yollarını değerlendirir
- ✓ Biyopsi öncesi koagülasyonu kontrol edin

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Gastroenteroloji | Köpek

Vaka 008 · Çöp karıştırdıktan sonra kanlı ishal ve kusma olan köpek


Hasta
- Köpek
- 2 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Akut kanlı, jöle kıvamında ishal
- Kusma

Öykü ve bağlam
- Aşıları tam
- Bir gün önce çöpe girmiş

Fiziksel muayene
- Hafif dehidratasyon
- Ateş yok
- Genel durum orta

Ek bulgular
- Hematokrit: %62
- Total protein normal
- Parvovirüs testi negatif



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Yüksek hematokrit ve normal protein neyi düşündürür?
2. Bu tablo parvovirüsten nasıl ayrılır?
3. Antibiyotik her zaman gerekli midir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Akut hemorajik diyare sendromu (AHDS)
- Diyetsel indiskresyon
- Parvovirüs enteriti

Yorumlu çözüm
Aşılı genç köpekte ani kanlı ishal, belirgin hemokonsantrasyon ve normal total protein akut hemorajik diyare sendromunu düşündürür. Temel tedavi sıvı tedavisidir; çoğu hasta 24-48 saatte iyileşir. Sepsis bulgusu yoksa antibiyotik rutin olarak gerekli değildir. Parvovirüs testi ayırıcı tanı için önemlidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Hematokrit ↑ + protein normal = AHDS'yi düşünün
- ✓ Sıvı tedavisi temeldir
- ✓ Antibiyotik sadece sepsis şüphesinde

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Dermatoloji | Köpek

Vaka 009 · Yoğun kaşıntı ve kulak kenarında kabuklanma olan köpek


Hasta
- Köpek
- 3 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Gece de devam eden kaşıntı
- Kulak kenarlarında kabuk

Öykü ve bağlam
- Evdeki diğer köpekte de kaşıntı
- Sahibinin kolunda kızarıklık

Fiziksel muayene
- Kulak kenarı, dirsek ve karında papül ve kabuk
- Pinnal-pedal refleks pozitif

Ek bulgular
- Derin deri kazıntısında Sarcoptes akarı



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Pinnal-pedal refleks neyi düşündürür?
2. Kazıntının negatif olması tanıyı dışlar mı?
3. Neden tüm temaslılar tedavi edilmeli?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Sarkoptik uyuz
- Atopik dermatit
- Pire alerjisi

Yorumlu çözüm
Yoğun kaşıntı, kulak kenarında kabuk, pozitif pinnal-pedal refleks ve temaslılarda belirti sarkoptik uyuzu düşündürür. Akar her zaman bulunamaz; negatif kazıntıda tedaviye yanıt denemesi yapılabilir. Uygun antiparaziter ile tüm temaslı hayvanlar tedavi edilmelidir. Zoonotik risk sahibine açıklanmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Negatif kazıntı uyuzu dışlamaz
- ✓ Tüm temaslılar tedavi edilir
- ✓ Sarkoptik uyuz zoonotiktir

Dermatoloji | Köpek

Vaka 010 · Mevsimsel pati yalama ve kulak iltihabı olan genç köpek


Hasta
- Köpek
- 2 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Patileri yalama
- Tekrarlayan kulak iltihabı

Öykü ve bağlam
- Belirtiler ilkbaharda artıyor
- Pire kontrolü düzenli

Fiziksel muayene
- Pati arası eritem ve tükürük boyanması
- Bilateral eritematöz otitis eksterna

Ek bulgular
- Kulak sitolojisinde Malassezia
- Eliminasyon diyetine rağmen belirtiler devam



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Atopik dermatit tanısı nasıl konur?
2. Sekonder enfeksiyonların rolü nedir?
3. Uzun vadeli yönetim neleri içerir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Atopik dermatit
- Besin alerjisi
- Pire alerjisi dermatiti

Yorumlu çözüm
Atopik dermatit dışlama tanısıdır: pire alerjisi, ektoparazitler ve besin alerjisi elendikten sonra klinik kriterlere göre konur. Mevsimsellik çevresel alerjenleri düşündürür. Sekonder Malassezia ve bakteriyel enfeksiyonlar tedavi edilmeli, kaşıntı kontrol altına alınmalıdır. Uzun vadede alerjen spesifik immünoterapi seçeneği değerlendirilebilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Atopi bir dışlama tanısıdır
- ✓ Sekonder enfeksiyonları atlamayın
- ✓ Yönetim ömür boyudur

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Dermatoloji | Kedi

Vaka 011 · Yuvarlak tüy dökülmesi alanları olan yavru kedi


Hasta
- Kedi
- 1 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Başta ve patilerde yuvarlak tüysüz alanlar

Öykü ve bağlam
- Barınaktan yeni sahiplenilmiş
- Evdeki çocukta kızarık halka şeklinde lezyon

Fiziksel muayene
- Pullanmalı, kırık tüylü dairesel alopesi
- Kaşıntı hafif

Ek bulgular
- Wood lambasında bazı tüylerde yeşil floresan
- Trikogramda tüy şaftında artrospor



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Wood lambasının sınırlılıkları nelerdir?
2. Altın standart tanı yöntemi hangisidir?
3. Çevre neden tedavi edilmelidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Dermatofitoz (Microsporum canis)
- Demodikoz
- Psikojenik alopesi

Yorumlu çözüm
Yavru kedide dairesel alopesi ve evde zoonotik lezyon dermatofitozu düşündürür. Wood lambası sadece bazı Microsporum suşlarını gösterir; kesin tanı mantar kültürü veya PCR ile konur. Tedavi sistemik antifungal ile topikal tedaviyi birleştirir. Sporlar ortamda uzun süre yaşadığı için ev temizliği şarttır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kültür veya PCR tanıyı doğrular
- ✓ Topikal + sistemik tedavi birlikte
- ✓ Çevre dekontaminasyonu unutulmamalı

Dermatoloji | Köpek

Vaka 012 · Simetrik tüy dökülmesi ve kilo alımı olan köpek


Hasta
- Köpek
- 9 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Gövdede simetrik tüy kaybı
- Halsizlik, kilo alma

Öykü ve bağlam
- Soğuğa tahammülsüzlük
- Kaşıntı yok

Fiziksel muayene
- Gövdede bilateral simetrik alopesi
- Bradikardi
- Kuyrukta 'fare kuyruğu' görünümü

Ek bulgular
- Total T4 düşük, TSH yüksek
- Hiperkolesterolemi



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kaşıntısız simetrik alopesi neyi düşündürür?
2. Sadece T4 düşüklüğü tanı için yeterli mi?
3. Tedavi nasıl izlenir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hipotiroidizm
- Hiperadrenokortisizm
- Alopesi X

Yorumlu çözüm
Kaşıntısız simetrik alopesi, letarji, kilo alma ve bradikardi hipotiroidizmi düşündürür. Ötiroid hasta sendromu nedeniyle tek başına düşük T4 yeterli değildir; TSH ve gerekirse serbest T4 ile desteklenir. Levotiroksin ile tedavi edilir ve 4-6 hafta sonra ilaç sonrası T4 ölçümüyle doz ayarlanır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kaşıntısız simetrik alopesi = endokrin nedenleri düşünün
- ✓ Düşük T4 tek başına yetmez
- ✓ Doz, kontrol T4 ile ayarlanır

Dermatoloji | Köpek

Vaka 013 · Gözlerin çevresinde ve patilerde tüy kaybı olan yavru köpek


Hasta
- Köpek
- 7 aylık
- Erkek

Başvuru nedeni
- Göz çevresinde tüysüz alanlar
- Ön patilerde kızarıklık

Öykü ve bağlam
- Kaşıntı yok
- Kardeşinde benzer belirti

Fiziksel muayene
- Periokuler ve pedal alopesi
- Hafif eritem ve komedonlar

Ek bulgular
- Derin deri kazıntısında çok sayıda Demodex canis



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Juvenil lokal demodikoz neden çoğu zaman kendiliğinden iyileşir?
2. Generalize form ne zaman düşünülür?
3. Yetişkinde demodikoz neyi araştırmayı gerektirir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Juvenil demodikoz
- Dermatofitoz
- Bakteriyel follikülit

Yorumlu çözüm
Genç köpekte kaşıntısız periokuler ve pedal alopesi ile derin kazıntıda Demodex demodikozu doğrular. Lokal formlar çoğunlukla bağışıklık olgunlaştıkça iyileşir; generalize formda izoksazolin grubu ilaçlarla tedavi edilir. Tedavi, ardışık iki negatif kazıntıya kadar sürdürülür. Yetişkin başlangıçlı demodikozda altta yatan hastalık araştırılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Demodikoz için derin kazıntı gerekir
- ✓ Tedavi negatif kazıntılara kadar sürer
- ✓ Yetişkinde altta yatan nedeni arayın

Enfeksiyon hastalıkları | Köpek

Vaka 014 · Ateş, halsizlik, trombositopeni ve kene öyküsü olan köpek


Hasta
- Köpek
- 4 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Apati
- Ateş
- İştahsızlık

Öykü ve bağlam
- Kenelerin sık görüldüğü bölgede yaşıyor
- Düzensiz antiparaziter koruma

Fiziksel muayene
- Ateş: 40,2 °C
- Hafif soluk mukozalar
- Lenf düğümlerinde büyüme

Ek bulgular
- Trombosit: 45 ×10³/µL
- Hafif anemi
- Enfeksiyon süreciyle uyumlu değişiklikler



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kene öyküsü bu köpekte ne anlama geliyor?
2. Trombositopeninin anlamı nedir?
3. Hangi özel testler incelemeyi tamamlayabilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Köpek ehrlichiosisi
- Anaplazmoz
- Babesiyoz
- İmmün aracılı hastalık

Yorumlu çözüm
Kene öyküsüyle birlikte görülen ateş, trombositopeni ve hematolojik değişiklikler vektörle bulaşan hastalıkları düşündürür. Ancak eş zamanlı enfeksiyonlar da olasılık dışı değildir. Bu nedenle serolojik ve PCR testleriyle özgül tanı konulmalı, epidemiyolojik bağlam değerlendirilmelidir. Doksisiklin sık kullanılan bir tedavi seçeneğidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Epidemiyoloji tanının bir parçasıdır
- ✓ Trombositopeni tek başına bir hastalığı tanımlamaz
- ✓ Vektörle bulaşan hastalıklar benzer bulgular gösterebilir

Enfeksiyon hastalıkları | Köpek

Vaka 015 · Göz ve burun akıntısı, öksürük ve ardından kasılmalar görülen köpek


Hasta
- Köpek
- 1 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Mukopürülan burun ve göz akıntısı
- Öksürük
- Son günlerde çene kasılmaları

Öykü ve bağlam
- Aşı durumu bilinmiyor
- Sokaktan sahiplenilmiş

Fiziksel muayene
- Ateş
- Patilerde hiperkeratoz
- Çiğneme kaslarında miyoklonus

Ek bulgular
- Konjonktival yaymada inklüzyon cisimcikleri
- PCR: kanin distemper virüsü pozitif



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Çok sistemli tutulum hangi viral hastalığı düşündürür?
2. Nörolojik belirtilerin prognoza etkisi nedir?
3. Korunmada en önemli adım nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kanin distemper
- Kennel öksürüğü kompleksi
- Toksoplazmoz

Yorumlu çözüm
Solunum, göz ve ardından nörolojik belirtiler ile pati hiperkeratozu kanin distemperi düşündürür. Spesifik antiviral tedavi yoktur; destekleyici tedavi, sekonder enfeksiyonların kontrolü ve nöbet yönetimi yapılır. Nörolojik tutulum prognozu kötüleştirir. Aşılama en etkili korunma yöntemidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Solunum + nörolojik belirti = distemperi düşünün
- ✓ Tedavi destekleyicidir
- ✓ Aşılama temel korunmadır

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Enfeksiyon hastalıkları | Kedi

Vaka 016 · Karında sıvı birikimi ve ateşi olan genç kedi


Hasta
- Kedi
- 2 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Karında büyüme
- İştahsızlık
- Kilo kaybı

Öykü ve bağlam
- Çok kedili evden geliyor
- Antibiyotiğe yanıt vermeyen ateş

Fiziksel muayene
- Karında dalgalanma
- Ateş: 39,9 °C
- Hafif sarılık

Ek bulgular
- Abdominal sıvı: saman sarısı, yapışkan, protein yüksek
- Albumin/globulin oranı: 0,4
- Sıvıda koronavirüs PCR pozitif



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Efüzyon analizi tanıda nasıl yardımcı olur?
2. Düşük A/G oranı neyi gösterir?
3. Bu hastalıkta güncel tedavi seçenekleri nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Efüzif kedi enfeksiyöz peritoniti (FIP)
- Septik peritonit
- Lenfoma
- Kalp yetmezliği

Yorumlu çözüm
Genç ve çok kedili ortamdan gelen kedide yüksek proteinli yapışkan efüzyon, ateş ve düşük A/G oranı efüzif FIP'i güçlü şekilde düşündürür. Efüzyonda koronavirüs RNA'sının gösterilmesi tanıyı destekler. Günümüzde antiviral tedavilerle önemli iyileşme oranları bildirilmektedir; tedavi süresi ve izlem veteriner hekim kontrolünde yapılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Efüzyon analizi en değerli adımdır
- ✓ Düşük A/G oranı FIP'i destekler
- ✓ Antiviral tedavi prognozu değiştirmiştir

Enfeksiyon hastalıkları | Kedi

Vaka 017 · Dişeti iltihabı ve tekrarlayan enfeksiyonları olan sokak kedisi


Hasta
- Kedi
- 5 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Ağız ağrısı
- Tekrarlayan solunum enfeksiyonları

Öykü ve bağlam
- Kısırlaştırılmamış, dışarı çıkıyor
- Kavga yaraları öyküsü

Fiziksel muayene
- Şiddetli gingivostomatit
- Lenfadenopati

Ek bulgular
- FIV antikor testi pozitif
- FeLV antijen testi negatif



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. FIV nasıl bulaşır?
2. Pozitif test her zaman hastalık anlamına gelir mi?
3. Yönetimde neler önemlidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- FIV enfeksiyonu ile ilişkili immünsüpresyon
- Kronik gingivostomatit
- FeLV enfeksiyonu

Yorumlu çözüm
Kavga yaraları olan dışarı çıkan erkek kedide tekrarlayan enfeksiyonlar ve stomatit FIV'i düşündürür; virüs başlıca ısırıkla bulaşır. Pozitif kedi uzun yıllar sağlıklı yaşayabilir; aşılı yavrularda testin yorumlanması dikkat gerektirir. Yönetim, sekonder enfeksiyonların erken tedavisi, kısırlaştırma ve kedinin evde tutulmasını içerir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ FIV başlıca ısırıkla bulaşır
- ✓ Pozitif kedi uzun süre iyi yaşayabilir
- ✓ Sekonder enfeksiyonları erken tedavi edin

Enfeksiyon hastalıkları | Köpek

Vaka 018 · Göl kenarından sonra böbrek yetmezliği ve sarılık gelişen köpek


Hasta
- Köpek
- 6 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kusma
- Az idrar yapma
- Sarılık

Öykü ve bağlam
- Kırsal alanda yaşıyor
- Durgun suyla temas

Fiziksel muayene
- İkter
- Böbrek bölgesinde ağrı
- Dehidratasyon

Ek bulgular
- Üre ve kreatinin yüksek
- Bilirubin yüksek
- MAT/PCR: Leptospira pozitif



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Böbrek ve karaciğer birlikte tutulduğunda neyi düşünürsünüz?
2. Klinik personel için hangi önlemler gerekir?
3. Tedavide temel ilaç nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Leptospiroz
- Toksik akut böbrek hasarı
- İmmün aracılı hemolitik anemi

Yorumlu çözüm
Durgun suyla temas eden köpekte akut böbrek hasarı ve ikter leptospirozu düşündürür. Tanı PCR ve seroloji ile desteklenir. Tedavide antibiyotik (önce penisilin türevleri veya doksisiklin) ve sıvı tedavisi yapılır; idrar çıkışı yakından izlenir. Hastalık zoonotiktir; idrarla temas eden personel eldiven kullanmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Böbrek + karaciğer tutulumu = leptospirozu düşünün
- ✓ İdrar çıkışını izleyin
- ✓ Zoonotiktir, koruyucu ekipman kullanın

Nöroloji | Köpek

Vaka 019 · Arka bacaklarında ani felç gelişen kısa bacaklı köpek


Hasta
- Köpek
- 5 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Arka bacaklarda ani güçsüzlük
- Sırt ağrısı

Öykü ve bağlam
- Merdiven çıkarken ağlamış
- Dachshund ırkı

Fiziksel muayene
- Paraparezi, propriosepsiyon kaybı
- Torakolomber bölgede ağrı
- Derin ağrı duyusu mevcut

Ek bulgular
- MR'da T13-L1 arasında disk ekstrüzyonu ve omurilik basısı



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Derin ağrı duyusu neden en önemli prognostik bulgudur?
2. Lezyon yeri nörolojik muayeneyle nasıl belirlenir?
3. Cerrahi ne zaman önerilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İntervertebral disk hastalığı (Hansen tip I)
- Fibrokartilajinöz emboli
- Spinal travma

Yorumlu çözüm
Kondrodistrofik ırkta ani başlayan ağrılı paraparezi Hansen tip I disk ekstrüzyonunu düşündürür. Nörolojik muayene lezyonu T3-L3 segmentine yerleştirir. Derin ağrı duyusu korunmuşsa prognoz iyidir. Belirgin nörolojik açık veya kötüleşme varsa cerrahi dekompresyon (hemilaminektomi) önerilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Derin ağrı duyusu prognozu belirler
- ✓ Önce nöroanatomik lokalizasyon
- ✓ Kötüleşen hastada cerrahi geciktirilmez

Nöroloji | Köpek

Vaka 020 · Nöbetler arasında tamamen normal olan genç köpek


Hasta
- Köpek
- 2 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Ayda bir genel tonik-klonik nöbet

Öykü ve bağlam
- İlk nöbet 1 yaşında
- Toksin teması yok

Fiziksel muayene
- Nöbetler arası nörolojik muayene normal

Ek bulgular
- Hemogram ve biyokimya normal
- Safra asidi normal
- MR normal



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hangi yaş aralığı idiyopatik epilepsiyi destekler?
2. Tedaviye ne zaman başlanır?
3. Sahibine hangi bilgiler verilmelidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İdiyopatik epilepsi
- Yapısal beyin hastalığı
- Metabolik nöbet (portosistemik şant)

Yorumlu çözüm
6 ay-6 yaş arasında başlayan, nöbetler arası normal nörolojik muayene ve normal tetkiklerle seyreden tekrarlayan nöbetler idiyopatik epilepsiyi destekler. Sık nöbet, küme nöbet veya status epileptikus varsa antiepileptik tedavi başlanır. Sahibine nöbet günlüğü tutması ve ilacı düzenli vermesi öğretilmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Önce metabolik ve yapısal nedenleri dışlayın
- ✓ Tedavi kararı nöbet sıklığına göredir
- ✓ Nöbet günlüğü tedavinin parçasıdır

Nöroloji | Köpek

Vaka 021 · Ani baş eğikliği ve göz titremesi olan yaşlı köpek


Hasta
- Köpek
- 12 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Başı bir yana eğik
- Dengesizlik, yuvarlanma
- Kusma

Öykü ve bağlam
- Belirtiler sabah aniden başlamış

Fiziksel muayene
- Sola baş eğikliği
- Horizontal nistagmus
- Propriosepsiyon normal

Ek bulgular
- Otoskopide kulak zarı sağlam
- Kan tetkikleri normal



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Periferik ve santral vestibüler hastalık nasıl ayrılır?
2. Bu hastada prognoz nasıldır?
3. Hangi destekleyici tedaviler verilebilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İdiyopatik vestibüler sendrom
- Orta-iç kulak iltihabı
- Santral vestibüler hastalık (neoplazi, inme)

Yorumlu çözüm
Yaşlı köpekte ani baş eğikliği, horizontal nistagmus ve korunmuş propriosepsiyon periferik vestibüler hastalığı düşündürür; kulak muayenesi normal ise idiyopatik vestibüler sendrom olasıdır. Belirtiler genellikle günler içinde düzelir. Destekleyici tedavi antiemetik, sıvı ve güvenli ortamı içerir. Propriosepsiyon kaybı veya vertikal nistagmus santral lezyonu düşündürür.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Propriosepsiyon kaybı santral lezyonu düşündürür
- ✓ Kulak muayenesini atlamayın
- ✓ İdiyopatik form genelde kendiliğinden düzelir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Nöroloji | Kedi

Vaka 022 · Arka bacaklarında ani felç ve soğuk patileri olan kedi


Hasta
- Kedi
- 8 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Arka bacakları sürüme
- Şiddetli ağrı, bağırma

Öykü ve bağlam
- Belirtiler dakikalar içinde başlamış

Fiziksel muayene
- Femoral nabız alınamıyor
- Arka patiler soğuk, pedler soluk/siyanotik
- Kalpte galop ritmi

Ek bulgular
- Ekokardiyografide sol atriyum genişlemesi
- Arka patide glukoz, ön patiye göre belirgin düşük



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Bu tablo nörolojik mi, vasküler mi?
2. Altta yatan hastalık nedir?
3. Prognozu ne etkiler?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Aortik tromboemboli (kalp hastalığına bağlı)
- Spinal travma
- Disk hastalığı

Yorumlu çözüm
Kedide ani, ağrılı arka bacak felci, alınamayan femoral nabız ve soğuk patiler aortik tromboemboliyi düşündürür; çoğunlukla hipertrofik kardiyomiyopatiye bağlıdır. Tedavide güçlü analjezi, antitrombotik ilaç ve kalp yetmezliği yönetimi yer alır. Vücut ısısı, motor fonksiyonun kalması ve kalp durumu prognozu belirler.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Nabız yok + soğuk pati = tromboemboli
- ✓ Önce ağrı kontrolü
- ✓ Altta yatan kalp hastalığını arayın

Kardiyoloji | Köpek

Vaka 023 · Gece öksürüğü ve egzersiz intoleransı olan küçük ırk köpek


Hasta
- Köpek
- 10 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Gece artan öksürük
- Yürüyüşte çabuk yorulma

Öykü ve bağlam
- Kalpte üfürüm 2 yıldır biliniyor
- Cavalier King Charles ırkı

Fiziksel muayene
- Sol apikal sistolik üfürüm (5/6)
- Solunum sayısı istirahatte 48/dk
- Akciğerde krepitasyon

Ek bulgular
- Röntgende kardiyomegali ve perihiler ödem
- Ekokardiyografide miksomatöz mitral kapak dejenerasyonu



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. İstirahat solunum sayısı neden önemlidir?
2. Ödem ile kronik bronşit nasıl ayrılır?
3. Tedavinin temel ilaçları nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Mitral kapak hastalığına bağlı konjestif kalp yetmezliği
- Kronik bronşit
- Trakea kollapsı

Yorumlu çözüm
Küçük ırk yaşlı köpekte yüksek dereceli sol apikal üfürüm, artmış istirahat solunum sayısı ve perihiler ödem miksomatöz mitral kapak hastalığına bağlı sol kalp yetmezliğini gösterir. Tedavide diüretik (furosemid), pimobendan ve ACE inhibitörü kullanılır. Sahip evde uyurken solunum sayısını izlemelidir; 30/dk üzeri uyarı işaretidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ İstirahat solunum sayısı evde izlenir
- ✓ Röntgen ödemi doğrular
- ✓ Pimobendan + diüretik temel tedavidir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Kardiyoloji | Köpek

Vaka 024 · Bayılma ve karında sıvı birikimi olan dev ırk köpek


Hasta
- Köpek
- 7 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Egzersizde bayılma
- Karında şişlik
- Kilo kaybı

Öykü ve bağlam
- Doberman ırkı

Fiziksel muayene
- Düzensiz ritim, nabız açığı
- Asit
- Juguler venöz distansiyon

Ek bulgular
- EKG: atriyal fibrilasyon ve ventriküler erken atımlar
- Ekokardiyografi: sol ventrikül dilatasyonu, azalmış kasılma



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Bayılmanın kardiyak nedeni nasıl düşünülür?
2. Bu ırkta hangi kardiyomiyopati sık görülür?
3. Ritim bozukluğu neden önemlidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Dilate kardiyomiyopati
- Perikardiyal efüzyon
- Taurin eksikliği ile ilişkili DKM

Yorumlu çözüm
Dobermanda bayılma, aritmiler ve ventrikül dilatasyonu dilate kardiyomiyopatiyi düşündürür. Ani ölüm riski ventriküler aritmilerle ilişkilidir; Holter ile değerlendirme önerilir. Tedavi pimobendan, diüretik, ACE inhibitörü ve gerekirse antiaritmik ilaçları içerir. Diyetsel nedenler de sorgulanmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Bayılan dev ırk köpekte kalbi düşünün
- ✓ Holter aritmiyi gösterir
- ✓ Diyet öyküsünü sorgulayın

Kardiyoloji | Kedi

Vaka 025 · Ağız açık solunum yapan ve üfürümü olan kedi


Hasta
- Kedi
- 6 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Hızlı ve zorlu solunum
- Saklanma

Öykü ve bağlam
- Daha önce belirti yok
- Stresli taşınma sonrası başlamış

Fiziksel muayene
- Solunum: 72/dk, ağız açık
- Galop ritmi
- Hipotermi: 37,1 °C

Ek bulgular
- Odak ultrasonda (POCUS) plevral efüzyon
- Ekokardiyografide konsantrik sol ventrikül hipertrofisi, sol atriyum genişlemesi
- NT-proBNP yüksek



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Dispneik kedide ilk adım ne olmalı?
2. Torasentez ne zaman yapılır?
3. Uzun vadeli risk nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hipertrofik kardiyomiyopati ve kalp yetmezliği
- Astım
- Piyotoraks

Yorumlu çözüm
Dispneik kedide önce oksijen ve minimum stresle stabilizasyon yapılır; POCUS hızlı bilgi verir. Plevral efüzyon solunumu kısıtlıyorsa torasentez hem tanısal hem tedavidir. Ekokardiyografi hipertrofik kardiyomiyopatiyi gösterir; tedavide diüretik ve tromboemboli riski nedeniyle antitrombotik ilaç kullanılır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Dispneik kedide önce stabilizasyon
- ✓ POCUS ile efüzyonu hızla görün
- ✓ HCM'de tromboemboli riskini unutmayın

Kardiyoloji | Köpek

Vaka 026 · Halsizlik ve boğuk kalp sesleri olan köpek


Hasta
- Köpek
- 9 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Ani halsizlik
- Karında hafif şişlik

Öykü ve bağlam
- Alman çoban köpeği

Fiziksel muayene
- Boğuk kalp sesleri
- Zayıf femoral nabız
- Pulsus paradoksus

Ek bulgular
- POCUS: perikardiyal efüzyon ve sağ atriyum kollapsı
- Sağ atriyum aurikulasında kitle



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kardiyak tamponat nasıl tanınır?
2. Perikardiyosentez neden acildir?
3. Kitle neyi düşündürür?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hemanjiyosarkoma bağlı perikardiyal efüzyon
- İdiyopatik perikardiyal efüzyon
- Kemodektoma

Yorumlu çözüm
Boğuk kalp sesleri, zayıf nabız ve sağ atriyum kollapsı kardiyak tamponatı gösterir; acil perikardiyosentez hayat kurtarıcıdır. Sağ atriyum aurikulasında kitle büyük ırk köpekte en çok hemanjiyosarkomu düşündürür. Prognoz ve tedavi seçenekleri sahiple dürüstçe konuşulmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Tamponatta perikardiyosentez acildir
- ✓ Sağ atriyum kitlesi = hemanjiyosarkomu düşünün
- ✓ POCUS hızlı tanı sağlar

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Kardiyoloji | Köpek

Vaka 027 · Öksürük ve egzersiz intoleransı olan, korunmasız köpek


Hasta
- Köpek
- 4 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kuru öksürük
- Çabuk yorulma

Öykü ve bağlam
- Sivrisineklerin yoğun olduğu bölge
- Kalp kurdu koruması yapılmamış

Fiziksel muayene
- Hafif dispne
- Sağ tarafta üfürüm

Ek bulgular
- Dirofilaria immitis antijen testi pozitif
- Mikrofilarya görüldü
- Röntgende genişlemiş pulmoner arterler



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kalp kurdu nasıl bulaşır?
2. Tedavi sırasında egzersiz neden kısıtlanır?
3. Korunma nasıl sağlanır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Dirofilariozis (kalp kurdu hastalığı)
- Kronik bronşit
- Pulmoner hipertansiyon

Yorumlu çözüm
Sivrisinekle bulaşan Dirofilaria immitis pulmoner arterlerde hasara ve sağ kalp yükünün artmasına yol açar. Tedavi kurallara uygun adultisit protokol, doksisiklin ve makrosiklik laktonları içerir. Ölen kurtlar tromboemboliye yol açabileceğinden tedavi boyunca katı egzersiz kısıtlaması gerekir. Düzenli koruyucu ilaç en iyi önlemdir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Antijen testi tanıda temeldir
- ✓ Tedavide egzersiz kısıtlaması şart
- ✓ Koruma tedaviden kolaydır

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Endokrinoloji | Köpek

Vaka 028 · Çok su içen, çok idrar yapan ve kilo kaybeden köpek


Hasta
- Köpek
- 9 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Poliüri ve polidipsi
- İştah artmış, kilo kaybı

Öykü ve bağlam
- Kısırlaştırılmamış
- Belirtiler 1 aydır var

Fiziksel muayene
- Bilateral katarakt başlangıcı
- Kondisyon düşük

Ek bulgular
- Kan glukozu: 420 mg/dL
- Glukozüri
- Fruktozamin yüksek
- Keton negatif



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Fruktozamin neden önemlidir?
2. Kısırlaştırma bu hastada neden önerilir?
3. İnsülin dozu nasıl ayarlanır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Diabetes mellitus
- Hiperadrenokortisizm
- Böbrek glukozürisi

Yorumlu çözüm
Poliüri, polidipsi, polifaji ve kilo kaybı ile kalıcı hiperglisemi ve glukozüri diabetes mellitusu gösterir; fruktozamin kronik hiperglisemiyi doğrular. Tedavi insülin, düzenli öğün ve egzersizi içerir. Dişide diöstrus insülin direncine yol açabildiğinden kısırlaştırma önerilir. Doz, glukoz eğrisi veya sürekli glukoz izlemiyle ayarlanır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Fruktozamin kronik hiperglisemiyi gösterir
- ✓ Kısırlaştırma insülin direncini azaltır
- ✓ Doz, glukoz eğrisiyle ayarlanır

Endokrinoloji | Kedi

Vaka 029 · İştahı artmasına rağmen kilo kaybeden hiperaktif yaşlı kedi

Hasta
- Kedi
- 13 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Kilo kaybı
- Aşırı iştah
- Huzursuzluk ve gece miyavlama

Öykü ve bağlam
- Belirtiler 4 aydır var

Fiziksel muayene
- Taşikardi: 240/dk
- Palpe edilebilen tiroid bezi
- Mat tüyler

Ek bulgular
- Total T4: 9,8 µg/dL (yüksek)
- ALT hafif yüksek
- Kreatinin normal sınırda



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hipertiroidizm böbrek değerlerini nasıl etkiler?
2. Tedavi seçenekleri nelerdir?
3. Hipertansiyon neden kontrol edilmelidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hipertiroidizm
- Diabetes mellitus
- Kronik enteropati

Yorumlu çözüm
Yaşlı kedide polifaji, kilo kaybı, taşikardi ve palpe edilebilen tiroid bezi hipertiroidizmi düşündürür; yüksek T4 tanıyı doğrular. Hipertiroidizm glomerüler filtrasyonu artırarak böbrek hastalığını maskeleyebilir; tedavi sonrası böbrek değerleri yeniden kontrol edilmelidir. Seçenekler: antitiroid ilaç, radyoaktif iyot, diyet veya cerrahi. Kan basıncı ölçülmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Hipertiroidizm böbrek hastalığını maskeleyebilir
- ✓ Tedavi sonrası kreatinini tekrar ölçün
- ✓ Kan basıncını kontrol edin

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Endokrinoloji | Köpek

Vaka 030 · Göbekli görünüm, tüy dökülmesi ve aşırı su içme olan köpek


Hasta
- Köpek
- 10 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Poliüri, polidipsi
- Karında sarkma
- İnce deri ve tüy kaybı

Öykü ve bağlam
- Aşırı nefes nefese kalma

Fiziksel muayene
- Sarkık karın
- Hepatomegali
- İnce deri, komedonlar

Ek bulgular
- ALP belirgin yüksek
- İdrar dansitesi düşük
- ACTH stimülasyon testinde abartılı kortizol yanıtı



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hangi testler hiperadrenokortisizmi destekler?
2. Hipofiz ve adrenal kaynaklı form nasıl ayrılır?
3. Tedavi nasıl izlenir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hiperadrenokortisizm (Cushing)
- Diabetes mellitus
- Hipotiroidizm

Yorumlu çözüm
Poliüri-polidipsi, sarkık karın, alopesi ve yüksek ALP hiperadrenokortisizmi düşündürür. Tanı düşük doz deksametazon supresyon veya ACTH stimülasyon testiyle desteklenir; adrenal ultrasonografi ve endojen ACTH ayrım için kullanılır. Tedavide trilostan sık tercih edilir ve klinik belirtiler ile kortizol ölçümleriyle izlenir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Klinik şüphe olmadan test yapmayın
- ✓ Ultrason hipofiz/adrenal ayrımına yardım eder
- ✓ Trilostan dozu klinikle birlikte izlenir

Endokrinoloji | Köpek

Vaka 031 · Dalgalı seyirli kusma, halsizlik ve bradikardi olan genç köpek


Hasta
- Köpek
- 4 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Aralıklı kusma ve ishal
- Halsizlik
- Ani kollaps

Öykü ve bağlam
- Belirtiler aylardır gelip gidiyor

Fiziksel muayene
- Dehidratasyon
- Bradikardi: 50/dk
- Zayıf nabız

Ek bulgular
- Sodyum: 128 mmol/L, potasyum: 7,4 mmol/L
- Na/K oranı: 17
- ACTH stimülasyon testinde kortizol yanıtı yok



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Stresli hastada bradikardi neden alarm işaretidir?
2. Na/K oranı neyi düşündürür?
3. Acil tedavide öncelikler nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hipoadrenokortisizm (Addison)
- Akut böbrek hasarı
- Gastroenterit

Yorumlu çözüm
Dalgalı gastrointestinal belirtiler, kollaps, bradikardi ve düşük Na/K oranı Addison krizini düşündürür; ACTH stimülasyon testi tanıyı doğrular. Hiperkalemi hayatı tehdit eder: sıvı tedavisi, hiperkalemi yönetimi ve glukokortikoid uygulaması önceliklidir. Uzun dönemde mineralokortikoid ve glukokortikoid takviyesi gerekir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Şoktaki hastada bradikardi = hiperkalemiyi düşünün
- ✓ Na/K < 27 şüphe uyandırır
- ✓ Tanı ACTH testiyle konur

Endokrinoloji | Köpek

Vaka 032 · Egzersiz sonrası titreme ve bayılma olan köpek


Hasta
- Köpek
- 8 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Egzersiz veya açlıkta titreme
- Kısa süreli bayılmalar

Öykü ve bağlam
- Yemekten sonra belirtiler düzeliyor

Fiziksel muayene
- Muayene normal

Ek bulgular
- Açlık glukozu: 42 mg/dL
- Eş zamanlı insülin normal-yüksek
- Ultrasonda pankreasta küçük nodül



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hipoglisemide insülinin normal olması neden anlamlıdır?
2. Ayırıcı tanıda neler var?
3. Tedavi seçenekleri nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İnsülinoma
- Hepatik yetmezlik
- Sepsis
- Paraneoplastik hipoglisemi

Yorumlu çözüm
Hipoglisemi varken insülinin baskılanmamış olması uygunsuz insülin salgısını, yani insülinomayı düşündürür. Ultrason ve gerekirse BT ile kitle ve metastaz araştırılır. Tedavi cerrahi rezeksiyon veya medikal yönetimdir (sık ve az öğün, glukokortikoid). Akut krizde dikkatli glukoz uygulanmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Hipoglisemide normal insülin = uygunsuz salgı
- ✓ Sık, küçük öğünler belirtileri azaltır
- ✓ Glukozu dikkatli verin

Gastroenteroloji | Kedi

Vaka 033 · İştahsızlık sonrası sarılık gelişen şişman kedi


Hasta
- Kedi
- 6 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- 5 gündür hiç yememe
- Gözlerde sararma

Öykü ve bağlam
- Obez
- Evde yeni köpek gelmiş (stres)

Fiziksel muayene
- İkter
- Hepatomegali
- Dehidratasyon

Ek bulgular
- ALP ve bilirubin yüksek, GGT normal
- İnce iğne aspirasyonunda hepatositlerde yoğun yağ vakuolleri



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Obez kedide kısa süreli iştahsızlık neden tehlikelidir?
2. GGT'nin normal olması neyi düşündürür?
3. Tedavinin en önemli parçası nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hepatik lipidoz
- Kolanjit
- Pankreatit

Yorumlu çözüm
Obez kedide birkaç günlük iştahsızlık sonrası ikter ve yüksek ALP ile normal GGT hepatik lipidozu düşündürür; sitoloji yağ birikimini gösterir. Tedavinin temeli yeterli enteral beslenmedir; çoğu zaman beslenme tüpü gerekir. Altta yatan neden (stres, pankreatit, diğer hastalıklar) araştırılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Şişman kedide iştahsızlık acil durumdur
- ✓ Beslenme tüpü hayat kurtarır
- ✓ Altta yatan nedeni arayın

Dermatoloji | Köpek

Vaka 034 · Kuyruk kökünde kaşıntı ve tüy kaybı olan köpek


Hasta
- Köpek
- 5 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kuyruk kökünü ısırma
- Arka bölgede tüy kaybı

Öykü ve bağlam
- Yaz aylarında kötüleşiyor
- Pire uygulaması düzensiz

Fiziksel muayene
- Lumbosakral bölgede papül, kabuk ve alopesi
- Tüylerde pire dışkısı

Ek bulgular
- Islak kâğıt testinde kırmızı-kahverengi lekeler



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Lezyonların dağılımı neyi düşündürür?
2. Pire görülmemesi tanıyı dışlar mı?
3. Kontrol programı nasıl olmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Pire alerjisi dermatiti
- Atopik dermatit
- Sarkoptik uyuz

Yorumlu çözüm
Lumbosakral bölgede yoğunlaşan kaşıntı ve pire dışkısı pire alerjisi dermatitini düşündürür. Alerjik köpeklerde birkaç pire ısırığı bile yeterlidir; pire görülmemesi tanıyı dışlamaz. Evdeki tüm hayvanlara düzenli pire koruması ve çevre kontrolü uygulanmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kuyruk kökü kaşıntısı = önce pireyi düşünün
- ✓ Pire görülmemesi tanıyı dışlamaz
- ✓ Tüm evcil hayvanlar tedavi edilir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Nöroloji | Köpek

Vaka 035 · Ön bacaklarda yürüme bozukluğu ve boyun ağrısı olan küçük ırk köpek


Hasta
- Köpek
- 3 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Boynu hareket ettirmek istememe
- Dört bacakta dengesizlik

Öykü ve bağlam
- Yorkshire terrier

Fiziksel muayene
- Tetraparezi, propriosepsiyon eksikliği
- Boyun palpasyonunda ağrı

Ek bulgular
- Röntgen ve BT: atlantoaksiyal instabilite



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hangi omurilik segmenti etkilenmiştir?
2. Boyun manipülasyonunda neden dikkatli olunmalı?
3. Tedavi seçenekleri nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Atlantoaksiyal subluksasyon
- Servikal disk hastalığı
- Meningoensefalit

Yorumlu çözüm
Küçük ırk genç köpekte boyun ağrısı ve tetraparezi kranial servikal lezyonu düşündürür; görüntüleme atlantoaksiyal instabiliteyi gösterir. Muayene ve görüntüleme sırasında boyun fleksiyonundan kaçınılmalıdır; omurilik basısı ağırlaşabilir. Tedavi cerrahi stabilizasyon veya hafif vakalarda boyunluk ve kısıtlı aktivitedir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Boyun ağrısı + tetraparezi = servikal lezyon
- ✓ Boyun fleksiyonundan kaçının
- ✓ Cerrahi stabilizasyon sık gerekir

Enfeksiyon hastalıkları | Kedi

Vaka 036 · Gözlerde akıntı, hapşırma ve ağızda ülser olan yavru kedi

Hasta
- Kedi
- 3 aylık
- Erkek

Başvuru nedeni
- Hapşırma
- Göz akıntısı
- Salya ve yememe

Öykü ve bağlam
- Barınaktan alınmış, aşıları başlamamış

Fiziksel muayene
- Konjonktivit
- Dilde ülserler
- Ateş: 39,8 °C

Ek bulgular
- Orofaringeal PCR: kedi herpesvirüsü ve kalisivirüs pozitif



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hangi virüsler kedi üst solunum yolu hastalığında öne çıkar?
2. Dil ülseri hangi etkeni düşündürür?
3. Destek tedavide neler önemlidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kedi üst solunum yolu enfeksiyonu kompleksi
- Klamidiya
- Mikoplazma

Yorumlu çözüm
Yavru kedide hapşırma, konjonktivit ve dil ülserleri kedi herpesvirüsü ve kalisivirüs enfeksiyonunu düşündürür; ülserler daha çok kalisivirüsle ilişkilidir. Tedavi destekleyicidir: sıvı, burun temizliği, nemlendirme, iştahı destekleme, gerekirse sekonder enfeksiyon için antibiyotik. Aşılama ve barınak hijyeni korunmada önemlidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Dil ülseri = kalisivirüsü düşünün
- ✓ Koku alamayan kedi yemez: burnu temizleyin
- ✓ Aşılama ve hijyen korunmanın temelidir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Kardiyoloji | Köpek

Vaka 037 · Sürekli 'makine sesi' benzeri üfürümü olan yavru köpek


Hasta
- Köpek
- 5 aylık
- Dişi

Başvuru nedeni
- Rutin aşı muayenesinde üfürüm

Öykü ve bağlam
- Kardeşlerinden küçük
- Belirti yok

Fiziksel muayene
- Sol kalp tabanında sürekli üfürüm
- Sıçrayan (hiperkinetik) nabız

Ek bulgular
- Ekokardiyografide aorta ile pulmoner arter arasında akım
- Sol kalp boşluklarında genişleme



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Sürekli üfürüm hangi konjenital hastalığı düşündürür?
2. Neden erken düzeltme önerilir?
3. Hangi tedavi yöntemleri var?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Patent duktus arteriozus (PDA)
- Ventriküler septal defekt
- Aort stenozu

Yorumlu çözüm
Yavru köpekte sol kalp tabanında duyulan sürekli 'makine sesi' üfürümü ve sıçrayan nabız soldan sağa şantlı PDA'yı düşündürür. Tedavi edilmezse sol kalp yetmezliği gelişebilir. Kateterle oklüzyon veya cerrahi ligasyon ile kapatma önerilir; erken müdahale ile prognoz çok iyidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Sürekli üfürüm = PDA'yı düşünün
- ✓ Erken kapatma kalp yetmezliğini önler
- ✓ Her yavru dikkatle oskülte edilmeli

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Nefroloji ve üroloji | Köpek

Vaka 038 · İdrarda kan, idrar yaparken ağrı ve sızlama olan köpek


Hasta
- Köpek
- 7 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Gözle görülür kan
- Sık ve az miktarda idrar
- İdrar yaparken zorlanma

Öykü ve bağlam
- Son aylarda benzer ataklar
- Daha önce idrarında kan yok

Fiziksel muayene
- Karın bölgesinde hassasiyet
- Mesane palpasyonunda hafif ağrı

Ek bulgular
- İdrar tahlili: hematüri, piyüri
- İdrar kültürü (sistosentez)
- İdrar sedimentinin mikroskobik incelemesi
- Mesane ve prostat ultrasonu



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Sorun alt idrar yolunda mı, üst idrar yolunda mı?
2. Gerçek hematüriyi nasıl doğrular ve kaynağını nasıl ararız?
3. Hastanın yaşı ve cinsiyeti göz önüne alındığında en olası nedenler nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Bakteriyel sistit
- Ürolitiazis
- Prostatit
- Üriner neoplazi

Yorumlu çözüm
Pollakiüri, stranguri ve hematüri alt idrar yolu hastalığını gösterir. Erkek köpekte bakteriyel sistit, ürolitiazis, prostat hastalıkları ve neoplazi ayırıcı tanıda yer alır. İdrar tahlili, sistosentezle alınan kültür ve ultrasonografi tanıyı doğrulamak ve uygun tedaviyi planlamak için temel araçlardır. Tekrarlayan ataklarda altta yatan neden (taş, prostat) mutlaka araştırılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ İdrar tahlili birçok ayırıcı tanıda yol gösterir
- ✓ Kültür için sistosentez tercih edilir
- ✓ Erkek köpekte prostatı mutlaka değerlendirin

Nefroloji ve üroloji | Kedi

Vaka 039 · Kum kabında ıkınan ama idrar yapamayan erkek kedi


Hasta
- Kedi
- 4 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kum kabına sık gidip idrar yapamama
- Ağlama, penisi yalama

Öykü ve bağlam
- Kuru mama ile besleniyor
- Az su içiyor

Fiziksel muayene
- Büyük, sert ve ağrılı mesane
- Bradikardi

Ek bulgular
- Potasyum: 7,8 mmol/L
- Kreatinin yüksek
- İdrarda struvit kristalleri



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Bu tablo neden acildir?
2. Bradikardi neyi gösterir?
3. Tekrarı önlemek için ne yapılmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Üretral obstrüksiyon (idiyopatik sistit, tıkaç)
- Ürolitiazis
- Bakteriyel sistit

Yorumlu çözüm
Erkek kedide idrar yapamama ve büyük, sert mesane üretral tıkanıklığı gösterir ve acildir. Hiperkalemi ve bradikardi hayatı tehdit eder; önce sıvı ve hiperkalemi tedavisi, ardından sedasyon altında sonda ile tıkanıklık açılır. Tekrarı önlemek için ıslak mama, su tüketimini artırma ve stres yönetimi önerilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ İdrar yapamayan erkek kedi acildir
- ✓ Önce hiperkalemi, sonra sonda
- ✓ Su tüketimi ve stres yönetimi tekrarı azaltır

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Nefroloji ve üroloji | Kedi

Vaka 040 · Kilo kaybı, ağız kokusu ve çok su içen yaşlı kedi


Hasta
- Kedi
- 15 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Çok su içme
- Kilo kaybı
- Ara sıra kusma

Öykü ve bağlam
- Yıllardır belirti yok

Fiziksel muayene
- Dehidratasyon
- Küçük, düzensiz böbrekler
- Ağızda üremik koku

Ek bulgular
- Kreatinin: 3,4 mg/dL, SDMA yüksek
- İdrar dansitesi: 1,012
- Proteinüri ve kan basıncı ölçülmeli



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. IRIS evrelemesi neden önemlidir?
2. Proteinüri ve hipertansiyon neden araştırılır?
3. Diyetin rolü nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kronik böbrek hastalığı
- Hipertiroidizm
- Diabetes mellitus

Yorumlu çözüm
Yaşlı kedide poliüri-polidipsi, kilo kaybı, küçük böbrekler ve azotemi ile birlikte düşük idrar dansitesi kronik böbrek hastalığını gösterir. IRIS evrelemesi kreatinin/SDMA, proteinüri ve kan basıncına göre yapılır ve tedaviyi yönlendirir. Böbrek diyeti, sıvı desteği, fosfor kontrolü ve gerekirse antihipertansif tedavi uygulanır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Azotemi + düşük dansite = böbrek kaynaklı
- ✓ IRIS evrelemesi tedaviyi yönlendirir
- ✓ Böbrek diyeti yaşam süresini uzatır

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Hemogram | Köpek

Vaka 041 · Soluk mukozalar ve sarılık olan, aniden halsizleşen köpek


Hasta
- Köpek
- 6 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Ani halsizlik
- Koyu renkli idrar

Öykü ve bağlam
- Yeni ilaç veya aşı öyküsü yok

Fiziksel muayene
- Soluk-ikterik mukozalar
- Taşikardi
- Splenomegali

Ek bulgular
- Hematokrit: %14
- Sferositler ve otoaglütinasyon
- Retikülosit sayısı yüksek
- Bilirubin yüksek



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Anemi rejeneratif mi?
2. Sferositoz ve otoaglütinasyon neyi gösterir?
3. Tromboemboli riski neden önemlidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İmmün aracılı hemolitik anemi
- Babesiyoz
- Çinko veya soğan toksikozu

Yorumlu çözüm
Rejeneratif anemi, sferositoz, otoaglütinasyon ve ikter immün aracılı hemolitik anemiyi düşündürür. Önce enfeksiyöz ve toksik nedenler (kan parazitleri, çinko, soğan) dışlanır. Tedavide immünsüpresif ilaçlar, gerekirse kan transfüzyonu ve tromboembolinin önlenmesi yer alır. Tedavi yanıtı hematokrit ile izlenir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Retikülosit sayısı rejenerasyonu gösterir
- ✓ Otoaglütinasyon immün aracılı süreci destekler
- ✓ Tromboprofilaksiyi unutmayın

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Hemogram | Kedi

Vaka 042 · Halsizlik ve rejeneratif olmayan anemisi olan yaşlı kedi


Hasta
- Kedi
- 10 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- İştah azalması
- Halsizlik

Öykü ve bağlam
- Kilo kaybı

Fiziksel muayene
- Soluk mukozalar
- Küçük böbrekler

Ek bulgular
- Hematokrit: %19, normositik-normokromik
- Retikülosit sayısı düşük
- Kreatinin yüksek



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Rejeneratif olmayan aneminin nedenleri nelerdir?
2. Böbrek hastalığı aneme nasıl yol açar?
3. Tedavide ne düşünülmelidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kronik böbrek hastalığına bağlı anemi
- Kronik hastalık anemisi
- Kemik iliği hastalığı (FeLV ilişkili)

Yorumlu çözüm
Normositik-normokromik, rejeneratif olmayan anemi ve azotemi böbrek hastalığına bağlı eritropoietin eksikliğini düşündürür. FeLV ve kemik iliği hastalıkları ayırıcı tanıda dışlanmalıdır. Tedavide altta yatan hastalık yönetilir; demir durumu değerlendirilir ve gerekirse eritropoezi uyarıcı ajanlar kullanılır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Retikülosit sayısı anemi tipini belirler
- ✓ Böbrek hastalığı eritropoietini azaltır
- ✓ FeLV'i dışlayın

Hemogram | Köpek

Vaka 043 · Lökositozu çok yüksek, kemik iliği şüphesi olan köpek


Hasta
- Köpek
- 8 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Halsizlik
- Kilo kaybı

Öykü ve bağlam
- Lenf düğümleri büyümüş

Fiziksel muayene
- Generalize lenfadenopati
- Hepatosplenomegali

Ek bulgular
- Lökosit: 98 ×10³/µL, olgun görünümlü lenfositler
- Anemi ve trombositopeni hafif



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Belirgin lenfositoz hangi hastalıkları düşündürür?
2. Flow sitometri ne sağlar?
3. Fiziksel lenfositozdan nasıl ayrılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kronik lenfositik lösemi
- Multisentrik lenfoma (lösemik faz)
- Ehrlichiosis

Yorumlu çözüm
Belirgin, olgun görünümlü lenfositoz kronik lenfositik lösemiyi düşündürür; lenfoma ve Ehrlichia ayırıcı tanıda yer alır. Flow sitometri ve PARR ile hücre tipi ve klonalite belirlenir. Kedilerde strese bağlı fizyolojik lenfositoz olabilir, ancak bu boyutta değildir. Tedavi ve prognoz alt tipe göre değişir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Lenfositozun boyutu ve morfolojisi önemlidir
- ✓ Flow sitometri immünfenotip verir
- ✓ Enfeksiyöz nedenleri dışlayın

Hemogram | Köpek

Vaka 044 · Peteşiler ve burun kanaması olan köpek


Hasta
- Köpek
- 3 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Burun kanaması
- Karın derisinde noktasal kanamalar

Öykü ve bağlam
- İlaç veya toksin öyküsü yok
- Kene teması yok

Fiziksel muayene
- Ventral karında peteşi ve ekimozlar
- Mukozalarda peteşi

Ek bulgular
- Trombosit: 6 ×10³/µL
- PT ve aPTT normal
- Vektör hastalıkları testleri negatif



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Peteşi trombosit mi, koagülasyon mu sorununu gösterir?
2. Normal PT/aPTT neyi dışlar?
3. Tedavide öncelik nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İmmün aracılı trombositopeni
- Vektörle bulaşan hastalıklar
- Yaygın damar içi pıhtılaşma

Yorumlu çözüm
Peteşi ve mukozal kanama primer hemostaz (trombosit) bozukluğunu gösterir; normal PT ve aPTT koagülasyon faktörü eksikliğini dışlar. Belirgin trombositopeni ile enfeksiyöz nedenler dışlandığında immün aracılı trombositopeni düşünülür. Tedavide immünsüpresif ilaçlar verilir; kas içi enjeksiyon ve travmadan kaçınılır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Peteşi = trombosit sorunu
- ✓ PT/aPTT ikincil hemostazı değerlendirir
- ✓ Önce enfeksiyöz nedenleri dışlayın

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Hemogram | Köpek

Vaka 045 · Fare zehiri yediği düşünülen ve topallayan köpek


Hasta
- Köpek
- 5 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Eklemde şişlik ve topallık
- Halsizlik, öksürük

Öykü ve bağlam
- Bodrumda fare zehiri var

Fiziksel muayene
- Hemartroz
- Soluk mukozalar
- Akciğerde azalmış sesler

Ek bulgular
- PT ve aPTT belirgin uzamış
- Trombosit normal-hafif düşük
- Toraks röntgeninde plevral efüzyon (hemotoraks)



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hangi testi önce yükselir ve neden?
2. Kanama yeri primer mi sekonder hemostaz bozukluğunu gösterir?
3. Tedavi süresi neden uzun olmalıdır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Antikoagülan rodentisit zehirlenmesi
- Hemofili
- Karaciğer yetmezliği

Yorumlu çözüm
Eklem ve vücut boşluklarına kanama sekonder hemostaz bozukluğunu gösterir; uzamış PT ve aPTT antikoagülan rodentisit zehirlenmesini düşündürür. Faktör VII'nin yarı ömrü kısa olduğundan PT önce uzar. Tedavide K1 vitamini birkaç hafta verilir; aktif kanamada taze donmuş plazma gerekir. Tedavi bitiminden 48-72 saat sonra PT tekrar kontrol edilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Boşluk/eklem kanaması = koagülasyon bozukluğu
- ✓ PT önce uzar
- ✓ K1 vitamini uzun süre verilir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Hemogram | Kedi

Vaka 046 · Anemi ve eritrositlerde parazit görülen kedi


Hasta
- Kedi
- 2 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Halsizlik
- İştahsızlık

Öykü ve bağlam
- Dışarı çıkıyor, kavga yarası

Fiziksel muayene
- Soluk mukozalar
- Ateş
- Hafif ikter

Ek bulgular
- Hematokrit: %16, rejeneratif
- Kan yaymasında eritrosit yüzeyinde küçük kokoid yapılar
- PCR: Mycoplasma haemofelis pozitif



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hemotropik mikoplazma nasıl bulaşır?
2. Kan yayması neden yanıltıcı olabilir?
3. Tedavide hangi antibiyotik kullanılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hemotropik mikoplazmoz
- İmmün aracılı hemolitik anemi
- FeLV ilişkili anemi

Yorumlu çözüm
Rejeneratif anemi ve eritrosit yüzeyinde küçük kokoid organizmalar hemotropik mikoplazmozu düşündürür; PCR tanıyı doğrular çünkü organizmalar yaymada aralıklı görülür. Bulaşma kavga ve vektörlerle olabilir. Doksisiklin ile tedavi edilir; ağır anemide transfüzyon gerekebilir. FeLV/FIV durumu kontrol edilmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ PCR yaymadan daha duyarlıdır
- ✓ Doksisiklin ilk tercih
- ✓ Retrovirüs durumunu kontrol edin

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Hemogram | Köpek

Vaka 047 · Kronik kan kaybı ve mikrositik anemi olan köpek

Hasta

- Köpek
- 4 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni

- Halsizlik
- Kara renkli dışkı

Öykü ve bağlam


- Uzun süreli NSAİİ kullanımı (eklem ağrısı)

Fiziksel muayene

- Soluk mukozalar
- Melena

Ek bulgular

- Hematokrit: %22, MCV düşük, MCHC düşük
- Trombositoz
- Demir düşük



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları

1. Mikrositik hipokromik anemi neyi düşündürür?
2. Melena hangi kanama yerini gösterir?
3. İlacın rolü nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar

- NSAİİ'ye bağlı gastrik ülser ve demir eksikliği
- Gastrointestinal neoplazi
- Bağırsak parazitleri

Yorumlu çözüm

Mikrositik, hipokromik anemi ve trombositoz kronik kan kaybına bağlı demir eksikliğini gösterir. Melena üst gastrointestinal kanamayı düşündürür; uzun süreli NSAİİ kullanımı gastrik ülser riskini artırır. NSAİİ kesilir, gastroprotektif tedavi ve demir takviyesi verilir; neoplazi için endoskopi düşünülebilir.

Akılda tutulacak noktalar

- ✓ Mikrositoz = demir eksikliği/kronik kan kaybı
- ✓ Melena = üst GİS kanaması
- ✓ NSAİİ kullanımını sorgulayın

Hemogram | Kedi

Vaka 048 · Ateş ve şiddetli nötropeni olan yavru kedi


Hasta
- Kedi
- 1 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Kusma
- İshal
- Halsizlik

Öykü ve bağlam
- Aşısız
- Evde yeni kedi gelmiş

Fiziksel muayene
- Ateş: 40,3 °C
- Dehidratasyon
- Kalın bağırsak ansları

Ek bulgular
- Lökosit: 0,9 ×10³/µL, belirgin nötropeni
- Dışkıda parvovirüs antijeni pozitif



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kedide panlökopeninin etkeni nedir?
2. Nötropeni neden prognoz için önemlidir?
3. Diğer kediler nasıl korunur?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kedi panlökopenisi
- Salmonelloz
- FeLV

Yorumlu çözüm
Aşısız yavru kedide ateş, gastrointestinal belirtiler ve şiddetli lökopeni kedi panlökopenisini (feline parvovirüs) düşündürür. Tedavi destekleyicidir: sıvı, antiemetik, beslenme desteği ve sepsis riskine karşı geniş spektrumlu antibiyotik. Virüs çevrede çok dayanıklıdır; izolasyon ve uygun dezenfeksiyon gerekir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Şiddetli nötropeni sepsis riskini artırır
- ✓ Destekleyici tedavi hayat kurtarır
- ✓ Aşılama ve dezenfeksiyon şart

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Hemogram | Köpek

Vaka 049 · Sürekli yüksek hematokrit ve kırmızı mukozaları olan köpek


Hasta
- Köpek
- 9 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Burun kanaması
- Kızarık mukozalar

Öykü ve bağlam
- Dehidratasyon yok

Fiziksel muayene
- Hiperemik mukozalar
- Normal hidrasyon

Ek bulgular
- Hematokrit: %72 (tekrarlanan ölçümlerde)
- Total protein normal
- Eritropoietin düşük-normal
- Kan gazı normal oksijenasyon



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Göreceli ve mutlak eritrositoz nasıl ayrılır?
2. Eritropoietin düzeyi neyi gösterir?
3. Tedavide flebotominin rolü nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Primer eritrositoz (polisitemia vera)
- Sekonder eritrositoz (hipoksi, böbrek tümörü)
- Dehidratasyon

Yorumlu çözüm
Normal hidrasyon ve normal total protein ile kalıcı yüksek hematokrit mutlak eritrositozu gösterir. Normal oksijenasyon ve düşük-normal eritropoietin sekonder nedenleri azaltır ve primer eritrositozu düşündürür. Hiperviskozite belirtileri için flebotomi ve uzun dönemde miyelosupresif ilaçlar kullanılabilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Önce dehidratasyonu dışlayın
- ✓ Eritropoietin primer/sekonder ayrımına yardım eder
- ✓ Flebotomi viskoziteyi düşürür

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Hemogram | Köpek

Vaka 050 · Sepsiste lökosit tablosunun yorumlanması


Hasta
- Köpek
- 7 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Ateş
- Kusma
- Huzursuzluk

Öykü ve bağlam
- 2 hafta önce kızgınlık geçirmiş
- Kısırlaştırılmamış

Fiziksel muayene
- Vulvadan akıntı yok
- Karında genişleme
- Taşikardi

Ek bulgular
- Lökosit: 38 ×10³/µL, sola kayma (çomak nötrofil artışı)
- Toksik nötrofil değişiklikleri
- Ultrasonda sıvı dolu uterus



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Sola kayma ve toksik değişiklik neyi gösterir?
2. Kapalı piyometra neden daha tehlikelidir?
3. Kesin tedavi nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kapalı piyometra
- Septik peritonit
- Pankreatit

Yorumlu çözüm
Kızgınlık sonrası dişi köpekte ateş, belirgin nötrofili, sola kayma ve toksik değişiklikler ile ultrasonda sıvı dolu uterus kapalı piyometrayı gösterir. Kapalı formda drenaj olmadığı için sepsis ve uterus rüptürü riski yüksektir. Stabilizasyon sonrası acil ovariohisterektomi kesin tedavidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Sola kayma şiddetli inflamasyonu gösterir
- ✓ Kapalı piyometra acildir
- ✓ Ovariohisterektomi kesin tedavidir

Biyokimya | Köpek

Vaka 051 · Yüksek kalsiyum ve çok su içme şikâyeti olan köpek


Hasta
- Köpek
- 11 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Poliüri, polidipsi
- İştahsızlık

Öykü ve bağlam
- Perianal bölgede kitle fark edilmiş

Fiziksel muayene
- Anal kese bölgesinde sert kitle
- Sublumbar lenf düğümü büyümüş

Ek bulgular
- İyonize kalsiyum yüksek
- Fosfor düşük-normal
- PTH düşük, PTHrP yüksek



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hiperkalsemide ilk doğrulama hangi testle yapılır?
2. PTHrP yüksekliği neyi gösterir?
3. Hangi tümörler sıklıkla hiperkalsemi yapar?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Anal kese adenokarsinomuna bağlı malign hiperkalsemi
- Lenfoma
- Primer hiperparatiroidizm

Yorumlu çözüm
Hiperkalsemi önce iyonize kalsiyumla doğrulanır. Düşük PTH ve yüksek PTHrP malign hiperkalsemiyi gösterir; köpekte en sık nedenler lenfoma ve anal kese adenokarsinomudur. Rektal muayene mutlaka yapılmalıdır. Tedavi sıvı diürezi, kalsiyumu düşüren ilaçlar ve altta yatan tümörün tedavisidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ İyonize kalsiyumla doğrulayın
- ✓ Rektal muayeneyi atlamayın
- ✓ PTHrP malignite lehinedir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Biyokimya | Köpek

Vaka 052 · Yemekten sonra şaşkınlık ve büyüme geriliği olan yavru köpek


Hasta
- Köpek
- 1 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Yemekten sonra başını duvara dayama
- Büyüme geriliği

Öykü ve bağlam
- Yorkshire terrier
- Anestezi sonrası geç uyanma öyküsü

Fiziksel muayene
- Küçük vücut yapısı
- Nörolojik belirtiler aralıklı

Ek bulgular
- Açlık ve tokluk safra asitleri belirgin yüksek
- Üre ve albumin düşük
- İdrarda amonyum biürat kristalleri



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Safra asidi testi neyi değerlendirir?
2. Düşük üre neden anlamlıdır?
3. Tanıyı hangi görüntüleme doğrular?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Portosistemik şant
- Mikrovasküler displazi
- Hepatik ensefalopati

Yorumlu çözüm
Genç küçük ırk köpekte yemekle ilişkili nörolojik belirtiler, büyüme geriliği, düşük üre ve albumin ile yüksek safra asitleri portosistemik şantı düşündürür. Amonyum biürat kristalleri amonyak metabolizması bozukluğunu destekler. Tanı ultrason veya BT anjiyografi ile konur; tedavi diyet ve laktüloz ile stabilizasyon sonrası cerrahi kapatmadır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Safra asitleri karaciğer fonksiyonunu ölçer
- ✓ Düşük üre + biürat kristalleri = şantı düşünün
- ✓ Cerrahi öncesi medikal stabilizasyon

Biyokimya | Köpek

Vaka 053 · Hipoalbuminemi ve karında sıvı birikimi olan köpek


Hasta
- Köpek
- 6 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Karında şişlik
- Kilo kaybı

Öykü ve bağlam
- Kronik ishal yok

Fiziksel muayene
- Asit
- Ödem yok

Ek bulgular
- Albumin: 1,4 g/dL
- İdrar protein/kreatinin oranı: 6,2
- Kolesterol yüksek



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hipoalbumineminin üç ana nedeni nelerdir?
2. UPC oranı neyi gösterir?
3. Tromboemboli riski neden artar?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Protein kaybettiren nefropati (glomerülonefrit)
- Protein kaybettiren enteropati
- Karaciğer yetmezliği

Yorumlu çözüm
Hipoalbuminemi; karaciğer yetmezliği, bağırsak kaybı veya böbrek kaybından kaynaklanabilir. Belirgin yüksek UPC oranı protein kaybettiren nefropatiyi gösterir. Antitrombin kaybı tromboemboli riskini artırır. Tedavide ACE inhibitörü veya ARB, diyet, antitrombotik ilaç ve gerekirse immünsüpresif tedavi yer alır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Albumin kaybının kaynağını belirleyin
- ✓ UPC böbrek kaybını ölçer
- ✓ Tromboprofilaksi düşünülmeli

Biyokimya | Kedi

Vaka 054 · Antifriz içtiği şüphelenilen ve kusan kedi


Hasta
- Kedi
- 3 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kusma
- Sarhoş gibi yürüme

Öykü ve bağlam
- Garajda antifriz dökülmüş

Fiziksel muayene
- Ataksi
- Dehidratasyon

Ek bulgular
- Anyon açığı yüksek metabolik asidoz
- Serum osmolalite açığı yüksek
- İdrarda kalsiyum oksalat monohidrat kristalleri



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Osmolalite açığı neyi gösterir?
2. Neden zaman çok kritiktir?
3. Tedavide antidot nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Etilen glikol zehirlenmesi
- Diyabetik ketoasidoz
- Akut böbrek hasarı (başka nedenli)

Yorumlu çözüm
Antifriz teması, ataksi, yüksek anyon açığı ve osmolalite açığı ile kalsiyum oksalat kristalleri etilen glikol zehirlenmesini düşündürür. Kedilerde birkaç saat içinde böbrek hasarı başlar; antidot (fomepizol veya etanol) mümkün olan en erken dönemde verilmelidir. Akut böbrek hasarı gelişmişse prognoz kötüdür.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Zaman kritik: saatler önemlidir
- ✓ Osmolalite açığı erken ipucudur
- ✓ Kristaller tanıyı destekler

Biyokimya | Köpek

Vaka 055 · Rutin kontrolde ALP yüksekliği bulunan köpek


Hasta
- Köpek
- 10 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Belirti yok, rutin kan tahlili

Öykü ve bağlam
- Eklem ağrısı için uzun süre kortikosteroid kullanmış

Fiziksel muayene
- Hafif hepatomegali

Ek bulgular
- ALP: 860 U/L
- ALT hafif yüksek
- Bilirubin ve safra asitleri normal



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Köpekte ALP yükselmesinin hepatik olmayan nedenleri nelerdir?
2. Steroidler ALP'yi nasıl etkiler?
3. Hangi adımlar planlanmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Steroid hepatopatisi (ilaç kaynaklı)
- Hiperadrenokortisizm
- Hepatik neoplazi
- Kolestaz

Yorumlu çözüm
Köpekte ALP, kortikosteroidlerin indüklediği izoenzim nedeniyle yükselebilir. Fonksiyon testleri normal, belirti yok ve steroid öyküsü varsa ilaç kaynaklı hepatopati olasıdır. İlacın kademeli azaltılması sonrası tekrar ölçüm yapılır; devam ediyorsa ultrason ve endokrin testler planlanır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ ALP her zaman karaciğer hastalığı demek değildir
- ✓ İlaç öyküsünü sorgulayın
- ✓ Kademeli azaltıp tekrar ölçün

Biyokimya | Köpek

Vaka 056 · Ksilitollü sakız yedikten sonra titreme ve kollaps


Hasta
- Köpek
- 2 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Titreme
- Kollaps

Öykü ve bağlam
- Şekersiz sakız paketi yemiş (30 dk önce)

Fiziksel muayene
- Letarji
- Hipotermi eğilimi

Ek bulgular
- Glukoz: 38 mg/dL
- Takipte ALT yükselmesi
- Potasyum hafif düşük



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Ksilitol köpekte neden hipoglisemi yapar?
2. Hangi organ ikinci aşamada etkilenir?
3. İzlemde hangi değerler takip edilmeli?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Ksilitol zehirlenmesi
- İnsülinoma
- Sepsis

Yorumlu çözüm
Ksilitol köpeklerde güçlü insülin salgısına yol açarak hızlı hipoglisemiye neden olur; yüksek dozlarda hepatik nekroz gelişebilir. Tedavide glukoz desteği, sık kan şekeri ölçümü ve karaciğer koruyucu tedavi uygulanır. Karaciğer enzimleri ve koagülasyon 72 saat boyunca izlenmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Ksilitol köpeklerde çok toksiktir
- ✓ Glukozu sık ölçün
- ✓ Karaciğeri 72 saat izleyin

Biyokimya | Kedi

Vaka 057 · Diyabetik kedide kusma, dehidratasyon ve aseton kokusu


Hasta
- Kedi
- 7 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kusma
- Hiç yememe
- Halsizlik

Öykü ve bağlam
- Diyabet tanısı var, insülini düzensiz

Fiziksel muayene
- Ağır dehidratasyon
- Nefeste keton kokusu

Ek bulgular
- Glukoz: 520 mg/dL
- Kan ketonu (beta-hidroksibütirat) yüksek
- pH: 7,08, bikarbonat düşük
- Potasyum ve fosfor düşük



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. DKA ile komplike olmayan diyabet nasıl ayrılır?
2. Tedavide neden önce sıvı ve elektrolit düzeltilir?
3. Hipofosfatemi hangi komplikasyona yol açar?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Diyabetik ketoasidoz
- Pankreatit
- Hepatik lipidoz

Yorumlu çözüm
Diyabetik kedide kusma, dehidratasyon, ketonemi ve metabolik asidoz diyabetik ketoasidozu gösterir. Tedavide önce sıvı ve elektrolit (potasyum, fosfor) düzeltilir, ardından düşük doz kısa etkili insülin başlanır. Hipofosfatemi hemolize yol açabilir. Tetikleyici hastalıklar (pankreatit, enfeksiyon) araştırılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Önce sıvı ve elektrolit
- ✓ Fosfor düşüklüğü hemoliz yapabilir
- ✓ Tetikleyici hastalığı arayın

Biyokimya | Köpek

Vaka 058 · Kronik böbrek hastalığında SDMA ve kreatinin yorumlanması


Hasta
- Köpek
- 9 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Hafif kilo kaybı
- Su tüketimi artmış

Öykü ve bağlam
- Kas kütlesi az olan küçük ırk köpek

Fiziksel muayene
- Kas kaybı
- Hafif dehidratasyon

Ek bulgular
- Kreatinin: 1,3 mg/dL (normal sınırda)
- SDMA: 22 µg/dL (yüksek)
- İdrar dansitesi: 1,018



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kas kütlesi kreatinini nasıl etkiler?
2. SDMA neden erken uyarı verir?
3. İzlem nasıl olmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Erken evre kronik böbrek hastalığı
- Prerenal azotemi
- Hipertiroidizm (kedide)

Yorumlu çözüm
Kreatinin kas kütlesinden etkilendiği için kaslı olmayan hastalarda böbrek kaybını gizleyebilir. Yüksek SDMA ve izostenüriye yakın idrar dansitesi erken evre kronik böbrek hastalığını düşündürür. Hidrasyon sağlandıktan sonra tekrar ölçüm yapılır; proteinüri ve kan basıncı da değerlendirilerek IRIS evrelemesi yapılır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kas kaybı kreatinini düşük gösterebilir
- ✓ SDMA erken belirteçtir
- ✓ Hidrasyon sonrası tekrar ölçün

Biyokimya | Köpek

Vaka 059 · Kusma sonrası hipokloremik metabolik alkaloz


Hasta
- Köpek
- 3 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Sık kusma (2 gündür)
- Yememe

Öykü ve bağlam
- Çorap çiğnediği görülmüş

Fiziksel muayene
- Dehidratasyon
- Kranial karında ağrı

Ek bulgular
- Klor düşük, bikarbonat yüksek
- Potasyum düşük
- Görüntülemede midede yabancı cisim, pilor tıkanıklığı



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hipokloremik alkaloz hangi kusma tipini düşündürür?
2. Elektrolit düzeltmesinde hangi sıvı tercih edilir?
3. Cerrahi öncesi neler düzeltilmeli?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Pilorik yabancı cisim obstrüksiyonu
- Pilor stenozu
- Gastrik neoplazi

Yorumlu çözüm
Mide içeriğinin (HCl) kaybı hipokloremik metabolik alkaloz yapar ve pilor veya proksimal duodenum tıkanıklığını düşündürür. Tedavide %0,9 NaCl ile sıvı ve klor açığı kapatılır, potasyum eklenir. Elektrolitler düzeltildikten sonra endoskopi veya cerrahi ile yabancı cisim çıkarılır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Hipokloremik alkaloz = proksimal tıkanıklık
- ✓ %0,9 NaCl tercih edilir
- ✓ Potasyumu takviye edin

Biyokimya · At

Vaka 060 · Yaz aylarında yeşil meraya çıkınca topallayan, aşırı kilolu kısrak


Hasta
- At
- 12 yaş
- Kısrak

Başvuru nedeni
- Ön ayaklarda topallık
- Ağırlığı arka ayaklara verme

Öykü ve bağlam
- Aşırı kilolu
- Yeşil meraya çıkarılmış

Fiziksel muayene
- Tırnaklarda sıcaklık artışı
- Dijital nabız güçlü
- Tırnak pensinde hassasiyet

Ek bulgular
- Bazal insülin yüksek
- Oral şeker testinde abartılı insülin yanıtı
- Röntgende tırnak kemiğinde hafif rotasyon



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Laminitin endokrin nedenleri nelerdir?
2. Röntgen neden gereklidir?
3. Yönetimde diyetin rolü nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Equine metabolik sendroma bağlı laminit
- PPID (Cushing) ilişkili laminit
- Tırnak apsesi

Yorumlu çözüm
Aşırı kilolu atta yeşil mera sonrası laminit ve hiperinsülinemi equine metabolik sendromu düşündürür. Röntgen tırnak kemiğinin rotasyon veya çökmesini değerlendirir ve prognozu belirler. Tedavide ağrı yönetimi, tırnak desteği, düşük şekerli diyet ve kilo kaybı esastır. Yaşlı atlarda PPID de araştırılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Hiperinsülinemi laminit riskidir
- ✓ Röntgen prognozu belirler
- ✓ Diyet ve kilo kontrolü temeldir

İdrar analizi | Köpek

Vaka 061 · Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ve idrarda kristaller


Hasta
- Köpek
- 5 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Sık idrar yapma
- İdrarda kötü koku

Öykü ve bağlam
- Son 6 ayda 3 kez antibiyotik kullanmış

Fiziksel muayene
- Mesane palpasyonunda hafif ağrı

Ek bulgular
- İdrar pH: 8,0
- Struvit kristalleri
- Kültür: üreaz üreten Staphylococcus
- Röntgende radyoopak mesane taşı



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Köpekte struvit taşları genellikle neden oluşur?
2. İdrar kültürü neden sistosentezle alınmalı?
3. Taş çözülebilir mi?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Enfeksiyona bağlı struvit ürolitiazisi
- Kalsiyum oksalat ürolitiazisi
- Polip veya neoplazi

Yorumlu çözüm
Köpeklerde struvit taşları çoğunlukla üreaz üreten bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlara bağlıdır. Kültür, kontaminasyonu önlemek için sistosentezle alınmalıdır. Uygun antibiyotik ve çözündürücü diyetle taşlar çözülebilir; taş çözülene kadar antibiyotik sürdürülür ve görüntülemeyle izlenir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Köpekte struvit = enfeksiyonu düşünün
- ✓ Kültür için sistosentez
- ✓ Çözünme görüntülemeyle izlenir

İdrar analizi | Köpek

Vaka 062 · İdrar dansitesi düşük, çok su içen ve kan değerleri normal köpek


Hasta
- Köpek
- 8 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Aşırı su içme (100 mL/kg/gün üzeri)
- Evde idrar kaçırma

Öykü ve bağlam
- Davranış değişikliği yok

Fiziksel muayene
- Muayene normal

Ek bulgular
- İdrar dansitesi: 1,004
- Biyokimya normal
- Su kısıtlama testinde konsantrasyon yok, desmopresin sonrası artış



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hipostenüri hangi hastalıkları düşündürür?
2. Su kısıtlama testi neden dikkatli yapılmalı?
3. Desmopresine yanıt neyi gösterir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Santral diabetes insipidus
- Nefrojenik diabetes insipidus
- Psikojenik polidipsi
- Hiperadrenokortisizm

Yorumlu çözüm
Belirgin hipostenüri ve normal biyokimya ile poliüri-polidipsi önce yaygın nedenler (Cushing, böbrek, karaciğer) dışlanarak değerlendirilir. Desmopresin sonrası idrar konsantrasyonunun artması santral diabetes insipidusu gösterir. Su kısıtlama testi dehidratasyon riski nedeniyle yakından izlenmelidir. Tedavi desmopresindir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Önce yaygın nedenleri dışlayın
- ✓ Su kısıtlama testi risklidir
- ✓ Desmopresin yanıtı santral DI'yi gösterir

İdrar analizi | Kedi

Vaka 063 · İdrar kültürü pozitif ama belirtisi olmayan kedi


Hasta
- Kedi
- 8 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Rutin kontrol, belirti yok

Öykü ve bağlam
- Kronik böbrek hastalığı tanısı var

Fiziksel muayene
- Muayene normal

Ek bulgular
- Sistosentezle alınan kültürde E. coli üremesi
- İdrar sedimentinde piyüri yok



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Subklinik bakteriüri her zaman tedavi gerektirir mi?
2. Hangi durumlarda tedavi düşünülür?
3. Gereksiz antibiyotiğin zararı nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Subklinik bakteriüri
- Sistit
- Piyelonefrit

Yorumlu çözüm
Klinik belirti ve piyüri olmadan pozitif idrar kültürü subklinik bakteriüri olarak değerlendirilir. Güncel önerilere göre çoğu hastada antibiyotik gerekmez; böbrek fonksiyonunda kötüleşme veya piyelonefrit şüphesi varsa tedavi düşünülür. Gereksiz antibiyotik direnci artırır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Pozitif kültür ≠ her zaman tedavi
- ✓ Klinik bulgulara bakın
- ✓ Antibiyotik direncini düşünün

İdrar analizi | Köpek

Vaka 064 · Dalmaçyalı köpekte idrarda urat kristalleri ve taşlar


Hasta
- Köpek
- 4 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- İdrar yapma güçlüğü

Öykü ve bağlam
- Dalmaçyalı
- Yüksek proteinli diyet

Fiziksel muayene
- Penis tabanında üretral taş palpe ediliyor

Ek bulgular
- Amonyum ürat kristalleri
- Röntgende taş görünmüyor, ultrasonda görülüyor
- Safra asitleri normal



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Dalmaçyalılar neden ürat taşına yatkındır?
2. Ürat taşları röntgende neden zor görülür?
3. Tekrarı önlemek için ne yapılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Genetik hiperürikozüriye bağlı ürat ürolitiazisi
- Portosistemik şant
- Sistin taşı

Yorumlu çözüm
Dalmaçyalılarda ürik asit metabolizmasındaki genetik bozukluk ürat taşlarına yatkınlık yaratır. Ürat taşları radyolusenttir; ultrason veya kontrastlı çekim gerekir. Şant dışlandıktan sonra düşük pürinli diyet, idrarın alkalileştirilmesi, su tüketiminin artırılması ve gerekirse allopurinol kullanılır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Ürat taşları röntgende zor görülür
- ✓ Şantı mutlaka dışlayın
- ✓ Düşük pürinli diyet tekrarı azaltır

Sitoloji | Köpek

Vaka 065 · Deride hızla büyüyen kitle ve ince iğne aspirasyonu


Hasta
- Köpek
- 9 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Gövdede hızla büyüyen deri kitlesi
- Kitle dokununca kızarıyor

Öykü ve bağlam
- Kitle bazen küçülüp büyüyor

Fiziksel muayene
- Deride 2 cm, sınırları belirsiz kitle
- Darier işareti pozitif

Ek bulgular
- İİA: metakromatik granüllü yuvarlak hücreler
- Eozinofiller



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Darier işareti nedir?
2. Sitoloji neden yeterli değildir?
3. Operasyon öncesi hangi önlem alınır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Mast hücreli tümör
- Histiyositom
- Lipom

Yorumlu çözüm
Granüllü yuvarlak hücreler ve eozinofiller mast hücreli tümörü düşündürür; dokunmayla kızarma (Darier) histamin salınımını gösterir. Sitoloji tanı koydurur ama derece belirlemez; geniş cerrahi eksizyon sonrası histopatoloji derece ve cerrahi sınırları gösterir. Operasyon öncesi H1/H2 blokerleri verilmeli, evreleme için lenf düğümü değerlendirilmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Her deri kitlesine İİA yapın
- ✓ Derece için histopatoloji gerekir
- ✓ Antihistaminik ön tedavi verin

Sitoloji | Köpek

Vaka 066 · Tüm lenf düğümleri büyümüş ama genel durumu iyi köpek


Hasta
- Köpek
- 7 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Boyunda şişlikler fark edilmiş

Öykü ve bağlam
- İştah normal

Fiziksel muayene
- Generalize, ağrısız lenfadenopati

Ek bulgular
- İİA: büyük, tek tip lenfoblastlar (>%50)
- Hafif hiperkalsemi



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Reaktif lenf düğümünden nasıl ayrılır?
2. Evreleme için neler yapılır?
3. Tedavi öncesi neden kortikosteroid verilmemeli?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Multisentrik lenfoma
- Reaktif lenfadenopati
- Ehrlichiosis

Yorumlu çözüm
Generalize ağrısız lenfadenopati ve aspiratta baskın, tek tip büyük lenfoblastlar multisentrik lenfomayı düşündürür. İmmünfenotip (flow sitometri) ve evreleme (görüntüleme, kan tablosu) prognozu belirler. Kortikosteroid, kemoterapiden önce verilirse tedavi yanıtını azaltabilir; bu nedenle onkoloji planı yapılmadan başlanmamalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Tek tip büyük lenfoblastlar = lenfoma
- ✓ İmmünfenotip prognozu belirler
- ✓ Steroidi kemoterapi planından önce vermeyin

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Görüntüleme | Kedi

Vaka 067 · Bağırsak duvarı kalınlaşması olan kedi: ultrasonografi ve kilo kaybı

Hasta
- Kedi
- 11 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Kilo kaybı
- Aralıklı kusma
- Değişken iştah

Öykü ve bağlam
- Kronik seyir
- Kötü vücut kondisyonu

Fiziksel muayene
- Bağırsak duvarı kalınlaşması
- Katman yapısında kısmi bozulma
- Mezenterik lenf nodlarında artış

Ek bulgular
- Ultrason: kalınlaşmış bağırsak duvarı
- Kısmen korunmuş katman yapısı
- Artmış mezenterik lenf nodları



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Bağırsak duvarı kalınlaşması neoplazi anlamına gelir mi?
2. Katman yapısını korumak veya kaybetmek neden önemlidir?
3. Sitoloji veya biyopsi ne zaman düşünülmelidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İnflamatuvar enteropati
- Lenfoma
- Adenokarsinom
- İnfiltratif hastalık

Yorumlu çözüm
Bağırsak duvarı kalınlaşması hem inflamatuvar hem de neoplastik süreçlerde görülebilir. Katman yapısının korunması ve işaretlenmiş bulguların korunması, mezenterik lenf nodlarında artış ile birlikte neoplazi şüphesini artırır; kesin tanı için sitoloji veya biyopsiyle doku örneklemesi gerekebilir. Ultrasonografi tek başına tanıyı doğrulamaz.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Ultrasonografi her zaman tanıyı doğrulamaz
- ✓ Bağırsak katmanları bilgi sağlar
- ✓ İnflamasyon ve neoplazi benzeyebilir

Görüntüleme | Köpek

Vaka 068 · Topallık ve uzun kemikte litik lezyon olan dev ırk köpek


Hasta
- Köpek
- 10 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Ön bacakta giderek artan topallık
- Bölgede şişlik

Öykü ve bağlam
- Rottweiler
- Travma öyküsü yok

Fiziksel muayene
- Distal radiusta sert, ağrılı şişlik

Ek bulgular
- Röntgende metafizde litik-proliferatif lezyon
- Sunburst periost reaksiyonu
- Toraks röntgeninde metastaz yok



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Dev ırkta metafizer lezyon neyi düşündürür?
2. Toraks görüntülemesi neden yapılır?
3. Tanı nasıl kesinleşir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Osteosarkom
- Fungal osteomiyelit
- Kemik kisti

Yorumlu çözüm
Dev ırk yaşlı köpekte distal radius metafizinde litik-proliferatif lezyon ve 'sunburst' periost reaksiyonu osteosarkomu düşündürür. Akciğer metastazı için toraks görüntülemesi yapılır. Tanı kemik biyopsisi veya sitolojiyle konur. Tedavi ağrı kontrolü, amputasyon veya ekstremite koruyucu cerrahi ve kemoterapidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ 'Dizden uzak, dirsekten yakın' lokalizasyon
- ✓ Toraks görüntülemesi evrelemenin parçası
- ✓ Ağrı kontrolü önceliklidir

Görüntüleme | Köpek

Vaka 069 · Ani dispne ve göğüs röntgeninde yaygın opasite


Hasta
- Köpek
- 6 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Ani nefes darlığı
- Öksürük

Öykü ve bağlam
- Travma yok
- Ateş

Fiziksel muayene
- Takipne
- Kranioventral akciğer alanlarında krepitasyon

Ek bulgular
- Röntgen: kranioventral alveoler patern, hava bronkogramları
- Lökositoz, sola kayma



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Alveoler paternin dağılımı neyi düşündürür?
2. Kardiyojenik ödem nasıl ayrılır?
3. Trakeal yıkama ne sağlar?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Bakteriyel (aspirasyon) pnömonisi
- Kardiyojenik ödem
- Akciğer kontüzyonu

Yorumlu çözüm
Kranioventral alveoler patern ve inflamatuvar lökogram bakteriyel veya aspirasyon pnömonisini düşündürür; kardiyojenik ödem genellikle perihiler-kaudodorsal dağılım gösterir. Trakeal yıkama ile kültür ve sitoloji alınır. Tedavi antibiyotik, oksijen, nebülizasyon ve aspirasyonun altta yatan nedeninin araştırılmasıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Dağılım paterni tanıya yön verir
- ✓ Kültür için hava yolu örneği alın
- ✓ Aspirasyon nedenini arayın

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Görüntüleme | Kedi

Vaka 070 · Öksürük ve göğüs röntgeninde bronşiyal patern olan kedi


Hasta
- Kedi
- 9 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Nöbetler hâlinde öksürük
- Hırıltı

Öykü ve bağlam
- Tozlu kum kullanılıyor
- Evde sigara içiliyor

Fiziksel muayene
- Ekspiratuvar efor
- Wheeze

Ek bulgular
- Röntgen: bronşiyal patern ('donut' ve tren rayı), akciğer hiperinflasyonu
- Bronkoalveoler lavajda eozinofiller



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Bronşiyal patern neyi gösterir?
2. Parazitik nedenler neden dışlanmalıdır?
3. Uzun dönem tedavi nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kedi astımı (alerjik bronşit)
- Akciğer parazitleri
- Kronik bronşit

Yorumlu çözüm
Nöbetler hâlinde öksürük, ekspiratuvar dispne, bronşiyal patern ve BAL'da eozinofiller kedi astımını düşündürür. Akciğer kurtları benzer tablo yapabildiğinden dışkı testi ve antiparaziter deneme yapılmalıdır. Tedavide inhale kortikosteroid ve krizde bronkodilatör kullanılır; çevresel tetikleyiciler azaltılır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Eozinofilik BAL astımı destekler
- ✓ Önce parazitleri dışlayın
- ✓ Çevresel tetikleyicileri azaltın

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Görüntüleme | Köpek

Vaka 071 · Ultrasonda dalakta kitle bulunan, ani kollaps geçiren köpek


Hasta
- Köpek
- 8 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Ani kollaps
- Soluk mukozalar

Öykü ve bağlam
- Golden retriever

Fiziksel muayene
- Taşikardi
- Karında sıvı dalgası

Ek bulgular
- Abdominal POCUS: serbest sıvı ve dalakta heterojen kitle
- Abdominosentez: hemorajik sıvı
- Hematokrit: %24



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hemoabdomenin en sık nedeni nedir?
2. Ameliyat öncesi hangi görüntülemeler yapılmalı?
3. Prognozu ne belirler?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Dalak hemanjiyosarkomu (rüptüre)
- Dalak hematomu
- Nodüler hiperplazi

Yorumlu çözüm
Büyük ırk yaşlı köpekte hemoabdomen ve dalak kitlesi rüptüre dalak tümörünü, en sık hemanjiyosarkomu düşündürür; ancak benign hematomlar da benzer görünebilir. Stabilizasyon sonrası toraks görüntülemesi ve kalp değerlendirmesi metastaz için yapılır. Splenektomi ve histopatoloji kesin tanıyı sağlar.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Her dalak kitlesi malign değildir
- ✓ Metastaz taraması yapın
- ✓ Kesin tanı histopatolojiyle

Görüntüleme | Köpek

Vaka 072 · Arka bacakta topallık ve diz eklemi röntgeni


Hasta
- Köpek
- 3 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Sağ arka bacakta ani topallık
- Koşarken ağlamış

Öykü ve bağlam
- Aşırı kilolu, aktif köpek

Fiziksel muayene
- Kranial çekmece testi pozitif
- Tibial baskı testi pozitif
- Diz ekleminde efüzyon

Ek bulgular
- Röntgende eklem efüzyonu, erken osteofitler



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kranial çapraz bağ yırtığı nasıl tanınır?
2. Röntgen ne gösterir, ne göstermez?
3. Cerrahi seçenekler nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kranial çapraz bağ rüptürü
- Patella luksasyonu
- Menisküs yaralanması

Yorumlu çözüm
Kranial çekmece ve tibial baskı testlerinin pozitif olması kranial çapraz bağ rüptürünü gösterir. Röntgen bağı göstermez ama efüzyon ve dejeneratif değişiklikleri gösterir. Büyük köpeklerde cerrahi stabilizasyon (TPLO, TTA vb.) önerilir; menisküs değerlendirilmelidir. Kilo kontrolü uzun dönem sonucu iyileştirir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Tanı muayeneyle konur
- ✓ Röntgen bağı değil sonuçlarını gösterir
- ✓ Menisküsü kontrol edin

Görüntüleme | Köpek

Vaka 073 · Kalça displazisi değerlendirmesi ve röntgen yorumu


Hasta
- Köpek
- 5 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Kalkarken zorlanma
- Tavşan gibi zıplayarak koşma

Öykü ve bağlam
- Alman çoban köpeği

Fiziksel muayene
- Kalça ekleminde ağrı
- Ortolani testi (sedasyonda) pozitif

Ek bulgular
- VD kalça röntgeninde sığ asetabulum, femur başı subluksasyonu
- Femur boynunda osteofit (Morgan çizgisi)



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kalça displazisi nasıl değerlendirilir?
2. Genç ve yetişkin hastada tedavi neden farklıdır?
3. Hangi faktörler belirtileri artırır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kalça displazisi ve sekonder osteoartrit
- Lumbosakral stenoz
- Kranial çapraz bağ hastalığı

Yorumlu çözüm
Sığ asetabulum, subluksasyon ve dejeneratif değişiklikler kalça displazisini gösterir. Genç hastalarda koruyucu cerrahiler, yetişkinlerde ağrı yönetimi, fizyoterapi ve kilo kontrolü; ileri olgularda total kalça protezi veya femur başı ostektomisi düşünülür. Kilo ve aşırı hareket belirtileri artırır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Röntgen pozisyonu doğru olmalı
- ✓ Kilo kontrolü en etkili önlemdir
- ✓ Tedavi yaş ve şiddete göre seçilir

Görüntüleme | Kedi

Vaka 074 · Ultrasonda böbrekleri asimetrik olan yaşlı kedi


Hasta
- Kedi
- 12 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kilo kaybı
- Kusma

Öykü ve bağlam
- Böbrek değerleri yüksek

Fiziksel muayene
- Sol böbrek büyük, sağ küçük

Ek bulgular
- Ultrason: sol böbrekte pelvis genişlemesi ve üreterde taş
- Sağ böbrek küçük, kortikal hiperekojenite



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. 'Büyük böbrek-küçük böbrek' sendromu neyi düşündürür?
2. Üreter taşı neden acildir?
3. Tedavi seçenekleri nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Üreteral obstrüksiyon (kalsiyum oksalat taşı)
- Kronik böbrek hastalığı
- Böbrek lenfoması

Yorumlu çözüm
Bir böbrekte hidronefroz ve üreter taşı, diğerinde kronik küçülme 'büyük böbrek-küçük böbrek' sendromunu oluşturur; işlevsel böbreğin tıkanması akut azotemiye yol açar. Üreter obstrüksiyonu böbrek kaybını önlemek için hızla değerlendirilmelidir. Medikal diürez denenebilir; yanıt yoksa subkutan üreteral bypass veya stent gerekir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Asimetrik böbrekler = üreteri kontrol edin
- ✓ Obstrüksiyon böbrek kaybına yol açar
- ✓ Medikal yanıt yoksa cerrahi

Görüntüleme | Köpek

Vaka 075 · Kronik öksürük ve toraks röntgeninde nodüller


Hasta
- Köpek
- 13 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kronik öksürük
- Kilo kaybı

Öykü ve bağlam
- Bir yıl önce meme bölgesinde değil, ağızda melanom alınmış

Fiziksel muayene
- Solunum sesleri hafif sert

Ek bulgular
- Toraks röntgeninde yaygın 'top' şeklinde nodüller (3 projeksiyon)



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Metastaz taramasında neden 3 projeksiyon önerilir?
2. Nodüllerin dağılımı neyi düşündürür?
3. BT'nin üstünlüğü nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Pulmoner metastaz
- Fungal pnömoni
- Primer akciğer tümörü

Yorumlu çözüm
Malign tümör öyküsü olan köpekte yaygın yuvarlak akciğer nodülleri pulmoner metastazı düşündürür. Üç projeksiyon (sağ, sol lateral ve VD) küçük nodüllerin saptanma olasılığını artırır; BT daha duyarlıdır. Prognoz ve palyatif bakım planı sahiple paylaşılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Metastaz taramasında 3 projeksiyon
- ✓ BT daha duyarlıdır
- ✓ Öykü yorumu yönlendirir

Klinik korelasyon | Köpek

Vaka 076 · Laboratuvar 'normal' ama klinik tablo ağır olan köpek


Hasta
- Köpek
- 7 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Ani halsizlik
- Hızlı solunum

Öykü ve bağlam
- Sabah aniden başlamış

Fiziksel muayene
- Soluk mukozalar
- Taşikardi
- Karında sıvı

Ek bulgular
- İlk hematokrit: %38 (normal)
- Total protein düşük
- Abdominosentezde kan



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Akut kanamada hematokrit neden hemen düşmez?
2. Total protein neden ipucu verir?
3. Hangi tetkik önceliklidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Akut iç kanama
- Septik şok
- Anafilaksi

Yorumlu çözüm
Akut kanamada kan bütün olarak kaybedildiği için hematokrit ilk saatlerde normal kalabilir; dalak kontraksiyonu da bunu maskeler. Total proteinin düşmesi daha erken bir ipucudur. Klinik bulgular laboratuvardan önce gelir; POCUS ve abdominosentez hızla iç kanamayı gösterir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Laboratuvar klinikle birlikte yorumlanır
- ✓ Akut kanamada hematokrit gecikir
- ✓ Total protein erken düşer

Klinik korelasyon | Kedi

Vaka 077 · Stres hiperglisemisi ile diyabeti ayırt etme


Hasta
- Kedi
- 5 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kliniğe getirilirken çok stresli
- Rutin kontrol

Öykü ve bağlam
- Su tüketimi normal

Fiziksel muayene
- Muayene normal, aşırı huzursuz

Ek bulgular
- Glukoz: 260 mg/dL
- Glukozüri yok
- Fruktozamin normal



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Stres kedide glukozu nasıl etkiler?
2. Fruktozamin neden ayırt edicidir?
3. Klinik belirti neden önemlidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Stres hiperglisemisi
- Erken diabetes mellitus
- Akromegali

Yorumlu çözüm
Kedilerde stres glukozu belirgin şekilde yükseltebilir. Klinik belirti, glukozüri ve yüksek fruktozamin olmadan tek bir yüksek glukoz değeri diyabet tanısı için yeterli değildir. Fruktozaminin normal olması geçici stres hiperglisemisini destekler; evde ölçüm veya tekrar test planlanabilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Tek glukoz ölçümüyle diyabet tanısı konmaz
- ✓ Fruktozamin kronik değeri gösterir
- ✓ Kedi dostu klinik yaklaşımı stresi azaltır

Klinik korelasyon | Köpek

Vaka 078 · Hemolizli kan örneğinde yanıltıcı sonuçlar


Hasta
- Köpek
- 6 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Rutin operasyon öncesi tahlil

Öykü ve bağlam
- Kan alma zorlu olmuş, ince iğne kullanılmış

Fiziksel muayene
- Muayene normal

Ek bulgular
- Serum kırmızı renkte (hemoliz)
- Potasyum hafif yüksek, ALT hafif yüksek
- Tekrar alınan örnekte değerler normal



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hemoliz hangi parametreleri etkiler?
2. Örnek kalitesi neden tanının parçasıdır?
3. Doğru kan alma için neler yapılmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Preanalitik hata (in vitro hemoliz)
- İn vivo hemoliz
- Gerçek elektrolit bozukluğu

Yorumlu çözüm
Zor kan alma ve ince iğne in vitro hemolize yol açarak potasyum, bazı enzimler ve renk tabanlı ölçümleri yanıltabilir. Klinik bulgularla uyumsuz sonuçlar örnek kalitesinin sorgulanmasını gerektirir. Uygun iğne çapı, nazik aspirasyon ve doğru tüp sırasıyla tekrar örnek alınmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Önce örnek kalitesine bakın
- ✓ Hemoliz potasyumu yanıltır
- ✓ Uyumsuz sonuçları tekrarlayın

Klinik korelasyon | Köpek

Vaka 079 · Ateş, nötrofili ve bacakta şişlik: sepsisin kaynağını arama


Hasta
- Köpek
- 12 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Ateş
- Bir bacakta şişlik ve ağrı

Öykü ve bağlam
- 10 gün önce bacakta ısırık yarası

Fiziksel muayene
- Ateş: 40,4 °C
- Sol arka bacakta sıcak, ağrılı ve dalgalanan şişlik

Ek bulgular
- Nötrofili, sola kayma
- İİA: dejenere nötrofiller ve hücre içi bakteriler



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Dejenere nötrofil neyi gösterir?
2. Kaynak kontrolü neden önemlidir?
3. Kültür neden gereklidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Isırık apsesi ve selülit
- Septik artrit
- Nekrotizan fasiit

Yorumlu çözüm
Isırık öyküsü, dalgalanan sıcak şişlik ve aspiratta dejenere nötrofillerle hücre içi bakteriler apseyi gösterir. Tedavide kaynak kontrolü (drenaj, debridman) en önemli adımdır. Kültür ve antibiyogram alınır, uygun antibiyotik ve analjezi verilir. Hızla yayılan ağrı nekrotizan fasiit açısından uyarıcıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Hücre içi bakteri = septik süreç
- ✓ Önce drenaj
- ✓ Kültür ve antibiyogram alın

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Klinik korelasyon | Kedi

Vaka 080 · Hipertiroidizm tedavisi sonrası ortaya çıkan böbrek yetmezliği


Hasta
- Kedi
- 14 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Antitiroid tedavi sonrası iştahsızlık

Öykü ve bağlam
- Tedavi öncesi kreatinin normal

Fiziksel muayene
- Kilo artışı başlamış
- Hafif dehidratasyon

Ek bulgular
- T4 normal aralıkta
- Kreatinin: 2,6 mg/dL (tedavi öncesi 1,4)
- İdrar dansitesi: 1,016



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hipertiroidizm böbrek fonksiyonunu nasıl maskeler?
2. Tedavi dozu nasıl ayarlanmalı?
3. Hangi parametreler birlikte izlenir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Maskelenmiş kronik böbrek hastalığının ortaya çıkması
- İatrojenik hipotiroidizm
- Prerenal azotemi

Yorumlu çözüm
Hipertiroidizm glomerüler filtrasyon hızını artırarak altta yatan böbrek hastalığını gizleyebilir; tiroid hormonu düştüğünde azotemi ortaya çıkar. İatrojenik hipotiroidizm böbrek fonksiyonunu kötüleştirebileceğinden T4 normal aralıkta tutulmalı, gerekirse TSH ölçülmelidir. T4, kreatinin ve kan basıncı birlikte izlenir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Tiroid tedavisi böbrek hastalığını açığa çıkarabilir
- ✓ İatrojenik hipotiroidizmden kaçının
- ✓ T4 ve kreatinini birlikte izleyin

Sitoloji | Köpek

Vaka 081 · Meme zincirinde birden fazla kitle olan kısırlaştırılmamış köpek


Hasta
- Köpek
- 10 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Meme bölgesinde şişlikler

Öykü ve bağlam
- Kısırlaştırılmamış
- Kitleler 6 aydır büyüyor

Fiziksel muayene
- Kaudal meme lobunda 3 cm, diğerlerinde küçük nodüller
- İnguinal lenf düğümü hafif büyük

Ek bulgular
- İİA: kümeler hâlinde epitel hücreleri, belirgin anizokaryoz
- Toraks röntgeninde metastaz yok



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Meme tümörlerinde sitolojinin sınırları nelerdir?
2. Evreleme için neler yapılır?
3. Erken kısırlaştırmanın etkisi nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Meme karsinomu
- Benign meme tümörü
- İnflamatuvar karsinom

Yorumlu çözüm
Kısırlaştırılmamış yaşlı dişide çoklu meme kitleleri sık görülür; yaklaşık yarısı malignndir. Sitoloji yol gösterir ama malignite ayrımı için histopatoloji gerekir. Evreleme toraks görüntülemesi ve lenf düğümü değerlendirmesini içerir. Cerrahi eksizyon temel tedavidir; erken kısırlaştırma riski belirgin şekilde azaltır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Tanı ve derece histopatolojiyle
- ✓ Toraks görüntülemesi evrelemenin parçası
- ✓ Erken kısırlaştırma koruyucudur

Vaka 082

Sitoloji | Köpek

Vaka 082 · Kulak akıntısı ve kulak sitolojisinin yorumu


Hasta
- Köpek
- 6 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Başını sallama
- Kulakta kötü koku

Öykü ve bağlam
- Daha önce birkaç kez kulak damlası kullanmış

Fiziksel muayene
- Sağ kulakta pürülan akıntı, ödem
- Kulak zarı görülemiyor

Ek bulgular
- Kulak sitolojisi: çok sayıda çubuk bakteri ve dejenere nötrofil
- Kültür: Pseudomonas aeruginosa



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Sitoloji tedavi seçimini nasıl yönlendirir?
2. Çubuk bakteri neden önemlidir?
3. Kulak zarı görülemezse ne yapılmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Bakteriyel otitis eksterna (Pseudomonas)
- Malassezia otiti
- Otitis media

Yorumlu çözüm
Kulak sitolojisinde çubuk bakteriler ve nötrofiller Pseudomonas gibi dirençli etkenleri düşündürür; kültür ve antibiyogram gereklidir. Kulak zarı değerlendirilemiyorsa ototoksik ilaçlardan kaçınılır ve sedasyon altında kulak temizliği yapılır. Altta yatan alerji gibi primer nedenler yönetilmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Her otitte sitoloji yapın
- ✓ Çubuk bakteri = kültür alın
- ✓ Primer nedeni bulun

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Sitoloji | Köpek

Vaka 083 · Göğüs boşluğunda süt rengi sıvı birikimi


Hasta
- Köpek
- 8 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Nefes darlığı
- Egzersiz intoleransı

Öykü ve bağlam
- Afgan tazısı

Fiziksel muayene
- Ventral toraksta boğuk sesler

Ek bulgular
- Torasentez: süt beyazı sıvı
- Sıvı trigliserit > serum trigliserit
- Sitoloji: olgun küçük lenfositler



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Şilöz efüzyon nasıl doğrulanır?
2. Altta yatan nedenler nelerdir?
3. Tedavi seçenekleri nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Şilotoraks (idiyopatik)
- Lenfoma
- Kalp yetmezliği

Yorumlu çözüm
Süt beyazı sıvıda trigliseritin serumdan yüksek olması şilöz efüzyonu doğrular. Kalp hastalığı, neoplazi ve travma gibi nedenler araştırılmalıdır; neden bulunamazsa idiyopatik şilotoraks olarak değerlendirilir. Tedavide tekrarlayan torasentez, düşük yağlı diyet, rutin ve dirençli olgularda cerrahi (duktus torasikus ligasyonu) uygulanır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Trigliserit oranı tanıyı doğrular
- ✓ Altta yatan nedeni arayın
- ✓ Dirençli olgularda cerrahi

Sitoloji | Kedi

Vaka 084 · Burnunda şişlik ve ülserasyon olan dışarı çıkan kedi


Hasta
- Kedi
- 6 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Burun üzerinde şişlik
- Hapşırma

Öykü ve bağlam
- Güvercinlerin olduğu bölgede yaşıyor

Fiziksel muayene
- Burun köprüsünde 'palyaço burnu' şişliği
- Mandibular lenf düğümü büyük

Ek bulgular
- İİA: kalın kapsüllü, tomurcuklanan maya hücreleri



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kalın kapsüllü maya hangi etkendir?
2. Bu enfeksiyon nasıl bulaşır?
3. Tedavi ne kadar sürer?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kriptokokkoz
- Burun lenfoması
- Skuamöz hücreli karsinom

Yorumlu çözüm
Kedide burun köprüsü şişliği ve aspiratta kalın kapsüllü tomurcuklanan mayalar kriptokokkozu gösterir; etken kuş dışkısıyla kirlenmiş çevrede bulunur. Lateks antijen testi tanı ve izlemde kullanılır. Tedavi azol grubu antifungallerle aylarca sürer; antijen titresi negatifleşene kadar devam edilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kapsüllü maya = Cryptococcus
- ✓ Antijen titresiyle izleyin
- ✓ Tedavi aylar sürer

Sitoloji | Köpek

Vaka 085 · Eklem sıvısı analizi ile çoklu eklem ağrısı


Hasta
- Köpek
- 5 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Dolaşan topallık
- Ateş
- Yürümek istememe

Öykü ve bağlam
- Travma yok
- Kene testi negatif

Fiziksel muayene
- Birden fazla eklemde efüzyon ve ağrı
- Ateş: 40,0 °C

Ek bulgular
- Artrosentez: düşük viskozite, nötrofil artışı (dejenere olmayan)
- Kültür negatif



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Septik ve immün aracılı artrit nasıl ayrılır?
2. Neden birden fazla eklemden örnek alınmalı?
3. Tedavi nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İmmün aracılı poliartrit
- Septik artrit
- Vektörle bulaşan hastalıklar

Yorumlu çözüm
Birden fazla eklemde efüzyon, ateş ve sinovyal sıvıda dejenere olmayan nötrofiller immün aracılı poliartriti düşündürür. Septik artrit genellikle tek eklemde ve dejenere nötrofillerle görülür; kültür alınmalıdır. Enfeksiyöz nedenler dışlandıktan sonra immünsüpresif tedavi başlanır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Ateşin kaynağı eklemler olabilir
- ✓ Birden fazla eklemden örnek alın
- ✓ Önce enfeksiyonu dışlayın

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Görüntüleme | Köpek

Vaka 086 · İdrar yapma güçlüğü ve ultrasonda büyümüş prostat


Hasta
- Köpek
- 9 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- İdrar yaparken zorlanma
- Şerit şeklinde dışkı

Öykü ve bağlam
- Kısırlaştırılmamış

Fiziksel muayene
- Rektal muayenede simetrik büyümüş, ağrısız prostat

Ek bulgular
- Ultrasonda homojen büyümüş prostat, küçük kistler
- İdrar kültürü negatif



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kısırlaştırılmamış köpekte en sık prostat hastalığı nedir?
2. Prostat neoplazisi nasıl ayırt edilir?
3. Tedavi seçenekleri nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Benign prostat hiperplazisi
- Prostatit
- Prostat karsinomu

Yorumlu çözüm
Kısırlaştırılmamış yaşlı köpekte simetrik, ağrısız büyümüş prostat benign prostat hiperplazisini düşündürür. Asimetri, mineralizasyon veya kısırlaştırılmış köpekte prostat büyümesi neoplazi açısından uyarıcıdır. Tedavi kastrasyon veya antiandrojen ilaçlardır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kısırlaştırılmamış köpekte BPH sıktır
- ✓ Kısırlaştırılmış köpekte büyük prostat = neoplaziyi düşünün
- ✓ Kastrasyon tedavidir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Görüntüleme | Kedi

Vaka 087 · Trafik kazası sonrası dispne ve göğüs röntgeni


Hasta
- Kedi
- 4 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Nefes darlığı
- Hareket etmek istememe

Öykü ve bağlam
- Arabanın çarptığı düşünülüyor

Fiziksel muayene
- Paradoks solunum yok
- Karın 'boş' hissediliyor
- Kalp sesleri bir tarafta boğuk

Ek bulgular
- Röntgen: toraksta bağırsak ansları, diyafram çizgisi kayıp



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Travmatik diyafram hernisi nasıl tanınır?
2. Ameliyat zamanlaması nasıl belirlenir?
3. Başka hangi travma bulguları aranmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Travmatik diyafram hernisi
- Pnömotoraks
- Akciğer kontüzyonu

Yorumlu çözüm
Travma sonrası dispne, toraksta abdominal organlar ve kayıp diyafram çizgisi diyafram hernisini gösterir. Hasta önce oksijen ve şok tedavisiyle stabilize edilir; mide toraksa girmişse ve şişiyorsa acil cerrahi gerekir. Pnömotoraks, kontüzyon ve diğer yaralanmalar da araştırılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Önce stabilizasyon
- ✓ Mide fıtıklaşırsa acil cerrahi
- ✓ Çoklu travmayı düşünün

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Biyokimya | Köpek

Vaka 088 · Kas hasarı ve CK yüksekliği: nöbet sonrası mı, miyopati mi?


Hasta
- Köpek
- 4 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Ard arda nöbetler sonrası halsizlik
- Koyu renkli idrar

Öykü ve bağlam
- Epilepsi tanısı var

Fiziksel muayene
- Kaslarda hassasiyet
- Ateş: 39,6 °C

Ek bulgular
- CK: 18.000 U/L
- AST yüksek
- İdrarda heme pozitif, eritrosit yok



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. CK neyi gösterir?
2. Heme pozitif ama eritrosit yok ne anlama gelir?
3. Böbrekler neden risk altında?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Nöbet sonrası rabdomiyoliz
- İnflamatuvar miyopati
- Hemoliz

Yorumlu çözüm
Uzun süren nöbetlerden sonra kas hasarı CK'yı yükseltir; idrarda eritrosit olmadan heme pozitifliği miyoglobinüriyi düşündürür. Miyoglobin böbrek tübüllerine zarar verebileceğinden sıvı diürezi ve böbrek değerlerinin izlenmesi gerekir. Nöbet kontrolü gözden geçirilmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ CK kas hasarının belirtecidir
- ✓ Heme + / eritrosit − = miyoglobin veya hemoglobin
- ✓ Böbrekleri koruyun

Hemogram | Köpek

Vaka 089 · Pansitopeni ve kanayan dişetleri olan yaşlı köpek


Hasta
- Köpek
- 11 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Dişeti kanaması
- Halsizlik
- Tekrarlayan enfeksiyonlar

Öykü ve bağlam
- Kene bölgesinde yaşıyor

Fiziksel muayene
- Soluk mukozalar, peteşi
- Ateş

Ek bulgular
- Anemi, lökopeni ve trombositopeni (pansitopeni)
- Globulin yüksek
- Ehrlichia canis serolojisi yüksek titre



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Pansitopeni kemik iliği hakkında ne söyler?
2. Kronik ehrlichiosisin prognozu nedir?
3. Kemik iliği aspirasyonu ne zaman gerekir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kronik ehrlichiosis
- Kemik iliği neoplazisi
- İlaç kaynaklı kemik iliği supresyonu

Yorumlu çözüm
Pansitopeni kemik iliği yetmezliğini gösterir; kene bölgesinde hiperglobulinemi ile birlikte kronik ehrlichiosisi düşündürür. Kronik fazda kemik iliği hipoplazisi gelişebilir ve prognoz akut faza göre kötüdür. Tedavi doksisiklin ve destekleyici tedavidir; neoplazi şüphesinde kemik iliği aspirasyonu yapılır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Pansitopeni = kemik iliğine bakın
- ✓ Hiperglobulinemi kronik enfeksiyonu destekler
- ✓ Kronik form daha kötü prognozludur

İdrar analizi | Kedi

Vaka 090 · Hiperglisemisi olmadan glukozüri görülen kedi


Hasta
- Kedi
- 7 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Su tüketiminde hafif artış

Öykü ve bağlam
- Yeni bir ilaç başlanmamış

Fiziksel muayene
- Muayene normal

Ek bulgular
- Kan glukozu normal
- İdrarda glukoz pozitif
- İdrar örneği sondayla, travmatik alınmış ve bekletilmiş



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Normoglisemik glukozüri hangi durumları düşündürür?
2. Preanalitik hatalar idrar sonucunu nasıl etkiler?
3. Hangi testler tekrarlanmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Tübüler hasar / Fanconi benzeri sendrom
- Örnek kontaminasyonu
- Stres hiperglisemisinin geçmesi

Yorumlu çözüm
Kan glukozu normalken glukozüri; renal tübüler bozukluk, ilaç veya toksin hasarı ya da örnek hatasından kaynaklanabilir. Dip test şeritlerinin bazı kontaminantlarla yanlış pozitif verebileceği unutulmamalıdır. Taze, sistosentezle alınmış örnekle test tekrarlanmalı; gerçekse tübüler fonksiyon araştırılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Normoglisemik glukozüri tübülü düşündürür
- ✓ Önce örneği tekrarlayın
- ✓ Toksin/ilaç öyküsü sorgulanmalı

Klinik korelasyon | Köpek

Vaka 091 · Pozitif kalp kurdu testi ama belirti olmayan köpek: sonuçları birleştirme


Hasta
- Köpek
- 5 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Rutin kontrol, belirti yok

Öykü ve bağlam
- Koruyucu ilaç düzensiz

Fiziksel muayene
- Muayene normal

Ek bulgular
- Antijen testi pozitif
- Mikrofilarya negatif
- Toraks röntgeni normal



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Mikrofilarya negatif olması enfeksiyonu dışlar mı?
2. Belirtisiz hastada evreleme neden yapılır?
3. Tedavi neden yine de gereklidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Gizli (amikrofilaremik) dirofilariozis
- Yanlış pozitif test
- Erken enfeksiyon

Yorumlu çözüm
Antijen pozitif, mikrofilarya negatif köpekte gizli enfeksiyon olabilir; ikinci bir yöntemle doğrulama önerilir. Belirti olmasa da kurtlar pulmoner arterlere zarar verir; röntgen ve gerekirse ekokardiyografiyle evreleme yapılır ve kurallara uygun tedavi planlanır. Tedavi boyunca egzersiz kısıtlanır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Mikrofilarya yokluğu enfeksiyonu dışlamaz
- ✓ Belirtisiz hasta da tedavi edilir
- ✓ Doğrulama testi önerilir

Biyokimya | Köpek

Vaka 092 · Pankreatik lipazı yüksek olan köpek


Hasta
- Köpek
- 7 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Kusma
- Karın ağrısı
- İştahsızlık

Öykü ve bağlam
- Pankreatik spesifik lipaz yüksekliği
- Karaciğer enzimlerinde yükselme

Fiziksel muayene
- Dua pozisyonu (prayer position)
- Orta derecede dehidratasyon

Ek bulgular
- Pankreatik lipaz: 820 µg/L (ref. < 200)
- ALT: 95 U/L, ALP: 180 U/L
- Ultrasonda hipoekoik pankreas ve hiperekoik çevre yağ dokusu



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Yüksek pankreatik lipaz pankreatiti doğrular mı?
2. Ekografi hangi değeri verir?
3. Diğer hastalıklar birlikte olabilir mi?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Akut pankreatit
- Gastroenterit
- Gastrointestinal tıkanıklık
- Karaciğer hastalığı

Yorumlu çözüm
Pankreatik lipazın yüksek olması pankreatitin olası bir belirtisidir, özellikle ultrasonografi bulguları ile birlikte. Bununla birlikte, tek başına test kesin bir tanı koymaz; klinik tablo ve diğer bulgularla desteklenerek değerlendirilmelidir. Tedavi sıvı, analjezi, antiemetik ve erken enteral beslenmeye dayanır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Yüksek lipaz, her zaman pankreatiti göstermez, ancak vakayı tamamlar
- ✓ Görüntüleme ve laboratuvar bulguları birlikte ele alınmalıdır
- ✓ Analjezi ve erken beslenme tedavinin temelidir

Görüntüleme | Köpek

Vaka 093 · Kusma ve ultrasonda 'hedef' görünümü olan genç köpek


Hasta
- Köpek
- 2 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kusma
- Az miktarda kanlı-mukuslu dışkı

Öykü ve bağlam
- Bir hafta önce ağır paraziter ishal geçirmiş

Fiziksel muayene
- Karında sosis şeklinde kitle

Ek bulgular
- Ultrasonda enine kesitte çok katmanlı 'hedef' görünümü



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hedef görünümü neyi gösterir?
2. Genç hayvanlarda tetikleyici nedenler nelerdir?
3. Tedavi nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İntussusepsiyon
- Yabancı cisim
- Bağırsak neoplazisi

Yorumlu çözüm
Genç köpekte enterit sonrası kusma, kanlı-mukuslu dışkı, palpe edilen sosis şeklinde kitle ve ultrasonda 'hedef' görünümü intussusepsiyonu gösterir. Enterit ve parazitler tetikleyici olabilir. Tedavi cerrahi redüksiyon veya canlılığı olmayan segmentin rezeksiyonudur; altta yatan neden tedavi edilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ 'Hedef' görünümü = intussusepsiyon
- ✓ Enterit tetikleyebilir
- ✓ Tedavi cerrahidir

Görüntüleme | Köpek

Vaka 094 · Adrenal bezde kitle ve yüksek kan basıncı


Hasta
- Köpek
- 10 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Ara sıra nefes nefese kalma
- Huzursuzluk atakları

Öykü ve bağlam
- Belirtiler epizodik

Fiziksel muayene
- Kan basıncı: 210 mmHg
- Taşikardi

Ek bulgular
- Ultrasonda sol adrenalde 3 cm kitle, vena kava'ya yakın
- İdrarda normetanefrin yüksek



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Adrenal kitlenin ayırıcı tanısı nedir?
2. Hipertansiyon neden tehlikelidir?
3. Ameliyat öncesi hangi ilaç verilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Feokromositoma
- Adrenokortikal tümör
- İnsidental adrenal nodül

Yorumlu çözüm
Epizodik huzursuzluk, taşikardi, hipertansiyon ve adrenal kitle feokromositomayı düşündürür; idrar normetanefrin yüksekliği tanıyı destekler. Hipertansiyon göz, böbrek ve beyin hasarına yol açabilir. Cerrahi öncesi alfa-bloker ile kan basıncı kontrol edilir; vena kava invazyonu BT ile değerlendirilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Epizodik belirtiler feokromositomada tipiktir
- ✓ Ameliyat öncesi alfa-bloker
- ✓ BT invazyonu gösterir

Klinik korelasyon | Kedi

Vaka 095 · Ani körlük ve yüksek kan basıncı olan kedi


Hasta
- Kedi
- 9 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Eşyalara çarpma
- Gözbebekleri büyük

Öykü ve bağlam
- Kronik böbrek hastalığı tanısı var, kontrolleri aksamış

Fiziksel muayene
- Bilateral midriyazis, tehdit refleksi yok
- Fundusta retina dekolmanı ve kanama

Ek bulgular
- Sistolik kan basıncı: 230 mmHg
- Kreatinin: 2,8 mg/dL



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hipertansiyonun hedef organları nelerdir?
2. Kronik böbrek hastalığında neden düzenli ölçüm gerekir?
3. Tedavi nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hipertansif retinopati
- Glokom
- Merkezi sinir sistemi lezyonu

Yorumlu çözüm
Kronik böbrek hastalığı olan kedide ani körlük ve retina dekolmanı ile birlikte çok yüksek kan basıncı hipertansif retinopatiyi gösterir. Hedef organlar göz, böbrek, kalp ve beyindir. Amlodipin ile kan basıncı düşürülür; erken tedavide görme kısmen geri dönebilir. Böbrek hastalarında kan basıncı düzenli ölçülmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Ani körlük + KBH = kan basıncını ölçün
- ✓ Amlodipin ilk tercih
- ✓ Düzenli ölçüm hedef organ hasarını önler

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Acil | Köpek

Vaka 096 · Araba çarpması sonrası şokta gelen köpek


Hasta
- Köpek
- 3 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Araba çarpması
- Kalkamıyor

Öykü ve bağlam
- 15 dakika önce olmuş

Fiziksel muayene
- Soluk mukozalar, KDZ 3 sn
- Taşikardi, zayıf nabız
- Ekstremitelerde soğukluk

Ek bulgular
- Laktat: 5,2 mmol/L
- T-FAST/A-FAST: az miktarda abdominal sıvı



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Travmalı hastada ilk değerlendirme sırası nedir?
2. Şokun hangi tipi düşünülmeli?
3. Sıvı tedavisi nasıl planlanır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hipovolemik (hemorajik) şok
- Pnömotoraks
- Kafa travması

Yorumlu çözüm
Travmalı hastada ABC (hava yolu, solunum, dolaşım) sırasıyla hızlı birincil değerlendirme yapılır. Soluk mukozalar, uzamış KDZ ve yüksek laktat hipovolemik şoku gösterir. Damar yolu açılır, kristaloid bolusları küçük dozlarla verilir ve yanıt değerlendirilir. POCUS iç kanama ve pnömotoraksı hızlıca tarar.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Önce ABC
- ✓ Laktat perfüzyonu gösterir
- ✓ Sıvıyı bolus ve yeniden değerlendirme ile verin

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Acil | Kedi

Vaka 097 · Balkondan düşen ve burnu kanayan kedi


Hasta
- Kedi
- 2 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Yüksekten düşme
- Burun kanaması
- Nefes darlığı

Öykü ve bağlam
- 5. kattan düşmüş

Fiziksel muayene
- Sert damak yarığı
- Takipne
- Bir arka bacakta şişlik

Ek bulgular
- Toraks röntgeni: pnömotoraks ve akciğer kontüzyonu
- Arka bacakta tibia kırığı



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. 'Yüksekten düşme sendromu'nun tipik bulguları nelerdir?
2. Hangi yaralanma önce tedavi edilir?
3. Torasentez ne zaman yapılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Yüksekten düşme sendromu
- Diyafram hernisi
- Kafa travması

Yorumlu çözüm
Yüksekten düşen kedilerde göğüs travması (pnömotoraks, kontüzyon), sert damak yarığı ve ekstremite kırıkları tipiktir. Önce solunum stabilize edilir: oksijen ve gerekirse torasentez. Kırıklar hasta stabil hâle gelince tedavi edilir; ağrı kontrolü baştan sağlanmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Önce solunum, sonra kırıklar
- ✓ Damak yarığını kontrol edin
- ✓ Ağrı kontrolü erken başlar

Acil | Köpek

Vaka 098 · Arı soktuktan sonra yüz şişliği ve kollaps


Hasta
- Köpek
- 6 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Yüzde ani şişlik
- Kusma
- Kollaps

Öykü ve bağlam
- Bahçede arı sokması

Fiziksel muayene
- Hipotansiyon
- Ürtiker
- Solunum sıkıntısı yok

Ek bulgular
- POCUS: safra kesesi duvarında 'halo' görünümü



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Anafilaksinin köpekte hedef organı nedir?
2. İlk ilaç hangisidir?
3. Hasta ne kadar izlenmelidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Anafilaksi
- Septik şok
- Anjiyoödem

Yorumlu çözüm
Arı sokması sonrası kusma, kollaps ve hipotansiyon anafilaksiyi gösterir; köpeklerde karaciğer ve gastrointestinal sistem başlıca hedef organdır ve safra kesesi duvarında ödem görülebilir. İlk ilaç adrenalindir; ardından sıvı, antihistaminik ve gerekirse kortikosteroid verilir. Bifazik reaksiyon riski nedeniyle hasta saatlerce izlenmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Anafilakside ilk ilaç adrenalin
- ✓ Köpekte safra kesesi halo işareti
- ✓ Bifazik reaksiyona karşı izleyin

Acil · Köpek

Vaka 099 · Sıcak günde koşu sonrası kollaps


Hasta
- Köpek
- 4 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kollaps
- Kusma, kanlı ishal

Öykü ve bağlam
- Öğle sıcağında koşu
- Brakisefalik ırk

Fiziksel muayene
- Rektal ısı: 41,8 °C
- Hiperemik mukozalar
- Zihinsel durum bozuk

Ek bulgular
- Trombositopeni
- PT uzamış
- Glukoz düşük



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Soğutma nasıl yapılmalı?
2. Hangi komplikasyonlar gelişebilir?
3. Neden soğutma 39,5 °C'de durdurulur?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Sıcak çarpması
- Kötü huylu hipertermi
- Septik şok

Yorumlu çözüm
Sıcak ortamda egzersiz sonrası çok yüksek vücut ısısı ve kollaps sıcak çarpmasını gösterir. Soğutma ılık su ve hava akımıyla yapılır; buzlu su vazokonstriksiyonla ısı kaybını azaltır. Rebound hipotermiyi önlemek için 39,5 °C civarında durdurulur. DIC, akut böbrek hasarı ve beyin ödemi açısından izlenmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Ilık su ile soğutun, buzlu su değil
- ✓ 39,5 °C'de soğutmayı durdurun
- ✓ DIC ve böbreği izleyin

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Acil · Köpek

Vaka 100 · Ani nefes darlığı ve inspiratuvar stridor olan köpek


Hasta
- Köpek
- 9 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Gürültülü nefes alma
- Ses değişikliği
- Sıcakta kötüleşme

Öykü ve bağlam
- Labrador retriever
- Belirtiler aylardır yavaş artıyor

Fiziksel muayene
- İnspiratuvar stridor
- Siyanoz eğilimi
- Hipertermi

Ek bulgular
- Sedasyon altında larinks muayenesi: aritenoidler inspirasyonda açılmıyor



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. İnspiratuvar stridor hava yolunun hangi kısmını gösterir?
2. Acil yönetim nasıl olmalı?
3. Kalıcı tedavi nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Larinks paralizisi
- Larinks kitlesi
- Brakisefalik sendrom

Yorumlu çözüm
İnspiratuvar stridor ve ses değişikliği üst hava yolu, özellikle larinks sorununu gösterir. Yaşlı büyük ırkta larinks paralizisi sıktır. Akut krizde sedasyon, oksijen ve soğutma yapılır; gerekirse entübasyon veya geçici trakeostomi gerekir. Kalıcı tedavi tek taraflı aritenoid lateralizasyondur; aspirasyon pnömonisi riski konuşulmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ İnspiratuvar stridor = üst hava yolu
- ✓ Sedasyon ve soğutma krizi rahatlatır
- ✓ Cerrahi sonrası aspirasyon riski var

Acil | Kedi

Vaka 101 · Ani gelişen göğüs travması olmayan pnömotoraks


Hasta
- Kedi
- 7 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Hızlı ve yüzeysel solunum
- Saklanma

Öykü ve bağlam
- Travma öyküsü yok
- Kronik öksürük öyküsü

Fiziksel muayene
- Dorsal akciğer alanlarında sesler azalmış
- Takipne

Ek bulgular
- POCUS: kayma işareti (lung sliding) kayıp
- Torasentezde bol hava



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Spontan pnömotoraksın nedenleri nelerdir?
2. Torasentez neden hem tanısal hem tedavidir?
3. Ne zaman cerrahi gerekir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Spontan pnömotoraks (büllöz hastalık, astım)
- Akciğer neoplazisi
- Travma

Yorumlu çözüm
Travma olmadan gelişen pnömotoraks altta yatan akciğer hastalığını (büller, astım, neoplazi, parazit) düşündürür. Torasentez solunumu hızla rahatlatır. Tekrarlayan hava birikiminde göğüs tüpü takılır; devam eden kaçakta BT ile lezyon araştırılıp cerrahi düşünülür.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Dorsal sessizlik = havayı düşünün
- ✓ Torasentez hayat kurtarır
- ✓ Tekrarlıyorsa BT ve cerrahi

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Acil | Köpek

Vaka 102 · Sürekli nöbet geçiren köpek (status epileptikus)


Hasta
- Köpek
- 5 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- 30 dakikadır durmayan nöbet

Öykü ve bağlam
- Bilinen epilepsi
- İlaç dozunu atlamış

Fiziksel muayene
- Generalize tonik-klonik aktivite
- Hipertermi: 41,0 °C

Ek bulgular
- Glukoz normal
- Elektrolitler normal



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Status epileptikus tanımı nedir?
2. İlk basamak ilaç hangisidir?
3. Hangi komplikasyonlar izlenmelidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İdiyopatik epilepside status epileptikus (ilaç uyumsuzluğu)
- Toksin
- Metabolik nöbet

Yorumlu çözüm
5 dakikadan uzun süren nöbet veya arada bilinç dönmeden tekrarlayan nöbetler status epileptikustur. İlk basamak benzodiazepindir (IV, rektal veya intranazal); yanıt yoksa ikinci basamak antiepileptik veya infüzyon kullanılır. Hipertermi, hipoglisemi, aspirasyon ve beyin ödemi açısından izlenmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ 5 dakika üzeri nöbet acildir
- ✓ İlk ilaç benzodiazepin
- ✓ Hipertermi ve beyin ödemini izleyin

Acil | Köpek

Vaka 103 · Ani kollaps ve karında sıvı ile gelen köpek: hemoabdomen


Hasta
- Köpek
- 8 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Ani kollaps
- Soluk dişetleri

Öykü ve bağlam
- Belirti yokken aniden

Fiziksel muayene
- Karında sıvı dalgası
- Taşikardi
- Zayıf nabız

Ek bulgular
- Abdominosentez: pıhtılaşmayan kan
- Sıvıdaki hematokrit periferikle benzer



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Pıhtılaşmayan kan neyi gösterir?
2. Permissif hipotansiyon nedir?
3. Otolog transfüzyon ne zaman düşünülür?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Rüptüre abdominal kitle
- Koagülopati
- Travma

Yorumlu çözüm
Abdominosentezde pıhtılaşmayan kan aktif olmayan, önceden olmuş iç kanamayı gösterir; damar içinden yanlışlıkla alınan kan pıhtılaşır. Stabilizasyonda permissif hipotansiyon hedeflenir, aşırı sıvı kanamayı artırabilir. Kan ürünleri hazırlanır; kaynak kontrolü için cerrahi planlanır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Pıhtılaşmayan kan = boşluk içi kanama
- ✓ Aşırı sıvı vermekten kaçının
- ✓ Kan ürünlerini hazırlayın

Acil | Kedi

Vaka 104 · Dövüş sonrası ateş ve göğüs boşluğunda irin birikimi


Hasta
- Kedi
- 3 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Nefes darlığı
- Ateş
- İştahsızlık

Öykü ve bağlam
- Dışarı çıkan, kavgacı kedi

Fiziksel muayene
- Ventral göğüste boğuk sesler
- Ateş: 40,1 °C

Ek bulgular
- Torasentez: kötü kokulu, bulanık sıvı
- Sitoloji: dejenere nötrofiller, karışık bakteriler



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Piyotoraks nasıl tanınır?
2. Tedavide göğüs tüpünün rolü nedir?
3. Hangi bakteriler sıktır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Piyotoraks
- Şilotoraks
- FIP efüzyonu

Yorumlu çözüm
Kötü kokulu septik efüzyon piyotoraksı gösterir; kedilerde genellikle ağız florasından anaerob karışık bakteriler sorumludur. Tedavide göğüs tüpleri ile drenaj ve lavaj, geniş spektrumlu antibiyotik ve destekleyici tedavi yapılır. Erken ve agresif tedaviyle prognoz iyidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kötü koku anaerobu düşündürür
- ✓ Drenaj tedavinin temelidir
- ✓ Geniş spektrumlu antibiyotik başlayın

Acil | Köpek

Vaka 105 · Göğüs kafesine kitle baskısı olmadan ani dispne: kardiyojenik ödem


Hasta
- Köpek
- 10 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Gece başlayan nefes darlığı
- Pembe köpüklü burun akıntısı

Öykü ve bağlam
- Bilinen mitral kapak hastalığı, ilaçları kesilmiş

Fiziksel muayene
- Ortopne
- Akciğerlerde yaygın krepitasyon
- Sol apikal üfürüm

Ek bulgular
- POCUS: B-çizgileri yaygın, sol atriyum büyük



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Dispneik hastada röntgen ne zaman çekilmeli?
2. Akut tedavide hangi ilaçlar verilir?
3. Sahip neyi takip etmeli?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Akut kardiyojenik pulmoner ödem
- Pnömoni
- Akut solunum sıkıntısı sendromu

Yorumlu çözüm
Bilinen kalp hastalığı olan köpekte akut dispne, pembe köpüklü akıntı ve yaygın B-çizgileri kardiyojenik ödemi gösterir. Stresli hastada röntgen stabilizasyondan sonra çekilir. Oksijen, IV/IM furosemid, pimobendan ve gerekirse sedasyon (butorfanol) verilir. Sahip evde istirahat solunum sayısını izlemelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Önce stabilizasyon, sonra röntgen
- ✓ Furosemid + oksijen ilk adımdır
- ✓ İlaçların kesilmesi krize yol açabilir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Zehirlenmeler | Köpek

Vaka 106 · Bitter çikolata yedikten sonra huzursuzluk ve taşikardi


Hasta
- Köpek
- 3 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Huzursuzluk
- Kusma
- Çok su içme

Öykü ve bağlam
- 2 saat önce yaklaşık 100 g bitter çikolata yemiş
- Vücut ağırlığı 8 kg

Fiziksel muayene
- Taşikardi: 190/dk
- Tremor
- Hipertermi

Ek bulgular
- EKG: sinüs taşikardisi, ventriküler erken atımlar



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Toksik maddenin adı ve etkisi nedir?
2. Kusturma ne zaman uygundur?
3. Tedavide hangi önlemler alınır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Metilksantin (teobromin) zehirlenmesi
- Amfetamin zehirlenmesi
- Kafein zehirlenmesi

Yorumlu çözüm
Çikolatadaki teobromin ve kafein (metilksantinler) köpekte uyarılma, kusma, taşikardi, aritmi ve tremor yapar; bitter çikolata en tehlikelisidir. Erken dönemde kusturma ve aktif kömür (tekrarlanan dozlar) uygulanır. Sıvı tedavisi, aritmi ve tremor kontrolü yapılır; mesane sık boşaltılmalıdır (geri emilim).

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Bitter çikolata en toksiktir
- ✓ Aktif kömür tekrarlanabilir
- ✓ Mesaneyi boş tutun

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Zehirlenmeler | Kedi

Vaka 107 · Köpeğe ait pire damlası uygulanan kedide tremor


Hasta
- Kedi
- 4 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kasılmalar, titreme
- Salya

Öykü ve bağlam
- Sahip köpek için olan spot-on'u kediye sürmüş

Fiziksel muayene
- Generalize tremor
- Hipertermi
- Midriyazis

Ek bulgular
- Glukoz normal



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hangi etken madde kediler için toksiktir?
2. Dekontaminasyon nasıl yapılır?
3. Tremor nasıl kontrol edilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Permetrin zehirlenmesi
- Organofosfat zehirlenmesi
- Epilepsi

Yorumlu çözüm
Köpeğe özel pire ürünlerindeki permetrin kedilerde ciddi nörotoksisiteye yol açar. Hasta stabilize edildikten sonra ılık su ve bulaşık deterjanı ile yıkanır. Tremor metokarbamol ile, nöbetler benzodiazepinle kontrol edilir; IV lipid emülsiyonu düşünülebilir. Vücut ısısı izlenmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Köpek ürünlerini kedide kullanmayın
- ✓ Yıkama dekontaminasyondur
- ✓ Metokarbamol tremoru azaltır

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Zehirlenmeler | Köpek

Vaka 108 · Üzüm yedikten sonra kusma ve az idrar yapma


Hasta
- Köpek
- 5 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kusma
- İdrar azalması

Öykü ve bağlam
- 2 gün önce kuru üzüm yemiş

Fiziksel muayene
- Dehidratasyon
- Böbrek bölgesinde ağrı

Ek bulgular
- Kreatinin: 4,8 mg/dL
- Fosfor ve kalsiyum yüksek
- İdrar çıkışı düşük



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Üzüm toksisitesinde doz-yanıt ilişkisi nasıldır?
2. Erken dönemde hangi önlemler alınır?
3. Oligüri neden prognozu kötüleştirir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Üzüm/kuru üzüm toksisitesi (akut böbrek hasarı)
- Leptospiroz
- Etilen glikol zehirlenmesi

Yorumlu çözüm
Üzüm ve kuru üzüm köpeklerde öngörülemeyen şekilde akut böbrek hasarına yol açabilir; güvenli doz yoktur. Erken dönemde kusturma, aktif kömür ve 48-72 saat sıvı diürezi önerilir. Oligüri gelişirse prognoz kötüleşir; diüretik, sıvı dengesi ve gerekirse diyaliz değerlendirilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Üzümde güvenli doz yoktur
- ✓ Erken diürez böbreği korur
- ✓ İdrar çıkışını ölçün

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Zehirlenmeler | Kedi

Vaka 109 · Zambak çiçeği kemirdikten sonra kusma


Hasta
- Kedi
- 2 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Kusma
- Salya
- İştahsızlık

Öykü ve bağlam
- Evdeki buket zambak içeriyor

Fiziksel muayene
- Hafif dehidratasyon

Ek bulgular
- Başlangıçta böbrek değerleri normal
- İdrarda tübüler silendirler



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Zambak kediler için ne kadar toksiktir?
2. Böbrek değerleri normal diye taburcu edilir mi?
3. Tedavi ne kadar sürer?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Zambak (Lilium) zehirlenmesi
- Gastrit
- Etilen glikol zehirlenmesi

Yorumlu çözüm
Lilium ve Hemerocallis türlerinin tüm parçaları, polen ve vazodaki su dahil, kedilerde akut böbrek hasarı yapar. Başlangıçta böbrek değerleri normal olabilir; silendirüri erken bir ipucudur. Erken dekontaminasyon ve en az 48 saat agresif sıvı diürezi uygulanmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Zambakta polen bile toksiktir
- ✓ Normal kreatinin güvence değildir
- ✓ Erken diürez hayat kurtarır

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Zehirlenmeler | Köpek

Vaka 110 · Ağrı kesici (ibuprofen) yutan köpekte kusma


Hasta
- Köpek
- 7 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kanlı kusma
- Karın ağrısı

Öykü ve bağlam
- Sahibin ilaç kutusunu çiğnemiş

Fiziksel muayene
- Kranial karın ağrısı
- Hafif dehidratasyon

Ek bulgular
- Üre ve kreatinin hafif yüksek
- Hematokrit hafif düşük



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. NSAİİ zehirlenmesinde hangi organlar etkilenir?
2. Doza göre klinik tablo nasıl değişir?
3. Gastroprotektif tedavi neleri içerir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İbuprofen (NSAİİ) zehirlenmesi
- Gastrik yabancı cisim
- Gastrit

Yorumlu çözüm
İnsan NSAİİ'leri köpeklerde gastrointestinal ülserasyon, akut böbrek hasarı ve yüksek dozlarda nörolojik belirtiler yapar. Dekontaminasyon sonrası gastroprotektif ilaçlar (proton pompası inhibitörü, sukralfat) ve böbrek koruyucu sıvı tedavisi uygulanır. Böbrek değerleri birkaç gün izlenir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Doz klinik tabloyu belirler
- ✓ Mide ve böbreği koruyun
- ✓ Böbrek değerlerini izleyin

Zehirlenmeler | Kedi

Vaka 111 · Parasetamol verilen kedide kahverengi mukoza ve yüz ödemi


Hasta
- Kedi
- 1 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Nefes darlığı
- Yüz ve patilerde şişlik

Öykü ve bağlam
- Sahip ateşi düşsün diye parasetamol vermiş

Fiziksel muayene
- Kahverengi-siyanotik mukozalar
- Yüz ödemi
- Takipne

Ek bulgular
- Kan çikolata kahvesi renginde
- Eritrositlerde Heinz cisimcikleri
- Methemoglobin yüksek



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kedi neden parasetamole duyarlıdır?
2. Methemoglobinemi nasıl tanınır?
3. Antidot nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Parasetamol zehirlenmesi
- Soğan zehirlenmesi
- Kardiyojenik dispne

Yorumlu çözüm
Kediler glukuronidasyon kapasitesi düşük olduğu için parasetamolü metabolize edemez; methemoglobinemi, Heinz cisimciği anemisi ve yüz ödemi gelişir. Antidot N-asetilsisteindir; oksijen, destekleyici tedavi ve gerekirse transfüzyon yapılır. Sahiplere insan ilaçlarının kedilerde kullanılmaması anlatılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Parasetamol kedide çok toksiktir
- ✓ Kahverengi kan = methemoglobin
- ✓ Antidot N-asetilsistein

Zehirlenmeler | Köpek

Vaka 112 · Tarım ilacı temasından sonra salya, kusma ve kas titremesi


Hasta
- Köpek
- 4 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Aşırı salya
- Kusma, ishal
- Kas seğirmesi

Öykü ve bağlam
- Bahçede ilaçlama yapılmış

Fiziksel muayene
- Miyozis
- Bradikardi
- Bronkore

Ek bulgular
- Kolinesteraz aktivitesi düşük



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Muskarinik ve nikotinik belirtiler nelerdir?
2. Atropinin rolü nedir?
3. Personel nasıl korunmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Organofosfat / karbamat zehirlenmesi
- Permetrin zehirlenmesi
- Mantar zehirlenmesi

Yorumlu çözüm
Salya, gözyaşı, idrar, dışkılama, kusma (SLUDGE), miyozis ve bradikardi muskarinik; kas seğirmesi ve güçsüzlük nikotinik etkilerdir. Kolinesteraz inhibisyonu tanıyı destekler. Atropin muskarinik belirtileri kontrol eder; organofosfatlarda erken dönemde pralidoksim düşünülebilir. Dekontaminasyonda personel eldiven kullanmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ SLUDGE + miyozis = kolinerjik kriz
- ✓ Atropin muskarinik etkileri durdurur
- ✓ Yıkama sırasında koruyucu ekipman

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Zehirlenmeler | Köpek

Vaka 113 · Esrarlı yiyecek yedikten sonra ataksi ve idrar kaçırma


Hasta
- Köpek
- 2 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Sendeleme
- İdrar kaçırma
- Aşırı ses ve harekete tepki

Öykü ve bağlam
- Evde misafir varmış

Fiziksel muayene
- Ataksi
- Hiperestezi
- Bradikardi

Ek bulgular
- Glukoz normal



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. THC zehirlenmesinin tipik bulguları nelerdir?
2. Çikolatalı yiyeceklerde ek risk nedir?
3. Tedavi destekleyici midir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- THC (kenevir) zehirlenmesi
- İvermektin zehirlenmesi
- Vestibüler hastalık

Yorumlu çözüm
Ataksi, idrar kaçırma, uyaranlara aşırı tepki ve bradikardi THC zehirlenmesini düşündürür. Ürün çikolatalıysa metilksantin toksisitesi de eklenir. Tedavi genelde destekleyicidir: sessiz ortam, ısı kontrolü, sıvı ve gerekirse IV lipid emülsiyonu. Sahiple yargılamadan konuşmak doğru öyküyü almayı kolaylaştırır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ İdrar kaçırma + hiperestezi tipiktir
- ✓ Çikolata içeriğini sorgulayın
- ✓ Yargılamadan öykü alın

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Zehirlenmeler | Köpek

Vaka 114 · Ormanda yürüyüş sonrası ağızda şişlik ve dil nekrozu


Hasta
- Köpek
- 6 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Aşırı salya
- Dilde şişlik
- Ağzını patileme

Öykü ve bağlam
- Çam ağaçlarının olduğu bölgede yürüyüş
- İlkbahar

Fiziksel muayene
- Dilde ödem ve renk değişikliği
- Yüzde ödem

Ek bulgular
- Çevrede kese şeklinde tırtıl yuvaları görülmüş



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Çam kese böceği tırtılı nasıl zarar verir?
2. İlk müdahalede ne yapılmamalı?
3. Uzun dönem komplikasyonlar nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Çam kese böceği tırtılı teması
- Anafilaksi
- Yanık

Yorumlu çözüm
İlkbaharda çam ormanında yürüyüş sonrası ağızda ödem ve dil renk değişikliği çam kese böceği tırtılının kıllarındaki toksinle teması düşündürür. Bölge ovulmadan bol suyla yıkanır; kortikosteroid, antihistaminik ve analjezi verilir. Dilde nekroz ve doku kaybı gelişebilir; hasta günlerce izlenmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Ovmayın, bol suyla yıkayın
- ✓ Dil nekrozu gelişebilir
- ✓ Mevsim ve ortam öyküsü önemlidir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Akut değişiklikler | Köpek

Vaka 115 · Ani gelişen akut böbrek hasarı ve oligüri


Hasta
- Köpek
- 12 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kusma
- İdrar yapmama (12 saattir)

Öykü ve bağlam
- Kronik hastalık öyküsü yok

Fiziksel muayene
- Dehidratasyon düzeltildikten sonra idrar çıkışı < 0,5 mL/kg/saat

Ek bulgular
- Kreatinin: 6,2 mg/dL
- Potasyum: 7,0 mmol/L
- İdrar dansitesi: 1,012



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Prerenal ve renal azotemi nasıl ayrılır?
2. Oligüri nasıl ölçülür?
3. Diyaliz ne zaman gerekir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Akut böbrek hasarı (toksik / iskemik / enfeksiyöz)
- Postrenal obstrüksiyon
- Prerenal azotemi

Yorumlu çözüm
Rehidratasyona rağmen düşük idrar çıkışı ve izostenüriye yakın dansiteyle azotemi renal kaynaklı akut böbrek hasarını gösterir. İdrar çıkışı sonda ile saatlik ölçülür. Hiperkalemi ve sıvı yüklenmesi kontrol edilir; tedaviye yanıt yoksa diyaliz düşünülür. Leptospiroz ve toksinler araştırılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ İdrar çıkışını saatlik ölçün
- ✓ Sıvı yüklenmesinden kaçının
- ✓ Nedeni araştırın: toksin, enfeksiyon, iskemi

Akut değişiklikler | Köpek

Vaka 116 · Ameliyat sonrası hipotansiyon ve taşikardi: sepsis mi?


Hasta
- Köpek
- 7 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Ameliyat sonrası ikinci gün halsizlik
- Ateş

Öykü ve bağlam
- İki gün önce bağırsak rezeksiyonu yapılmış

Fiziksel muayene
- Hiperemik mukozalar, hızlı KDZ
- Taşikardi
- Karında ağrı

Ek bulgular
- Abdominal sıvıda dejenere nötrofil ve hücre içi bakteri
- Sıvı glukozu kan glukozundan 20 mg/dL düşük



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Septik peritonit nasıl doğrulanır?
2. Sepsisin erken (hiperdinamik) fazının bulguları nelerdir?
3. Tedavide zaman neden kritiktir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Anastomoz kaçağına bağlı septik peritonit
- Postoperatif ağrı
- Pankreatit

Yorumlu çözüm
Bağırsak ameliyatı sonrası ateş, karın ağrısı ve hiperdinamik bulgular anastomoz kaçağını düşündürür. Sıvıda hücre içi bakteri ve sıvı-kan glukoz farkı septik peritoniti destekler. Erken antibiyotik, sıvı resüsitasyonu ve acil cerrahi kaynak kontrolü hayatta kalmayı belirler.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Anastomoz kaçağı 2-5. günlerde görülür
- ✓ Sıvı analizi hızlı tanı sağlar
- ✓ Erken kaynak kontrolü şart

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Akut değişiklikler | Kedi

Vaka 117 · Kalp yetmezliği tedavisi sırasında hipokalemi ve kas güçsüzlüğü


Hasta
- Kedi
- 10 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Boynunu bükük tutma
- Güçsüzlük

Öykü ve bağlam
- Yüksek doz diüretik kullanıyor
- Kronik böbrek hastalığı

Fiziksel muayene
- Ventrofleksiyon (boyun eğik)
- Kas güçsüzlüğü

Ek bulgular
- Potasyum: 2,6 mmol/L
- CK yüksek



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hipokaleminin kedilerdeki tipik bulgusu nedir?
2. Hangi ilaçlar hipokalemi yapar?
3. Potasyum takviyesinde dikkat edilecekler nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hipokalemik miyopati
- Tiamin eksikliği
- Miyastenia gravis

Yorumlu çözüm
Kedilerde ventrofleksiyon ve kas güçsüzlüğü hipokalemik miyopatinin tipik bulgusudur; diüretikler ve kronik böbrek hastalığı potasyum kaybını artırır. Potasyum oral veya IV olarak takviye edilir; IV infüzyon hızı 0,5 mEq/kg/saati geçmemelidir. Diüretik dozu gözden geçirilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Ventrofleksiyon = potasyumu ölçün
- ✓ IV potasyum hızına dikkat
- ✓ Diüretik dozunu gözden geçirin

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Akut değişiklikler | Köpek

Vaka 118 · Ani karın şişliği olmadan solukluk ve sağ kalp yetmezliği


Hasta
- Köpek
- 9 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Halsizlik
- Karında hafif şişlik
- Bayılma

Öykü ve bağlam
- Kronik öksürük ve kalp kurdu öyküsü

Fiziksel muayene
- Juguler venöz pulsasyon
- Asit
- Sağ apikal üfürüm

Ek bulgular
- Ekokardiyografi: pulmoner arter genişlemesi, sağ ventrikül hipertrofisi
- Triküspit yetmezliği hızı yüksek



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Pulmoner hipertansiyonun nedenleri nelerdir?
2. Sağ kalp yetmezliği hangi bulgularla tanınır?
3. Tedavide hangi ilaç kullanılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Pulmoner hipertansiyon (kalp kurdu ilişkili)
- Perikardiyal efüzyon
- Dilate kardiyomiyopati

Yorumlu çözüm
Juguler venöz distansiyon ve asit sağ kalp yetmezliğini gösterir; ekokardiyografideki yüksek triküspit yetmezliği hızı pulmoner hipertansiyonu destekler. Kalp kurdu, kronik akciğer hastalığı ve tromboemboli nedenler arasındadır. Altta yatan neden tedavi edilir, sildenafil kullanılır ve asit gerekirse boşaltılır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Juguler distansiyon + asit = sağ kalp
- ✓ Altta yatan nedeni tedavi edin
- ✓ Sildenafil pulmoner basıncı düşürür

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Akut değişiklikler | Köpek

Vaka 119 · Kanayan, pıhtılaşma testleri uzamış ve trombositi düşen septik köpek


Hasta
- Köpek
- 6 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Venöz ponksiyon yerlerinden sızıntı
- Peteşi

Öykü ve bağlam
- Piyometra nedeniyle opere olmuş, septik

Fiziksel muayene
- Peteşi ve ekimozlar
- Hipotansiyon

Ek bulgular
- Trombosit düşüyor
- PT ve aPTT uzamış
- D-dimer yüksek, fibrinojen düşük



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. DIC'nin tetikleyicileri nelerdir?
2. Tedavinin temeli nedir?
3. Plazma ne zaman verilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Yaygın damar içi pıhtılaşma (DIC)
- Rodentisit zehirlenmesi
- İmmün trombositopeni

Yorumlu çözüm
Sepsis gibi ağır sistemik hastalıklarda pıhtılaşma sistemi aşırı aktive olur; faktörler ve trombositler tükenir ve kanama gelişir. Trombositopeni, uzamış PT/aPTT, yüksek D-dimer ve düşük fibrinojen DIC'yi destekler. Tedavide altta yatan neden kontrol edilir, perfüzyon desteklenir ve aktif kanamada taze donmuş plazma verilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ DIC her zaman ikincildir
- ✓ Altta yatan nedeni tedavi edin
- ✓ Plazma faktörleri yerine koyar

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Akut değişiklikler | Kedi

Vaka 120 · Ani gelişen anizokori ve davranış değişikliği: kafa travması


Hasta
- Kedi
- 8 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Sendeleme
- Bilinç bulanıklığı

Öykü ve bağlam
- Dolabın üstünden düşmüş

Fiziksel muayene
- Anizokori
- Bilinç: stupor
- Bradikardi ve hipertansiyon

Ek bulgular
- Glukoz hafif yüksek



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Modifiye Glasgow Koma Skalası nasıl kullanılır?
2. Bradikardi + hipertansiyon neyi gösterir?
3. Tedavide öncelikler nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kafa travması ve kafa içi basınç artışı
- İntrakraniyal kanama
- Hipoglisemi

Yorumlu çözüm
Kafa travması sonrası bilinç değişikliği, anizokori ve bradikardi ile hipertansiyon (Cushing refleksi) kafa içi basınç artışını gösterir. Öncelik oksijenasyon ve normotansiyondur; başın 15-30 derece yükseltilmesi ve hiperozmolar tedavi (mannitol veya hipertonik salin) kullanılır. MGKS ile seri değerlendirme yapılır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Cushing refleksi = acil
- ✓ Oksijen ve kan basıncı beynin yakıtıdır
- ✓ Seri nörolojik skor tutun

Anestezi | Köpek

Vaka 121 · Brakisefalik köpekte anestezi planlaması


Hasta
- Köpek
- 3 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Yumuşak damak operasyonu için anestezi

Öykü ve bağlam
- İngiliz bulldog
- Uykuda horlama, sıcak intoleransı

Fiziksel muayene
- Darlaşmış burun delikleri
- Stridor

Ek bulgular
- Preoperatif muayene ve kan tahlili normal



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Brakisefalik hastada en riskli dönem hangisidir?
2. Premedikasyon nasıl seçilir?
3. Ekstübasyon ne zaman yapılmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Brakisefalik obstrüktif hava yolu sendromu (BOAS)

Yorumlu çözüm
BOAS'lı köpeklerde indüksiyon ve özellikle derlenme dönemi hava yolu tıkanması açısından en riskli dönemlerdir. Preoksijenasyon, hızlı indüksiyon ve entübasyon için hazırlık yapılır; mide koruyucu ilaçlar regürjitasyon riskini azaltır. Ekstübasyon hasta başını kaldırıp yutkunduğunda, mümkün olduğunca geç yapılır ve hasta yakından izlenir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Derlenme en riskli dönemdir
- ✓ Preoksijenasyon şart
- ✓ Ekstübasyonu geciktirin

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Anestezi | Köpek

Vaka 122 · Diş operasyonu sırasında hipotansiyon


Hasta
- Köpek
- 12 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Diş temizliği ve çekim

Öykü ve bağlam
- Hafif mitral kapak hastalığı

Fiziksel muayene
- İzofluran altında ortalama arter basıncı: 52 mmHg
- Kalp hızı normal

Ek bulgular
- Anestezi monitörü: SpO2 normal, EtCO2 normal



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Anestezide hipotansiyon nasıl tanımlanır?
2. İlk müdahale adımları nelerdir?
3. İnhalasyon anesteziğinin rolü nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İnhalasyon anesteziğine bağlı vazodilatasyon
- Hipovolemi
- Bradikardi

Yorumlu çözüm
Ortalama arter basıncının 60 mmHg altına düşmesi hipotansiyondur ve böbrek gibi organların perfüzyonunu tehlikeye atar. İlk adım inhalasyon anestezik konsantrasyonunu azaltmaktır; ardından kalp hızı değerlendirilir, gerekirse kristaloid bolusu ve inotrop/vazopresör verilir. Kalp hastalarında sıvı dikkatle verilmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ OAB < 60 mmHg = hipotansiyon
- ✓ Önce anestezik derinliğini azaltın
- ✓ Kalp hastasında sıvıya dikkat

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Anestezi · Kedi

Vaka 123 · Kısırlaştırma anestezisinde apne ve bradikardi


Hasta
- Kedi
- 2 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Rutin ovariohisterektomi

Öykü ve bağlam
- Sağlıklı genç kedi

Fiziksel muayene
- İndüksiyondan sonra apne
- Kalp hızı: 110/dk
- SpO2 düşüyor

Ek bulgular
- EtCO2 ölçülemiyor (solunum yok)



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. İndüksiyon sonrası apnenin nedeni nedir?
2. İlk müdahale nedir?
3. Kedide entübasyonda nelere dikkat edilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İndüksiyon ajanına bağlı apne
- Laringospazm
- Hatalı entübasyon

Yorumlu çözüm
Propofol gibi ajanların hızlı verilmesi apneye yol açabilir. Hemen entübasyon ve %100 oksijenle pozitif basınçlı ventilasyon (dakikada 8-12 nefes) yapılır; kapnografi doğru yerleşimi doğrular. Kedilerde laringospazm sık olduğundan topikal lidokain ve nazik entübasyon önerilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Apnede hemen ventilasyon
- ✓ Kapnografi tüp yerini doğrular
- ✓ Kedide laringospazma dikkat

Anestezi | Köpek

Vaka 124 · Anestezi sonrası uzamış derlenme ve hipoglisemi


Hasta
- Köpek
- 8 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Ameliyat sonrası uyanamama

Öykü ve bağlam
- Küçük ırk, düşük kilolu
- Uzun ameliyat açlığı

Fiziksel muayene
- Uyuşukluk, hipotermi

Ek bulgular
- Glukoz: 48 mg/dL
- Vücut ısısı: 35,5 °C



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Uzamış derlenmenin nedenleri nelerdir?
2. Hipotermi ilaç metabolizmasını nasıl etkiler?
3. Önleme için neler yapılmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hipoglisemi ve hipotermiye bağlı uzamış derlenme
- Aşırı doz
- Nörolojik hastalık

Yorumlu çözüm
Küçük ırk hastalarda uzun açlık ve uzun operasyon hipoglisemi ve hipotermiye yol açar; ikisi de derlenmeyi uzatır. Hipotermi ilaç metabolizmasını yavaşlatır. Tedavide aktif ısıtma ve glukoz takviyesi yapılır. Önlemek için açlık süresi kısa tutulur, ameliyat boyunca ısı desteği ve glukoz izlemi yapılır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Glukoz ve ısıyı ölçün
- ✓ Küçük hastalar hızlı soğur
- ✓ Açlık süresi kısa olmalı

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Anestezi | Köpek

Vaka 125 · Göğüs ameliyatı sonrası ağrı yönetimi


Hasta
- Köpek
- 5 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Lateral torakotomi sonrası

Öykü ve bağlam
- Akciğer lobektomisi yapılmış

Fiziksel muayene
- Hızlı ve yüzeysel solunum
- Dokunmaya aşırı tepki
- Glasgow ağrı skoru yüksek

Ek bulgular
- SpO2: %93
- Göğüs tüpünden az miktarda sıvı



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Ağrı solunumu nasıl etkiler?
2. Multimodal analjezi nedir?
3. İnterplevral blok nasıl yapılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Postoperatif ağrıya bağlı hipoventilasyon
- Pnömotoraks
- Akciğer ödemi

Yorumlu çözüm
Torakotomi çok ağrılıdır; ağrı yüzeysel solunuma ve hipoventilasyona yol açar. Multimodal analjezi (opioid infüzyonu, NSAİİ uygunsa, lokal anestezik bloklar) önerilir. Göğüs tüpünden interplevral bupivakain veya interkostal bloklar ek rahatlama sağlar. Ağrı skorları düzenli değerlendirilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Ağrı solunumu bozar
- ✓ Multimodal analjezi kullanın
- ✓ Ağrıyı skorlayarak izleyin

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Anestezi | Kedi

Vaka 126 · Anestezi sırasında hipotermi gelişen kedi


Hasta
- Kedi
- 3 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Uzun süren karın ameliyatı

Öykü ve bağlam
- Vücut ısısında düşme
- Anesteziden daha uzun sürede uyanma

Fiziksel muayene
- Küçük vücut yapısı
- Açık ağız solunumu
- Uzamış iyileşme süresi
- Soğuk ekstremiteler

Ek bulgular
- Vücut ısısı 180 dakikada 36,8 °C'den 33,6 °C'ye düştü
- Ağırlık: 3,2 kg



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hayvanın küçük vücut yapısı neden daha fazla ısı kaybetmesine yol açar?
2. Hipoterminin ilaçlara etkisi nasıl olur?
3. Önleyici yöntemler nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Anesteziye bağlı hipotermi
- Hipoglisemi
- Aşırı anestezik doz

Yorumlu çözüm
Anestezi, ısı düzenlemesini azaltır ve ısı kaybını artırır. Küçük hastalarda yüzey alanı/hacim oranı yüksektir. Bu nedenle, ameliyat öncesi ve sırasında özel önlemler almak, nihai prosedür sırasında hipotermiyi ciddi ölçüde azaltır. Hipotermi ilaç metabolizmasını yavaşlatır, pıhtılaşmayı ve yara iyileşmesini olumsuz etkiler.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Vücut ısısının izlenmesi gerekir
- ✓ Isıtma sürecini planlayın
- ✓ Riskleri en aza indiren hipotermi önlenmelidir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Anestezi | Köpek

Vaka 127 · Anestezi altında bradikardi ve ikinci derece AV blok


Hasta
- Köpek
- 10 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Rutin kitle operasyonu

Öykü ve bağlam
- Premedikasyonda alfa-2 agonist kullanılmış

Fiziksel muayene
- Kalp hızı: 42/dk
- OAB: 70 mmHg

Ek bulgular
- EKG: P dalgalarının bir kısmını QRS izlemiyor (ikinci derece AV blok)



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Alfa-2 agonistlerin kalp üzerine etkisi nedir?
2. Ne zaman antikolinerjik verilir?
3. Bradikardi her zaman tedavi gerektirir mi?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İlaca bağlı bradiaritmi
- Vagal tonus artışı
- Hiperkalemi

Yorumlu çözüm
Alfa-2 agonistler periferik vazokonstriksiyon ve refleks bradikardi, bazen AV blok yapar. Kan basıncı yeterliyse yalnızca izlem yeterli olabilir; hipotansiyon eşlik ediyorsa antagonist veya dikkatle antikolinerjik düşünülür. Hiperkalemi gibi diğer nedenler dışlanmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Bradikardi + normal basınç = izleyin
- ✓ Hipotansiyon varsa müdahale edin
- ✓ İlaç etkisini her zaman düşünün

Komplikasyonlar | Köpek

Vaka 128 · Kısırlaştırma sonrası karın içi kanama


Hasta
- Köpek
- 4 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Ameliyattan 6 saat sonra halsizlik
- Soluk mukozalar

Öykü ve bağlam
- Rutin ovariohisterektomi

Fiziksel muayene
- Taşikardi
- Karında genişleme

Ek bulgular
- Hematokrit düşüyor
- POCUS: serbest abdominal sıvı, kan



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Postoperatif kanamanın en sık kaynağı nedir?
2. Hangi bulgular tekrar ameliyat gerektirir?
3. Koagülasyon testleri neden yapılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Ligatür kayması (ovaryan pedikül kanaması)
- Koagülopati
- Dalak yaralanması

Yorumlu çözüm
Ovariohisterektomi sonrası erken dönemde gelişen hemoabdomen çoğunlukla ovaryan pedikül veya uterus damarlarından ligatür kaymasına bağlıdır. Hematokrit düşüşü ve hemodinamik bozulma devam ederse acil eksploratif laparotomi gerekir. Koagülasyon testleri altta yatan pıhtılaşma bozukluğunu dışlar.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Erken postoperatif hemoabdomen = ligatürü düşünün
- ✓ Hemodinamik bozulmada tekrar ameliyat
- ✓ Koagülasyonu kontrol edin

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Komplikasyonlar | Kedi

Vaka 129 · Yara yerinde açılma (dehisens) ve akıntı


Hasta
- Kedi
- 6 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kesi hattından sıvı gelmesi
- Kesi açılmış

Öykü ve bağlam
- 5 gün önce karın ameliyatı
- Yaka takılmamış, yarayı yalamış

Fiziksel muayene
- Kesi hattında açılma, kızarıklık
- Ateş yok

Ek bulgular
- Sitoloji: dejenere nötrofiller, bakteri



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Dehisensin risk faktörleri nelerdir?
2. Sadece deri mi, karın duvarı mı açılmış?
3. Tedavide neler yapılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Yara enfeksiyonuna bağlı dehisens
- Seroma
- Evantrasyon

Yorumlu çözüm
Yarayı yalama, enfeksiyon, gerginlik ve uygun olmayan sütür materyali dehisense yol açar. Karın duvarının açılıp açılmadığı mutlaka değerlendirilmelidir; evantrasyon acil cerrahi gerektirir. Yüzeysel dehisenste debridman, kültür, uygun antibiyotik ve sekonder kapama veya yeniden sütür uygulanır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Yaka yara korumasıdır
- ✓ Karın duvarı bütünlüğünü kontrol edin
- ✓ Kültür alın

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Komplikasyonlar | Köpek

Vaka 130 · Uzun süreli yatan hastada aspirasyon pnömonisi


Hasta
- Köpek
- 9 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Ameliyat sonrası öksürük
- Ateş

Öykü ve bağlam
- Megaözofagus tanısı var
- Anestezide regürjitasyon

Fiziksel muayene
- Takipne
- Kranioventral krepitasyon

Ek bulgular
- Röntgen: sağ orta lobda alveoler patern
- Lökositoz



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Aspirasyon riski taşıyan hastalar kimlerdir?
2. Sağ orta lob neden sık etkilenir?
3. Önleme için neler yapılabilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Aspirasyon pnömonisi
- Kardiyojenik ödem
- Akciğer kontüzyonu

Yorumlu çözüm
Megaözofagus, larinks paralizisi ve anestezi sırasında regürjitasyon aspirasyon riskini artırır. Yerçekimi ve bronş anatomisi nedeniyle sağ orta lob sık etkilenir. Tedavide oksijen, antibiyotik, nebülizasyon ve fizyoterapi uygulanır. Önlemde dik pozisyonda besleme ve antiemetik/prokinetik ilaçlar yardımcıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Megaözofagus aspirasyon riskidir
- ✓ Sağ orta lobu kontrol edin
- ✓ Dik pozisyonda besleyin

Komplikasyonlar | Köpek

Vaka 131 · Kan transfüzyonu sırasında ateş ve kusma


Hasta
- Köpek
- 7 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Transfüzyonun 20. dakikasında huzursuzluk

Öykü ve bağlam
- Daha önce transfüzyon almış
- Bu sefer çapraz eşleştirme yapılmamış

Fiziksel muayene
- Ateş
- Kusma
- Taşikardi

Ek bulgular
- Plazma pembe renkte (hemoliz)
- Hemoglobinüri



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Transfüzyon reaksiyonları nelerdir?
2. Daha önce transfüzyon almış köpekte neden çapraz eşleştirme gerekir?
3. Reaksiyonda ilk adım nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu
- Ateşli non-hemolitik reaksiyon
- Bakteriyel kontaminasyon

Yorumlu çözüm
Daha önce transfüzyon almış köpekte antikor gelişmiş olabilir; çapraz eşleştirme yapılmadan verilen kan akut hemolitik reaksiyona yol açabilir. İlk adım transfüzyonu durdurmaktır; destekleyici tedavi ve böbrek fonksiyonu izlenir. Kan grubu tayini ve çapraz eşleştirme reaksiyonları önler.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Reaksiyonda transfüzyonu durdurun
- ✓ Tekrar transfüzyonda çapraz eşleştirme
- ✓ İlk 15 dakika yavaş verin ve izleyin

Komplikasyonlar | Kedi

Vaka 132 · Sıvı tedavisi sırasında akciğer ödemi gelişen kedi


Hasta
- Kedi
- 9 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Sıvı tedavisinin ikinci günü hızlı solunum

Öykü ve bağlam
- Kronik böbrek hastalığı için yüksek hızda sıvı verilmiş
- Fark edilmemiş kalp hastalığı

Fiziksel muayene
- Takipne
- Krepitasyon
- Kilo artışı: %8 (24 saatte)

Ek bulgular
- POCUS: B-çizgileri, plevral efüzyon



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Sıvı yüklenmesinin erken bulguları nelerdir?
2. Kediler neden daha hassastır?
3. Önleme için neler izlenir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İatrojenik sıvı yüklenmesi
- Kardiyojenik ödem
- Pnömoni

Yorumlu çözüm
Kedilerde kan hacmi küçüktür ve gizli kalp hastalığı sıktır; agresif sıvı tedavisi pulmoner ödem ve plevral efüzyona yol açabilir. Erken bulgular kilo artışı, seröz burun akıntısı, kemozis ve solunum sayısında artıştır. Sıvı durdurulur, oksijen ve diüretik verilir. Sıvı tedavisinde kilo ve solunum düzenli izlenmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kiloyu günde iki kez tartın
- ✓ Kedi kalbi gizli hasta olabilir
- ✓ Kemozis erken işarettir

Komplikasyonlar | Köpek

Vaka 133 · Ortopedi ameliyatı sonrası bandaj komplikasyonu


Hasta
- Köpek
- 6 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Bandajlı bacakta şişlik ve koku

Öykü ve bağlam
- Kırık sonrası bandaj, 7 gündür kontrol edilmemiş

Fiziksel muayene
- Ayak parmaklarında ödem ve soğukluk
- Bandaj altında nemli deri, basınç yaraları

Ek bulgular
- Sitoloji: bakteri ve nötrofiller



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Bandaj komplikasyonlarının erken işaretleri nelerdir?
2. Bandaj ne sıklıkla kontrol edilmelidir?
3. Sahibe hangi uyarılar yapılmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Bandaj basınç yaraları ve enfeksiyon
- Kompartman sendromu
- Osteomiyelit

Yorumlu çözüm
Sıkı veya ıslanmış bandaj dolaşım bozukluğu, basınç nekrozu ve enfeksiyona yol açabilir. Parmakların ayrılması, şişlik, koku, ıslaklık ve hayvanın bandajı çiğnemesi uyarı işaretleridir. Bandaj hemen değiştirilir, yaralar tedavi edilir. Sahibe günlük kontrol ve kuru tutma öğretilmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Parmaklar ayrık ve sıcak olmalı
- ✓ Islak bandaj değiştirilir
- ✓ Sahip eğitimi komplikasyonu önler

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Zehirlenmeler | Köpek

Vaka 134 · Kaçırılan ivermektin dozu sonrası körlük ve tremor


Hasta
- Köpek
- 3 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Sendeleme
- Görme kaybı
- Tremor

Öyku ve bağlam
- At için olan antiparaziter macun yemiş
- Collie melezi

Fiziksel muayene
- Midriyazis
- Ataksi
- Bilinç bulanıklığı

Ek bulgular
- MDR1 (ABCB1) gen mutasyonu testi pozitif



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. MDR1 mutasyonu ne anlama gelir?
2. Hangi ırklar risk altındadır?
3. Tedavide neler yapılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İvermektin (makrosiklik lakton) zehirlenmesi
- THC zehirlenmesi
- Ensefalit

Yorumlu çözüm
MDR1 mutasyonu olan köpeklerde P-glikoprotein eksikliği nedeniyle ivermektin beyne geçer ve nörotoksisite yapar; çoban ırkları risk altındadır. Tedavi destekleyicidir: aktif kömür (erken dönemde), sıvı, beslenme, göz koruması ve gerekirse mekanik ventilasyon. IV lipid emülsiyonu kullanılabilir; iyileşme haftalar alabilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Çoban ırklarında MDR1'i düşünün
- ✓ At ürünleri çok yüksek dozludur
- ✓ İyileşme uzun sürebilir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Acil | Köpek

Vaka 135 · Köpek ısırığı sonrası göğüs yaralanması


Hasta
- Köpek
- 5 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Başka köpekle kavga
- Göğüste delinme yaraları

Öykü ve bağlam
- Küçük köpek, büyük köpek ısırmış

Fiziksel muayene
- Göğüs duvarında hava kaçağı sesi
- Takipne
- Deri altı amfizem

Ek bulgular
- Röntgen: kosta kırıkları, pnömotoraks



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Isırık yaralarında 'buzdağı etkisi' nedir?
2. Açık pnömotoraksa ilk müdahale nedir?
3. Neden cerrahi eksplorasyon gerekebilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Penetran göğüs travması (ısırık)
- Akciğer kontüzyonu
- Yelken göğüs

Yorumlu çözüm
Isırık yaralarında derideki küçük delikler altta ciddi doku hasarını gizleyebilir ('buzdağı etkisi'). Açık pnömotoraksta yara steril bir kapamayla örtülür ve torasentez yapılır. Kosta kırığı, akciğer hasarı ve kirlenme nedeniyle çoğu zaman cerrahi eksplorasyon, debridman ve antibiyotik gerekir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Küçük delik büyük hasarı gizler
- ✓ Açık yarayı hemen kapatın
- ✓ Eksplorasyon ve debridman sık gerekir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Cerrahi | Köpek

Vaka 136 · Skrotumda tek testis olan genç köpek


Hasta
- Köpek
- 1 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Skrotumda tek testis
- Kısırlaştırma için başvuru

Öykü ve bağlam
- Diğer testis hiç inmemiş

Fiziksel muayene
- Sol testis skrotumda
- Sağ testis inguinal kanalda palpe edilemiyor

Ek bulgular
- Ultrasonda sağ testis karın içinde, böbrek kaudalinde



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kriptorşidizmin riskleri nelerdir?
2. Karın içi testis nasıl lokalize edilir?
3. Neden her iki testis alınmalıdır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Tek taraflı abdominal kriptorşidizm
- İnguinal kriptorşidizm
- Anorşi

Yorumlu çözüm
8 haftadan sonra skrotuma inmeyen testis kriptorşidizmdir ve kalıtsaldır. Karın içi testislerde Sertoli hücreli tümör ve torsiyon riski artar. Ultrason lokalizasyona yardım eder; kastrasyonda her iki testis alınır. Etkilenen hayvanlar damızlıkta kullanılmamalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kriptorşidizm kalıtsaldır
- ✓ Karın içi testis tümör riskidir
- ✓ Her iki testis alınır

Cerrahi | Köpek

Vaka 137 · Göz kapağında içe dönme ve göz akıntısı


Hasta
- Köpek
- 6 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Gözde sulanma
- Gözü kısma

Öykü ve bağlam
- Shar pei ırkı
- Belirtiler gençlikten beri var

Fiziksel muayene
- Alt göz kapağı içe dönük, kirpikler korneaya temas ediyor
- Floresein boyama: kornea ülseri

Ek bulgular
- Schirmer gözyaşı testi normal



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Entropiyon neden korneaya zarar verir?
2. Floresein testi ne gösterir?
3. Cerrahi düzeltme nasıl yapılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Entropiyon ve sekonder kornea ülseri
- Distikiyazis
- Kuru göz

Yorumlu çözüm
İçe dönük göz kapağının kılları korneayı tahriş eder ve ülsere yol açar; floresein boyama ülseri gösterir. Ülser tedavi edilir (antibiyotikli damla, ağrı kontrolü) ve cerrahi düzeltme (Hotz-Celsus tekniği) yapılır. Çok genç yavrularda geçici dikiş yöntemi uygulanabilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Floresein ülseri gösterir
- ✓ Cerrahi kalıcı çözümdür
- ✓ Kalıtsal yatkınlık vardır

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Cerrahi | Köpek

Vaka 138 · Arka bacağını aralıklı kaldıran küçük ırk köpek: patella luksasyonu


Hasta
- Köpek
- 2 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Yürürken ara ara bacağı kaldırma
- Birkaç adım sonra normal yürüme

Öykü ve bağlam
- Pomeranian

Fiziksel muayene
- Medial patella luksasyonu (derece 2)
- Ağrı hafif

Ek bulgular
- Röntgende tibial tuberositas hafif medial yer değiştirmiş



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Patella luksasyonu nasıl derecelendirilir?
2. 'Atlayan' yürüyüş neden olur?
3. Ne zaman cerrahi önerilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Medial patella luksasyonu
- Kranial çapraz bağ hastalığı
- Legg-Calvé-Perthes hastalığı

Yorumlu çözüm
Küçük ırklarda medial patella luksasyonu sıktır; patella yerinden çıktığında köpek bacağını kaldırır, yerine dönünce normal yürür. Derece 1-4 arası sınıflandırılır. Klinik belirti veren ve derece 2 üzeri olgularda trokleoplasti ve tibial tuberositas transpozisyonu gibi cerrahi düzeltme önerilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Aralıklı topallık tipiktir
- ✓ Derece tedaviyi belirler
- ✓ Kilo kontrolü yardımcıdır

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Cerrahi Kedi

Vaka 139 · Meme bölgesinde ülserleşen kitle olan kısırlaştırılmamış kedi


Hasta
- Kedi
- 12 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Meme bölgesinde yara ve kitle

Öykü ve bağlam
- Kısırlaştırılmamış
- Progestin içeren kızgınlık bastırıcı kullanmış

Fiziksel muayene
- İki meme lobunda sert, ülserleşmiş kitle
- İnguinal lenf düğümü büyük

Ek bulgular
- Toraks röntgeninde nodül yok
- İİA: malign epitel hücreleri



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kedi meme tümörleri köpektekinden nasıl farklıdır?
2. Cerrahi kapsam nasıl olmalı?
3. Progestin kullanımının etkisi nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Meme adenokarsinomu
- Fibroadenomatöz hiperplazi
- Mastit

Yorumlu çözüm
Kedilerde meme tümörlerinin büyük çoğunluğu maligndir ve agresiftir. Tedavi, tek veya iki taraflı radikal mastektomi ve bölgesel lenf düğümlerinin çıkarılmasıdır; ardından kemoterapi değerlendirilir. Progestinler riski artırır; erken kısırlaştırma koruyucudur.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kedide meme kitlelerinin çoğu maligndir
- ✓ Radikal mastektomi önerilir
- ✓ Erken kısırlaştırma riski azaltır

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Cerrahi | Köpek

Vaka 140 · Ön bacakta açık kırık olan köpek


Hasta
- Köpek
- 4 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kaza sonrası bacakta kemik görünüyor

Öykü ve bağlam
- 1 saat önce olmuş

Fiziksel muayene
- Radius-ulnada açık kırık
- Yara kirli
- Distal nabız ve his mevcut

Ek bulgular
- Röntgen: parçalı radius-ulna kırığı



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Açık kırıkta ilk müdahale nedir?
2. Antibiyotik ne zaman başlanmalı?
3. Fiksasyon yöntemi nasıl seçilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Açık radius-ulna kırığı
- Yumuşak doku yaralanması
- Sinir hasarı

Yorumlu çözüm
Açık kırık acil durumdur; önce hasta stabilize edilir, analjezi verilir, yara steril örtüyle kapatılır ve en kısa sürede antibiyotik başlanır. Yara bol sıvıyla yıkanır ve debride edilir. Fiksasyon yöntemi (eksternal fiksatör, plak) kırık tipi ve yara durumuna göre seçilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Açık kırık acildir
- ✓ Antibiyotiği geciktirmeyin
- ✓ Önce yara, sonra fiksasyon

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Cerrahi | Köpek

Vaka 141 · Perianal bölgede şişlik ve dışkılama güçlüğü


Hasta
- Köpek
- 8 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Dışkılamada zorlanma
- Anüs yanında şişlik

Öykü ve bağlam
- Daha önce dışkılamada zorlanma ve kayma (popo sürtme) öyküsü
- Belirtiler 3 gündür var

Fiziksel muayene
- Sağ anal kese bölgesinde ağrılı, şiş ve kırmızı alan
- Fistül ağzından kanlı-irinli akıntı

Ek bulgular
- Sitoloji: dejenere nötrofiller ve bakteriler



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Anal kese apsesi nasıl gelişir?
2. Tedavide drenajın önemi nedir?
3. Tekrarlayan olgularda ne yapılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Anal kese apsesi
- Anal kese adenokarsinomu
- Perianal fistül

Yorumlu çözüm
Anal kese içeriğinin boşalamaması kese iltihabına ve apseye yol açar. Tedavide apse drene edilir, kese yıkanır, analjezik ve uygun antibiyotik verilir. Tekrarlayan olgularda anal sakkülektomi düşünülür. Kesede sert kitle varsa neoplazi açısından sitoloji yapılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Drenaj tedavinin temelidir
- ✓ Tekrarlıyorsa sakkülektomi
- ✓ Sert kitlede neoplaziyi düşünün

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Cerrahi | Kedi

Vaka 142 · Tekrarlayan tıkanma sonrası perineal üretrostomi kararı


Hasta
- Kedi
- 3 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Üçüncü kez idrar tıkanması

Öykü ve bağlam
- Sonda ile açılmış, diyet değiştirilmiş

Fiziksel muayene
- Penis ucunda ödem ve travma

Ek bulgular
- İdrar kültürü negatif
- Retrograd üretrografide distal üretrada darlık



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Perineal üretrostomi hangi durumlarda önerilir?
2. Ameliyat sonrası hangi komplikasyonlar görülür?
3. Bu cerrahi sistiti tedavi eder mi?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Distal üretra darlığı
- Üretral tıkaç
- Ürolit

Yorumlu çözüm
Medikal tedaviye rağmen tekrarlayan obstrüksiyon veya distal üretra darlığında perineal üretrostomi ile geniş pelvik üretra açılır. Komplikasyonlar arasında darlık, idrar yolu enfeksiyonu ve idrar sızıntısı bulunur. Cerrahi altta yatan idiyopatik sistiti tedavi etmez; stres ve su yönetimi sürdürülmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Tekrarlayan tıkanmada cerrahi düşünülür
- ✓ Darlık en önemli komplikasyondur
- ✓ Sistit yönetimi devam eder

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Cerrahi | Köpek

Vaka 143 · Splenektomi sonrası ventriküler aritmi


Hasta
- Köpek
- 7 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Ameliyat sonrası düzensiz nabız

Öykü ve bağlam
- Dalak kitlesi nedeniyle splenektomi yapılmış

Fiziksel muayene
- Nabız açığı
- Hafif hipotansiyon

Ek bulgular
- EKG: hızlı ventriküler taşikardi atakları
- Laktat hafif yüksek



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Splenektomi sonrası neden aritmi görülür?
2. Hangi durumda antiaritmik verilir?
3. Ağrı ve elektrolitlerin rolü nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Postoperatif ventriküler aritmi
- Hipokalemi
- Kardiyak metastaz

Yorumlu çözüm
Dalak ve GDV cerrahileri sonrası ventriküler aritmiler sıktır; miyokardiyal iskemi, ağrı, elektrolit bozuklukları ve sistemik inflamasyon katkıda bulunur. Hız çok yüksekse veya perfüzyon bozuluyorsa lidokain ile tedavi edilir. Ağrı, potasyum ve magnezyum düzeltilmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Önce ağrı ve elektrolitleri düzeltin
- ✓ Perfüzyon bozuluyorsa lidokain
- ✓ EKG ile 24-48 saat izleyin

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Gebelik | Köpek

Vaka 144 · Çiftleşme sonrası gebelik tanısı ve yavru sayısı


Hasta
- Köpek
- 3 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Gebelik kontrolü

Öykü ve bağlam
- Çiftleşme 28 gün önce

Fiziksel muayene
- Karın palpasyonunda uterusta şişlikler

Ek bulgular
- Ultrasonda kalp atışı olan embriyolar



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Gebelik tanısı hangi günden itibaren güvenilirdir?
2. Yavru sayısı için hangi yöntem daha doğrudur?
3. Gebelikte hangi aşılar/ilaçlar önemlidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Normal gebelik
- Psödogebelik
- Piyometra

Yorumlu çözüm
Köpekte ultrasonla gebelik yaklaşık 25. günden itibaren güvenle teşhis edilir; kalp atışları canlılığı gösterir. Yavru sayısını en doğru şekilde, iskeletler mineralize olduktan sonra (yaklaşık 45. gün) çekilen röntgen verir. Gebelik boyunca ilaçlar dikkatle seçilmeli, beslenme son trimesterde artırılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Ultrason ~25. günden itibaren
- ✓ Yavru sayısı için 45. gün sonrası röntgen
- ✓ İlaç seçiminde dikkatli olun

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Gebelik | Köpek

Vaka 145 · Kızgınlıktan 2 ay sonra süt gelmesi ve yuvalama davranışı


Hasta
- Köpek
- 5 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Memelerde süt
- Oyuncakları sahiplenme, yuva yapma

Öykü ve bağlam
- Çiftleşme yok
- Kısırlaştırılmamış

Fiziksel muayene
- Meme bezlerinde büyüme ve süt
- Genel durum iyi

Ek bulgular
- Ultrason: uterus boş, gebelik yok



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Psödogebelik neden olur?
2. Tedavi gerekli midir?
3. Memeyi uyarmanın etkisi nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Psödogebelik
- Gebelik
- Mastit

Yorumlu çözüm
Diöstrus sonunda progesteron düşüp prolaktin yükselince psödogebelik gelişir; gebeliğe benzer fiziksel ve davranışsal belirtiler görülür. Çoğu olgu kendiliğinden geçer. Memeyi yalamak ve sağmak süt üretimini artırır; yaka önerilir. Belirgin olgularda prolaktin inhibitörleri (kabergolin) kullanılabilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Psödogebelik fizyolojiktir
- ✓ Memeyi uyarmaktan kaçının
- ✓ Gerekirse kabergolin

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Gebelik | Kedi

Vaka 146 · Gebeliğin son haftasında kasılmalar ve halsizlik


Hasta
- Kedi
- 2 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Halsizlik
- Titreme
- Huzursuzluk

Öykü ve bağlam
- Doğuma bir hafta kalmış
- Kalabalık batın (çok yavru)

Fiziksel muayene
- Tremor
- Hipertermi
- Taşikardi

Ek bulgular
- İyonize kalsiyum: 0,8 mmol/L (düşük)
- Glukoz normal



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Eklampsi en sık ne zaman görülür?
2. Acil tedavi nedir?
3. Kalsiyum verirken neler izlenmeli?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hipokalsemi (eklampsi)
- Hipoglisemi
- Epilepsi

Yorumlu çözüm
Eklampsi çoğunlukla laktasyonun ilk haftalarında görülür, ancak gebeliğin sonunda da gelişebilir; kalsiyum ihtiyacının karşılanamamasından kaynaklanır. Tedavi yavaş IV kalsiyum glukonattır; infüzyon sırasında EKG ve kalp hızı izlenir (bradikardi, aritmi). Kalsiyum takviyesi oral olarak sürdürülür.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kalsiyumu yavaş ve EKG ile verin
- ✓ Laktasyonun ilk haftaları en riskli
- ✓ Gebelikte rastgele kalsiyum takviyesi önerilmez

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Gebelik | Köpek

Vaka 147 · Gebelikte vajinal akıntı ve yavru kaybı


Hasta
- Köpek
- 4 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Yeşil-kahverengi vajinal akıntı
- Ateş

Öykü ve bağlam
- Gebeliğin 40. günü

Fiziksel muayene
- Ateş: 39,9 °C
- Karın palpasyonunda hassasiyet

Ek bulgular
- Ultrason: bazı fetüslerde kalp atışı yok
- Brucella canis serolojisi pozitif



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Gebelik kaybının enfeksiyöz nedenleri nelerdir?
2. Brucella canis neden önemlidir?
3. Kennel yönetiminde neler yapılmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Brucella canis'e bağlı abort
- Kanin herpesvirüs
- Hormonal (luteal yetmezlik)

Yorumlu çözüm
Gebelik ortasında akıntı ve fetal ölüm enfeksiyöz nedenleri düşündürür; Brucella canis köpeklerde abort ve infertilitenin önemli nedenidir ve zoonotiktir. Tedavi zordur ve enfeksiyon kalıcı olabilir. Pozitif hayvanlar damızlıktan çıkarılmalı, kennel taranmalı ve insan sağlığı açısından önlem alınmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Brucella canis zoonotiktir
- ✓ Pozitifler damızlıktan çıkarılır
- ✓ Tüm kennel taranmalı

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Doğum | Köpek

Vaka 148 · Normal doğumun takibi: ne zaman müdahale edilmeli?


Hasta
- Köpek
- 3 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Doğum başladı, sahip endişeli

Öykü ve bağlam
- Rektal ısı 12 saat önce 37 °C'ye düşmüş

Fiziksel muayene
- Aralıklı kasılmalar
- Yeşil akıntı (ilk yavrudan önce değil, sonra)

Ek bulgular
- Ultrason: fetal kalp hızları > 180/dk



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Normal doğumun evreleri nelerdir?
2. Hangi süreler müdahale gerektirir?
3. Fetal kalp hızı neyi gösterir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Normal doğum
- Distosi
- Primer uterus atonisi

Yorumlu çözüm
Rektal ısının düşmesi genellikle 24 saat içinde doğumu müjdeler. Güçlü ıkınmaya rağmen 30-60 dakikada yavru gelmemesi, yavrular arasında 2-4 saatten uzun ara veya yavrudan önce yeşil akıntı müdahale gerektirir. Fetal kalp hızının 150-160/dk altına düşmesi fetal stresi gösterir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Isı düşüşü doğumun habercisidir
- ✓ Süreleri sahibe öğretin
- ✓ Fetal kalp hızı stresi gösterir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Distosi | Köpek

Vaka 149 · 1 saattir güçlü ıkınan ama yavru doğurmayan köpek


Hasta
- Köpek
- 5 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Güçlü ıkınma
- Vulvada yavru görünüp ilerlemiyor

Öykü ve bağlam
- İlk doğum
- Bulldog ırkı

Fiziksel muayene
- Vajinal muayenede büyük yavru başı, doğum kanalı dar

Ek bulgular
- Ultrason: kalan fetüslerde kalp hızı 140/dk



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Distosinin anne ve fetus kaynaklı nedenleri nelerdir?
2. Oksitosin ne zaman kontrendikedir?
3. Sezaryen kararı nasıl verilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Obstrüktif distosi (fetopelvik uyumsuzluk)
- Uterus atonisi
- Fetal malpozisyon

Yorumlu çözüm
Brakisefalik ırklarda büyük başlı yavrular ve dar pelvis nedeniyle obstrüktif distosi sıktır. Obstrüksiyon varken oksitosin verilmez; uterus rüptürü riski vardır. Fetal stres bulguları ve ilerlemeyen doğumda sezaryen yapılır; anestezide fetusa geçen ilaçlar en aza indirilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Obstrüksiyonda oksitosin vermeyin
- ✓ Brakisefaliklerde planlı sezaryen düşünülebilir
- ✓ Fetal stres sezaryen nedenidir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Distosi | Kedi

Vaka 150 · İki yavru doğduktan sonra kasılmaları duran kedi


Hasta
- Kedi
- 4 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Doğum durmuş (4 saattir)
- Kedi sakin, ıkınmıyor

Öykü ve bağlam
- İki yavru sağlıklı doğmuş

Fiziksel muayene
- Karında palpe edilen fetüsler
- Doğum kanalı açık, obstrüksiyon yok

Ek bulgular
- İyonize kalsiyum normal
- Röntgen: 2 fetüs, normal pozisyon



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Sekonder uterus atonisi nedir?
2. Medikal müdahale ne zaman uygundur?
3. Ne zaman sezaryen gerekir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Sekonder uterus atonisi
- Obstrüktif distosi
- Primer atoni

Yorumlu çözüm
Doğumun ortasında kasılmaların durması ve obstrüksiyon olmaması uterus yorgunluğuna bağlı sekonder atoniyi düşündürür. Obstrüksiyon dışlandıktan sonra düşük doz oksitosin (gerekirse kalsiyum ile) denenebilir. Yanıt yoksa veya fetal stres varsa sezaryen yapılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Önce obstrüksiyonu dışlayın
- ✓ Düşük doz oksitosin denenebilir
- ✓ Yanıt yoksa sezaryen

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Distosi | Sığır

Vaka 151 · İlk doğumunu yapan düvede güç doğum


Hasta
- Sığır
- 2 yaş
- Dişi (düve)

Başvuru nedeni
- 2 saattir ıkınma
- Su kesesi patlamış, buzağı gelmiyor

Öykü ve bağlam
- Büyük boyutlu boğa ile tohumlanmış

Fiziksel muayene
- Vajinal muayenede iki ön ayak ve baş, ancak çok büyük buzağı
- Pelvik kanal dar

Ek bulgular
- Buzağı canlı (refleksler mevcut)



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Fetopelvik uyumsuzluk nasıl değerlendirilir?
2. Zorla çekmenin riskleri nelerdir?
3. Ne zaman sezaryen tercih edilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Fetopelvik uyumsuzluk
- Fetal malpozisyon
- Uterus torsiyonu

Yorumlu çözüm
Düvelerde büyük buzağı ile dar pelvis fetopelvik uyumsuzluğa yol açar. Yeterli kayganlaştırıcı ve kontrollü çekme ilerleme sağlamıyorsa zorlamak anne ve buzağıda ciddi yaralanmalara neden olur; canlı buzağıda sezaryen tercih edilir. Önlem için düvelere kolay doğum yapan boğa seçilmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Zorla çekme yaralanma yapar
- ✓ Canlı buzağıda sezaryen
- ✓ Boğa seçimi önleyicidir

Puerperyum | Köpek

Vaka 152 · Doğumdan bir hafta sonra ateş ve kötü kokulu akıntı


Hasta
- Köpek
- 4 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Kötü kokulu, koyu vajinal akıntı
- Yavruları emzirmek istememe

Öykü ve bağlam
- Bir yavru ölü doğmuş

Fiziksel muayene
- Ateş: 40,2 °C
- Dehidratasyon
- Uterus palpasyonda büyük

Ek bulgular
- Ultrason: uterusta sıvı ve plasenta kalıntısı
- Nötrofili



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Normal lohia ile metrit nasıl ayrılır?
2. Tedavide neler yapılır?
3. Yavrular nasıl korunur?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Akut postpartum metrit
- Plasenta retansiyonu
- Mastit

Yorumlu çözüm
Normal lohia kokusuz, koyu yeşil-kırmızı renkte ve birkaç hafta sürebilir. Ateş, kötü kokulu akıntı ve sistemik hastalık akut metriti gösterir; fetus veya plasenta kalıntısı risk faktörüdür. Sıvı, antibiyotik ve uterus boşaltımı uygulanır; ağır olgularda ovariohisterektomi gerekebilir. Yavruların beslenmesi desteklenmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kötü koku ve ateş = metrit
- ✓ Kalıntıları araştırın
- ✓ Yavruların beslenmesini destekleyin

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Puerperyum | Kedi

Vaka 153 · Emziren kedide sert, sıcak ve ağrılı meme


Hasta
- Kedi
- 3 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Bir memede şişlik
- Yavrulara emzirmek istememe

Öykü ve bağlam
- Yavrular 2 haftalık

Fiziksel muayene
- Bir meme bezi sıcak, sert, mor renkli
- Ateş

Ek bulgular
- Süt sitolojisi: dejenere nötrofiller ve bakteri



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Mastitin sistemik bulguları nelerdir?
2. Yavrular emmeye devam edebilir mi?
3. Antibiyotik seçiminde neye dikkat edilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Septik mastit
- Galaktostaz
- Meme tümörü

Yorumlu çözüm
Emziren kedide sıcak, sert ve ağrılı meme ile ateş septik mastiti gösterir. Hafif olgularda yavrular emmeye devam edebilir; gangrenli veya apseli memede yavrular uzak tutulur. Süte geçişi güvenli olan antibiyotikler (örneğin amoksisilin-klavulanat) seçilir; sıcak kompres ve ağrı kontrolü yapılır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Gangrenli memeden yavru emzirilmez
- ✓ Antibiyotik süte geçişe göre seçilir
- ✓ Ağrı kontrolü önemlidir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Puerperyum | Sığır

Vaka 154 · Doğumdan sonra yatar hâlde kalkamayan süt ineği


Hasta
- Sığır
- 5 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Doğumdan 12 saat sonra kalkamama
- İştahsızlık

Öykü ve bağlam
- Yüksek verimli süt ineği
- Üçüncü laktasyon

Fiziksel muayene
- Soğuk kulaklar
- Başı böğrüne dönük (S şekli)
- Rumen hareketleri azalmış

Ek bulgular
- Serum kalsiyumu: 5,0 mg/dL (düşük)



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Doğum felcinin mekanizması nedir?
2. IV kalsiyum verirken nelere dikkat edilir?
3. Önleme stratejileri nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hipokalsemi (süt humması)
- Hipomagnezemi
- Doğum sonu sinir hasarı

Yorumlu çözüm
Doğumla birlikte süt üretiminin başlaması kalsiyum ihtiyacını hızla artırır; yüksek verimli ineklerde hipokalsemi (süt humması) gelişir. Tedavide yavaş IV kalsiyum verilir ve kalp oskülte edilerek aritmi izlenir. Önlemede kuru dönemde negatif DCAD rasyonu ve doğum sonrası oral kalsiyum kullanılır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kalsiyumu yavaş verin, kalbi dinleyin
- ✓ Yüksek verim risk faktörüdür
- ✓ Kuru dönem rasyonu önleyicidir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Vaka 155

Neonatoloji | Köpek

Vaka 155 · Göbek fıtığı olan yavru köpek


Hasta
- Köpek
- 2 aylık
- Erkek

Başvuru nedeni
- Göbek bölgesinde şişlik
- Ağrı yok

Öykü ve bağlam
- Doğumdan beri var
- Elle geri itilebiliyor
- Annede de göbek fıtığı öyküsü

Fiziksel muayene
- Göbekte yumuşak, ağrısız şişlik
- Fıtık halkası parmak ucu genişliğinde

Ek bulgular
- Gastrointestinal belirtiler yok
- Genel durum iyi



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Redüktabl fıtığın anlamı nedir?
2. Fıtık halkasının boyutu neden önemlidir?
3. Cerrahi olarak ne zaman gerçekleştirilebilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Umbilikal fıtık
- Umbilikal apse
- Omfalosel

Yorumlu çözüm
Küçük bir umbilikal kese ve redükte edilebilir bir fıtık bazen kendiliğinden kapanabilir; bu sebeple ağrı yoksa ve büyüme ile birlikte izlenebilir. Bununla birlikte ağrı, redükte edilememe veya karın içi organların sıkışma riski cerrahi müdahale gerektirir. Fıtığın büyüklüğü ve evrimi değerlendirilerek tercih edilen tedavi planı belirlenir; genellikle kısırlaştırma ile aynı anda onarılır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Redükte edilebilir ve redükte edilemez fıtıkları ayırt edin
- ✓ Ağrının değişimini değerlendirin
- ✓ Sadece fıtığa değil, tüm hastaya bakın

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Neonatoloji | Köpek

Vaka 156 · Emmeyen, soğuk ve sürekli ağlayan yeni doğan yavru


Hasta
- Köpek
- 3 günlük
- Dişi

Başvuru nedeni
- Emmeme
- Sürekli ağlama
- Kardeşlerinden ayrı durma

Öykü ve bağlam
- Batında 7 yavru
- Anne iyi bakıyor

Fiziksel muayene
- Vücut ısısı: 34,5 °C
- Emme refleksi zayıf
- Dehidratasyon

Ek bulgular
- Glukoz: 45 mg/dL



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Yeni doğanda hipotermi ve hipoglisemi neden kısır döngü yaratır?
2. Neden soğuk yavru beslenmemelidir?
3. Isıtma nasıl yapılmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Solgun yavru (fading puppy) sendromu
- Neonatal sepsis
- Konjenital anomali

Yorumlu çözüm
Yeni doğan yavrular ısılarını düzenleyemez; hipotermi emmeyi ve sindirimi durdurur, hipoglisemi gelişir. Hipotermik yavru beslenirse ileus ve aspirasyon gelişebilir; önce yavaşça (birkaç saatte) ısıtılır, ardından glukoz ve beslenme verilir. Sepsis ve konjenital anomaliler araştırılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Önce ısıt, sonra besle
- ✓ Yavaş ısıtma güvenlidir
- ✓ Günlük tartım erken uyarı verir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Neonatoloji | Kedi

Vaka 157 · Doğumdan sonra hızla zayıflayan ve sarılık gelişen yavru kedi


Hasta
- Kedi
- 2 günlük
- Erkek

Başvuru nedeni
- Emmeyi bırakma
- İdrarı koyu kırmızı
- Kuyruk ucunda nekroz

Öykü ve bağlam
- Anne B kan grubu, baba A
- İlk günden itibaren emiyor

Fiziksel muayene
- İkter
- Halsizlik

Ek bulgular
- Şiddetli hemolitik anemi
- Anne kan grubu: B, yavru: A



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Neonatal izoeritroliz nasıl gelişir?
2. Hangi ırklar risklidir?
3. Önleme nasıl yapılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Neonatal izoeritroliz
- Neonatal sepsis
- Konjenital anomali

Yorumlu çözüm
B kan grubu annenin kolostrumundaki anti-A antikorları, A grubu yavruların eritrositlerini yok eder. Belirtiler ilk günlerde başlar: hemoglobinüri, ikter, kuyruk nekrozu ve ölüm. Risk taşıyan yavrular ilk 24-48 saat anneden emzirilmemeli, mama ile beslenmelidir. Çiftleştirme öncesi kan grubu tayini önleyicidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ B anne + A yavru = risk
- ✓ İlk 24-48 saat kolostrum verilmemeli
- ✓ Çiftleştirmeden önce kan grubu belirleyin

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Neonatoloji | Köpek

Vaka 158 · Burundan süt gelen yavru köpek


Hasta
- Köpek
- 10 günlük
- Erkek

Başvuru nedeni
- Emerken burundan süt gelmesi
- Kilo alamama

Öykü ve bağlam
- Kardeşleri normal

Fiziksel muayene
- Sert damakta yarık
- Takipne

Ek bulgular
- Toraks röntgeni: kranioventral akciğerde aspirasyon bulguları



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Damak yarığı nasıl tanınır?
2. Aspirasyon pnömonisi riski neden yüksektir?
3. Beslenme ve cerrahi planı nasıl olmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Konjenital damak yarığı
- Aspirasyon pnömonisi
- Megaözofagus

Yorumlu çözüm
Emerken burundan süt gelmesi damak yarığını düşündürür; ağız muayenesinde görülür. Süt hava yollarına kaçtığı için aspirasyon pnömonisi sık görülür. Yavru sonda ile beslenir ve büyüdükten sonra (genellikle 3-4 aylıkken) cerrahi onarım planlanır. Kalıtsal olabileceği için damızlıkta dikkate alınmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Her yeni doğanda damağı kontrol edin
- ✓ Sonda ile beslenme hayat kurtarır
- ✓ Cerrahi büyümeden sonra

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Neonatoloji | Buzağı

Vaka 159 · Kolostrum alıp almadığı bilinmeyen halsiz buzağı


Hasta
- Buzağı
- 2 günlük
- Erkek

Başvuru nedeni
- Emmeme
- Halsizlik

Öykü ve bağlam
- Gece doğmuş, ilk saatler gözlenmemiş

Fiziksel muayene
- Dehidratasyon
- Göbek kordonu ıslak ve şiş

Ek bulgular
- Serum total protein: 4,6 g/dL
- Brix refraktometre: %7,5



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Pasif transfer yetmezliği nasıl tanımlanır?
2. Kolostrum yönetiminde 'zaman, miktar, kalite' ne anlama gelir?
3. Göbek enfeksiyonu neden önemlidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Pasif bağışıklık transferi yetmezliği ve omfalit
- Neonatal sepsis
- Neonatal ishal

Yorumlu çözüm
Buzağılar antikorları sadece kolostrumla alır; ilk 2-6 saatte yeterli miktarda kaliteli kolostrum verilmezse pasif transfer yetmezliği gelişir. Düşük serum total protein veya Brix değeri bunu gösterir. Omfalit ve sepsis riski artar; plazma transfüzyonu, antibiyotik ve göbek bakımı uygulanır. Kolostrum protokolü sürüde gözden geçirilmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ İlk 2-6 saat kritik
- ✓ Brix ile transferi ölçün
- ✓ Göbek dezenfeksiyonu rutin olmalı

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Neonatoloji | Kuzu

Vaka 160 · İshal ve dehidratasyon gelişen kuzu

Hasta
- Kuzu
- 1 haftalık
- Dişi

Başvuru nedeni
- Sulu ishal
- Emmeyi bırakma

Öykü ve bağlam
- Kalabalık ağıl
- Diğer kuzularda da ishal

Fiziksel muayene
- Dehidratasyon (%10)
- Hipotermi

Ek bulgular
- Dışkı testi: Cryptosporidium pozitif
- Metabolik asidoz



KUZU

Vaka 160

KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Neonatal ishalin sık etkenleri nelerdir?
2. Sıvı tedavisi nasıl planlanır?
3. Sürü yönetiminde neler yapılmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kriptosporidiyoz
- E. coli enteriti
- Rotavirüs enteriti

Yorumlu çözüm
Kalabalık ve kirli ortamda yeni doğan kuzularda ishal sıklıkla Cryptosporidium, E. coli, rota ve koronavirüslerden kaynaklanır. Tedavinin temeli dehidratasyon ve asidozun düzeltilmesidir: oral veya IV sıvı ve bikarbonat. Emzirme sürdürülür. Hijyen, kolostrum yönetimi ve hasta hayvanların ayrılması salgını kontrol eder; Cryptosporidium zoonotiktir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Sıvı ve asidoz düzeltmesi temeldir
- ✓ Emzirmeyi kesmeyin
- ✓ Cryptosporidium zoonotiktir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Cerrahi | Köpek

Vaka 161 · Kısırlaştırma sonrası idrar kaçırma


Hasta
- Köpek
- 6 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Uyurken idrar kaçırma

Öykü ve bağlam
- 2 yıl önce kısırlaştırılmış
- Büyük ırk

Fiziksel muayene
- Muayene normal
- Perineal bölge idrarla ıslak

Ek bulgular
- İdrar tahlili ve kültür normal
- Ultrason normal



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kısırlaştırma sonrası inkontinans mekanizması nedir?
2. Hangi tetkikler diğer nedenleri dışlar?
3. Medikal tedavi seçenekleri nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Üretral sfinkter yetmezliği
- İdrar yolu enfeksiyonu
- Ektopik üreter

Yorumlu çözüm
Kısırlaştırılmış büyük ırk dişilerde uyurken idrar kaçırma üretral sfinkter yetmezliğini düşündürür; östrojen azalması sfinkter tonusunu düşürür. Enfeksiyon, poliüri ve anatomik anomaliler dışlanmalıdır. Tedavide fenilpropanolamin veya östriol kullanılır; dirençli olgularda cerrahi veya enjeksiyon yöntemleri vardır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Uyurken kaçırma tipiktir
- ✓ Önce enfeksiyonu dışlayın
- ✓ Fenilpropanolamin etkilidir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Cerrahi Köpek

Vaka 162 · Perineal bölgede şişlik ve dışkılama güçlüğü olan kısırlaştırılmamış köpek


Hasta
- Köpek
- 10 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Dışkılamada zorlanma
- Anüs yanında şişlik

Öykü ve bağlam
- Kısırlaştırılmamış
- Kronik kabızlık

Fiziksel muayene
- Rektal muayenede pelvik diyafram zayıflığı, rektumda kese
- Prostat büyük

Ek bulgular
- Ultrason: fıtık içinde mesane yok



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Perineal fıtığın risk faktörleri nelerdir?
2. Mesane fıtık içine girerse ne olur?
3. Cerrahi tedavide neler yapılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Perineal fıtık
- Perianal tümör
- Anal kese hastalığı

Yorumlu çözüm
Kısırlaştırılmamış yaşlı erkek köpeklerde pelvik diyafram kaslarının zayıflaması perineal fıtığa yol açar; prostat büyümesi ve kronik ıkınma risk faktörüdür. Mesanenin fıtığa girmesi idrar tıkanmasına neden olur ve acildir. Tedavi fıtık onarımı (internal obturator kas flebi) ve kastrasyondur.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kısırlaştırılmamış yaşlı erkek risk altında
- ✓ Mesane fıtıklaşırsa acil
- ✓ Kastrasyon tedavinin parçasıdır

Gebelik | Koyun

Vaka 163 · Gebeliğin sonunda körlük, sendeleme ve yatma

Hasta
- Koyun
- 4 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Sürüden ayrılma
- Görme kaybı, dişleri gıcırdatma
- Yatıp kalkamama

Öykü ve bağlam
- İkiz gebelik
- Kış, yem kalitesi düşük

Fiziksel muayene
- Nefeste aseton kokusu
- Bilinç bulanıklığı

Ek bulgular
- Kan beta-hidroksibütirat: 3,5 mmol/L (yüksek)
- Glukoz düşük



KOYUN

Vaka 163

KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Gebelik toksemisi neden ikiz gebelikte sıktır?
2. Tedavide neler yapılır?
3. Sürüde nasıl önlenir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Gebelik toksemisi (ketoz)
- Hipokalsemi
- Listeriyoz

Yorumlu çözüm
Gebeliğin son haftalarında ikiz veya üçüz kuzular yüksek enerji gerektirir; yetersiz beslenmede yağ mobilizasyonu ketozise yol açar. Tedavide oral propilen glikol, IV glukoz ve kalsiyum desteği verilir; ağır olgularda sezaryen veya doğum indüksiyonu düşünülür. Önlemde son trimesterde enerji yoğun yem ve kondisyon izlemi önemlidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ İkiz gebelik risk faktörüdür
- ✓ Propilen glikol ilk tedavidir
- ✓ Son trimester beslenmesi önleyicidir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Doğum · At

Vaka 164 · Doğumdan sonra 3 saat geçmesine rağmen düşmeyen eş (plasenta)


Hasta
- At
- 8 yaş
- Kısrak

Başvuru nedeni
- Plasenta düşmedi
- Kısrak huzursuz

Öykü ve bağlam
- Normal doğum, sağlıklı tay

Fiziksel muayene
- Vulvadan sarkan plasenta parçası
- Ateş yok

Ek bulgular
- Plasenta kontrol edilmemiş



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kısrakta plasenta retansiyonu neden acildir?
2. Doğan plasenta neden incelenmelidir?
3. Hangi komplikasyonlar gelişebilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Plasenta retansiyonu
- Uterus atonisi
- Uterus yırtığı

Yorumlu çözüm
Kısrakta plasentanın 3 saat içinde düşmemesi retansiyon olarak kabul edilir ve acildir; metrit, sepsis ve laminit gelişebilir. Tedavide oksitosin uygulanır, gerekirse uterus lavajı yapılır; plasenta zorla çekilmez. Doğan plasenta eksik parça (özellikle boynuz ucu) açısından mutlaka incelenmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ 3 saat kuralı
- ✓ Plasentayı zorla çekmeyin
- ✓ Laminit riskini izleyin

Neonatoloji | Tay

Vaka 165 · Ayağa kalkamayan ve emmeyen yeni doğan tay


Hasta
- Tay
- 1 günlük
- Erkek

Başvuru nedeni
- Doğumdan sonra kalkmaya çalışmama
- Emme refleksi zayıf

Öykü ve bağlam
- Uzun süren doğum

Fiziksel muayene
- Anne ile ilgisizlik
- Amaçsız hareketler, emme refleksi kayıp

Ek bulgular
- IgG: < 400 mg/dL
- Glukoz düşük



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Tayın normal ilk saatleri nasıl olmalı?
2. Neonatal maladjüstman sendromu nedir?
3. IgG neden ölçülür?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Neonatal maladjüstman (hipoksik) sendromu
- Neonatal sepsis
- Pasif transfer yetmezliği

Yorumlu çözüm
Sağlıklı tay 1 saat içinde ayağa kalkar ve 2 saat içinde emer. Zor doğum sonrası anneye ilgisizlik ve emme refleksi kaybı hipoksiye bağlı neonatal maladjüstman sendromunu düşündürür. Destekleyici tedavi, beslenme, ısı ve gerekirse plazma ile IgG desteği verilir; sepsis araştırılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ 1-2-3 kuralı: kalk, em, eşi at
- ✓ Düşük IgG plazma gerektirir
- ✓ Sepsisi dışlayın

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Vaka 166

Cerrahi | Tavşan

Vaka 166 · Kısırlaştırılmamış tavşanda vajinal kanama

Hasta
- Tavşan
- 5 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- İdrarda kan gibi görünen akıntı
- Karında kitle

Öykü ve bağlam
- Kısırlaştırılmamış

Fiziksel muayene
- Karın palpasyonunda büyük, düzensiz uterus

Ek bulgular
- Ultrason: uterusta kitleler
- Toraks röntgeni metastaz için normal



TAVŞAN

Vaka 166

KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kısırlaştırılmamış tavşanlarda en sık uterus hastalığı nedir?
2. Hematüri gerçekten idrardan mı geliyor?
3. Tedavi ve önleme nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Uterus adenokarsinomu
- Endometrial hiperplazi
- Ürolitiazis

Yorumlu çözüm
Yaşlı, kısırlaştırılmamış dişi tavşanlarda uterus adenokarsinomu çok sıktır; kanama sıklıkla idrara karıştığı için hematüri sanılır. Erken dönemde ovariohisterektomi tedavi edicidir; akciğer metastazı araştırılmalıdır. Dişi tavşanların genç yaşta kısırlaştırılması önerilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Tavşanda uterus tümörü çok sıktır
- ✓ Gerçek hematüri ile uterus kanamasını ayırın
- ✓ Erken kısırlaştırma koruyucudur

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Cerrahi | Köpek

Vaka 167 · Kızgınlıktan sonra vulvadan çıkan kitle


Hasta
- Köpek
- 5 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Vulvadan sarkan pembe doku

Öykü ve bağlam
- Kızgınlık döneminde
- Kısırlaştırılmamış

Fiziksel muayene
- Vajen tabanından kaynaklanan ödemli doku, üretra açıklığı korunmuş

Ek bulgular
- Sitoloji: inflamasyon, neoplazi yok



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Vajinal hiperplazinin hormonal nedeni nedir?
2. Neoplaziden nasıl ayrılır?
3. Tedavi ve tekrar riski nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Vajinal hiperplazi (prolapsus)
- Vajinal tümör (leiyomiyom)
- Vajen prolapsusu

Yorumlu çözüm
Kızgınlık sırasında östrojene aşırı yanıt vajen tabanında ödemli doku büyümesine yol açar. Doku nemli ve korunmalı tutulmalı, idrar yapabildiği kontrol edilmelidir. Kızgınlık bitince genellikle geriler; tekrarı önlemek için ovariohisterektomi önerilir. Yaşlı hastada kitle tümör açısından değerlendirilmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Östrojen bağımlıdır
- ✓ Dokuyu nemli tutun
- ✓ Kısırlaştırma tekrarı önler

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Neonatoloji | Köpek

Vaka 168 · Yavruda göz kapakları açılmadan şişlik ve akıntı


Hasta
- Köpek
- 3 haftalık
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kapalı göz kapağı altında şişlik

Öykü ve bağlam
- Kardeşlerin gözleri açılmış

Fiziksel muayene
- Göz kapağı altında dalgalanan şişlik
- Kapak kenarından pürülan sızıntı

Ek bulgular
- Sitoloji: nötrofiller ve kokoid bakteriler



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Neonatal oftalmi neden acildir?
2. Göz kapağı nasıl açılır?
3. Kornea neden risk altındadır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Neonatal konjonktivit (oftalmia neonatorum)
- Dermoid
- Göz kapağı anomalisi

Yorumlu çözüm
Göz kapakları açılmadan önce biriken irin korneaya zarar verebilir ve kör bırakabilir. Kapaklar medial köşeden nazikçe ayrılır, irin temizlenir ve sık aralıklarla topikal antibiyotik uygulanır. Annenin ve yuvanın hijyeni gözden geçirilmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kapalı kapak altında irin acildir
- ✓ Kapakları nazikçe açın
- ✓ Yuva hijyeni önemlidir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Gebelik · Kedi

Vaka 169 · Gebeliğin 50. gününde karın büyümesi duran kedi

Hasta

- Kedi
- 3 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni

- Karın küçülmüş
- İştah değişikliği

Öykü ve bağlam


- Gebelik ultrasonla 25. günde doğrulanmış

Fiziksel muayene

- Ateş yok
- Vulvadan akıntı yok

Ek bulgular

- Ultrason: fetal kalp atışı yok, fetal yapılarda mineralizasyon



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları

1. Fetal mumifikasyon nasıl oluşur?
2. Kalan fetuslar neden çıkarılmalı?
3. Gelecekteki gebelikler için ne yapılmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar

- Fetal ölüm ve mumifikasyon
- Fetal rezorpsiyon
- Psödogebelik

Yorumlu çözüm

Fetal ölümden sonra serviks kapalı kalır ve bakteri girmezse fetuslar sıvısını kaybederek mumifiye olur. Mumifiye fetuslar enfeksiyon ve kısırlık riski oluşturduğundan medikal yöntemlerle veya cerrahi olarak çıkarılır. Enfeksiyöz nedenler ve beslenme sorgulanmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar

- ✓ Kapalı serviks = mumifikasyon
- ✓ Fetuslar çıkarılmalı
- ✓ Nedeni araştırın

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Doğum | Sığır

Vaka 170 · Doğumdan sonra rahmin dışarı çıkması


Hasta
- Sığır
- 6 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Doğumdan hemen sonra vulvadan büyük kitle sarkması

Öykü ve bağlam
- Güç doğum ve hipokalsemi öyküsü

Fiziksel muayene
- Karunkullerin görüldüğü dışarıda uterus
- Taşikardi

Ek bulgular
- Kalsiyum düşük



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Uterus prolapsusu neden acildir?
2. Yerine yerleştirme nasıl kolaylaştırılır?
3. Hangi komplikasyonlar izlenir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Uterus prolapsusu
- Vajen prolapsusu
- Rektum prolapsusu

Yorumlu çözüm
Uterus prolapsusu doğum sonrası acil durumdur; kanama, şok ve uterus hasarı gelişebilir. Uterus temizlenip nemli ve korunmalı tutulur, epidural anestezi altında hayvan uygun pozisyona getirilerek yerine yerleştirilir; vulva geçici olarak dikilir. Kalsiyum, oksitosin ve antibiyotik verilir; kanama ve şok izlenir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Uterusu temiz ve nemli tutun
- ✓ Epidural yerleştirmeyi kolaylaştırır
- ✓ Hipokalsemiyi düzeltin

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Atlar · At

Vaka 171 · Yerde yuvarlanan ve karnına bakan at: kolik değerlendirmesi


Hasta
- At
- 9 yaş
- Aygır

Başvuru nedeni
- Yerde yuvarlanma
- Karnına bakma
- Dışkılama yok

Öykü ve bağlam
- Belirtiler 4 saattir
- Yem değişikliği yapılmış

Fiziksel muayene
- Kalp hızı: 64/dk
- Mukozalar kırmızı, KDZ 3 sn
- Bağırsak sesleri azalmış

Ek bulgular
- Rektal muayene: genişlemiş ince bağırsak ansları
- Nazogastrik sonda: 8 L reflü
- Periton sıvısı serosanguinöz



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kolikte cerrahi kararını hangi bulgular belirler?
2. Nazogastrik reflü neyi gösterir?
3. Periton sıvısının rengi ne anlatır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Strangüle ince bağırsak (cerrahi kolik)
- Basit kabızlık (impaksiyon)
- Proksimal enterit

Yorumlu çözüm
Yüksek kalp hızı, ağrının kontrol edilememesi, nazogastrik reflü, rektal muayenede gergin ince bağırsak ve serosanguinöz periton sıvısı strangülasyonu düşündürür ve cerrahi gerektirir. Nazogastrik sonda mide rüptürünü önlemek için hayati önemdedir. Hızlı sevk prognozu belirler.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kontrol edilemeyen ağrı = cerrahi kolik
- ✓ Reflü varsa sondayı bırakın
- ✓ Periton sıvısı rengi bağırsak canlılığını gösterir

Atlar · At

Vaka 172 · Uzun ve kıvırcık tüyler, kas kaybı ve laminit öyküsü olan yaşlı at


Hasta
- At
- 14 yaş
- Kısrak

Başvuru nedeni
- Yazın tüy dökmeme
- Kas kaybı
- Tekrarlayan laminit

Öykü ve bağlam
- Su tüketimi artmış

Fiziksel muayene
- Uzun, kıvırcık tüy (hirsutizm)
- Sırt kaslarında atrofi
- Supraorbital yağ birikimi

Ek bulgular
- Endojen ACTH yüksek
- İnsülin yüksek



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. PPID nasıl tanınır?
2. Laminit ile ilişkisi nedir?
3. Tedavide hangi ilaç kullanılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hipofiz pars intermedia disfonksiyonu (PPID)
- Equine metabolik sendrom
- Kronik kilo kaybı nedenleri

Yorumlu çözüm
Yaşlı atta hirsutizm, kas kaybı ve tekrarlayan laminit PPID'yi (equine Cushing) düşündürür; yüksek endojen ACTH tanıyı destekler (mevsim etkisi dikkate alınmalı). Hiperinsülinemi laminit riskini artırır. Tedavide pergolid kullanılır; diş bakımı, tırnak bakımı ve parazit kontrolü önemlidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Hirsutizm PPID'nin en tipik bulgusudur
- ✓ ACTH mevsime göre yorumlanır
- ✓ Pergolid temel tedavidir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Atlar · At

Vaka 173 · Burun akıntısı ve çene altında apseleşen lenf düğümleri

Hasta

- At
- 6 yaş
- Kısrak

Başvuru nedeni

- Ateş
- Pürülan burun akıntısı
- Yutkunma güçlüğü

Öykü ve bağlam


- Ahıra yeni at gelmiş

Fiziksel muayene

- Ateş: 40,2 °C
- Submandibular lenf düğümlerinde apse

Ek bulgular

- Apse sıvısından Streptococcus equi subsp. equi PCR pozitif



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları

1. Gurm (atlarda boğaz apsesi) nasıl bulaşır?
2. Apseler nasıl yönetilir?
3. Ahırda karantina neden şarttır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar

- Gurm (Strangles)
- Viral solunum yolu enfeksiyonu
- Diş apsesi

Yorumlu çözüm

Ateş, pürülan burun akıntısı ve submandibular lenf düğüm apseleri gurmu (Streptococcus equi) düşündürür. Hastalık burun akıntısı ve ortak ekipmanla bulaşır. Olgunlaşan apseler drene edilir; antibiyotik kullanımı vakaya göre değerlendirilir. Hasta atlar izole edilir, taşıyıcılar guttural kese endoskopisi ile taranır.

Akılda tutulacak noktalar

- ✓ Ahırda karantina yayılmayı önler
- ✓ Apseleri drene edin
- ✓ Taşıyıcıları guttural kesede arayın

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Atlar · At

Vaka 174 · Ön ayakta ani şiddetli topallık ve tırnakta sıcaklık

Hasta

- At
- 7 yaş
- İğdiş

Başvuru nedeni

- Ön ayağa basmama

Öykü ve bağlam


- Islak ve çamurlu padok

Fiziksel muayene

- Tek tırnakta sıcaklık ve güçlü dijital nabız
- Tırnak pensinde lokal ağrı

Ek bulgular

- Tabanın açılmasıyla siyah irin çıkışı



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları

1. Tek tırnakta ani ve şiddetli topallığın en sık nedeni nedir?
2. Laminitten nasıl ayrılır?
3. Tedavi nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar

- Tırnak apsesi
- Laminit
- Kemik kırığı (tırnak kemiği)

Yorumlu çözüm

Tek tırnakta ani şiddetli topallık, lokal ağrı ve güçlü dijital nabız en sık tırnak apsesinden kaynaklanır; laminit genellikle iki ön ayağı birlikte tutar. Tabanda apse drene edilir, tırnak ıslatılıp temiz bandajla korunur ve tetanoz koruması kontrol edilir.

Akılda tutulacak noktalar

- ✓ Tek tırnak = önce apseyi düşünün
- ✓ Drenaj rahatlama sağlar
- ✓ Tetanoz aşısını kontrol edin

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Atlar · At

Vaka 175 · Toz ortamında öksürük ve egzersiz intoleransı olan at


Hasta
- At
- 12 yaş
- İğdiş

Başvuru nedeni
- Kronik öksürük
- Burun deliklerinde genişleme
- Performans düşüklüğü

Öykü ve bağlam
- Kapalı ahırda kuru saman ile besleniyor

Fiziksel muayene
- İstirahatte artmış abdominal solunum ('heave line')
- Wheeze

Ek bulgular
- Bronkoalveoler lavaj: nötrofil oranı yüksek



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Equine astımın tetikleyicileri nelerdir?
2. BAL neden tanıda önemlidir?
3. Çevresel yönetim nasıl olmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Equine astım (ağır form)
- Bakteriyel pnömoni
- Akciğer kurdu

Yorumlu çözüm
Tozlu ortamda kronik öksürük, ekspiratuvar efor ve BAL'da nötrofil artışı ağır equine astımı gösterir. Tedavinin temeli çevresel değişikliktir: ıslatılmış veya buharlanmış ot, tozsuz altlık, merada tutma. Kriz döneminde kortikosteroid ve bronkodilatörler kullanılır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Çevre yönetimi ilaçtan önemlidir
- ✓ BAL tanıyı doğrular
- ✓ Islatılmış ot tozu azaltır

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Sığırlar | Sığır

Vaka 176 · Doğumdan 3 hafta sonra süt veriminde düşüş ve aseton kokusu


Hasta
- Sığır
- 4 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Süt veriminde düşüş
- Kesif yem yememe

Öykü ve bağlam
- Yüksek verimli
- Doğum sonrası 3. hafta

Fiziksel muayene
- Nefeste aseton kokusu
- Kilo kaybı
- Rumen hareketleri hafif azalmış

Ek bulgular
- Kan beta-hidroksibütirat: 2,4 mmol/L
- İdrar keton pozitif



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Ketozun subklinik ve klinik formları nasıl ayrılır?
2. Tedavide hangi ürünler kullanılır?
3. Sürü düzeyinde nasıl önlenir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Primer ketoz
- Abomazum deplasmanı (sekonder ketoz)
- Metrit

Yorumlu çözüm
Laktasyonun başında enerji açığı yağ mobilizasyonu ve ketozla sonuçlanır. Kan BHB değeri tanıyı koyar; 1,2 mmol/L üzeri subklinik ketoz kabul edilir. Tedavide oral propilen glikol ve gerekirse IV glukoz verilir. Sekonder nedenler (abomazum deplasmanı, metrit) araştırılmalı; kuru dönem beslenmesi ve kondisyon yönetimi önleyicidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ BHB tanıyı koyar
- ✓ Propilen glikol ilk tedavidir
- ✓ Sekonder nedenleri arayın

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Sığırlar | Sığır

Vaka 177 · Sol karında 'ping' sesi olan süt ineği


Hasta
- Sığır
- 5 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- İştah azalması
- Süt verimi düşüşü
- Dışkı azalmış

Öykü ve bağlam
- Doğumdan 2 hafta sonra

Fiziksel muayene
- Sol tarafta perküsyonla oskültasyonda metalik 'ping' sesi (9-13. kostalar)

Ek bulgular
- Kan ketonu yüksek
- Hipokalsemi hafif



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Sol abomazum deplasmanı nasıl oluşur?
2. Ping sesi başka hangi durumlarda duyulur?
3. Tedavi seçenekleri nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Sol abomazum deplasmanı
- Rumen timpanisi
- Pnömoperitoneum

Yorumlu çözüm
Doğum sonrası hipokalsemi ve düşük yem tüketimi abomazum motilitesini azaltır; gazla dolan abomazum sola kayar. Sol taraftaki 'ping' sesi tipiktir. Tedavide cerrahi (omentopeksi veya abomazopeksi) veya rulo yöntemi uygulanır; eşlik eden ketoz ve hipokalsemi tedavi edilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Ping sesi = gaz dolu organ
- ✓ Doğum sonrası ilk ay risklidir
- ✓ Ketoz ve hipokalsemiyi düzeltin

Sığırlar | Sığır

Vaka 178 · Memede sertlik ve sütte pıhtılar


Hasta
- Sığır
- 3 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Sütte pıhtılar
- Bir meme lobunda şişlik

Öykü ve bağlam
- Sağım ekipmanı eski

Fiziksel muayene
- Bir lobda sıcak, sert ve ağrılı meme
- Ateş: 39,8 °C

Ek bulgular
- California mastitis testi (CMT) güçlü pozitif
- Süt kültürü: Staphylococcus aureus



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Klinik ve subklinik mastit nasıl ayrılır?
2. CMT neyi ölçer?
3. Staphylococcus aureus mastiti neden zor tedavi edilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Klinik mastit (S. aureus)
- Koliform mastit
- Meme ödemi

Yorumlu çözüm
Sütte gözle görülür değişiklik ve memede inflamasyon klinik mastittir; CMT somatik hücre artışını gösterir. S. aureus meme dokusunda kalıcı enfeksiyonlar yapar ve tedavi başarısı düşüktür. Kültüre göre tedavi, sağım hijyeni, sağım makinesinin bakımı ve kronik ineklerin ayrılması önemlidir. İlaç kalıntı süreleri sütte uygulanmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ CMT somatik hücreyi gösterir
- ✓ Kültüre göre tedavi edin
- ✓ Kalıntı süresine uyun

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Sığırlar | Buzağı

Vaka 179 · Sulu ishal ve şiddetli dehidratasyon olan buzağı


Hasta
- Buzağı
- 10 günlük
- Erkek

Başvuru nedeni
- Sarı, sulu ishal
- Emmeme
- Ayağa kalkamama

Öykü ve bağlam
- Aynı haftada başka buzağılarda da ishal

Fiziksel muayene
- Gözler çökük (dehidratasyon %10-12)
- Emme refleksi zayıf
- Hipotermi

Ek bulgular
- Metabolik asidoz
- Dışkı testi: rotavirüs ve Cryptosporidium pozitif



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Dehidratasyon derecesi klinikte nasıl tahmin edilir?
2. Hangi durumda IV sıvı gerekir?
3. Bikarbonat neden önemlidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Neonatal buzağı ishali (rotavirüs, Cryptosporidium)
- E. coli (ETEC)
- Salmonelloz

Yorumlu çözüm
Göz çöküklüğü ve deri kıvrımının geç düzelmesi dehidratasyon derecesini gösterir. Emme refleksi kaybolmuş ve ayağa kalkamayan buzağıda IV sıvı ve bikarbonat ile asidoz düzeltilir. Süt kesilmez, oral elektrolit ile birlikte verilir. Kolostrum yönetimi, hijyen ve aşılama salgınları önler.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Emme refleksi kaybı = IV sıvı
- ✓ Asidozu düzeltin
- ✓ Sütü kesmeyin

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Sığırlar | Sığır

Vaka 180 · Besi danasında ateş, burun akıntısı ve öksürük


Hasta
- Sığır
- 2 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Ateş
- Burun akıntısı
- Öksürük, iştahsızlık

Öykü ve bağlam
- İki hafta önce farklı sürülerden toplanıp nakledilmiş

Fiziksel muayene
- Ateş: 41,0 °C
- Takipne
- Kranioventral akciğerde krepitasyon

Ek bulgular
- Nazal sürüntü: Mannheimia haemolytica ve BRSV pozitif



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Sığır solunum hastalığı kompleksinin risk faktörleri nelerdir?
2. Nakil stresi neden önemlidir?
3. Sürü düzeyinde nasıl önlenir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Sığır solunum hastalığı kompleksi (BRD)
- Enzootik pnömoni
- Akciğer kurdu

Yorumlu çözüm
Farklı kaynaklardan toplanma, nakil stresi ve viral enfeksiyonlar bakteriyel pnömoniye zemin hazırlar ('nakil humması'). Erken tanı (ateş, iştahsızlık) ve uygun antibiyotik ile antiinflamatuvar tedavi başarıyı artırır. Önlemede aşılama, nakil öncesi hazırlık ve havalandırma önemlidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Nakil stresi BRD'yi tetikler
- ✓ Erken tedavi kritiktir
- ✓ Havalandırma ve aşı önleyicidir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Sığırlar | Sığır

Vaka 181 · Ateş, ağızda yaralar ve topallık görülen sürü

Hasta

- Sığır
- 6 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni

- Aşırı salya
- Topallık
- Süt veriminde ani düşüş

Öykü ve bağlam


- Sürüde birden çok hayvanda benzer belirti

Fiziksel muayene

- Dil ve dişetlerinde patlamış veziküller
- Tırnak arasında yaralar
- Ateş

Ek bulgular

- Resmi laboratuvar testi bekleniyor



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları

1. Bu tablo hangi ihbarı zorunlu hastalığı düşündürür?
2. Klinik ekip ne yapmalı?
3. Benzer veziküler hastalıklar nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar

- Şap hastalığı
- Sığır viral diyaresi (mukozal hastalık)
- Veziküler stomatit

Yorumlu çözüm

Sürüde salya, ağız ve ayaklarda veziküller ve topallık şap hastalığını düşündürür; ihbarı zorunlu bir hastalıktır. Veteriner hekim hayvan hareketlerini durdurmalı, resmi makamlara hemen bildirmeli ve biyogüvenlik önlemleri almalıdır. Tanı resmi laboratuvarlarda konur; kontrol, aşılama ve hareket kısıtlamasıyla yapılır.

Akılda tutulacak noktalar

- ✓ Şap ihbarı zorunlu hastalıktır
- ✓ Hayvan hareketini durdurun, bildirin
- ✓ Biyogüvenlik ekibi korur

Sığırlar | Sığır

Vaka 182 · Ani yatıp kalkamama ve kas titremesi: otlakta otlayan inek


Hasta
- Sığır
- 5 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Kas titremesi
- Sendeleme
- Kasılmalar

Öykü ve bağlam
- İlkbaharda taze, gübreli meraya çıkarılmış

Fiziksel muayene
- Hiperestezi
- Tetanik kasılmalar

Ek bulgular
- Serum magnezyumu düşük



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Çayır tetanisinin nedeni nedir?
2. Tedavide neler verilir?
3. Nasıl önlenir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hipomagnezemi (çayır tetanisi)
- Hipokalsemi
- Kurşun zehirlenmesi

Yorumlu çözüm
Hızlı büyüyen, potasyumu yüksek ve magnezyumu düşük taze meralar hipomagnezemiye yol açar. Tedavi yavaş IV kalsiyum-magnezyum çözeltisi ve deri altı magnezyumdur; uyarılmış hayvanda dikkatli olunmalıdır. Önlemede magnezyum takviyeli yem veya tuz blokları kullanılır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Taze mera risk faktörüdür
- ✓ Magnezyumu yavaş verin
- ✓ Takviye önleyicidir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Koyunlar | Koyun

Vaka 183 · Soluk göz mukozası ve çene altında ödem olan koyunlar

Hasta
- Koyun
- 3 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Halsizlik
- Çene altında şişlik
- Kilo kaybı

Öykü ve bağlam
- Yaz sonu, ıslak mera
- Antiparaziter uygulama yapılmamış

Fiziksel muayene
- FAMACHA skoru 4-5 (çok soluk)
- Submandibular ödem

Ek bulgular
- Hematokrit: %14
- Dışkıda yüksek strongylid yumurta sayısı



KOYUN

Vaka 183

KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. FAMACHA yöntemi nasıl kullanılır?
2. Hangi parazit anemi yapar?
3. Antiparaziter direnç nasıl önlenir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Haemonchus contortus enfestasyonu
- Karaciğer kelebeği
- Beslenme yetersizliği

Yorumlu çözüm
Haemonchus contortus kan emen bir abomazum kurdudur; anemi ve hipoproteinemiye bağlı çene altı ödemi yapar. FAMACHA skoru ile sadece anemik hayvanlar seçici olarak ilaçlanır, bu da direnç gelişimini yavaşlatır. Mera rotasyonu ve dışkı yumurta sayımıyla izlem önemlidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ FAMACHA seçici tedavi sağlar
- ✓ Çene altı ödemi hipoproteinemiyi gösterir
- ✓ Direnç gelişimini önleyin

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Koyunlar | Koyun

Vaka 184 · Daireler çizen ve bir yöne dönen koyun

Hasta
- Koyun
- 2 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Daireler çizme
- Başını bir yana eğme
- Yüz felci

Öykü ve bağlam
- Silaj ile besleniyor
- Kış ayları

Fiziksel muayene
- Tek taraflı yüz felci (kulak düşük, göz kapağı kapanmıyor)
- Salya

Ek bulgular
- Beyin omurilik sıvısında mononükleer hücre artışı



KOYUN

Vaka 184

II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Bu nörolojik tablo hangi bakteriyel hastalığı düşündürür?
2. Silajın rolü nedir?
3. Zoonotik risk nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Listeriyoz
- Serebrokortikal nekroz
- Koenuroz

Yorumlu çözüm
Kötü kaliteli silajla beslenen koyunda daireler çizme ve tek taraflı kranial sinir felci Listeria monocytogenes'e bağlı beyin sapı ensefalitini düşündürür. Erken dönemde yüksek doz penisilin ve destekleyici tedavi uygulanır. Kalitesiz silaj kullanılmamalıdır. Listeria zoonotiktir; özellikle gebe kadınlar dikkatli olmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Silaj kalitesi önemlidir
- ✓ Erken antibiyotik prognozu iyileştirir
- ✓ Listeria zoonotiktir

Koyunlar | Koyun

Vaka 185 · Tırnak arasında kötü koku ve sürüde yaygın topallık

Hasta
- Koyun
- 4 yaş
- Koç

Başvuru nedeni
- Topallık
- Diz üstünde otlama

Öykü ve bağlam
- Islak mera
- Sürüye yeni hayvan katılmış

Fiziksel muayene
- Tırnak arası deride iltihap, tırnak tabanının ayrılması
- Kötü koku

Ek bulgular
- Sürüntüde Dichelobacter nodosus



KOYUN

Vaka 185

KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Ayak çürüğü nasıl yayılır?
2. Sürü düzeyinde kontrol nasıl yapılır?
3. Ayak banyosunun rolü nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Bulaşıcı ayak çürüğü
- Tırnak arası dermatit
- Tırnak apsesi

Yorumlu çözüm
Bulaşıcı ayak çürüğü Dichelobacter nodosus ile ıslak koşullarda yayılır; tırnak tabanının ayrılması ve kötü koku tipiktir. Tedavide hasta hayvanlar ayrılır, sistemik antibiyotik verilir ve ayak banyoları kullanılır. Sürüye yeni katılan hayvanlar karantinaya alınmalı, aşı düşünülebilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Islak koşullar yayılımı artırır
- ✓ Hastaları ayırın
- ✓ Yeni hayvana karantina

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Koyunlar | Koyun

Vaka 186 · Sürüde ani ölümler: mera değişikliği sonrası

Hasta
- Koyun
- 1 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Gece ani ölümler
- Bazılarında ishal ve kasılma

Öykü ve bağlam
- Daha verimli meraya geçilmiş
- Aşılama yapılmamış

Fiziksel muayene
- Ölü hayvanlarda karın şişliği
- Hasta hayvanlarda nörolojik belirtiler

Ek bulgular
- Nekropside 'pulpy kidney' (yumuşak böbrek)
- İdrarda glukoz



KOYUN

Vaka 186

KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Ani ölüm nedenleri nelerdir?
2. Enterotoksemi nasıl tetiklenir?
3. Koruyucu yöntem nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Enterotoksemi (Clostridium perfringens tip D)
- Şarbon
- Zehirli bitki

Yorumlu çözüm
Zengin yeme ani geçiş bağırsakta Clostridium perfringens tip D çoğalmasına ve toksin üretimine yol açar; ani ölüm, nörolojik belirti ve glukozüri tipiktir. Nekropside yumuşak böbrek görülebilir. Klostridyal aşılama ve rasyon değişikliklerinin kademeli yapılması temel korunma yöntemleridir. Ani ölümlerde şarbon mutlaka dışlanmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Ani yem değişikliği risklidir
- ✓ Klostridyal aşılama koruyucudur
- ✓ Ani ölümde önce şarbonu dışlayın

Koyunlar | Keçi

Vaka 187 · Keçide bacak eklemlerinde şişlik ve kilo kaybı

Hasta
- Keçi
- 3 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Diz eklemlerinde şişlik
- Kilo kaybı
- Süt veriminde azalma

Öykü ve bağlam
- Sürüde birçok yetişkin keçide benzer
- Oğlaklar havuz kolostrumla besleniyor

Fiziksel muayene
- Karpal eklemlerde büyüme
- Sert meme ('taş meme')

Ek bulgular
- CAEV serolojisi pozitif



KEÇİ

Vaka 187

KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. CAE nasıl bulaşır?
2. Sürü kontrol programı nasıl olmalı?
3. Tedavi var mı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Keçi artriti-ensefaliti (CAE)
- Mikoplazma artriti
- Septik artrit

Yorumlu çözüm
Keçi artriti-ensefaliti virüsü başlıca kolostrum ve sütle bulaşır; yetişkinlerde artrit ve indüratif mastit yapar. Tedavisi yoktur. Kontrol için oğlaklar doğumdan hemen sonra ayrılır, ısıl işlem görmüş kolostrum ve pastörize süt verilir, düzenli seroloji ile pozitifler ayrılır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kolostrum ana bulaş yoludur
- ✓ Tedavisi yoktur, kontrol esastır
- ✓ Düzenli serolojik tarama

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Kanatlılar · Tavuk

Vaka 188 · Köy tavuklarında ani ölümler, solunum ve nörolojik belirtiler

Hasta
- Tavuk
- 20 haftalık
- Dişi

Başvuru nedeni
- Ani ölümler
- Hırıltılı solunum
- Boyun bükülmesi

Öykü ve bağlam
- Aşılanmamış küçük sürü
- Komşu köyde ölümler

Fiziksel muayene
- Tortikolis
- Yeşil ishal
- Yumurta veriminde düşüş

Ek bulgular
- Resmi laboratuvara örnek gönderilmiş



TAVUK

Vaka 188

KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Bu tablo hangi ihbarı zorunlu hastalıkları düşündürür?
2. Örnek alma ve gönderme nasıl olmalı?
3. Biyogüvenlik önlemleri nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Newcastle hastalığı
- Yüksek patojenli kuş gribi
- Enfeksiyöz bronşit

Yorumlu çözüm
Aşılanmamış sürüde ani ölümler, solunum ve nörolojik belirtiler Newcastle hastalığı ve kuş gribini düşündürür; ikisi de ihbarı zorunludur ve kuş gribi zoonotiktir. Resmi makamlara bildirilir, kişisel koruyucu ekipmanla örnek alınır, hareketler durdurulur. Aşılama ve yabani kuşlarla temasın önlenmesi korunmada esastır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Ani ölümlerde ihbar zorunlu hastalıkları düşünün
- ✓ Koruyucu ekipman kullanın
- ✓ Yabani kuş temasını önleyin

Kanatlılar | Muhabbet kuşu

Vaka 189 · Kabarık duran, burun deliği akıntısı olan muhabbet kuşu

Hasta
- Muhabbet kuşu
- 5 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kabarık durma
- Burun akıntısı
- Yeşil dışkı

Öykü ve bağlam
- Yeni kuş alınmış, karantina yapılmamış

Fiziksel muayene
- Konjonktivit
- Tüyler kabarık, uyuşukluk

Ek bulgular
- PCR: Chlamydia psittaci pozitif



MUHABBET KUŞU

Vaka 189

KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Psittakoz neden önemlidir?
2. Kuş sahibine hangi uyarılar yapılmalı?
3. Tedavi ne kadar sürer?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Psittakoz (klamidiyoz)
- Aspergilloz
- Hava keseleri akarı

Yorumlu çözüm
Kabarık duruş, solunum belirtileri ve yeşil dışkı kuşlarda sistemik hastalığı gösterir; PCR Chlamydia psittaci'yi doğrular. Psittakoz zoonotiktir ve insanlarda pnömoniye yol açabilir; sahibe kafes temizliğinde maske ve eldiven kullanması, grip benzeri belirtide hekime başvurması söylenmelidir. Doksisiklin ile uzun süreli tedavi edilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kabarık kuş hasta kuştur
- ✓ Psittakoz zoonotiktir
- ✓ Yeni kuşa karantina uygulayın

Kanatlılar | Papağan

Vaka 190 · Kendi tüylerini yolan gri papağan

Hasta
- Papağan
- 12 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Göğüs ve kanat altında tüy yolma

Öykü ve bağlam
- Gün boyu yalnız
- Beslenme ağırlıklı ayçiçeği çekirdeği

Fiziksel muayene
- Göğüste tüysüz alanlar, deri sağlıklı
- Baş tüyleri normal

Ek bulgular
- Kan tahlili ve tetkikler normal



PAPAĞAN

Vaka 190

KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Tüy yolmanın tıbbi ve davranışsal nedenleri nelerdir?
2. Baş tüylerinin normal olması neyi düşündürür?
3. Çevre zenginleştirme nasıl yapılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Davranışsal tüy yolma
- Beslenme yetersizliği
- Psittacine beak and feather disease

Yorumlu çözüm
Baş tüyleri normal, gaganın ulaşabildiği yerlerde tüy kaybı kuşun kendisinin yoluyor olduğunu gösterir. Önce tıbbi nedenler (beslenme, enfeksiyon, parazit, ağrı) dışlanır. Yalnızlık, can sıkıntısı ve yetersiz beslenme sık nedenlerdir; çevre zenginleştirme, sosyal etkileşim ve dengeli diyet önerilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Baş tüyleri normal = kendi yoluyor
- ✓ Önce tıbbi nedenleri dışlayın
- ✓ Çevre zenginleştirme tedavinin parçasıdır

Kanatlılar | Tavuk

Vaka 191 · Yumurtlayan tavukta karın şişliği ve penguen duruşu

Hasta
- Tavuk
- 40 haftalık
- Dişi

Başvuru nedeni
- Yumurtlamayı bırakma
- Penguen gibi dik duruş
- Karında şişlik

Öykü ve bağlam
- Yüksek verimli yumurta tavuğu

Fiziksel muayene
- Karında dalgalanan şişlik

Ek bulgular
- Ultrason: karın içi serbest yumurta materyali ve sıvı



TAVUK

Vaka 191

KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Yumurta peritoniti nasıl gelişir?
2. Yumurta bağlanması ile nasıl ayrılır?
3. Tedavi seçenekleri nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Yumurta sarısı peritoniti
- Yumurta bağlanması (yumurta tıkanıklığı)
- Neoplazi

Yorumlu çözüm
Yumurta sarısının ovidukt yerine karın boşluğuna düşmesi peritonite yol açar; penguen duruşu ve karın şişliği tipiktir. Ultrason ve gerekirse abdominosentez tanıyı destekler. Tedavide antibiyotik, antiinflamatuvar, sıvı ve yumurtlamayı baskılayan hormonal uygulamalar; ağır olgularda cerrahi yapılır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Penguen duruşu karın içi sorunu gösterir
- ✓ Yumurtlamayı baskılamak tekrarı azaltır
- ✓ Ağır olguda cerrahi

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Sürüngenler | Kaplumbağa

Vaka 192 · Kış uykusundan sonra gözlerini açamayan kaplumbağa

Hasta
- Kaplumbağa
- 15 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Gözlerde şişlik
- Yememe

Öykü ve bağlam
- Beslenme sadece marul
- UVB lambası yok

Fiziksel muayene
- Göz kapakları şiş ve kapalı
- Kabukta yumuşaklık

Ek bulgular
- Kan kalsiyumu düşük



KAPLUMBAĞA

Vaka 192

KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hipovitaminoz A göz kapaklarını nasıl etkiler?
2. UVB neden gereklidir?
3. Doğru bakım koşulları nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- A vitamini eksikliği ve metabolik kemik hastalığı
- Bakteriyel konjonktivit
- Orta kulak apsesi

Yorumlu çözüm
Tek tip beslenme A vitamini eksikliğine yol açar; göz kapağı ve epitel değişiklikleri ile göz şişliği görülür. UVB eksikliği ve düşük kalsiyum metabolik kemik hastalığı yapar. Tedavide dikkatli A vitamini takviyesi, kalsiyum, UVB ışığı, doğru sıcaklık ve çeşitli bitkisel beslenme gerekir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Sürüngen hastalıklarının çoğu bakım hatasıdır
- ✓ UVB ve kalsiyum kemik sağlığı için şart
- ✓ Tek tip beslenmeden kaçının

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Sürüngenler | İguana

Vaka 193 · Çenesi yumuşak ve bacakları şiş iguana

Hasta
- İguana
- 2 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Yemek yiyememe
- Bacaklarda şişlik
- Titremeler

Öykü ve bağlam
- UVB lambası yok
- Beslenme ağırlıklı meyve

Fiziksel muayene
- Yumuşak, 'lastik' çene
- Uzun kemiklerde kalınlaşma
- Kas seğirmeleri

Ek bulgular
- Röntgen: kemik yoğunluğunda azalma, patolojik kırıklar



İGUANA

Vaka 193

KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Beslenme kaynaklı sekonder hiperparatiroidizm nasıl gelişir?
2. Kas seğirmeleri neyi gösterir?
3. Tedavi ve bakım düzeltmesi nasıl yapılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Metabolik kemik hastalığı
- Kırık
- Böbrek hastalığı

Yorumlu çözüm
UVB eksikliği ve düşük kalsiyum/yüksek fosfor diyet D vitamini ve kalsiyum eksikliğine, paratiroid hormonun artmasına ve kemik yıkımına yol açar. Kas seğirmeleri hipokalsemiyi gösterir. Tedavide kalsiyum takviyesi, UVB ve uygun ısı sağlanır, beslenme yeşil yapraklı sebzelere ağırlık verecek şekilde düzenlenir. Kırıklar dikkatle desteklenmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ UVB + kalsiyum = sağlam kemik
- ✓ Hipokalsemiye dikkat
- ✓ Bakım düzeltilmeden ilaç işe yaramaz

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Sürüngenler | Yılan

Vaka 194 · Ağız açık nefes alan ve salgısı olan yılan

Hasta
- Yılan
- 6 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Ağız açık solunum
- Burun ve ağızda köpüklü salgı

Öykü ve bağlam
- Terraryum sıcaklığı düşük

Fiziksel muayene
- Hırıltı
- Başı yukarıda tutma

Ek bulgular
- Trakeal yıkama: Gram negatif bakteri



YILAN

Vaka 194

II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Sürüngenlerde solunum enfeksiyonunda ortam sıcaklığının rolü nedir?
2. Neden bağışıklık sistemi zayıflar?
3. Tedavi planı nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Bakteriyel solunum yolu enfeksiyonu
- Viral enfeksiyon
- Parazitler

Yorumlu çözüm
Ektotermik sürüngenlerde düşük ortam sıcaklığı bağışıklık sistemini baskılar ve solunum enfeksiyonlarını kolaylaştırır. Tedavide önce tercih edilen optimum sıcaklık sağlanır, kültüre göre antibiyotik, nemlendirme ve destekleyici bakım yapılır. Terraryum hijyeni ve sıcaklık gradyanı kontrol edilmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Önce sıcaklığı düzeltin
- ✓ Kültüre göre antibiyotik
- ✓ Terraryum koşullarını sorgulayın

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Zoonozlar | Köpek

Vaka 195 · Bilinmeyen bir köpek tarafından ısırılmış, aşısı bilinmeyen köpek


Hasta
- Köpek
- 3 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Davranış değişikliği
- Saldırganlık
- Yutkunma güçlüğü

Öykü ve bağlam
- 2 hafta önce sokak köpeğiyle kavga
- Kuduz aşısı yok

Fiziksel muayene
- Salya
- Çene düşüklüğü
- Ses değişikliği

Ek bulgular
- Hasta karantinada, tanı resmi laboratuvarda konacak



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kuduz şüphesinde veteriner hekimin yasal yükümlülükleri nelerdir?
2. Temaslı insanlar için ne yapılmalı?
3. Neden canlı hayvanda kesin tanı zordur?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kuduz
- Distemper
- Yabancı cisim (ağızda)

Yorumlu çözüm
Aşısız köpekte davranış değişikliği, salya ve yutkunma güçlüğü kuduzu düşündürür; ihbarı zorunlu ve öldürücü bir zoonozdur. Hayvan karantinaya alınır, resmi makamlara bildirilir; temaslı kişiler hemen sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Muayene minimum temasla ve koruyucu ekipmanla yapılmalıdır. Aşılama en etkili korunmadır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kuduz şüphesi ihbar zorunludur
- ✓ Temaslı insanlar hemen hekime
- ✓ Ağız muayenesinde son derece dikkatli olun

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Zoonozlar | Sığır

Vaka 196 · Sürüde yavru atma ve çobanda dalgalı ateş

Hasta

- Sığır
- 5 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni

- Gebeliğin son döneminde yavru atma
- Plasenta retansiyonu

Öykü ve bağlam


- Sürüde birden fazla abort
- Çobanda uzun süreli ateş ve eklem ağrısı

Fiziksel muayene

- Abort sonrası genel durum iyi

Ek bulgular

- Rose Bengal ve ELISA testleri pozitif



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları

1. Bruselloz neden önemli bir halk sağlığı sorunudur?
2. Abort materyali nasıl ele alınmalı?
3. Kontrol programı nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar

- Bruselloz
- Leptospiroz
- Neosporoz

Yorumlu çözüm

Sürüde geç dönem abortlar ve insanlarda dalgalı ateş brusellozu düşündürür; ihbarı zorunlu bir zoonozdur ve çiğ süt/süt ürünleri ile abort materyali temasıyla bulaşır. Abort materyali eldivenle toplanıp imha edilir, alan dezenfekte edilir, resmi makamlara bildirilir. Kontrol aşılama, test ve pozitif hayvanların ayrılması ile yapılır.

Akılda tutulacak noktalar

- ✓ Bruselloz ihbarı zorunludur
- ✓ Abort materyaline korumasız dokunmayın
- ✓ Çiğ süt tüketimi risktir

Zoonozlar | Köpek

Vaka 197 · Koyun sürüsüyle yaşayan çoban köpeğinde parazit kontrolü

Hasta
- Köpek
- 8 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Rutin kontrol
- Belirti yok

Öykü ve bağlam
- Kesilen koyunların iç organlarıyla besleniyor
- Antiparaziter uygulaması düzensiz

Fiziksel muayene
- Muayene normal

Ek bulgular
- Dışkıda tenya yumurtaları (Echinococcus şüphesi)



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kistik ekinokokkozun yaşam döngüsü nasıldır?
2. İnsanlar nasıl enfekte olur?
3. Köpeklerde kontrol nasıl yapılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Echinococcus granulosus enfestasyonu
- Taenia türleri
- Dipylidium caninum

Yorumlu çözüm
Köpekler, ara konaktaki (koyun) kistli organları yiyerek Echinococcus granulosus ile enfekte olur; dışkıyla yumurta saçarlar. İnsanlar bu yumurtaları yutarak karaciğer ve akciğerde kist hidatik geliştirir. Köpeklere düzenli prazikuantel verilmesi ve kesim artıklarının köpeklere verilmemesi en etkili kontrol yöntemidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kesim artığı köpeğe verilmez
- ✓ Prazikuantel düzenli uygulanır
- ✓ Kist hidatik ciddi bir halk sağlığı sorunudur

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Zoonozlar | Kedi

Vaka 198 · Gebe sahibi olan genç kedide toksoplazma kaygısı

Hasta
- Kedi
- 1 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Sahip gebe, danışmak istiyor

Öykü ve bağlam
- Kedi evde yaşıyor, kuru mama ile besleniyor

Fiziksel muayene
- Muayene normal

Ek bulgular
- Seroloji: Toxoplasma IgG pozitif, IgM negatif



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kediden insana bulaş nasıl olur?
2. IgG pozitifliği ne anlama gelir?
3. Gebe sahibe hangi öneriler verilmeli?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Geçirilmiş (eski) toksoplazmoz
- Aktif enfeksiyon
- Seronegatif kedi

Yorumlu çözüm
Kediler Toxoplasma ookistlerini sadece ilk enfeksiyondan sonraki kısa süre içinde dışkıyla atar; ookistler 1-5 gün içinde enfektif hâle gelir. IgG pozitif, IgM negatif kedi büyük olasılıkla daha önce enfekte olmuştur. Gebe sahiplere kum kabının her gün başkası tarafından temizlenmesi, eldiven, el yıkama ve çiğ et tüketmemesi önerilir. İnsanlarda en sık kaynak az pişmiş et ve yıkanmamış sebzelerdir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kum kabını her gün temizleyin
- ✓ Çiğ et ana risk kaynağıdır
- ✓ Kediyi evden uzaklaştırmak gerekmez

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Zoonozlar | Köpek

Vaka 199 · Kum sineklerinin yaygın olduğu bölgede kilo kaybı ve deri lezyonları


Hasta
- Köpek
- 6 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Kilo kaybı
- Göz çevresinde tüy kaybı
- Tırnaklarda uzama

Öykü ve bağlam
- Akdeniz kıyısında yaşıyor
- Sivrisinek/kum sineği koruması yok

Fiziksel muayene
- Periokuler alopesi, pul pul deri
- Lenfadenopati
- Onikogrifoz

Ek bulgular
- Hiperglobulinemi
- Proteinüri
- Leishmania serolojisi yüksek



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Leishmaniasis nasıl bulaşır?
2. Böbrek tutulumu neden prognozu belirler?
3. Korunma yöntemleri nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Leishmaniasis
- Ehrlichiosis
- Lupus

Yorumlu çözüm
Kum sineğiyle bulaşan Leishmania infantum kronik sistemik hastalık yapar; deri lezyonları, lenfadenopati, tırnak uzaması ve hiperglobulinemi tipiktir. Glomerülonefrit ve proteinüri prognozu belirler. Tedavide leishmanisidal ve leishmaniostatik ilaçlar kullanılır. Repellent tasmalar ve aşılama korunmada önemlidir; hastalık zoonotiktir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Proteinüri prognozu belirler
- ✓ Repellent korunmada esastır
- ✓ Endemik bölgede tarama yapın

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Zoonozlar | Kedi

Vaka 200 · Kedi tırmığı sonrası sahibinde lenf düğümü şişliği


Hasta
- Kedi
- 2 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Sahip kolunda tırmık sonrası lenf düğümü şişliği yaşamış

Öykü ve bağlam
- Kedide pire var
- Yavruyken sokaktan alınmış

Fiziksel muayene
- Kedi sağlıklı görünüyor
- Pire dışkısı mevcut

Ek bulgular
- Kedide Bartonella henselae serolojisi pozitif



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kedi tırmığı hastalığının etkeni nedir?
2. Pirenin bulaşmadaki rolü nedir?
3. Hangi kişiler daha fazla risk altındadır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Bartonelloz (kedi tırmığı hastalığı)
- Toksoplazmoz
- Mantar enfeksiyonu

Yorumlu çözüm
Bartonella henselae kedilerde genellikle belirti vermez; pire dışkısıyla kedi tırnaklarına bulaşır ve tırmık veya ısırıkla insana geçer. İnsanlarda lenfadenopati yapar; bağışıklığı baskılanmış kişilerde ağır seyredebilir. En önemli önlem düzenli pire kontrolüdür; tırmık yarası hemen yıkanmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Pire kontrolü bulaşmayı önler
- ✓ Kedi genellikle belirtisizdir
- ✓ Bağışıklığı zayıf kişiler risk altındadır

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Halk sağlığı | Sığır

Vaka 201 · Kesimhanede akciğerde nodüller bulunan inek

Hasta

- Sığır
- 7 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni

- Kesim sonrası muayenede bulgu

Öykü ve bağlam


- Canlıyken hafif kronik öksürük ve kilo kaybı

Fiziksel muayene

- Akciğer ve bölgesel lenf düğümlerinde peynirimsi nodüller

Ek bulgular

- Örnekler resmi laboratuvara gönderilmiş
- Sürüde tüberkülin testi planlanıyor



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları

1. Bu bulgular hangi hastalığı düşündürür?
2. Et muayenesinde veteriner hekimin rolü nedir?
3. Sürüde nasıl kontrol edilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar

- Sığır tüberkülozu
- Akciğer apsesi
- Neoplazi

Yorumlu çözüm

Kesim sırasında akciğer ve lenf düğümlerinde kazeöz nodüller sığır tüberkülozunu (Mycobacterium bovis) düşündürür; ihbarı zorunlu bir zoonozdur ve çiğ sütle insana bulaşabilir. Etkilenen organ veya karkas mevzuata göre imha edilir, sürü tüberkülin testiyle taranır, pozitifler ayrılır. Et muayenesi halk sağlığının önemli bir güvencesidir.

Akılda tutulacak noktalar

- ✓ Et muayenesi halk sağlığı kalkanıdır
- ✓ Tüberküloz ihbarı zorunludur
- ✓ Pastörize olmayan süt risk taşır

Halk sağlığı | Sığır

Vaka 202 · Antibiyotik tedavisi sonrası sütün satışa verilmesi


Hasta
- Sığır
- 4 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Mastit tedavisi tamamlanmış
- Çiftçi sütü hemen satmak istiyor

Öykü ve bağlam
- İntramamer antibiyotik kullanılmış

Fiziksel muayene
- Meme normal görünüyor

Ek bulgular
- Süt kalıntı testi pozitif



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. İlaç bekleme süresi nedir?
2. Kalıntılar neden halk sağlığı sorunudur?
3. Çiftçiye nasıl danışmanlık verilmeli?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Bekleme süresi tamamlanmamış süt (kalıntı)
- Yanlış pozitif test
- Diğer ilaç kalıntıları

Yorumlu çözüm
Her ilacın etiketinde süt ve et için bekleme süresi bulunur; bu süre dolmadan elde edilen ürünler gıda zincirine girmemelidir. Kalıntılar alerjiye ve antimikrobiyal direncin artmasına katkıda bulunur. Çiftçi tedavi kayıtlarını tutmalı, tedavi edilen hayvanları işaretlemeli ve kalıntı testlerini kullanmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Bekleme süresi yasal zorunluluktur
- ✓ Kalıntı direnci artırır
- ✓ Tedavi kaydı ve hayvan işaretleme şart

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Halk sağlığı | Tavuk

Vaka 203 · Etlik piliç sürüsünde Salmonella izlemesi

Hasta
- Tavuk
- 6 haftalık
- Karışık

Başvuru nedeni
- Rutin izleme
- Belirti yok

Öykü ve bağlam
- Kesim öncesi dönem

Fiziksel muayene
- Sürü sağlıklı

Ek bulgular
- Çizme süründüsünde Salmonella Enteritidis pozitif



TAVUK

Vaka 203

II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Belirtisiz sürüde Salmonella neden önemlidir?
2. Gıda zinciri boyunca hangi önlemler alınır?
3. Tüketiciye hangi öneriler verilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Salmonella taşıyıcılığı
- Çevresel kontaminasyon
- Yem kaynaklı kontaminasyon

Yorumlu çözüm
Kanatlılar Salmonella'yı belirti göstermeden taşıyabilir ve gıda kaynaklı salgınlara yol açabilir. Pozitif sürülerde mevzuata uygun önlemler alınır, kümes temizliği ve dezenfeksiyonu yapılır, yem ve su kaynağı araştırılır. Tüketicilere tavuk etinin iyi pişirilmesi ve çapraz bulaşmanın önlenmesi önerilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Sağlıklı görünen sürü taşıyıcı olabilir
- ✓ Çiftlikten sofraya kontrol gerekir
- ✓ Çapraz bulaşmayı önleyin

Atlar · At

Vaka 204 · Sert yürüyüş, çene kilitlenmesi ve üçüncü göz kapağı çıkması


Hasta
- At
- 10 yaş
- İğdiş

Başvuru nedeni
- Sert yürüme
- Yem yiyememe
- Seslere aşırı tepki

Öykü ve bağlam
- 2 hafta önce tırnakta çivi batması
- Aşı durumu bilinmiyor

Fiziksel muayene
- Testere ata benzer duruş
- Üçüncü göz kapağının prolapsusu
- Kuyruk havada sert

Ek bulgular
- Tanı klinik



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Tetanoz nasıl gelişir?
2. Tedavide neler yapılır?
3. Neden bütün atlar aşılanmalıdır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Tetanoz
- Hipokalsemi
- Ensefalit

Yorumlu çözüm
Clostridium tetani sporları derin, oksijensiz yaralarda çoğalır ve toksin sinir sisteminde inhibitör nöronları bloke eder; kas sertliği ve uyarılara aşırı tepki gelişir. Tedavide yara debride edilir, tetanoz antitoksini ve penisilin verilir, karanlık ve sessiz ortam, kas gevşeticiler ve destekleyici bakım uygulanır. Atlarda düzenli aşılama hayat kurtarır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Atlar tetanoza çok duyarlıdır
- ✓ Yara + aşısızlık = risk
- ✓ Sessiz, karanlık ortam tedavinin parçası

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Sığırlar | Sığır

Vaka 205 · Çivi ya da tel yuttuğu düşünülen ve yürümek istemeyen inek


Hasta
- Sığır
- 3 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- İştahsızlık
- Sırtı kambur durma
- Yürümek istememe

Öykü ve bağlam
- Yemlikte tel parçaları bulunmuş

Fiziksel muayene
- Ateş: 39,7 °C
- Ksifoid bölgesine baskıda ağrı (inleme)

Ek bulgular
- Metal dedektörü pozitif
- Lökositoz, fibrinojen yüksek



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Travmatik retikülo-peritonit nasıl oluşur?
2. Hangi testler ağrıyı ortaya koyar?
3. Önlemede mıknatısın rolü nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Travmatik retikülo-peritonit
- Abomazum ülseri
- Pnömoni

Yorumlu çözüm
Sığırlar seçici beslenmediği için metal cisimleri yutabilir; bunlar retikulum duvarını delerek peritonite yol açar. Ksifoid bölgesi baskısında inleme ve kambur duruş tipiktir. Tedavide mıknatıs, antibiyotik ve hareket kısıtlaması uygulanır; ağır olgularda rumenotomi gerekir. Yemlerde metal kontrolü ve profilaktik mıknatıs önleyicidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kambur duruş + inleme = retikülo-peritonit
- ✓ Mıknatıs koruyucudur
- ✓ Yem hijyeni önemlidir

Koyunlar | Koyun

Vaka 206 · Sürüde göz bulanıklığı ve sulanma

Hasta
- Koyun
- 2 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Gözlerde sulanma ve bulanıklık
- Bazı koyunlar kör gibi

Öykü ve bağlam
- Yazın sinek yoğunluğu
- Sürü kalabalık

Fiziksel muayene
- Kornea ödemi ve ülseri
- Konjonktivit

Ek bulgular
- Göz sürüntüsü: Mycoplasma / Chlamydia



KOYUN

Vaka 206

KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Bulaşıcı keratokonjonktivit nasıl yayılır?
2. Kör koyunlar neden risk altındadır?
3. Tedavi ve kontrol nasıl yapılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Bulaşıcı keratokonjonktivit
- Yabancı cisim
- Entropiyon

Yorumlu çözüm
Bulaşıcı keratokonjonktivit sinekler ve yakın temasla yayılır; kornea bulanıklığı ve ülser görülür. Kör hayvanlar yem ve suya ulaşamayabilir ve kaza riski taşır; gölgeli, güvenli bir alana ayrılmalıdır. Topikal veya sistemik tetrasiklin ile tedavi edilir; sinek kontrolü yayılmayı azaltır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Sinekler yayılımı artırır
- ✓ Kör hayvanları ayırın
- ✓ Tetrasiklin etkilidir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Kanatlılar | Tavuk

Vaka 207 · Köy tavuklarında ayaklarda kabuklanma ve bacak pullarında kalkma

Hasta
- Tavuk
- 1 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Bacak pullarında kalkma ve kalınlaşma
- Topallık

Öykü ve bağlam
- Eski, temizlenmeyen kümes

Fiziksel muayene
- Bacak pullarının altında beyaz kabuklu birikim

Ek bulgular
- Kazıntıda Knemidocoptes akarları



TAVUK

Vaka 207

KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Bacak uyuzu nasıl yayılır?
2. Tedavi nasıl yapılır?
3. Kümes hijyeni neden önemlidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Bacak uyuzu (Knemidocoptes)
- Travma
- Vitamin eksikliği

Yorumlu çözüm
Knemidocoptes akarları bacak pullarının altına yerleşerek kabuklanma ve deformasyon yapar; temasla yayılır. Tedavide ivermektin gibi ilaçlar uygun dozda ve tavuk yumurta bekleme süreleri dikkate alınarak kullanılır; bacaklar yumuşatılıp kabuklar nazikçe temizlenir. Kümesin temizliği ve tüm sürünün tedavisi gerekir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Tüm sürü tedavi edilir
- ✓ Yumurta bekleme süresine uyun
- ✓ Kümes temizliği tekrarı önler

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Sürüngenler | Su kaplumbağası

Vaka 208 · Su kaplumbağasında kabukta yumuşama ve beyaz lekeler

Hasta
- Su kaplumbağası
- 4 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kabukta beyaz lekeler
- Kötü koku

Öykü ve bağlam
- Akvaryum filtresi yok
- Güneşlenme alanı yok

Fiziksel muayene
- Plastronda yumuşak, çukur lezyonlar
- Altında nekrotik doku

Ek bulgular
- Lezyon sürüntüsü: bakteri ve mantar



SU KAPLUMBAĞASI

Vaka 208

KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kabuk çürüğü nasıl gelişir?
2. Güneşlenme alanının rolü nedir?
3. Tedavide neler yapılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kabuk çürüğü (ülseratif kabuk hastalığı)
- Metabolik kemik hastalığı
- Travma

Yorumlu çözüm
Kirli su, yetersiz filtrasyon ve kuruyup güneşlenebileceği bir alanın olmaması kabukta bakteriyel ve mantar enfeksiyonuna yol açar. Lezyonlar debride edilir, antiseptikle temizlenir; hayvan tedavi süresince günün bir kısmında kuru tutulur. Su kalitesi, filtre, UVB ve güneşlenme alanı düzenlenmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kuru güneşlenme alanı şarttır
- ✓ Su kalitesi sağlığı belirler
- ✓ Debridman ve kuru tutma tedavidir

Halk sağlığı | Köpek

Vaka 209 · Sahipsiz köpek popülasyonunda kuduz ve parazit kontrol programı


Hasta
- Köpek
- Bilinmiyor
- Erkek

Başvuru nedeni
- Belediye barınağına alınan sokak köpekleri

Öykü ve bağlam
- Mahallede ısırık vakaları bildirilmiş

Fiziksel muayene
- Genel durum orta, dış parazitler var

Ek bulgular
- Bölgede kuduz riski



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Tek Sağlık yaklaşımı nedir?
2. Sahipsiz hayvan programında hangi uygulamalar yapılır?
3. Veteriner hekimin halk sağlığındaki rolü nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kuduz riski
- Ekinokokkoz ve diğer paraziter zoonozlar
- Leishmaniasis

Yorumlu çözüm
Tek Sağlık yaklaşımı insan, hayvan ve çevre sağlığının birbirine bağlı olduğunu kabul eder. Sahipsiz hayvan programlarında kuduz aşılaması, iç-dış parazit uygulaması, kısırlaştırma, kimliklendirme ve gözlem esastır. Isırık vakaları sağlık kuruluşlarıyla birlikte değerlendirilir. Veteriner hekim zoonozların kontrolünde ön saftadır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Tek Sağlık: insan-hayvan-çevre
- ✓ Kuduz aşılaması en etkili önlemdir
- ✓ Kısırlaştırma popülasyonu kontrol eder

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Halk sağlığı | Kedi

Vaka 210 · Barınakta yayılan kedi uyuzu: çalışanlarda da kaşıntı


Hasta
- Kedi
- 3 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Kulak kenarında ve yüzde kabuklanma
- Yoğun kaşıntı

Öykü ve bağlam
- Barınakta birçok kedide benzer
- Çalışanlarda kolda kaşıntılı lezyonlar

Fiziksel muayene
- Kulak kenarları ve yüzde gri-sarı kabuklar

Ek bulgular
- Deri kazıntısı: Notoedres cati



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Notoedres uyuzu nasıl yayılır?
2. Barınakta kontrol nasıl yapılır?
3. Çalışanlar için hangi önlemler gerekir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Notoedrik uyuz
- Dermatofitoz
- Otodektes

Yorumlu çözüm
Notoedres cati son derece bulaşıcıdır; kulak kenarı ve yüzde yoğun kaşıntılı kabuklanma yapar ve insanlarda geçici kaşıntılı lezyonlara yol açabilir. Barınaktaki tüm kediler tedavi edilir, yeni gelenler karantinaya alınır, ortam temizlenir. Çalışanlar eldiven kullanmalı, el hijyenine uymalı ve lezyon olursa hekime başvurmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Barınakta tüm hayvanlar tedavi edilir
- ✓ Karantina yeni salgınları önler
- ✓ Çalışan sağlığı da korunmalı

Yalnızca eğitim amaçlıdır