ROTA 02

210 Yorumlu Veteriner Klinik Vaka

Rota 02 · Tetkikler ve Tanısal Yorumlama · 55 vaka

5 Öğrenme Rotası · Küçük, büyük ve egzotik hayvanlar · Yorumlu çözümler

Hemogram | Köpek

Vaka 041 · Soluk mukozalar ve sarılık olan, aniden halsizleşen köpek


Hasta
- Köpek
- 6 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Ani halsizlik
- Koyu renkli idrar

Öykü ve bağlam
- Yeni ilaç veya aşı öyküsü yok

Fiziksel muayene
- Soluk-ikterik mukozalar
- Taşikardi
- Splenomegali

Ek bulgular
- Hematokrit: %14
- Sferositler ve otoaglütinasyon
- Retikülosit sayısı yüksek
- Bilirubin yüksek



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Anemi rejeneratif mi?
2. Sferositoz ve otoaglütinasyon neyi gösterir?
3. Tromboemboli riski neden önemlidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İmmün aracılı hemolitik anemi
- Babesiyoz
- Çinko veya soğan toksikozu

Yorumlu çözüm
Rejeneratif anemi, sferositoz, otoaglütinasyon ve ikter immün aracılı hemolitik anemiyi düşündürür. Önce enfeksiyöz ve toksik nedenler (kan parazitleri, çinko, soğan) dışlanır. Tedavide immünsüpresif ilaçlar, gerekirse kan transfüzyonu ve tromboembolinin önlenmesi yer alır. Tedavi yanıtı hematokrit ile izlenir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Retikülosit sayısı rejenerasyonu gösterir
- ✓ Otoaglütinasyon immün aracılı süreci destekler
- ✓ Tromboprofilaksiyi unutmayın

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Hemogram | Kedi

Vaka 042 · Halsizlik ve rejeneratif olmayan anemisi olan yaşlı kedi


Hasta
- Kedi
- 10 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- İştah azalması
- Halsizlik

Öykü ve bağlam
- Kilo kaybı

Fiziksel muayene
- Soluk mukozalar
- Küçük böbrekler

Ek bulgular
- Hematokrit: %19, normositik-normokromik
- Retikülosit sayısı düşük
- Kreatinin yüksek



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Rejeneratif olmayan aneminin nedenleri nelerdir?
2. Böbrek hastalığı aneme nasıl yol açar?
3. Tedavide ne düşünülmelidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kronik böbrek hastalığına bağlı anemi
- Kronik hastalık anemisi
- Kemik iliği hastalığı (FeLV ilişkili)

Yorumlu çözüm
Normositik-normokromik, rejeneratif olmayan anemi ve azotemi böbrek hastalığına bağlı eritropoietin eksikliğini düşündürür. FeLV ve kemik iliği hastalıkları ayırıcı tanıda dışlanmalıdır. Tedavide altta yatan hastalık yönetilir; demir durumu değerlendirilir ve gerekirse eritropoezi uyarıcı ajanlar kullanılır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Retikülosit sayısı anemi tipini belirler
- ✓ Böbrek hastalığı eritropoietini azaltır
- ✓ FeLV'i dışlayın

Hemogram | Köpek

Vaka 043 · Lökositozu çok yüksek, kemik iliği şüphesi olan köpek


Hasta
- Köpek
- 8 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Halsizlik
- Kilo kaybı

Öykü ve bağlam
- Lenf düğümleri büyümüş

Fiziksel muayene
- Generalize lenfadenopati
- Hepatosplenomegali

Ek bulgular
- Lökosit: 98 ×10³/µL, olgun görünümlü lenfositler
- Anemi ve trombositopeni hafif



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Belirgin lenfositoz hangi hastalıkları düşündürür?
2. Flow sitometri ne sağlar?
3. Fiziksel lenfositozdan nasıl ayrılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kronik lenfositik lösemi
- Multisentrik lenfoma (lösemik faz)
- Ehrlichiosis

Yorumlu çözüm
Belirgin, olgun görünümlü lenfositoz kronik lenfositik lösemiyi düşündürür; lenfoma ve Ehrlichia ayırıcı tanıda yer alır. Flow sitometri ve PARR ile hücre tipi ve klonalite belirlenir. Kedilerde strese bağlı fizyolojik lenfositoz olabilir, ancak bu boyutta değildir. Tedavi ve prognoz alt tipe göre değişir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Lenfositozun boyutu ve morfolojisi önemlidir
- ✓ Flow sitometri immünfenotip verir
- ✓ Enfeksiyöz nedenleri dışlayın

Hemogram | Köpek

Vaka 044 · Peteşiler ve burun kanaması olan köpek


Hasta
- Köpek
- 3 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Burun kanaması
- Karın derisinde noktasal kanamalar

Öykü ve bağlam
- İlaç veya toksin öyküsü yok
- Kene teması yok

Fiziksel muayene
- Ventral karında peteşi ve ekimozlar
- Mukozalarda peteşi

Ek bulgular
- Trombosit: 6 ×10³/µL
- PT ve aPTT normal
- Vektör hastalıkları testleri negatif



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Peteşi trombosit mi, koagülasyon mu sorununu gösterir?
2. Normal PT/aPTT neyi dışlar?
3. Tedavide öncelik nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İmmün aracılı trombositopeni
- Vektörle bulaşan hastalıklar
- Yaygın damar içi pıhtılaşma

Yorumlu çözüm
Peteşi ve mukozal kanama primer hemostaz (trombosit) bozukluğunu gösterir; normal PT ve aPTT koagülasyon faktörü eksikliğini dışlar. Belirgin trombositopeni ile enfeksiyöz nedenler dışlandığında immün aracılı trombositopeni düşünülür. Tedavide immünsüpresif ilaçlar verilir; kas içi enjeksiyon ve travmadan kaçınılır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Peteşi = trombosit sorunu
- ✓ PT/aPTT ikincil hemostazı değerlendirir
- ✓ Önce enfeksiyöz nedenleri dışlayın

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Hemogram | Köpek

Vaka 045 · Fare zehiri yediği düşünülen ve topallayan köpek


Hasta
- Köpek
- 5 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Eklemde şişlik ve topallık
- Halsizlik, öksürük

Öykü ve bağlam
- Bodrumda fare zehiri var

Fiziksel muayene
- Hemartroz
- Soluk mukozalar
- Akciğerde azalmış sesler

Ek bulgular
- PT ve aPTT belirgin uzamış
- Trombosit normal-hafif düşük
- Toraks röntgeninde plevral efüzyon (hemotoraks)



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hangi testi önce yükselir ve neden?
2. Kanama yeri primer mi sekonder hemostaz bozukluğunu gösterir?
3. Tedavi süresi neden uzun olmalıdır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Antikoagülan rodentisit zehirlenmesi
- Hemofili
- Karaciğer yetmezliği

Yorumlu çözüm
Eklem ve vücut boşluklarına kanama sekonder hemostaz bozukluğunu gösterir; uzamış PT ve aPTT antikoagülan rodentisit zehirlenmesini düşündürür. Faktör VII'nin yarı ömrü kısa olduğundan PT önce uzar. Tedavide K1 vitamini birkaç hafta verilir; aktif kanamada taze donmuş plazma gerekir. Tedavi bitiminden 48-72 saat sonra PT tekrar kontrol edilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Boşluk/eklem kanaması = koagülasyon bozukluğu
- ✓ PT önce uzar
- ✓ K1 vitamini uzun süre verilir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Hemogram | Kedi

Vaka 046 · Anemi ve eritrositlerde parazit görülen kedi


Hasta
- Kedi
- 2 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Halsizlik
- İştahsızlık

Öykü ve bağlam
- Dışarı çıkıyor, kavga yarası

Fiziksel muayene
- Soluk mukozalar
- Ateş
- Hafif ikter

Ek bulgular
- Hematokrit: %16, rejeneratif
- Kan yaymasında eritrosit yüzeyinde küçük kokoid yapılar
- PCR: Mycoplasma haemofelis pozitif



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hemotropik mikoplazma nasıl bulaşır?
2. Kan yayması neden yanıltıcı olabilir?
3. Tedavide hangi antibiyotik kullanılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hemotropik mikoplazmoz
- İmmün aracılı hemolitik anemi
- FeLV ilişkili anemi

Yorumlu çözüm
Rejeneratif anemi ve eritrosit yüzeyinde küçük kokoid organizmalar hemotropik mikoplazmozu düşündürür; PCR tanıyı doğrular çünkü organizmalar yaymada aralıklı görülür. Bulaşma kavga ve vektörlerle olabilir. Doksisiklin ile tedavi edilir; ağır anemide transfüzyon gerekebilir. FeLV/FIV durumu kontrol edilmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ PCR yaymadan daha duyarlıdır
- ✓ Doksisiklin ilk tercih
- ✓ Retrovirüs durumunu kontrol edin

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Hemogram | Köpek

Vaka 047 · Kronik kan kaybı ve mikrositik anemi olan köpek


Hasta
- Köpek
- 4 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Halsizlik
- Kara renkli dışkı

Öykü ve bağlam
- Uzun süreli NSAİİ kullanımı (eklem ağrısı)

Fiziksel muayene
- Soluk mukozalar
- Melena

Ek bulgular
- Hematokrit: %22, MCV düşük, MCHC düşük
- Trombositoz
- Demir düşük



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Mikrositik hipokromik anemi neyi düşündürür?
2. Melena hangi kanama yerini gösterir?
3. İlacın rolü nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- NSAİİ'ye bağlı gastrik ülser ve demir eksikliği
- Gastrointestinal neoplazi
- Bağırsak parazitleri

Yorumlu çözüm
Mikrositik, hipokromik anemi ve trombositoz kronik kan kaybına bağlı demir eksikliğini gösterir. Melena üst gastrointestinal kanamayı düşündürür; uzun süreli NSAİİ kullanımı gastrik ülser riskini artırır. NSAİİ kesilir, gastroprotektif tedavi ve demir takviyesi verilir; neoplazi için endoskopi düşünülebilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Mikrositoz = demir eksikliği/kronik kan kaybı
- ✓ Melena = üst GİS kanaması
- ✓ NSAİİ kullanımını sorgulayın

Vaka 048

Hemogram | Kedi

Vaka 048 · Ateş ve şiddetli nötropeni olan yavru kedi


Hasta
- Kedi
- 1 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Kusma
- İshal
- Halsizlik

Öykü ve bağlam
- Aşısız
- Evde yeni kedi gelmiş

Fiziksel muayene
- Ateş: 40,3 °C
- Dehidratasyon
- Kalın bağırsak ansları

Ek bulgular
- Lökosit: 0,9 ×10³/µL, belirgin nötropeni
- Dışkıda parvovirüs antijeni pozitif



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kedide panlökopeninin etkeni nedir?
2. Nötropeni neden prognoz için önemlidir?
3. Diğer kediler nasıl korunur?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kedi panlökopenisi
- Salmonelloz
- FeLV

Yorumlu çözüm
Aşısız yavru kedide ateş, gastrointestinal belirtiler ve şiddetli lökopeni kedi panlökopenisini (feline parvovirüs) düşündürür. Tedavi destekleyicidir: sıvı, antiemetik, beslenme desteği ve sepsis riskine karşı geniş spektrumlu antibiyotik. Virüs çevrede çok dayanıklıdır; izolasyon ve uygun dezenfeksiyon gerekir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Şiddetli nötropeni sepsis riskini artırır
- ✓ Destekleyici tedavi hayat kurtarır
- ✓ Aşılama ve dezenfeksiyon şart

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Hemogram | Köpek

Vaka 049 · Sürekli yüksek hematokrit ve kırmızı mukozaları olan köpek


Hasta
- Köpek
- 9 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Burun kanaması
- Kızarık mukozalar

Öykü ve bağlam
- Dehidratasyon yok

Fiziksel muayene
- Hiperemik mukozalar
- Normal hidrasyon

Ek bulgular
- Hematokrit: %72 (tekrarlanan ölçümlerde)
- Total protein normal
- Eritropoietin düşük-normal
- Kan gazı normal oksijenasyon



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Göreceli ve mutlak eritrositoz nasıl ayrılır?
2. Eritropoietin düzeyi neyi gösterir?
3. Tedavide flebotominin rolü nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Primer eritrositoz (polisitemia vera)
- Sekonder eritrositoz (hipoksi, böbrek tümörü)
- Dehidratasyon

Yorumlu çözüm
Normal hidrasyon ve normal total protein ile kalıcı yüksek hematokrit mutlak eritrositozu gösterir. Normal oksijenasyon ve düşük-normal eritropoietin sekonder nedenleri azaltır ve primer eritrositozu düşündürür. Hiperviskozite belirtileri için flebotomi ve uzun dönemde miyelosupresif ilaçlar kullanılabilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Önce dehidratasyonu dışlayın
- ✓ Eritropoietin primer/sekonder ayrımına yardım eder
- ✓ Flebotomi viskoziteyi düşürür

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Hemogram | Köpek

Vaka 050 · Sepsiste lökosit tablosunun yorumlanması


Hasta
- Köpek
- 7 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Ateş
- Kusma
- Huzursuzluk

Öykü ve bağlam
- 2 hafta önce kızgınlık geçirmiş
- Kısırlaştırılmamış

Fiziksel muayene
- Vulvadan akıntı yok
- Karında genişleme
- Taşikardi

Ek bulgular
- Lökosit: 38 ×10³/µL, sola kayma (çomak nötrofil artışı)
- Toksik nötrofil değişiklikleri
- Ultrasonda sıvı dolu uterus



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Sola kayma ve toksik değişiklik neyi gösterir?
2. Kapalı piyometra neden daha tehlikelidir?
3. Kesin tedavi nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kapalı piyometra
- Septik peritonit
- Pankreatit

Yorumlu çözüm
Kızgınlık sonrası dişi köpekte ateş, belirgin nötrofili, sola kayma ve toksik değişiklikler ile ultrasonda sıvı dolu uterus kapalı piyometrayı gösterir. Kapalı formda drenaj olmadığı için sepsis ve uterus rüptürü riski yüksektir. Stabilizasyon sonrası acil ovariohisterektomi kesin tedavidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Sola kayma şiddetli inflamasyonu gösterir
- ✓ Kapalı piyometra acildir
- ✓ Ovariohisterektomi kesin tedavidir

Biyokimya | Köpek

Vaka 051 · Yüksek kalsiyum ve çok su içme şikâyeti olan köpek


Hasta
- Köpek
- 11 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Poliüri, polidipsi
- İştahsızlık

Öykü ve bağlam
- Perianal bölgede kitle fark edilmiş

Fiziksel muayene
- Anal kese bölgesinde sert kitle
- Sublumbar lenf düğümü büyümüş

Ek bulgular
- İyonize kalsiyum yüksek
- Fosfor düşük-normal
- PTH düşük, PTHrP yüksek



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hiperkalsemide ilk doğrulama hangi testle yapılır?
2. PTHrP yüksekliği neyi gösterir?
3. Hangi tümörler sıklıkla hiperkalsemi yapar?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Anal kese adenokarsinomuna bağlı malign hiperkalsemi
- Lenfoma
- Primer hiperparatiroidizm

Yorumlu çözüm
Hiperkalsemi önce iyonize kalsiyumla doğrulanır. Düşük PTH ve yüksek PTHrP malign hiperkalsemiyi gösterir; köpekte en sık nedenler lenfoma ve anal kese adenokarsinomudur. Rektal muayene mutlaka yapılmalıdır. Tedavi sıvı diürezi, kalsiyumu düşüren ilaçlar ve altta yatan tümörün tedavisidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ İyonize kalsiyumla doğrulayın
- ✓ Rektal muayeneyi atlamayın
- ✓ PTHrP malignite lehinedir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Biyokimya | Köpek

Vaka 052 · Yemekten sonra şaşkınlık ve büyüme geriliği olan yavru köpek


Hasta
- Köpek
- 1 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Yemekten sonra başını duvara dayama
- Büyüme geriliği

Öykü ve bağlam
- Yorkshire terrier
- Anestezi sonrası geç uyanma öyküsü

Fiziksel muayene
- Küçük vücut yapısı
- Nörolojik belirtiler aralıklı

Ek bulgular
- Açlık ve tokluk safra asitleri belirgin yüksek
- Üre ve albumin düşük
- İdrarda amonyum biürat kristalleri



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Safra asidi testi neyi değerlendirir?
2. Düşük üre neden anlamlıdır?
3. Tanıyı hangi görüntüleme doğrular?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Portosistemik şant
- Mikrovasküler displazi
- Hepatik ensefalopati

Yorumlu çözüm
Genç küçük ırk köpekte yemekle ilişkili nörolojik belirtiler, büyüme geriliği, düşük üre ve albumin ile yüksek safra asitleri portosistemik şantı düşündürür. Amonyum biürat kristalleri amonyak metabolizması bozukluğunu destekler. Tanı ultrason veya BT anjiyografi ile konur; tedavi diyet ve laktüloz ile stabilizasyon sonrası cerrahi kapatmadır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Safra asitleri karaciğer fonksiyonunu ölçer
- ✓ Düşük üre + biürat kristalleri = şantı düşünün
- ✓ Cerrahi öncesi medikal stabilizasyon

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Biyokimya | Köpek

Vaka 053 · Hipoalbuminemi ve karında sıvı birikimi olan köpek


Hasta
- Köpek
- 6 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Karında şişlik
- Kilo kaybı

Öykü ve bağlam
- Kronik ishal yok

Fiziksel muayene
- Asit
- Ödem yok

Ek bulgular
- Albumin: 1,4 g/dL
- İdrar protein/kreatinin oranı: 6,2
- Kolesterol yüksek



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hipoalbumineminin üç ana nedeni nelerdir?
2. UPC oranı neyi gösterir?
3. Tromboemboli riski neden artar?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Protein kaybettiren nefropati (glomerülonefrit)
- Protein kaybettiren enteropati
- Karaciğer yetmezliği

Yorumlu çözüm
Hipoalbuminemi; karaciğer yetmezliği, bağırsak kaybı veya böbrek kaybından kaynaklanabilir. Belirgin yüksek UPC oranı protein kaybettiren nefropatiyi gösterir. Antitrombin kaybı tromboemboli riskini artırır. Tedavide ACE inhibitörü veya ARB, diyet, antitrombotik ilaç ve gerekirse immünsüpresif tedavi yer alır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Albumin kaybının kaynağını belirleyin
- ✓ UPC böbrek kaybını ölçer
- ✓ Tromboprofilaksi düşünülmeli

Biyokimya | Kedi

Vaka 054 · Antifriz içtiği şüphelenilen ve kusan kedi


Hasta
- Kedi
- 3 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kusma
- Sarhoş gibi yürüme

Öykü ve bağlam
- Garajda antifriz dökülmüş

Fiziksel muayene
- Ataksi
- Dehidratasyon

Ek bulgular
- Anyon açığı yüksek metabolik asidoz
- Serum osmolalite açığı yüksek
- İdrarda kalsiyum oksalat monohidrat kristalleri



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Osmolalite açığı neyi gösterir?
2. Neden zaman çok kritiktir?
3. Tedavide antidot nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Etilen glikol zehirlenmesi
- Diyabetik ketoasidoz
- Akut böbrek hasarı (başka nedenli)

Yorumlu çözüm
Antifriz teması, ataksi, yüksek anyon açığı ve osmolalite açığı ile kalsiyum oksalat kristalleri etilen glikol zehirlenmesini düşündürür. Kedilerde birkaç saat içinde böbrek hasarı başlar; antidot (fomepizol veya etanol) mümkün olan en erken dönemde verilmelidir. Akut böbrek hasarı gelişmişse prognoz kötüdür.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Zaman kritik: saatler önemlidir
- ✓ Osmolalite açığı erken ipucudur
- ✓ Kristaller tanıyı destekler

Biyokimya | Köpek

Vaka 055 · Rutin kontrolde ALP yüksekliği bulunan köpek


Hasta
- Köpek
- 10 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Belirti yok, rutin kan tahlili

Öykü ve bağlam
- Eklem ağrısı için uzun süre kortikosteroid kullanmış

Fiziksel muayene
- Hafif hepatomegali

Ek bulgular
- ALP: 860 U/L
- ALT hafif yüksek
- Bilirubin ve safra asitleri normal



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Köpekte ALP yükselmesinin hepatik olmayan nedenleri nelerdir?
2. Steroidler ALP'yi nasıl etkiler?
3. Hangi adımlar planlanmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Steroid hepatopatisi (ilaç kaynaklı)
- Hiperadrenokortisizm
- Hepatik neoplazi
- Kolestaz

Yorumlu çözüm
Köpekte ALP, kortikosteroidlerin indüklediği izoenzim nedeniyle yükselebilir. Fonksiyon testleri normal, belirti yok ve steroid öyküsü varsa ilaç kaynaklı hepatopati olasıdır. İlacın kademeli azaltılması sonrası tekrar ölçüm yapılır; devam ediyorsa ultrason ve endokrin testler planlanır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ ALP her zaman karaciğer hastalığı demek değildir
- ✓ İlaç öyküsünü sorgulayın
- ✓ Kademeli azaltıp tekrar ölçün

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Biyokimya | Köpek

Vaka 056 · Ksilitollü sakız yedikten sonra titreme ve kollaps


Hasta
- Köpek
- 2 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Titreme
- Kollaps

Öykü ve bağlam
- Şekersiz sakız paketi yemiş (30 dk önce)

Fiziksel muayene
- Letarji
- Hipotermi eğilimi

Ek bulgular
- Glukoz: 38 mg/dL
- Takipte ALT yükselmesi
- Potasyum hafif düşük



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Ksilitol köpekte neden hipoglisemi yapar?
2. Hangi organ ikinci aşamada etkilenir?
3. İzlemde hangi değerler takip edilmeli?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Ksilitol zehirlenmesi
- İnsülinoma
- Sepsis

Yorumlu çözüm
Ksilitol köpeklerde güçlü insülin salgısına yol açarak hızlı hipoglisemiye neden olur; yüksek dozlarda hepatik nekroz gelişebilir. Tedavide glukoz desteği, sık kan şekeri ölçümü ve karaciğer koruyucu tedavi uygulanır. Karaciğer enzimleri ve koagülasyon 72 saat boyunca izlenmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Ksilitol köpeklerde çok toksiktir
- ✓ Glukozu sık ölçün
- ✓ Karaciğeri 72 saat izleyin

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Biyokimya | Kedi

Vaka 057 · Diyabetik kedide kusma, dehidratasyon ve aseton kokusu


Hasta
- Kedi
- 7 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kusma
- Hiç yememe
- Halsizlik

Öykü ve bağlam
- Diyabet tanısı var, insülini düzensiz

Fiziksel muayene
- Ağır dehidratasyon
- Nefeste keton kokusu

Ek bulgular
- Glukoz: 520 mg/dL
- Kan ketonu (beta-hidroksibütirat) yüksek
- pH: 7,08, bikarbonat düşük
- Potasyum ve fosfor düşük



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. DKA ile komplike olmayan diyabet nasıl ayrılır?
2. Tedavide neden önce sıvı ve elektrolit düzeltilir?
3. Hipofosfatemi hangi komplikasyona yol açar?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Diyabetik ketoasidoz
- Pankreatit
- Hepatik lipidoz

Yorumlu çözüm
Diyabetik kedide kusma, dehidratasyon, ketonemi ve metabolik asidoz diyabetik ketoasidozu gösterir. Tedavide önce sıvı ve elektrolit (potasyum, fosfor) düzeltilir, ardından düşük doz kısa etkili insülin başlanır. Hipofosfatemi hemolize yol açabilir. Tetikleyici hastalıklar (pankreatit, enfeksiyon) araştırılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Önce sıvı ve elektrolit
- ✓ Fosfor düşüklüğü hemoliz yapabilir
- ✓ Tetikleyici hastalığı arayın

Biyokimya | Köpek

Vaka 058 · Kronik böbrek hastalığında SDMA ve kreatinin yorumlanması


Hasta
- Köpek
- 9 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Hafif kilo kaybı
- Su tüketimi artmış

Öykü ve bağlam
- Kas kütlesi az olan küçük ırk köpek

Fiziksel muayene
- Kas kaybı
- Hafif dehidratasyon

Ek bulgular
- Kreatinin: 1,3 mg/dL (normal sınırda)
- SDMA: 22 µg/dL (yüksek)
- İdrar dansitesi: 1,018



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kas kütlesi kreatinini nasıl etkiler?
2. SDMA neden erken uyarı verir?
3. İzlem nasıl olmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Erken evre kronik böbrek hastalığı
- Prerenal azotemi
- Hipertiroidizm (kedide)

Yorumlu çözüm
Kreatinin kas kütlesinden etkilendiği için kaslı olmayan hastalarda böbrek kaybını gizleyebilir. Yüksek SDMA ve izostenüriye yakın idrar dansitesi erken evre kronik böbrek hastalığını düşündürür. Hidrasyon sağlandıktan sonra tekrar ölçüm yapılır; proteinüri ve kan basıncı da değerlendirilerek IRIS evrelemesi yapılır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kas kaybı kreatinini düşük gösterebilir
- ✓ SDMA erken belirteçtir
- ✓ Hidrasyon sonrası tekrar ölçün

Biyokimya | Köpek

Vaka 059 · Kusma sonrası hipokloremik metabolik alkaloz


Hasta
- Köpek
- 3 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Sık kusma (2 gündür)
- Yememe

Öykü ve bağlam
- Çorap çiğnediği görülmüş

Fiziksel muayene
- Dehidratasyon
- Kranial karında ağrı

Ek bulgular
- Klor düşük, bikarbonat yüksek
- Potasyum düşük
- Görüntülemede midede yabancı cisim, pilor tıkanıklığı



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hipokloremik alkaloz hangi kusma tipini düşündürür?
2. Elektrolit düzeltmesinde hangi sıvı tercih edilir?
3. Cerrahi öncesi neler düzeltilmeli?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Pilorik yabancı cisim obstrüksiyonu
- Pilor stenozu
- Gastrik neoplazi

Yorumlu çözüm
Mide içeriğinin (HCl) kaybı hipokloremik metabolik alkaloz yapar ve pilor veya proksimal duodenum tıkanıklığını düşündürür. Tedavide %0,9 NaCl ile sıvı ve klor açığı kapatılır, potasyum eklenir. Elektrolitler düzeltildikten sonra endoskopi veya cerrahi ile yabancı cisim çıkarılır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Hipokloremik alkaloz = proksimal tıkanıklık
- ✓ %0,9 NaCl tercih edilir
- ✓ Potasyumu takviye edin

Biyokimya · At

Vaka 060 · Yaz aylarında yeşil meraya çıkınca topallayan, aşırı kilolu kısrak


Hasta
- At
- 12 yaş
- Kısrak

Başvuru nedeni
- Ön ayaklarda topallık
- Ağırlığı arka ayaklara verme

Öykü ve bağlam
- Aşırı kilolu
- Yeşil meraya çıkarılmış

Fiziksel muayene
- Tırnaklarda sıcaklık artışı
- Dijital nabız güçlü
- Tırnak pensinde hassasiyet

Ek bulgular
- Bazal insülin yüksek
- Oral şeker testinde abartılı insülin yanıtı
- Röntgende tırnak kemiğinde hafif rotasyon



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Laminitin endokrin nedenleri nelerdir?
2. Röntgen neden gereklidir?
3. Yönetimde diyetin rolü nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Equine metabolik sendroma bağlı laminit
- PPID (Cushing) ilişkili laminit
- Tırnak apsesi

Yorumlu çözüm
Aşırı kilolu atta yeşil mera sonrası laminit ve hiperinsülinemi equine metabolik sendromu düşündürür. Röntgen tırnak kemiğinin rotasyon veya çökmesini değerlendirir ve prognozu belirler. Tedavide ağrı yönetimi, tırnak desteği, düşük şekerli diyet ve kilo kaybı esastır. Yaşlı atlarda PPID de araştırılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Hiperinsülinemi laminit riskidir
- ✓ Röntgen prognozu belirler
- ✓ Diyet ve kilo kontrolü temeldir

İdrar analizi | Köpek

Vaka 061 · Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ve idrarda kristaller


Hasta
- Köpek
- 5 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Sık idrar yapma
- İdrarda kötü koku

Öykü ve bağlam
- Son 6 ayda 3 kez antibiyotik kullanmış

Fiziksel muayene
- Mesane palpasyonunda hafif ağrı

Ek bulgular
- İdrar pH: 8,0
- Struvit kristalleri
- Kültür: üreaz üreten Staphylococcus
- Röntgende radyoopak mesane taşı



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Köpekte struvit taşları genellikle neden oluşur?
2. İdrar kültürü neden sistosentezle alınmalı?
3. Taş çözülebilir mi?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Enfeksiyona bağlı struvit ürolitiazisi
- Kalsiyum oksalat ürolitiazisi
- Polip veya neoplazi

Yorumlu çözüm
Köpeklerde struvit taşları çoğunlukla üreaz üreten bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlara bağlıdır. Kültür, kontaminasyonu önlemek için sistosentezle alınmalıdır. Uygun antibiyotik ve çözündürücü diyetle taşlar çözülebilir; taş çözülene kadar antibiyotik sürdürülür ve görüntülemeyle izlenir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Köpekte struvit = enfeksiyonu düşünün
- ✓ Kültür için sistosentez
- ✓ Çözünme görüntülemeyle izlenir

İdrar analizi | Köpek

Vaka 062 · İdrar dansitesi düşük, çok su içen ve kan değerleri normal köpek


Hasta
- Köpek
- 8 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Aşırı su içme (100 mL/kg/gün üzeri)
- Evde idrar kaçırma

Öykü ve bağlam
- Davranış değişikliği yok

Fiziksel muayene
- Muayene normal

Ek bulgular
- İdrar dansitesi: 1,004
- Biyokimya normal
- Su kısıtlama testinde konsantrasyon yok, desmopresin sonrası artış



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hipostenüri hangi hastalıkları düşündürür?
2. Su kısıtlama testi neden dikkatli yapılmalı?
3. Desmopresine yanıt neyi gösterir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Santral diabetes insipidus
- Nefrojenik diabetes insipidus
- Psikojenik polidipsi
- Hiperadrenokortisizm

Yorumlu çözüm
Belirgin hipostenüri ve normal biyokimya ile poliüri-polidipsi önce yaygın nedenler (Cushing, böbrek, karaciğer) dışlanarak değerlendirilir. Desmopresin sonrası idrar konsantrasyonunun artması santral diabetes insipidusu gösterir. Su kısıtlama testi dehidratasyon riski nedeniyle yakından izlenmelidir. Tedavi desmopresindir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Önce yaygın nedenleri dışlayın
- ✓ Su kısıtlama testi risklidir
- ✓ Desmopresin yanıtı santral DI'yi gösterir

İdrar analizi | Kedi

Vaka 063 · İdrar kültürü pozitif ama belirtisi olmayan kedi


Hasta
- Kedi
- 8 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Rutin kontrol, belirti yok

Öykü ve bağlam
- Kronik böbrek hastalığı tanısı var

Fiziksel muayene
- Muayene normal

Ek bulgular
- Sistosentezle alınan kültürde E. coli üremesi
- İdrar sedimentinde piyüri yok



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Subklinik bakteriüri her zaman tedavi gerektirir mi?
2. Hangi durumlarda tedavi düşünülür?
3. Gereksiz antibiyotiğin zararı nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Subklinik bakteriüri
- Sistit
- Piyelonefrit

Yorumlu çözüm
Klinik belirti ve piyüri olmadan pozitif idrar kültürü subklinik bakteriüri olarak değerlendirilir. Güncel önerilere göre çoğu hastada antibiyotik gerekmez; böbrek fonksiyonunda kötüleşme veya piyelonefrit şüphesi varsa tedavi düşünülür. Gereksiz antibiyotik direnci artırır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Pozitif kültür ≠ her zaman tedavi
- ✓ Klinik bulgulara bakın
- ✓ Antibiyotik direncini düşünün

İdrar analizi | Köpek

Vaka 064 · Dalmaçyalı köpekte idrarda urat kristalleri ve taşlar


Hasta
- Köpek
- 4 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- İdrar yapma güçlüğü

Öykü ve bağlam
- Dalmaçyalı
- Yüksek proteinli diyet

Fiziksel muayene
- Penis tabanında üretral taş palpe ediliyor

Ek bulgular
- Amonyum ürat kristalleri
- Röntgende taş görünmüyor, ultrasonda görülüyor
- Safra asitleri normal



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Dalmaçyalılar neden ürat taşına yatkındır?
2. Ürat taşları röntgende neden zor görülür?
3. Tekrarı önlemek için ne yapılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Genetik hiperürikozüriye bağlı ürat ürolitiazisi
- Portosistemik şant
- Sistin taşı

Yorumlu çözüm
Dalmaçyalılarda ürik asit metabolizmasındaki genetik bozukluk ürat taşlarına yatkınlık yaratır. Ürat taşları radyolusenttir; ultrason veya kontrastlı çekim gerekir. Şant dışlandıktan sonra düşük pürinli diyet, idrarın alkalileştirilmesi, su tüketiminin artırılması ve gerekirse allopurinol kullanılır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Ürat taşları röntgende zor görülür
- ✓ Şantı mutlaka dışlayın
- ✓ Düşük pürinli diyet tekrarı azaltır

Sitoloji | Köpek

Vaka 065 · Deride hızla büyüyen kitle ve ince iğne aspirasyonu


Hasta
- Köpek
- 9 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Gövdede hızla büyüyen deri kitlesi
- Kitle dokununca kızarıyor

Öykü ve bağlam
- Kitle bazen küçülüp büyüyor

Fiziksel muayene
- Deride 2 cm, sınırları belirsiz kitle
- Darier işareti pozitif

Ek bulgular
- İİA: metakromatik granüllü yuvarlak hücreler
- Eozinofiller



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Darier işareti nedir?
2. Sitoloji neden yeterli değildir?
3. Operasyon öncesi hangi önlem alınır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Mast hücreli tümör
- Histiyositom
- Lipom

Yorumlu çözüm
Granüllü yuvarlak hücreler ve eozinofiller mast hücreli tümörü düşündürür; dokunmayla kızarma (Darier) histamin salınımını gösterir. Sitoloji tanı koydurur ama derece belirlemez; geniş cerrahi eksizyon sonrası histopatoloji derece ve cerrahi sınırları gösterir. Operasyon öncesi H1/H2 blokerleri verilmeli, evreleme için lenf düğümü değerlendirilmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Her deri kitlesine İİA yapın
- ✓ Derece için histopatoloji gerekir
- ✓ Antihistaminik ön tedavi verin

Sitoloji | Köpek

Vaka 066 · Tüm lenf düğümleri büyümüş ama genel durumu iyi köpek


Hasta
- Köpek
- 7 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Boyunda şişlikler fark edilmiş

Öykü ve bağlam
- İştah normal

Fiziksel muayene
- Generalize, ağrısız lenfadenopati

Ek bulgular
- İİA: büyük, tek tip lenfoblastlar (>%50)
- Hafif hiperkalsemi



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Reaktif lenf düğümünden nasıl ayrılır?
2. Evreleme için neler yapılır?
3. Tedavi öncesi neden kortikosteroid verilmemeli?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Multisentrik lenfoma
- Reaktif lenfadenopati
- Ehrlichiosis

Yorumlu çözüm
Generalize ağrısız lenfadenopati ve aspiratta baskın, tek tip büyük lenfoblastlar multisentrik lenfomayı düşündürür. İmmünfenotip (flow sitometri) ve evreleme (görüntüleme, kan tablosu) prognozu belirler. Kortikosteroid, kemoterapiden önce verilirse tedavi yanıtını azaltabilir; bu nedenle onkoloji planı yapılmadan başlanmamalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Tek tip büyük lenfoblastlar = lenfoma
- ✓ İmmünfenotip prognozu belirler
- ✓ Steroidi kemoterapi planından önce vermeyin

Görüntüleme | Kedi

Vaka 067 · Bağırsak duvarı kalınlaşması olan kedi: ultrasonografi ve kilo kaybı

Hasta
- Kedi
- 11 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Kilo kaybı
- Aralıklı kusma
- Değişken iştah

Öykü ve bağlam
- Kronik seyir
- Kötü vücut kondisyonu

Fiziksel muayene
- Bağırsak duvarı kalınlaşması
- Katman yapısında kısmi bozulma
- Mezenterik lenf nodlarında artış

Ek bulgular
- Ultrason: kalınlaşmış bağırsak duvarı
- Kısmen korunmuş katman yapısı
- Artmış mezenterik lenf nodları



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Bağırsak duvarı kalınlaşması neoplazi anlamına gelir mi?
2. Katman yapısını korumak veya kaybetmek neden önemlidir?
3. Sitoloji veya biyopsi ne zaman düşünülmelidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İnflamatuvar enteropati
- Lenfoma
- Adenokarsinom
- İnfiltratif hastalık

Yorumlu çözüm
Bağırsak duvarı kalınlaşması hem inflamatuvar hem de neoplastik süreçlerde görülebilir. Katman yapısının korunması ve işaretlenmiş bulguların korunması, mezenterik lenf nodlarında artış ile birlikte neoplazi şüphesini artırır; kesin tanı için sitoloji veya biyopsiyle doku örneklemesi gerekebilir. Ultrasonografi tek başına tanıyı doğrulamaz.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Ultrasonografi her zaman tanıyı doğrulamaz
- ✓ Bağırsak katmanları bilgi sağlar
- ✓ İnflamasyon ve neoplazi benzeyebilir

Görüntüleme | Köpek

Vaka 068 · Topallık ve uzun kemikte litik lezyon olan dev ırk köpek


Hasta
- Köpek
- 10 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Ön bacakta giderek artan topallık
- Bölgede şişlik

Öykü ve bağlam
- Rottweiler
- Travma öyküsü yok

Fiziksel muayene
- Distal radiusta sert, ağrılı şişlik

Ek bulgular
- Röntgende metafizde litik-proliferatif lezyon
- Sunburst periost reaksiyonu
- Toraks röntgeninde metastaz yok



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Dev ırkta metafizer lezyon neyi düşündürür?
2. Toraks görüntülemesi neden yapılır?
3. Tanı nasıl kesinleşir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Osteosarkom
- Fungal osteomiyelit
- Kemik kisti

Yorumlu çözüm
Dev ırk yaşlı köpekte distal radius metafizinde litik-proliferatif lezyon ve 'sunburst' periost reaksiyonu osteosarkomu düşündürür. Akciğer metastazı için toraks görüntülemesi yapılır. Tanı kemik biyopsisi veya sitolojiyle konur. Tedavi ağrı kontrolü, amputasyon veya ekstremite koruyucu cerrahi ve kemoterapidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ 'Dizden uzak, dirsekten yakın' lokalizasyon
- ✓ Toraks görüntülemesi evrelemenin parçası
- ✓ Ağrı kontrolü önceliklidir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Görüntüleme | Köpek

Vaka 069 · Ani dispne ve göğüs röntgeninde yaygın opasite


Hasta
- Köpek
- 6 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Ani nefes darlığı
- Öksürük

Öykü ve bağlam
- Travma yok
- Ateş

Fiziksel muayene
- Takipne
- Kranioventral akciğer alanlarında krepitasyon

Ek bulgular
- Röntgen: kranioventral alveoler patern, hava bronkogramları
- Lökositoz, sola kayma



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Alveoler paternin dağılımı neyi düşündürür?
2. Kardiyojenik ödem nasıl ayrılır?
3. Trakeal yıkama ne sağlar?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Bakteriyel (aspirasyon) pnömonisi
- Kardiyojenik ödem
- Akciğer kontüzyonu

Yorumlu çözüm
Kranioventral alveoler patern ve inflamatuvar lökogram bakteriyel veya aspirasyon pnömonisini düşündürür; kardiyojenik ödem genellikle perihiler-kaudodorsal dağılım gösterir. Trakeal yıkama ile kültür ve sitoloji alınır. Tedavi antibiyotik, oksijen, nebülizasyon ve aspirasyonun altta yatan nedeninin araştırılmasıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Dağılım paterni tanıya yön verir
- ✓ Kültür için hava yolu örneği alın
- ✓ Aspirasyon nedenini arayın

Görüntüleme | Kedi

Vaka 070 · Öksürük ve göğüs röntgeninde bronşiyal patern olan kedi


Hasta
- Kedi
- 9 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Nöbetler hâlinde öksürük
- Hırıltı

Öykü ve bağlam
- Tozlu kum kullanılıyor
- Evde sigara içiliyor

Fiziksel muayene
- Ekspiratuvar efor
- Wheeze

Ek bulgular
- Röntgen: bronşiyal patern ('donut' ve tren rayı), akciğer hiperinflasyonu
- Bronkoalveoler lavajda eozinofiller



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Bronşiyal patern neyi gösterir?
2. Parazitik nedenler neden dışlanmalıdır?
3. Uzun dönem tedavi nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kedi astımı (alerjik bronşit)
- Akciğer parazitleri
- Kronik bronşit

Yorumlu çözüm
Nöbetler hâlinde öksürük, ekspiratuvar dispne, bronşiyal patern ve BAL'da eozinofiller kedi astımını düşündürür. Akciğer kurtları benzer tablo yapabildiğinden dışkı testi ve antiparaziter deneme yapılmalıdır. Tedavide inhale kortikosteroid ve krizde bronkodilatör kullanılır; çevresel tetikleyiciler azaltılır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Eozinofilik BAL astımı destekler
- ✓ Önce parazitleri dışlayın
- ✓ Çevresel tetikleyicileri azaltın

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Görüntüleme | Köpek

Vaka 071 · Ultrasonda dalakta kitle bulunan, ani kollaps geçiren köpek


Hasta
- Köpek
- 8 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Ani kollaps
- Soluk mukozalar

Öykü ve bağlam
- Golden retriever

Fiziksel muayene
- Taşikardi
- Karında sıvı dalgası

Ek bulgular
- Abdominal POCUS: serbest sıvı ve dalakta heterojen kitle
- Abdominosentez: hemorajik sıvı
- Hematokrit: %24



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hemoabdomenin en sık nedeni nedir?
2. Ameliyat öncesi hangi görüntülemeler yapılmalı?
3. Prognozu ne belirler?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Dalak hemanjiyosarkomu (rüptüre)
- Dalak hematomu
- Nodüler hiperplazi

Yorumlu çözüm
Büyük ırk yaşlı köpekte hemoabdomen ve dalak kitlesi rüptüre dalak tümörünü, en sık hemanjiyosarkomu düşündürür; ancak benign hematomlar da benzer görünebilir. Stabilizasyon sonrası toraks görüntülemesi ve kalp değerlendirmesi metastaz için yapılır. Splenektomi ve histopatoloji kesin tanıyı sağlar.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Her dalak kitlesi malign değildir
- ✓ Metastaz taraması yapın
- ✓ Kesin tanı histopatolojiyle

Görüntüleme | Köpek

Vaka 072 · Arka bacakta topallık ve diz eklemi röntgeni


Hasta
- Köpek
- 3 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Sağ arka bacakta ani topallık
- Koşarken ağlamış

Öykü ve bağlam
- Aşırı kilolu, aktif köpek

Fiziksel muayene
- Kranial çekmece testi pozitif
- Tibial baskı testi pozitif
- Diz ekleminde efüzyon

Ek bulgular
- Röntgende eklem efüzyonu, erken osteofitler



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kranial çapraz bağ yırtığı nasıl tanınır?
2. Röntgen ne gösterir, ne göstermez?
3. Cerrahi seçenekler nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kranial çapraz bağ rüptürü
- Patella luksasyonu
- Menisküs yaralanması

Yorumlu çözüm
Kranial çekmece ve tibial baskı testlerinin pozitif olması kranial çapraz bağ rüptürünü gösterir. Röntgen bağı göstermez ama efüzyon ve dejeneratif değişiklikleri gösterir. Büyük köpeklerde cerrahi stabilizasyon (TPLO, TTA vb.) önerilir; menisküs değerlendirilmelidir. Kilo kontrolü uzun dönem sonucu iyileştirir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Tanı muayeneyle konur
- ✓ Röntgen bağı değil sonuçlarını gösterir
- ✓ Menisküsü kontrol edin

Görüntüleme | Köpek

Vaka 073 · Kalça displazisi değerlendirmesi ve röntgen yorumu


Hasta
- Köpek
- 5 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Kalkarken zorlanma
- Tavşan gibi zıplayarak koşma

Öykü ve bağlam
- Alman çoban köpeği

Fiziksel muayene
- Kalça ekleminde ağrı
- Ortolani testi (sedasyonda) pozitif

Ek bulgular
- VD kalça röntgeninde sığ asetabulum, femur başı subluksasyonu
- Femur boynunda osteofit (Morgan çizgisi)



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kalça displazisi nasıl değerlendirilir?
2. Genç ve yetişkin hastada tedavi neden farklıdır?
3. Hangi faktörler belirtileri artırır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kalça displazisi ve sekonder osteoartrit
- Lumbosakral stenoz
- Kranial çapraz bağ hastalığı

Yorumlu çözüm
Sığ asetabulum, subluksasyon ve dejeneratif değişiklikler kalça displazisini gösterir. Genç hastalarda koruyucu cerrahiler, yetişkinlerde ağrı yönetimi, fizyoterapi ve kilo kontrolü; ileri olgularda total kalça protezi veya femur başı ostektomisi düşünülür. Kilo ve aşırı hareket belirtileri artırır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Röntgen pozisyonu doğru olmalı
- ✓ Kilo kontrolü en etkili önlemdir
- ✓ Tedavi yaş ve şiddete göre seçilir

Görüntüleme | Kedi

Vaka 074 · Ultrasonda böbrekleri asimetrik olan yaşlı kedi


Hasta
- Kedi
- 12 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kilo kaybı
- Kusma

Öykü ve bağlam
- Böbrek değerleri yüksek

Fiziksel muayene
- Sol böbrek büyük, sağ küçük

Ek bulgular
- Ultrason: sol böbrekte pelvis genişlemesi ve üreterde taş
- Sağ böbrek küçük, kortikal hiperekojenite



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. 'Büyük böbrek-küçük böbrek' sendromu neyi düşündürür?
2. Üreter taşı neden acildir?
3. Tedavi seçenekleri nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Üreteral obstrüksiyon (kalsiyum oksalat taşı)
- Kronik böbrek hastalığı
- Böbrek lenfoması

Yorumlu çözüm
Bir böbrekte hidronefroz ve üreter taşı, diğerinde kronik küçülme 'büyük böbrek-küçük böbrek' sendromunu oluşturur; işlevsel böbreğin tıkanması akut azotemiye yol açar. Üreter obstrüksiyonu böbrek kaybını önlemek için hızla değerlendirilmelidir. Medikal diürez denenebilir; yanıt yoksa subkutan üreteral bypass veya stent gerekir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Asimetrik böbrekler = üreteri kontrol edin
- ✓ Obstrüksiyon böbrek kaybına yol açar
- ✓ Medikal yanıt yoksa cerrahi

Görüntüleme | Köpek

Vaka 075 · Kronik öksürük ve toraks röntgeninde nodüller


Hasta
- Köpek
- 13 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kronik öksürük
- Kilo kaybı

Öykü ve bağlam
- Bir yıl önce meme bölgesinde değil, ağızda melanom alınmış

Fiziksel muayene
- Solunum sesleri hafif sert

Ek bulgular
- Toraks röntgeninde yaygın 'top' şeklinde nodüller (3 projeksiyon)



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Metastaz taramasında neden 3 projeksiyon önerilir?
2. Nodüllerin dağılımı neyi düşündürür?
3. BT'nin üstünlüğü nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Pulmoner metastaz
- Fungal pnömoni
- Primer akciğer tümörü

Yorumlu çözüm
Malign tümör öyküsü olan köpekte yaygın yuvarlak akciğer nodülleri pulmoner metastazı düşündürür. Üç projeksiyon (sağ, sol lateral ve VD) küçük nodüllerin saptanma olasılığını artırır; BT daha duyarlıdır. Prognoz ve palyatif bakım planı sahiple paylaşılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Metastaz taramasında 3 projeksiyon
- ✓ BT daha duyarlıdır
- ✓ Öykü yorumu yönlendirir

Klinik korelasyon | Köpek

Vaka 076 · Laboratuvar 'normal' ama klinik tablo ağır olan köpek


Hasta
- Köpek
- 7 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Ani halsizlik
- Hızlı solunum

Öykü ve bağlam
- Sabah aniden başlamış

Fiziksel muayene
- Soluk mukozalar
- Taşikardi
- Karında sıvı

Ek bulgular
- İlk hematokrit: %38 (normal)
- Total protein düşük
- Abdominosentezde kan



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Akut kanamada hematokrit neden hemen düşmez?
2. Total protein neden ipucu verir?
3. Hangi tetkik önceliklidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Akut iç kanama
- Septik şok
- Anafilaksi

Yorumlu çözüm
Akut kanamada kan bütün olarak kaybedildiği için hematokrit ilk saatlerde normal kalabilir; dalak kontraksiyonu da bunu maskeler. Total proteinin düşmesi daha erken bir ipucudur. Klinik bulgular laboratuvardan önce gelir; POCUS ve abdominosentez hızla iç kanamayı gösterir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Laboratuvar klinikle birlikte yorumlanır
- ✓ Akut kanamada hematokrit gecikir
- ✓ Total protein erken düşer

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Klinik korelasyon | Kedi

Vaka 077 · Stres hiperglisemisi ile diyabeti ayırt etme


Hasta
- Kedi
- 5 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kliniğe getirilirken çok stresli
- Rutin kontrol

Öykü ve bağlam
- Su tüketimi normal

Fiziksel muayene
- Muayene normal, aşırı huzursuz

Ek bulgular
- Glukoz: 260 mg/dL
- Glukozüri yok
- Fruktozamin normal



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Stres kedide glukozu nasıl etkiler?
2. Fruktozamin neden ayırt edicidir?
3. Klinik belirti neden önemlidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Stres hiperglisemisi
- Erken diabetes mellitus
- Akromegali

Yorumlu çözüm
Kedilerde stres glukozu belirgin şekilde yükseltebilir. Klinik belirti, glukozüri ve yüksek fruktozamin olmadan tek bir yüksek glukoz değeri diyabet tanısı için yeterli değildir. Fruktozaminin normal olması geçici stres hiperglisemisini destekler; evde ölçüm veya tekrar test planlanabilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Tek glukoz ölçümüyle diyabet tanısı konmaz
- ✓ Fruktozamin kronik değeri gösterir
- ✓ Kedi dostu klinik yaklaşımı stresi azaltır

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Klinik korelasyon | Köpek

Vaka 078 · Hemolizli kan örneğinde yanıltıcı sonuçlar


Hasta
- Köpek
- 6 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Rutin operasyon öncesi tahlil

Öykü ve bağlam
- Kan alma zorlu olmuş, ince iğne kullanılmış

Fiziksel muayene
- Muayene normal

Ek bulgular
- Serum kırmızı renkte (hemoliz)
- Potasyum hafif yüksek, ALT hafif yüksek
- Tekrar alınan örnekte değerler normal



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hemoliz hangi parametreleri etkiler?
2. Örnek kalitesi neden tanının parçasıdır?
3. Doğru kan alma için neler yapılmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Preanalitik hata (in vitro hemoliz)
- İn vivo hemoliz
- Gerçek elektrolit bozukluğu

Yorumlu çözüm
Zor kan alma ve ince iğne in vitro hemolize yol açarak potasyum, bazı enzimler ve renk tabanlı ölçümleri yanıltabilir. Klinik bulgularla uyumsuz sonuçlar örnek kalitesinin sorgulanmasını gerektirir. Uygun iğne çapı, nazik aspirasyon ve doğru tüp sırasıyla tekrar örnek alınmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Önce örnek kalitesine bakın
- ✓ Hemoliz potasyumu yanıltır
- ✓ Uyumsuz sonuçları tekrarlayın

Klinik korelasyon | Köpek

Vaka 079 · Ateş, nötrofili ve bacakta şişlik: sepsisin kaynağını arama


Hasta
- Köpek
- 12 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Ateş
- Bir bacakta şişlik ve ağrı

Öykü ve bağlam
- 10 gün önce bacakta ısırık yarası

Fiziksel muayene
- Ateş: 40,4 °C
- Sol arka bacakta sıcak, ağrılı ve dalgalanan şişlik

Ek bulgular
- Nötrofili, sola kayma
- İİA: dejenere nötrofiller ve hücre içi bakteriler



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Dejenere nötrofil neyi gösterir?
2. Kaynak kontrolü neden önemlidir?
3. Kültür neden gereklidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Isırık apsesi ve selülit
- Septik artrit
- Nekrotizan fasiit

Yorumlu çözüm
Isırık öyküsü, dalgalanan sıcak şişlik ve aspiratta dejenere nötrofillerle hücre içi bakteriler apseyi gösterir. Tedavide kaynak kontrolü (drenaj, debridman) en önemli adımdır. Kültür ve antibiyogram alınır, uygun antibiyotik ve analjezi verilir. Hızla yayılan ağrı nekrotizan fasiit açısından uyarıcıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Hücre içi bakteri = septik süreç
- ✓ Önce drenaj
- ✓ Kültür ve antibiyogram alın

Klinik korelasyon | Kedi

Vaka 080 · Hipertiroidizm tedavisi sonrası ortaya çıkan böbrek yetmezliği


Hasta
- Kedi
- 14 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Antitiroid tedavi sonrası iştahsızlık

Öykü ve bağlam
- Tedavi öncesi kreatinin normal

Fiziksel muayene
- Kilo artışı başlamış
- Hafif dehidratasyon

Ek bulgular
- T4 normal aralıkta
- Kreatinin: 2,6 mg/dL (tedavi öncesi 1,4)
- İdrar dansitesi: 1,016



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hipertiroidizm böbrek fonksiyonunu nasıl maskeler?
2. Tedavi dozu nasıl ayarlanmalı?
3. Hangi parametreler birlikte izlenir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Maskelenmiş kronik böbrek hastalığının ortaya çıkması
- İatrojenik hipotiroidizm
- Prerenal azotemi

Yorumlu çözüm
Hipertiroidizm glomerüler filtrasyon hızını artırarak altta yatan böbrek hastalığını gizleyebilir; tiroid hormonu düştüğünde azotemi ortaya çıkar. İatrojenik hipotiroidizm böbrek fonksiyonunu kötüleştirebileceğinden T4 normal aralıkta tutulmalı, gerekirse TSH ölçülmelidir. T4, kreatinin ve kan basıncı birlikte izlenir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Tiroid tedavisi böbrek hastalığını açığa çıkarabilir
- ✓ İatrojenik hipotiroidizmden kaçının
- ✓ T4 ve kreatinini birlikte izleyin

Sitoloji | Köpek

Vaka 081 · Meme zincirinde birden fazla kitle olan kısırlaştırılmamış köpek


Hasta
- Köpek
- 10 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Meme bölgesinde şişlikler

Öykü ve bağlam
- Kısırlaştırılmamış
- Kitleler 6 aydır büyüyor

Fiziksel muayene
- Kaudal meme lobunda 3 cm, diğerlerinde küçük nodüller
- İnguinal lenf düğümü hafif büyük

Ek bulgular
- İİA: kümeler hâlinde epitel hücreleri, belirgin anizokaryoz
- Toraks röntgeninde metastaz yok



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Meme tümörlerinde sitolojinin sınırları nelerdir?
2. Evreleme için neler yapılır?
3. Erken kısırlaştırmanın etkisi nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Meme karsinomu
- Benign meme tümörü
- İnflamatuvar karsinom

Yorumlu çözüm
Kısırlaştırılmamış yaşlı dişide çoklu meme kitleleri sık görülür; yaklaşık yarısı malignndir. Sitoloji yol gösterir ama malignite ayrımı için histopatoloji gerekir. Evreleme toraks görüntülemesi ve lenf düğümü değerlendirmesini içerir. Cerrahi eksizyon temel tedavidir; erken kısırlaştırma riski belirgin şekilde azaltır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Tanı ve derece histopatolojiyle
- ✓ Toraks görüntülemesi evrelemenin parçası
- ✓ Erken kısırlaştırma koruyucudur

Sitoloji | Köpek

Vaka 082 · Kulak akıntısı ve kulak sitolojisinin yorumu


Hasta
- Köpek
- 6 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Başını sallama
- Kulakta kötü koku

Öykü ve bağlam
- Daha önce birkaç kez kulak damlası kullanmış

Fiziksel muayene
- Sağ kulakta pürülan akıntı, ödem
- Kulak zarı görülemiyor

Ek bulgular
- Kulak sitolojisi: çok sayıda çubuk bakteri ve dejenere nötrofil
- Kültür: Pseudomonas aeruginosa



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Sitoloji tedavi seçimini nasıl yönlendirir?
2. Çubuk bakteri neden önemlidir?
3. Kulak zarı görülemezse ne yapılmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Bakteriyel otitis eksterna (Pseudomonas)
- Malassezia otiti
- Otitis media

Yorumlu çözüm
Kulak sitolojisinde çubuk bakteriler ve nötrofiller Pseudomonas gibi dirençli etkenleri düşündürür; kültür ve antibiyogram gereklidir. Kulak zarı değerlendirilemiyorsa ototoksik ilaçlardan kaçınılır ve sedasyon altında kulak temizliği yapılır. Altta yatan alerji gibi primer nedenler yönetilmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Her otitte sitoloji yapın
- ✓ Çubuk bakteri = kültür alın
- ✓ Primer nedeni bulun

Sitoloji | Köpek

Vaka 083 · Göğüs boşluğunda süt rengi sıvı birikimi


Hasta
- Köpek
- 8 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Nefes darlığı
- Egzersiz intoleransı

Öykü ve bağlam
- Afgan tazısı

Fiziksel muayene
- Ventral toraksta boğuk sesler

Ek bulgular
- Torasentez: süt beyazı sıvı
- Sıvı trigliserit > serum trigliserit
- Sitoloji: olgun küçük lenfositler



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Şilöz efüzyon nasıl doğrulanır?
2. Altta yatan nedenler nelerdir?
3. Tedavi seçenekleri nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Şilotoraks (idiyopatik)
- Lenfoma
- Kalp yetmezliği

Yorumlu çözüm
Süt beyazı sıvıda trigliseritin serumdan yüksek olması şilöz efüzyonu doğrular. Kalp hastalığı, neoplazi ve travma gibi nedenler araştırılmalıdır; neden bulunamazsa idiyopatik şilotoraks olarak değerlendirilir. Tedavide tekrarlayan torasentez, düşük yağlı diyet, rutin ve dirençli olgularda cerrahi (duktus torasikus ligasyonu) uygulanır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Trigliserit oranı tanıyı doğrular
- ✓ Altta yatan nedeni arayın
- ✓ Dirençli olgularda cerrahi

Sitoloji | Kedi

Vaka 084 · Burnunda şişlik ve ülserasyon olan dışarı çıkan kedi


Hasta
- Kedi
- 6 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Burun üzerinde şişlik
- Hapşırma

Öykü ve bağlam
- Güvercinlerin olduğu bölgede yaşıyor

Fiziksel muayene
- Burun köprüsünde 'palyaço burnu' şişliği
- Mandibular lenf düğümü büyük

Ek bulgular
- İİA: kalın kapsüllü, tomurcuklanan maya hücreleri



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kalın kapsüllü maya hangi etkendir?
2. Bu enfeksiyon nasıl bulaşır?
3. Tedavi ne kadar sürer?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kriptokokkoz
- Burun lenfoması
- Skuamöz hücreli karsinom

Yorumlu çözüm
Kedide burun köprüsü şişliği ve aspiratta kalın kapsüllü tomurcuklanan mayalar kriptokokkozu gösterir; etken kuş dışkısıyla kirlenmiş çevrede bulunur. Lateks antijen testi tanı ve izlemde kullanılır. Tedavi azol grubu antifungallerle aylarca sürer; antijen titresi negatifleşene kadar devam edilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kapsüllü maya = Cryptococcus
- ✓ Antijen titresiyle izleyin
- ✓ Tedavi aylar sürer

Sitoloji | Köpek

Vaka 085 · Eklem sıvısı analizi ile çoklu eklem ağrısı


Hasta
- Köpek
- 5 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Dolaşan topallık
- Ateş
- Yürümek istememe

Öykü ve bağlam
- Travma yok
- Kene testi negatif

Fiziksel muayene
- Birden fazla eklemde efüzyon ve ağrı
- Ateş: 40,0 °C

Ek bulgular
- Artrosentez: düşük viskozite, nötrofil artışı (dejenere olmayan)
- Kültür negatif



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Septik ve immün aracılı artrit nasıl ayrılır?
2. Neden birden fazla eklemden örnek alınmalı?
3. Tedavi nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İmmün aracılı poliartrit
- Septik artrit
- Vektörle bulaşan hastalıklar

Yorumlu çözüm
Birden fazla eklemde efüzyon, ateş ve sinovyal sıvıda dejenere olmayan nötrofiller immün aracılı poliartriti düşündürür. Septik artrit genellikle tek eklemde ve dejenere nötrofillerle görülür; kültür alınmalıdır. Enfeksiyöz nedenler dışlandıktan sonra immünsüpresif tedavi başlanır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Ateşin kaynağı eklemler olabilir
- ✓ Birden fazla eklemden örnek alın
- ✓ Önce enfeksiyonu dışlayın

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Görüntüleme | Köpek

Vaka 086 · İdrar yapma güçlüğü ve ultrasonda büyümüş prostat


Hasta
- Köpek
- 9 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- İdrar yaparken zorlanma
- Şerit şeklinde dışkı

Öykü ve bağlam
- Kısırlaştırılmamış

Fiziksel muayene
- Rektal muayenede simetrik büyümüş, ağrısız prostat

Ek bulgular
- Ultrasonda homojen büyümüş prostat, küçük kistler
- İdrar kültürü negatif



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kısırlaştırılmamış köpekte en sık prostat hastalığı nedir?
2. Prostat neoplazisi nasıl ayırt edilir?
3. Tedavi seçenekleri nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Benign prostat hiperplazisi
- Prostatit
- Prostat karsinomu

Yorumlu çözüm
Kısırlaştırılmamış yaşlı köpekte simetrik, ağrısız büyümüş prostat benign prostat hiperplazisini düşündürür. Asimetri, mineralizasyon veya kısırlaştırılmış köpekte prostat büyümesi neoplazi açısından uyarıcıdır. Tedavi kastrasyon veya antiandrojen ilaçlardır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kısırlaştırılmamış köpekte BPH sıktır
- ✓ Kısırlaştırılmış köpekte büyük prostat = neoplaziyi düşünün
- ✓ Kastrasyon tedavidir

Görüntüleme | Kedi

Vaka 087 · Trafik kazası sonrası dispne ve göğüs röntgeni


Hasta
- Kedi
- 4 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Nefes darlığı
- Hareket etmek istememe

Öykü ve bağlam
- Arabanın çarptığı düşünülüyor

Fiziksel muayene
- Paradoks solunum yok
- Karın 'boş' hissediliyor
- Kalp sesleri bir tarafta boğuk

Ek bulgular
- Röntgen: toraksta bağırsak ansları, diyafram çizgisi kayıp



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Travmatik diyafram hernisi nasıl tanınır?
2. Ameliyat zamanlaması nasıl belirlenir?
3. Başka hangi travma bulguları aranmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Travmatik diyafram hernisi
- Pnömotoraks
- Akciğer kontüzyonu

Yorumlu çözüm
Travma sonrası dispne, toraksta abdominal organlar ve kayıp diyafram çizgisi diyafram hernisini gösterir. Hasta önce oksijen ve şok tedavisiyle stabilize edilir; mide toraksa girmişse ve şişiyorsa acil cerrahi gerekir. Pnömotoraks, kontüzyon ve diğer yaralanmalar da araştırılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Önce stabilizasyon
- ✓ Mide fıtıklaşırsa acil cerrahi
- ✓ Çoklu travmayı düşünün

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Biyokimya | Köpek

Vaka 088 · Kas hasarı ve CK yüksekliği: nöbet sonrası mı, miyopati mi?


Hasta
- Köpek
- 4 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Ard arda nöbetler sonrası halsizlik
- Koyu renkli idrar

Öykü ve bağlam
- Epilepsi tanısı var

Fiziksel muayene
- Kaslarda hassasiyet
- Ateş: 39,6 °C

Ek bulgular
- CK: 18.000 U/L
- AST yüksek
- İdrarda heme pozitif, eritrosit yok



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. CK neyi gösterir?
2. Heme pozitif ama eritrosit yok ne anlama gelir?
3. Böbrekler neden risk altında?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Nöbet sonrası rabdomiyoliz
- İnflamatuvar miyopati
- Hemoliz

Yorumlu çözüm
Uzun süren nöbetlerden sonra kas hasarı CK'yı yükseltir; idrarda eritrosit olmadan heme pozitifliği miyoglobinüriyi düşündürür. Miyoglobin böbrek tübüllerine zarar verebileceğinden sıvı diürezi ve böbrek değerlerinin izlenmesi gerekir. Nöbet kontrolü gözden geçirilmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ CK kas hasarının belirtecidir
- ✓ Heme + / eritrosit − = miyoglobin veya hemoglobin
- ✓ Böbrekleri koruyun

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Hemogram | Köpek

Vaka 089 · Pansitopeni ve kanayan dişetleri olan yaşlı köpek


Hasta
- Köpek
- 11 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Dişeti kanaması
- Halsizlik
- Tekrarlayan enfeksiyonlar

Öykü ve bağlam
- Kene bölgesinde yaşıyor

Fiziksel muayene
- Soluk mukozalar, peteşi
- Ateş

Ek bulgular
- Anemi, lökopeni ve trombositopeni (pansitopeni)
- Globulin yüksek
- Ehrlichia canis serolojisi yüksek titre



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Pansitopeni kemik iliği hakkında ne söyler?
2. Kronik ehrlichiosisin prognozu nedir?
3. Kemik iliği aspirasyonu ne zaman gerekir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kronik ehrlichiosis
- Kemik iliği neoplazisi
- İlaç kaynaklı kemik iliği supresyonu

Yorumlu çözüm
Pansitopeni kemik iliği yetmezliğini gösterir; kene bölgesinde hiperglobulinemi ile birlikte kronik ehrlichiosisi düşündürür. Kronik fazda kemik iliği hipoplazisi gelişebilir ve prognoz akut faza göre kötüdür. Tedavi doksisiklin ve destekleyici tedavidir; neoplazi şüphesinde kemik iliği aspirasyonu yapılır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Pansitopeni = kemik iliğine bakın
- ✓ Hiperglobulinemi kronik enfeksiyonu destekler
- ✓ Kronik form daha kötü prognozludur

Yalnızca eğitim amaçlıdır

İdrar analizi | Kedi

Vaka 090 · Hiperglisemisi olmadan glukozüri görülen kedi


Hasta
- Kedi
- 7 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Su tüketiminde hafif artış

Öykü ve bağlam
- Yeni bir ilaç başlanmamış

Fiziksel muayene
- Muayene normal

Ek bulgular
- Kan glukozu normal
- İdrarda glukoz pozitif
- İdrar örneği sondayla, travmatik alınmış ve bekletilmiş



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Normoglisemik glukozüri hangi durumları düşündürür?
2. Preanalitik hatalar idrar sonucunu nasıl etkiler?
3. Hangi testler tekrarlanmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Tübüler hasar / Fanconi benzeri sendrom
- Örnek kontaminasyonu
- Stres hiperglisemisinin geçmesi

Yorumlu çözüm
Kan glukozu normalken glukozüri; renal tübüler bozukluk, ilaç veya toksin hasarı ya da örnek hatasından kaynaklanabilir. Dip test şeritlerinin bazı kontaminantlarla yanlış pozitif verebileceği unutulmamalıdır. Taze, sistosentezle alınmış örnekle test tekrarlanmalı; gerçekse tübüler fonksiyon araştırılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Normoglisemik glukozüri tübülü düşündürür
- ✓ Önce örneği tekrarlayın
- ✓ Toksin/ilaç öyküsü sorgulanmalı

Klinik korelasyon | Köpek

Vaka 091 · Pozitif kalp kurdu testi ama belirti olmayan köpek: sonuçları birleştirme


Hasta
- Köpek
- 5 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Rutin kontrol, belirti yok

Öykü ve bağlam
- Koruyucu ilaç düzensiz

Fiziksel muayene
- Muayene normal

Ek bulgular
- Antijen testi pozitif
- Mikrofilarya negatif
- Toraks röntgeni normal



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Mikrofilarya negatif olması enfeksiyonu dışlar mı?
2. Belirtisiz hastada evreleme neden yapılır?
3. Tedavi neden yine de gereklidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Gizli (amikrofilaremik) dirofilariozis
- Yanlış pozitif test
- Erken enfeksiyon

Yorumlu çözüm
Antijen pozitif, mikrofilarya negatif köpekte gizli enfeksiyon olabilir; ikinci bir yöntemle doğrulama önerilir. Belirti olmasa da kurtlar pulmoner arterlere zarar verir; röntgen ve gerekirse ekokardiyografiyle evreleme yapılır ve kurallara uygun tedavi planlanır. Tedavi boyunca egzersiz kısıtlanır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Mikrofilarya yokluğu enfeksiyonu dışlamaz
- ✓ Belirtisiz hasta da tedavi edilir
- ✓ Doğrulama testi önerilir

Biyokimya | Köpek

Vaka 092 · Pankreatik lipazı yüksek olan köpek


Hasta
- Köpek
- 7 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Kusma
- Karın ağrısı
- İştahsızlık

Öykü ve bağlam
- Pankreatik spesifik lipaz yüksekliği
- Karaciğer enzimlerinde yükselme

Fiziksel muayene
- Dua pozisyonu (prayer position)
- Orta derecede dehidratasyon

Ek bulgular
- Pankreatik lipaz: 820 µg/L (ref. < 200)
- ALT: 95 U/L, ALP: 180 U/L
- Ultrasonda hipoekoik pankreas ve hiperekoik çevre yağ dokusu



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Yüksek pankreatik lipaz pankreatiti doğrular mı?
2. Ekografi hangi değeri verir?
3. Diğer hastalıklar birlikte olabilir mi?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Akut pankreatit
- Gastroenterit
- Gastrointestinal tıkanıklık
- Karaciğer hastalığı

Yorumlu çözüm
Pankreatik lipazın yüksek olması pankreatitin olası bir belirtisidir, özellikle ultrasonografi bulguları ile birlikte. Bununla birlikte, tek başına test kesin bir tanı koymaz; klinik tablo ve diğer bulgularla desteklenerek değerlendirilmelidir. Tedavi sıvı, analjezi, antiemetik ve erken enteral beslenmeye dayanır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Yüksek lipaz, her zaman pankreatiti göstermez, ancak vakayı tamamlar
- ✓ Görüntüleme ve laboratuvar bulguları birlikte ele alınmalıdır
- ✓ Analjezi ve erken beslenme tedavinin temelidir

Görüntüleme | Köpek

Vaka 093 · Kusma ve ultrasonda 'hedef' görünümü olan genç köpek


Hasta
- Köpek
- 2 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kusma
- Az miktarda kanlı-mukuslu dışkı

Öykü ve bağlam
- Bir hafta önce ağır paraziter ishal geçirmiş

Fiziksel muayene
- Karında sosis şeklinde kitle

Ek bulgular
- Ultrasonda enine kesitte çok katmanlı 'hedef' görünümü



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hedef görünümü neyi gösterir?
2. Genç hayvanlarda tetikleyici nedenler nelerdir?
3. Tedavi nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- İntussusepsiyon
- Yabancı cisim
- Bağırsak neoplazisi

Yorumlu çözüm
Genç köpekte enterit sonrası kusma, kanlı-mukuslu dışkı, palpe edilen sosis şeklinde kitle ve ultrasonda 'hedef' görünümü intussusepsiyonu gösterir. Enterit ve parazitler tetikleyici olabilir. Tedavi cerrahi redüksiyon veya canlılığı olmayan segmentin rezeksiyonudur; altta yatan neden tedavi edilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ 'Hedef' görünümü = intussusepsiyon
- ✓ Enterit tetikleyebilir
- ✓ Tedavi cerrahidir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Görüntüleme | Köpek

Vaka 094 · Adrenal bezde kitle ve yüksek kan basıncı


Hasta
- Köpek
- 10 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Ara sıra nefes nefese kalma
- Huzursuzluk atakları

Öykü ve bağlam
- Belirtiler epizodik

Fiziksel muayene
- Kan basıncı: 210 mmHg
- Taşikardi

Ek bulgular
- Ultrasonda sol adrenalde 3 cm kitle, vena kava'ya yakın
- İdrarda normetanefrin yüksek



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Adrenal kitlenin ayırıcı tanısı nedir?
2. Hipertansiyon neden tehlikelidir?
3. Ameliyat öncesi hangi ilaç verilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Feokromositoma
- Adrenokortikal tümör
- İnsidental adrenal nodül

Yorumlu çözüm
Epizodik huzursuzluk, taşikardi, hipertansiyon ve adrenal kitle feokromositomayı düşündürür; idrar normetanefrin yüksekliği tanıyı destekler. Hipertansiyon göz, böbrek ve beyin hasarına yol açabilir. Cerrahi öncesi alfa-bloker ile kan basıncı kontrol edilir; vena kava invazyonu BT ile değerlendirilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Epizodik belirtiler feokromositomada tipiktir
- ✓ Ameliyat öncesi alfa-bloker
- ✓ BT invazyonu gösterir

Klinik korelasyon | Kedi

Vaka 095 · Ani körlük ve yüksek kan basıncı olan kedi


Hasta
- Kedi
- 9 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Eşyalara çarpma
- Gözbebekleri büyük

Öykü ve bağlam
- Kronik böbrek hastalığı tanısı var, kontrolleri aksamış

Fiziksel muayene
- Bilateral midriyazis, tehdit refleksi yok
- Fundusta retina dekolmanı ve kanama

Ek bulgular
- Sistolik kan basıncı: 230 mmHg
- Kreatinin: 2,8 mg/dL



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Hipertansiyonun hedef organları nelerdir?
2. Kronik böbrek hastalığında neden düzenli ölçüm gerekir?
3. Tedavi nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hipertansif retinopati
- Glokom
- Merkezi sinir sistemi lezyonu

Yorumlu çözüm
Kronik böbrek hastalığı olan kedide ani körlük ve retina dekolmanı ile birlikte çok yüksek kan basıncı hipertansif retinopatiyi gösterir. Hedef organlar göz, böbrek, kalp ve beyindir. Amlodipin ile kan basıncı düşürülür; erken tedavide görme kısmen geri dönebilir. Böbrek hastalarında kan basıncı düzenli ölçülmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Ani körlük + KBH = kan basıncını ölçün
- ✓ Amlodipin ilk tercih
- ✓ Düzenli ölçüm hedef organ hasarını önler

Yalnızca eğitim amaçlıdır