ROTA 04

210 Yorumlu Veteriner Klinik Vaka

Rota 04 · Cerrahi, Üreme ve Neonatoloji · 35 vaka

5 Öğrenme Rotası · Küçük, büyük ve egzotik hayvanlar · Yorumlu çözümler

Cerrahi | Köpek

Vaka 136 · Skrotumda tek testis olan genç köpek


Hasta
- Köpek
- 1 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Skrotumda tek testis
- Kısırlaştırma için başvuru

Öykü ve bağlam
- Diğer testis hiç inmemiş

Fiziksel muayene
- Sol testis skrotumda
- Sağ testis inguinal kanalda palpe edilemiyor

Ek bulgular
- Ultrasonda sağ testis karın içinde, böbrek kaudalinde



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kriptorşidizmin riskleri nelerdir?
2. Karın içi testis nasıl lokalize edilir?
3. Neden her iki testis alınmalıdır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Tek taraflı abdominal kriptorşidizm
- İnguinal kriptorşidizm
- Anorşi

Yorumlu çözüm
8 haftadan sonra skrotuma inmeyen testis kriptorşidizmdir ve kalıtsaldır. Karın içi testislerde Sertoli hücreli tümör ve torsiyon riski artar. Ultrason lokalizasyona yardım eder; kastrasyonda her iki testis alınır. Etkilenen hayvanlar damızlıkta kullanılmamalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kriptorşidizm kalıtsaldır
- ✓ Karın içi testis tümör riskidir
- ✓ Her iki testis alınır

Cerrahi | Köpek

Vaka 137 · Göz kapağında içe dönme ve göz akıntısı


Hasta
- Köpek
- 6 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Gözde sulanma
- Gözü kısma

Öykü ve bağlam
- Shar pei ırkı
- Belirtiler gençlikten beri var

Fiziksel muayene
- Alt göz kapağı içe dönük, kirpikler korneaya temas ediyor
- Floresein boyama: kornea ülseri

Ek bulgular
- Schirmer gözyaşı testi normal



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Entropiyon neden korneaya zarar verir?
2. Floresein testi ne gösterir?
3. Cerrahi düzeltme nasıl yapılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Entropiyon ve sekonder kornea ülseri
- Distikiyazis
- Kuru göz

Yorumlu çözüm
İçe dönük göz kapağının kılları korneayı tahriş eder ve ülsere yol açar; floresein boyama ülseri gösterir. Ülser tedavi edilir (antibiyotikli damla, ağrı kontrolü) ve cerrahi düzeltme (Hotz-Celsus tekniği) yapılır. Çok genç yavrularda geçici dikiş yöntemi uygulanabilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Floresein ülseri gösterir
- ✓ Cerrahi kalıcı çözümdür
- ✓ Kalıtsal yatkınlık vardır

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Cerrahi | Köpek

Vaka 138 · Arka bacağını aralıklı kaldıran küçük ırk köpek: patella luksasyonu


Hasta
- Köpek
- 2 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Yürürken ara ara bacağı kaldırma
- Birkaç adım sonra normal yürüme

Öykü ve bağlam
- Pomeranian

Fiziksel muayene
- Medial patella luksasyonu (derece 2)
- Ağrı hafif

Ek bulgular
- Röntgende tibial tuberositas hafif medial yer değiştirmiş



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Patella luksasyonu nasıl derecelendirilir?
2. 'Atlayan' yürüyüş neden olur?
3. Ne zaman cerrahi önerilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Medial patella luksasyonu
- Kranial çapraz bağ hastalığı
- Legg-Calvé-Perthes hastalığı

Yorumlu çözüm
Küçük ırklarda medial patella luksasyonu sıktır; patella yerinden çıktığında köpek bacağını kaldırır, yerine dönünce normal yürür. Derece 1-4 arası sınıflandırılır. Klinik belirti veren ve derece 2 üzeri olgularda trokleoplasti ve tibial tuberositas transpozisyonu gibi cerrahi düzeltme önerilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Aralıklı topallık tipiktir
- ✓ Derece tedaviyi belirler
- ✓ Kilo kontrolü yardımcıdır

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Cerrahi Kedi

Vaka 139 · Meme bölgesinde ülserleşen kitle olan kısırlaştırılmamış kedi


Hasta
- Kedi
- 12 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Meme bölgesinde yara ve kitle

Öykü ve bağlam
- Kısırlaştırılmamış
- Progestin içeren kızgınlık bastırıcı kullanmış

Fiziksel muayene
- İki meme lobunda sert, ülserleşmiş kitle
- İnguinal lenf düğümü büyük

Ek bulgular
- Toraks röntgeninde nodül yok
- İİA: malign epitel hücreleri



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kedi meme tümörleri köpektekinden nasıl farklıdır?
2. Cerrahi kapsam nasıl olmalı?
3. Progestin kullanımının etkisi nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Meme adenokarsinomu
- Fibroadenomatöz hiperplazi
- Mastit

Yorumlu çözüm
Kedilerde meme tümörlerinin büyük çoğunluğu maligndir ve agresiftir. Tedavi, tek veya iki taraflı radikal mastektomi ve bölgesel lenf düğümlerinin çıkarılmasıdır; ardından kemoterapi değerlendirilir. Progestinler riski artırır; erken kısırlaştırma koruyucudur.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kedide meme kitlelerinin çoğu maligndir
- ✓ Radikal mastektomi önerilir
- ✓ Erken kısırlaştırma riski azaltır

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Cerrahi | Köpek

Vaka 140 · Ön bacakta açık kırık olan köpek


Hasta
- Köpek
- 4 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kaza sonrası bacakta kemik görünüyor

Öykü ve bağlam
- 1 saat önce olmuş

Fiziksel muayene
- Radius-ulnada açık kırık
- Yara kirli
- Distal nabız ve his mevcut

Ek bulgular
- Röntgen: parçalı radius-ulna kırığı



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Açık kırıkta ilk müdahale nedir?
2. Antibiyotik ne zaman başlanmalı?
3. Fiksasyon yöntemi nasıl seçilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Açık radius-ulna kırığı
- Yumuşak doku yaralanması
- Sinir hasarı

Yorumlu çözüm
Açık kırık acil durumdur; önce hasta stabilize edilir, analjezi verilir, yara steril örtüyle kapatılır ve en kısa sürede antibiyotik başlanır. Yara bol sıvıyla yıkanır ve debride edilir. Fiksasyon yöntemi (eksternal fiksatör, plak) kırık tipi ve yara durumuna göre seçilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Açık kırık acildir
- ✓ Antibiyotiği geciktirmeyin
- ✓ Önce yara, sonra fiksasyon

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Cerrahi | Köpek

Vaka 141 · Perianal bölgede şişlik ve dışkılama güçlüğü


Hasta
- Köpek
- 8 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Dışkılamada zorlanma
- Anüs yanında şişlik

Öykü ve bağlam
- Daha önce dışkılamada zorlanma ve kayma (popo sürtme) öyküsü
- Belirtiler 3 gündür var

Fiziksel muayene
- Sağ anal kese bölgesinde ağrılı, şiş ve kırmızı alan
- Fistül ağzından kanlı-irinli akıntı

Ek bulgular
- Sitoloji: dejenere nötrofiller ve bakteriler



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Anal kese apsesi nasıl gelişir?
2. Tedavide drenajın önemi nedir?
3. Tekrarlayan olgularda ne yapılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Anal kese apsesi
- Anal kese adenokarsinomu
- Perianal fistül

Yorumlu çözüm
Anal kese içeriğinin boşalamaması kese iltihabına ve apseye yol açar. Tedavide apse drene edilir, kese yıkanır, analjezik ve uygun antibiyotik verilir. Tekrarlayan olgularda anal sakkülektomi düşünülür. Kesede sert kitle varsa neoplazi açısından sitoloji yapılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Drenaj tedavinin temelidir
- ✓ Tekrarlıyorsa sakkülektomi
- ✓ Sert kitlede neoplaziyi düşünün

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Cerrahi Kedi

Vaka 142 · Tekrarlayan tıkanma sonrası perineal üretrostomi kararı


Hasta
- Kedi
- 3 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Üçüncü kez idrar tıkanması

Öykü ve bağlam
- Sonda ile açılmış, diyet değiştirilmiş

Fiziksel muayene
- Penis ucunda ödem ve travma

Ek bulgular
- İdrar kültürü negatif
- Retrograd üretrografide distal üretrada darlık



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Perineal üretrostomi hangi durumlarda önerilir?
2. Ameliyat sonrası hangi komplikasyonlar görülür?
3. Bu cerrahi sistiti tedavi eder mi?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Distal üretra darlığı
- Üretral tıkaç
- Ürolit

Yorumlu çözüm
Medikal tedaviye rağmen tekrarlayan obstrüksiyon veya distal üretra darlığında perineal üretrostomi ile geniş pelvik üretra açılır. Komplikasyonlar arasında darlık, idrar yolu enfeksiyonu ve idrar sızıntısı bulunur. Cerrahi altta yatan idiyopatik sistiti tedavi etmez; stres ve su yönetimi sürdürülmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Tekrarlayan tıkanmada cerrahi düşünülür
- ✓ Darlık en önemli komplikasyondur
- ✓ Sistit yönetimi devam eder

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Cerrahi | Köpek

Vaka 143 · Splenektomi sonrası ventriküler aritmi


Hasta
- Köpek
- 7 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Ameliyat sonrası düzensiz nabız

Öykü ve bağlam
- Dalak kitlesi nedeniyle splenektomi yapılmış

Fiziksel muayene
- Nabız açığı
- Hafif hipotansiyon

Ek bulgular
- EKG: hızlı ventriküler taşikardi atakları
- Laktat hafif yüksek



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Splenektomi sonrası neden aritmi görülür?
2. Hangi durumda antiaritmik verilir?
3. Ağrı ve elektrolitlerin rolü nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Postoperatif ventriküler aritmi
- Hipokalemi
- Kardiyak metastaz

Yorumlu çözüm
Dalak ve GDV cerrahileri sonrası ventriküler aritmiler sıktır; miyokardiyal iskemi, ağrı, elektrolit bozuklukları ve sistemik inflamasyon katkıda bulunur. Hız çok yüksekse veya perfüzyon bozuluyorsa lidokain ile tedavi edilir. Ağrı, potasyum ve magnezyum düzeltilmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Önce ağrı ve elektrolitleri düzeltin
- ✓ Perfüzyon bozuluyorsa lidokain
- ✓ EKG ile 24-48 saat izleyin

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Gebelik | Köpek

Vaka 144 · Çiftleşme sonrası gebelik tanısı ve yavru sayısı


Hasta
- Köpek
- 3 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Gebelik kontrolü

Öykü ve bağlam
- Çiftleşme 28 gün önce

Fiziksel muayene
- Karın palpasyonunda uterusta şişlikler

Ek bulgular
- Ultrasonda kalp atışı olan embriyolar



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Gebelik tanısı hangi günden itibaren güvenilirdir?
2. Yavru sayısı için hangi yöntem daha doğrudur?
3. Gebelikte hangi aşılar/ilaçlar önemlidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Normal gebelik
- Psödogebelik
- Piyometra

Yorumlu çözüm
Köpekte ultrasonla gebelik yaklaşık 25. günden itibaren güvenle teşhis edilir; kalp atışları canlılığı gösterir. Yavru sayısını en doğru şekilde, iskeletler mineralize olduktan sonra (yaklaşık 45. gün) çekilen röntgen verir. Gebelik boyunca ilaçlar dikkatle seçilmeli, beslenme son trimesterde artırılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Ultrason ~25. günden itibaren
- ✓ Yavru sayısı için 45. gün sonrası röntgen
- ✓ İlaç seçiminde dikkatli olun

Gebelik | Köpek

Vaka 145 · Kızgınlıktan 2 ay sonra süt gelmesi ve yuvalama davranışı


Hasta
- Köpek
- 5 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Memelerde süt
- Oyuncakları sahiplenme, yuva yapma

Öykü ve bağlam
- Çiftleşme yok
- Kısırlaştırılmamış

Fiziksel muayene
- Meme bezlerinde büyüme ve süt
- Genel durum iyi

Ek bulgular
- Ultrason: uterus boş, gebelik yok



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Psödogebelik neden olur?
2. Tedavi gerekli midir?
3. Memeyi uyarmanın etkisi nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Psödogebelik
- Gebelik
- Mastit

Yorumlu çözüm
Diöstrus sonunda progesteron düşüp prolaktin yükselince psödogebelik gelişir; gebeliğe benzer fiziksel ve davranışsal belirtiler görülür. Çoğu olgu kendiliğinden geçer. Memeyi yalamak ve sağmak süt üretimini artırır; yaka önerilir. Belirgin olgularda prolaktin inhibitörleri (kabergolin) kullanılabilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Psödogebelik fizyolojiktir
- ✓ Memeyi uyarmaktan kaçının
- ✓ Gerekirse kabergolin

Gebelik | Kedi

Vaka 146 · Gebeliğin son haftasında kasılmalar ve halsizlik


Hasta
- Kedi
- 2 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Halsizlik
- Titreme
- Huzursuzluk

Öykü ve bağlam
- Doğuma bir hafta kalmış
- Kalabalık batın (çok yavru)

Fiziksel muayene
- Tremor
- Hipertermi
- Taşikardi

Ek bulgular
- İyonize kalsiyum: 0,8 mmol/L (düşük)
- Glukoz normal



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Eklampsi en sık ne zaman görülür?
2. Acil tedavi nedir?
3. Kalsiyum verirken neler izlenmeli?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hipokalsemi (eklampsi)
- Hipoglisemi
- Epilepsi

Yorumlu çözüm
Eklampsi çoğunlukla laktasyonun ilk haftalarında görülür, ancak gebeliğin sonunda da gelişebilir; kalsiyum ihtiyacının karşılanamamasından kaynaklanır. Tedavi yavaş IV kalsiyum glukonattır; infüzyon sırasında EKG ve kalp hızı izlenir (bradikardi, aritmi). Kalsiyum takviyesi oral olarak sürdürülür.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kalsiyumu yavaş ve EKG ile verin
- ✓ Laktasyonun ilk haftaları en riskli
- ✓ Gebelikte rastgele kalsiyum takviyesi önerilmez

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Gebelik | Köpek

Vaka 147 · Gebelikte vajinal akıntı ve yavru kaybı


Hasta
- Köpek
- 4 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Yeşil-kahverengi vajinal akıntı
- Ateş

Öykü ve bağlam
- Gebeliğin 40. günü

Fiziksel muayene
- Ateş: 39,9 °C
- Karın palpasyonunda hassasiyet

Ek bulgular
- Ultrason: bazı fetüslerde kalp atışı yok
- Brucella canis serolojisi pozitif



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Gebelik kaybının enfeksiyöz nedenleri nelerdir?
2. Brucella canis neden önemlidir?
3. Kennel yönetiminde neler yapılmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Brucella canis'e bağlı abort
- Kanin herpesvirüs
- Hormonal (luteal yetmezlik)

Yorumlu çözüm
Gebelik ortasında akıntı ve fetal ölüm enfeksiyöz nedenleri düşündürür; Brucella canis köpeklerde abort ve infertilitenin önemli nedenidir ve zoonotiktir. Tedavi zordur ve enfeksiyon kalıcı olabilir. Pozitif hayvanlar damızlıktan çıkarılmalı, kennel taranmalı ve insan sağlığı açısından önlem alınmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Brucella canis zoonotiktir
- ✓ Pozitifler damızlıktan çıkarılır
- ✓ Tüm kennel taranmalı

Doğum | Köpek

Vaka 148 · Normal doğumun takibi: ne zaman müdahale edilmeli?


Hasta
- Köpek
- 3 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Doğum başladı, sahip endişeli

Öykü ve bağlam
- Rektal ısı 12 saat önce 37 °C'ye düşmüş

Fiziksel muayene
- Aralıklı kasılmalar
- Yeşil akıntı (ilk yavrudan önce değil, sonra)

Ek bulgular
- Ultrason: fetal kalp hızları > 180/dk



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Normal doğumun evreleri nelerdir?
2. Hangi süreler müdahale gerektirir?
3. Fetal kalp hızı neyi gösterir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Normal doğum
- Distosi
- Primer uterus atonisi

Yorumlu çözüm
Rektal ısının düşmesi genellikle 24 saat içinde doğumu müjdeler. Güçlü ıkınmaya rağmen 30-60 dakikada yavru gelmemesi, yavrular arasında 2-4 saatten uzun ara veya yavrudan önce yeşil akıntı müdahale gerektirir. Fetal kalp hızının 150-160/dk altına düşmesi fetal stresi gösterir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Isı düşüşü doğumun habercisidir
- ✓ Süreleri sahibe öğretin
- ✓ Fetal kalp hızı stresi gösterir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Distosi | Köpek

Vaka 149 · 1 saattir güçlü ıkınan ama yavru doğurmayan köpek


Hasta
- Köpek
- 5 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Güçlü ıkınma
- Vulvada yavru görünüp ilerlemiyor

Öykü ve bağlam
- İlk doğum
- Bulldog ırkı

Fiziksel muayene
- Vajinal muayenede büyük yavru başı, doğum kanalı dar

Ek bulgular
- Ultrason: kalan fetüslerde kalp hızı 140/dk



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Distosinin anne ve fetus kaynaklı nedenleri nelerdir?
2. Oksitosin ne zaman kontrendikedir?
3. Sezaryen kararı nasıl verilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Obstrüktif distosi (fetopelvik uyumsuzluk)
- Uterus atonisi
- Fetal malpozisyon

Yorumlu çözüm
Brakisefalik ırklarda büyük başlı yavrular ve dar pelvis nedeniyle obstrüktif distosi sıktır. Obstrüksiyon varken oksitosin verilmez; uterus rüptürü riski vardır. Fetal stres bulguları ve ilerlemeyen doğumda sezaryen yapılır; anestezide fetusa geçen ilaçlar en aza indirilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Obstrüksiyonda oksitosin vermeyin
- ✓ Brakisefaliklerde planlı sezaryen düşünülebilir
- ✓ Fetal stres sezaryen nedenidir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Distosi | Kedi

Vaka 150 · İki yavru doğduktan sonra kasılmaları duran kedi


Hasta
- Kedi
- 4 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Doğum durmuş (4 saattir)
- Kedi sakin, ıkınmıyor

Öykü ve bağlam
- İki yavru sağlıklı doğmuş

Fiziksel muayene
- Karında palpe edilen fetüsler
- Doğum kanalı açık, obstrüksiyon yok

Ek bulgular
- İyonize kalsiyum normal
- Röntgen: 2 fetüs, normal pozisyon



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Sekonder uterus atonisi nedir?
2. Medikal müdahale ne zaman uygundur?
3. Ne zaman sezaryen gerekir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Sekonder uterus atonisi
- Obstrüktif distosi
- Primer atoni

Yorumlu çözüm
Doğumun ortasında kasılmaların durması ve obstrüksiyon olmaması uterus yorgunluğuna bağlı sekonder atoniyi düşündürür. Obstrüksiyon dışlandıktan sonra düşük doz oksitosin (gerekirse kalsiyum ile) denenebilir. Yanıt yoksa veya fetal stres varsa sezaryen yapılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Önce obstrüksiyonu dışlayın
- ✓ Düşük doz oksitosin denenebilir
- ✓ Yanıt yoksa sezaryen

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Distosi | Sığır

Vaka 151 · İlk doğumunu yapan düvede güç doğum


Hasta
- Sığır
- 2 yaş
- Dişi (düve)

Başvuru nedeni
- 2 saattir ıkınma
- Su kesesi patlamış, buzağı gelmiyor

Öykü ve bağlam
- Büyük boyutlu boğa ile tohumlanmış

Fiziksel muayene
- Vajinal muayenede iki ön ayak ve baş, ancak çok büyük buzağı
- Pelvik kanal dar

Ek bulgular
- Buzağı canlı (refleksler mevcut)



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Fetopelvik uyumsuzluk nasıl değerlendirilir?
2. Zorla çekmenin riskleri nelerdir?
3. Ne zaman sezaryen tercih edilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Fetopelvik uyumsuzluk
- Fetal malpozisyon
- Uterus torsiyonu

Yorumlu çözüm
Düvelerde büyük buzağı ile dar pelvis fetopelvik uyumsuzluğa yol açar. Yeterli kayganlaştırıcı ve kontrollü çekme ilerleme sağlamıyorsa zorlamak anne ve buzağıda ciddi yaralanmalara neden olur; canlı buzağıda sezaryen tercih edilir. Önlem için düvelere kolay doğum yapan boğa seçilmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Zorla çekme yaralanma yapar
- ✓ Canlı buzağıda sezaryen
- ✓ Boğa seçimi önleyicidir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Puerperyum | Köpek

Vaka 152 · Doğumdan bir hafta sonra ateş ve kötü kokulu akıntı


Hasta
- Köpek
- 4 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Kötü kokulu, koyu vajinal akıntı
- Yavruları emzirmek istememe

Öykü ve bağlam
- Bir yavru ölü doğmuş

Fiziksel muayene
- Ateş: 40,2 °C
- Dehidratasyon
- Uterus palpasyonda büyük

Ek bulgular
- Ultrason: uterusta sıvı ve plasenta kalıntısı
- Nötrofili



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Normal lohia ile metrit nasıl ayrılır?
2. Tedavide neler yapılır?
3. Yavrular nasıl korunur?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Akut postpartum metrit
- Plasenta retansiyonu
- Mastit

Yorumlu çözüm
Normal lohia kokusuz, koyu yeşil-kırmızı renkte ve birkaç hafta sürebilir. Ateş, kötü kokulu akıntı ve sistemik hastalık akut metriti gösterir; fetus veya plasenta kalıntısı risk faktörüdür. Sıvı, antibiyotik ve uterus boşaltımı uygulanır; ağır olgularda ovariohisterektomi gerekebilir. Yavruların beslenmesi desteklenmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kötü koku ve ateş = metrit
- ✓ Kalıntıları araştırın
- ✓ Yavruların beslenmesini destekleyin

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Puerperyum | Kedi

Vaka 153 · Emziren kedide sert, sıcak ve ağrılı meme

Hasta

- Kedi
- 3 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni

- Bir memede şişlik
- Yavrulara emzirmek istememe

Öykü ve bağlam


- Yavrular 2 haftalık

Fiziksel muayene

- Bir meme bezi sıcak, sert, mor renkli
- Ateş

Ek bulgular

- Süt sitolojisi: dejenere nötrofiller ve bakteri



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları

1. Mastitin sistemik bulguları nelerdir?
2. Yavrular emmeye devam edebilir mi?
3. Antibiyotik seçiminde neye dikkat edilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar

- Septik mastit
- Galaktostaz
- Meme tümörü

Yorumlu çözüm

Emziren kedide sıcak, sert ve ağrılı meme ile ateş septik mastiti gösterir. Hafif olgularda yavrular emmeye devam edebilir; gangrenli veya apseli memede yavrular uzak tutulur. Süte geçişi güvenli olan antibiyotikler (örneğin amoksisilin-klavulanat) seçilir; sıcak kompres ve ağrı kontrolü yapılır.

Akılda tutulacak noktalar

- ✓ Gangrenli memeden yavru emzirilmez
- ✓ Antibiyotik süte geçişe göre seçilir
- ✓ Ağrı kontrolü önemlidir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Puerperyum | Sığır

Vaka 154 · Doğumdan sonra yatar hâlde kalkamayan süt ineği


Hasta
- Sığır
- 5 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Doğumdan 12 saat sonra kalkamama
- İştahsızlık

Öykü ve bağlam
- Yüksek verimli süt ineği
- Üçüncü laktasyon

Fiziksel muayene
- Soğuk kulaklar
- Başı böğrüne dönük (S şekli)
- Rumen hareketleri azalmış

Ek bulgular
- Serum kalsiyumu: 5,0 mg/dL (düşük)



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Doğum felcinin mekanizması nedir?
2. IV kalsiyum verirken nelere dikkat edilir?
3. Önleme stratejileri nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Hipokalsemi (süt humması)
- Hipomagnezemi
- Doğum sonu sinir hasarı

Yorumlu çözüm
Doğumla birlikte süt üretiminin başlaması kalsiyum ihtiyacını hızla artırır; yüksek verimli ineklerde hipokalsemi (süt humması) gelişir. Tedavide yavaş IV kalsiyum verilir ve kalp oskülte edilerek aritmi izlenir. Önlemede kuru dönemde negatif DCAD rasyonu ve doğum sonrası oral kalsiyum kullanılır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kalsiyumu yavaş verin, kalbi dinleyin
- ✓ Yüksek verim risk faktörüdür
- ✓ Kuru dönem rasyonu önleyicidir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Neonatoloji | Köpek

Vaka 155 · Göbek fıtığı olan yavru köpek


Hasta
- Köpek
- 2 aylık
- Erkek

Başvuru nedeni
- Göbek bölgesinde şişlik
- Ağrı yok

Öykü ve bağlam
- Doğumdan beri var
- Elle geri itilebiliyor
- Annede de göbek fıtığı öyküsü

Fiziksel muayene
- Göbekte yumuşak, ağrısız şişlik
- Fıtık halkası parmak ucu genişliğinde

Ek bulgular
- Gastrointestinal belirtiler yok
- Genel durum iyi



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Redüktabl fıtığın anlamı nedir?
2. Fıtık halkasının boyutu neden önemlidir?
3. Cerrahi olarak ne zaman gerçekleştirilebilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Umbilikal fıtık
- Umbilikal apse
- Omfalosel

Yorumlu çözüm
Küçük bir umbilikal kese ve redükte edilebilir bir fıtık bazen kendiliğinden kapanabilir; bu sebeple ağrı yoksa ve büyüme ile birlikte izlenebilir. Bununla birlikte ağrı, redükte edilememe veya karın içi organların sıkışma riski cerrahi müdahale gerektirir. Fıtığın büyüklüğü ve evrimi değerlendirilerek tercih edilen tedavi planı belirlenir; genellikle kısırlaştırma ile aynı anda onarılır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Redükte edilebilir ve redükte edilemez fıtıkları ayırt edin
- ✓ Ağrının değişimini değerlendirin
- ✓ Sadece fıtığa değil, tüm hastaya bakın

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Neonatoloji | Köpek

Vaka 156 · Emmeyen, soğuk ve sürekli ağlayan yeni doğan yavru


Hasta
- Köpek
- 3 günlük
- Dişi

Başvuru nedeni
- Emmeme
- Sürekli ağlama
- Kardeşlerinden ayrı durma

Öykü ve bağlam
- Batında 7 yavru
- Anne iyi bakıyor

Fiziksel muayene
- Vücut ısısı: 34,5 °C
- Emme refleksi zayıf
- Dehidratasyon

Ek bulgular
- Glukoz: 45 mg/dL



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Yeni doğanda hipotermi ve hipoglisemi neden kısır döngü yaratır?
2. Neden soğuk yavru beslenmemelidir?
3. Isıtma nasıl yapılmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Solgun yavru (fading puppy) sendromu
- Neonatal sepsis
- Konjenital anomali

Yorumlu çözüm
Yeni doğan yavrular ısılarını düzenleyemez; hipotermi emmeyi ve sindirimi durdurur, hipoglisemi gelişir. Hipotermik yavru beslenirse ileus ve aspirasyon gelişebilir; önce yavaşça (birkaç saatte) ısıtılır, ardından glukoz ve beslenme verilir. Sepsis ve konjenital anomaliler araştırılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Önce ısıt, sonra besle
- ✓ Yavaş ısıtma güvenlidir
- ✓ Günlük tartım erken uyarı verir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Neonatoloji | Kedi

Vaka 157 · Doğumdan sonra hızla zayıflayan ve sarılık gelişen yavru kedi


Hasta
- Kedi
- 2 günlük
- Erkek

Başvuru nedeni
- Emmeyi bırakma
- İdrarı koyu kırmızı
- Kuyruk ucunda nekroz

Öykü ve bağlam
- Anne B kan grubu, baba A
- İlk günden itibaren emiyor

Fiziksel muayene
- İkter
- Halsizlik

Ek bulgular
- Şiddetli hemolitik anemi
- Anne kan grubu: B, yavru: A



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Neonatal izoeritroliz nasıl gelişir?
2. Hangi ırklar risklidir?
3. Önleme nasıl yapılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Neonatal izoeritroliz
- Neonatal sepsis
- Konjenital anomali

Yorumlu çözüm
B kan grubu annenin kolostrumundaki anti-A antikorları, A grubu yavruların eritrositlerini yok eder. Belirtiler ilk günlerde başlar: hemoglobinüri, ikter, kuyruk nekrozu ve ölüm. Risk taşıyan yavrular ilk 24-48 saat anneden emzirilmemeli, mama ile beslenmelidir. Çiftleştirme öncesi kan grubu tayini önleyicidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ B anne + A yavru = risk
- ✓ İlk 24-48 saat kolostrum verilmemeli
- ✓ Çiftleştirmeden önce kan grubu belirleyin

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Neonatoloji | Köpek

Vaka 158 · Burnundan süt gelen yavru köpek


Hasta
- Köpek
- 10 günlük
- Erkek

Başvuru nedeni
- Emerken burundan süt gelmesi
- Kilo alamama

Öykü ve bağlam
- Kardeşleri normal

Fiziksel muayene
- Sert damakta yarık
- Takipne

Ek bulgular
- Toraks röntgeni: kranioventral akciğerde aspirasyon bulguları



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Damak yarığı nasıl tanınır?
2. Aspirasyon pnömonisi riski neden yüksektir?
3. Beslenme ve cerrahi planı nasıl olmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Konjenital damak yarığı
- Aspirasyon pnömonisi
- Megaözofagus

Yorumlu çözüm
Emerken burundan süt gelmesi damak yarığını düşündürür; ağız muayenesinde görülür. Süt hava yollarına kaçtığı için aspirasyon pnömonisi sık görülür. Yavru sonda ile beslenir ve büyüdükten sonra (genellikle 3-4 aylıkken) cerrahi onarım planlanır. Kalıtsal olabileceği için damızlıkta dikkate alınmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Her yeni doğanda damağı kontrol edin
- ✓ Sonda ile beslenme hayat kurtarır
- ✓ Cerrahi büyümeden sonra

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Neonatoloji | Buzağı

Vaka 159 · Kolostrum alıp almadığı bilinmeyen halsiz buzağı


Hasta
- Buzağı
- 2 günlük
- Erkek

Başvuru nedeni
- Emmeme
- Halsizlik

Öykü ve bağlam
- Gece doğmuş, ilk saatler gözlenmemiş

Fiziksel muayene
- Dehidratasyon
- Göbek kordonu ıslak ve şiş

Ek bulgular
- Serum total protein: 4,6 g/dL
- Brix refraktometre: %7,5



II KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Pasif transfer yetmezliği nasıl tanımlanır?
2. Kolostrum yönetiminde 'zaman, miktar, kalite' ne anlama gelir?
3. Göbek enfeksiyonu neden önemlidir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Pasif bağışıklık transferi yetmezliği ve omfalit
- Neonatal sepsis
- Neonatal ishal

Yorumlu çözüm
Buzağılar antikorları sadece kolostrumla alır; ilk 2-6 saatte yeterli miktarda kaliteli kolostrum verilmezse pasif transfer yetmezliği gelişir. Düşük serum total protein veya Brix değeri bunu gösterir. Omfalit ve sepsis riski artar; plazma transfüzyonu, antibiyotik ve göbek bakımı uygulanır. Kolostrum protokolü sürüde gözden geçirilmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ İlk 2-6 saat kritik
- ✓ Brix ile transferi ölçün
- ✓ Göbek dezenfeksiyonu rutin olmalı

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Neonatoloji | Kuzu

Vaka 160 · İshal ve dehidratasyon gelişen kuzu

Hasta
- Kuzu
- 1 haftalık
- Dişi

Başvuru nedeni
- Sulu ishal
- Emmeyi bırakma

Öykü ve bağlam
- Kalabalık ağıl
- Diğer kuzularda da ishal

Fiziksel muayene
- Dehidratasyon (%10)
- Hipotermi

Ek bulgular
- Dışkı testi: Cryptosporidium pozitif
- Metabolik asidoz



KUZU

Vaka 160

KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Neonatal ishalin sık etkenleri nelerdir?
2. Sıvı tedavisi nasıl planlanır?
3. Sürü yönetiminde neler yapılmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Kriptosporidiyoz
- E. coli enteriti
- Rotavirüs enteriti

Yorumlu çözüm
Kalabalık ve kirli ortamda yeni doğan kuzularda ishal sıklıkla Cryptosporidium, E. coli, rota ve koronavirüslerden kaynaklanır. Tedavinin temeli dehidratasyon ve asidozun düzeltilmesidir: oral veya IV sıvı ve bikarbonat. Emzirme sürdürülür. Hijyen, kolostrum yönetimi ve hasta hayvanların ayrılması salgını kontrol eder; Cryptosporidium zoonotiktir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Sıvı ve asidoz düzeltmesi temeldir
- ✓ Emzirmeyi kesmeyin
- ✓ Cryptosporidium zoonotiktir

Cerrahi | Köpek

Vaka 161 · Kısırlaştırma sonrası idrar kaçırma


Hasta
- Köpek
- 6 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Uyurken idrar kaçırma

Öykü ve bağlam
- 2 yıl önce kısırlaştırılmış
- Büyük ırk

Fiziksel muayene
- Muayene normal
- Perineal bölge idrarla ıslak

Ek bulgular
- İdrar tahlili ve kültür normal
- Ultrason normal



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kısırlaştırma sonrası inkontinans mekanizması nedir?
2. Hangi tetkikler diğer nedenleri dışlar?
3. Medikal tedavi seçenekleri nelerdir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Üretral sfinkter yetmezliği
- İdrar yolu enfeksiyonu
- Ektopik üreter

Yorumlu çözüm
Kısırlaştırılmış büyük ırk dişilerde uyurken idrar kaçırma üretral sfinkter yetmezliğini düşündürür; östrojen azalması sfinkter tonusunu düşürür. Enfeksiyon, poliüri ve anatomik anomaliler dışlanmalıdır. Tedavide fenilpropanolamin veya östriol kullanılır; dirençli olgularda cerrahi veya enjeksiyon yöntemleri vardır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Uyurken kaçırma tipiktir
- ✓ Önce enfeksiyonu dışlayın
- ✓ Fenilpropanolamin etkilidir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Cerrahi · Köpek

Vaka 162 · Perineal bölgede şişlik ve dışkılama güçlüğü olan kısırlaştırılmamış köpek


Hasta
- Köpek
- 10 yaş
- Erkek

Başvuru nedeni
- Dışkılamada zorlanma
- Anüs yanında şişlik

Öykü ve bağlam
- Kısırlaştırılmamış
- Kronik kabızlık

Fiziksel muayene
- Rektal muayenede pelvik diyafram zayıflığı, rektumda kese
- Prostat büyük

Ek bulgular
- Ultrason: fıtık içinde mesane yok



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Perineal fıtığın risk faktörleri nelerdir?
2. Mesane fıtık içine girerse ne olur?
3. Cerrahi tedavide neler yapılır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Perineal fıtık
- Perianal tümör
- Anal kese hastalığı

Yorumlu çözüm
Kısırlaştırılmamış yaşlı erkek köpeklerde pelvik diyafram kaslarının zayıflaması perineal fıtığa yol açar; prostat büyümesi ve kronik ıkınma risk faktörüdür. Mesanenin fıtığa girmesi idrar tıkanmasına neden olur ve acildir. Tedavi fıtık onarımı (internal obturator kas flebi) ve kastrasyondur.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kısırlaştırılmamış yaşlı erkek risk altında
- ✓ Mesane fıtıklaşırsa acil
- ✓ Kastrasyon tedavinin parçasıdır

Gebelik | Koyun

Vaka 163 · Gebeliğin sonunda körlük, sendeleme ve yatma

Hasta
- Koyun
- 4 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Sürüden ayrılma
- Görme kaybı, dişleri gıcırdatma
- Yatıp kalkamama

Öykü ve bağlam
- İkiz gebelik
- Kış, yem kalitesi düşük

Fiziksel muayene
- Nefeste aseton kokusu
- Bilinç bulanıklığı

Ek bulgular
- Kan beta-hidroksibütirat: 3,5 mmol/L (yüksek)
- Glukoz düşük



KOYUN

Vaka 163

KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Gebelik toksemisi neden ikiz gebelikte sıktır?
2. Tedavide neler yapılır?
3. Sürüde nasıl önlenir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Gebelik toksemisi (ketoz)
- Hipokalsemi
- Listeriyoz

Yorumlu çözüm
Gebeliğin son haftalarında ikiz veya üçüz kuzular yüksek enerji gerektirir; yetersiz beslenmede yağ mobilizasyonu ketozise yol açar. Tedavide oral propilen glikol, IV glukoz ve kalsiyum desteği verilir; ağır olgularda sezaryen veya doğum indüksiyonu düşünülür. Önlemde son trimesterde enerji yoğun yem ve kondisyon izlemi önemlidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ İkiz gebelik risk faktörüdür
- ✓ Propilen glikol ilk tedavidir
- ✓ Son trimester beslenmesi önleyicidir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Doğum · At

Vaka 164 · Doğumdan sonra 3 saat geçmesine rağmen düşmeyen eş (plasenta)


Hasta
- At
- 8 yaş
- Kısrak

Başvuru nedeni
- Plasenta düşmedi
- Kısrak huzursuz

Öykü ve bağlam
- Normal doğum, sağlıklı tay

Fiziksel muayene
- Vulvadan sarkan plasenta parçası
- Ateş yok

Ek bulgular
- Plasenta kontrol edilmemiş



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kısrakta plasenta retansiyonu neden acildir?
2. Doğan plasenta neden incelenmelidir?
3. Hangi komplikasyonlar gelişebilir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Plasenta retansiyonu
- Uterus atonisi
- Uterus yırtığı

Yorumlu çözüm
Kısrakta plasentanın 3 saat içinde düşmemesi retansiyon olarak kabul edilir ve acildir; metrit, sepsis ve laminit gelişebilir. Tedavide oksitosin uygulanır, gerekirse uterus lavajı yapılır; plasenta zorla çekilmez. Doğan plasenta eksik parça (özellikle boynuz ucu) açısından mutlaka incelenmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ 3 saat kuralı
- ✓ Plasentayı zorla çekmeyin
- ✓ Laminit riskini izleyin

Neonatoloji | Tay

Vaka 165 · Ayağa kalkamayan ve emmeyen yeni doğan tay


Hasta
- Tay
- 1 günlük
- Erkek

Başvuru nedeni
- Doğumdan sonra kalkmaya çalışmama
- Emme refleksi zayıf

Öykü ve bağlam
- Uzun süren doğum

Fiziksel muayene
- Anne ile ilgisizlik
- Amaçsız hareketler, emme refleksi kayıp

Ek bulgular
- IgG: < 400 mg/dL
- Glukoz düşük



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Tayın normal ilk saatleri nasıl olmalı?
2. Neonatal maladjüstman sendromu nedir?
3. IgG neden ölçülür?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Neonatal maladjüstman (hipoksik) sendromu
- Neonatal sepsis
- Pasif transfer yetmezliği

Yorumlu çözüm
Sağlıklı tay 1 saat içinde ayağa kalkar ve 2 saat içinde emer. Zor doğum sonrası anneye ilgisizlik ve emme refleksi kaybı hipoksiye bağlı neonatal maladjüstman sendromunu düşündürür. Destekleyici tedavi, beslenme, ısı ve gerekirse plazma ile IgG desteği verilir; sepsis araştırılmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ 1-2-3 kuralı: kalk, em, eşi at
- ✓ Düşük IgG plazma gerektirir
- ✓ Sepsisi dışlayın

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Cerrahi | Tavşan

Vaka 166 · Kısırlaştırılmamış tavşanda vajinal kanama

Hasta
- Tavşan
- 5 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- İdrarda kan gibi görünen akıntı
- Karında kitle

Öykü ve bağlam
- Kısırlaştırılmamış

Fiziksel muayene
- Karın palpasyonunda büyük, düzensiz uterus

Ek bulgular
- Ultrason: uterusta kitleler
- Toraks röntgeni metastaz için normal



TAVŞAN

Vaka 166

KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Kısırlaştırılmamış tavşanlarda en sık uterus hastalığı nedir?
2. Hematüri gerçekten idrardan mı geliyor?
3. Tedavi ve önleme nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Uterus adenokarsinomu
- Endometrial hiperplazi
- Ürolitiazis

Yorumlu çözüm
Yaşlı, kısırlaştırılmamış dişi tavşanlarda uterus adenokarsinomu çok sıktır; kanama sıklıkla idrara karıştığı için hematüri sanılır. Erken dönemde ovariohisterektomi tedavi edicidir; akciğer metastazı araştırılmalıdır. Dişi tavşanların genç yaşta kısırlaştırılması önerilir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Tavşanda uterus tümörü çok sıktır
- ✓ Gerçek hematüri ile uterus kanamasını ayırın
- ✓ Erken kısırlaştırma koruyucudur

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Cerrahi | Köpek

Vaka 167 · Kızgınlıktan sonra vulvadan çıkan kitle


Hasta
- Köpek
- 5 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Vulvadan sarkan pembe doku

Öykü ve bağlam
- Kızgınlık döneminde
- Kısırlaştırılmamış

Fiziksel muayene
- Vajen tabanından kaynaklanan ödemli doku, üretra açıklığı korunmuş

Ek bulgular
- Sitoloji: inflamasyon, neoplazi yok



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Vajinal hiperplazinin hormonal nedeni nedir?
2. Neoplaziden nasıl ayrılır?
3. Tedavi ve tekrar riski nedir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Vajinal hiperplazi (prolapsus)
- Vajinal tümör (leiyomiyom)
- Vajen prolapsusu

Yorumlu çözüm
Kızgınlık sırasında östrojene aşırı yanıt vajen tabanında ödemli doku büyümesine yol açar. Doku nemli ve korunmalı tutulmalı, idrar yapabildiği kontrol edilmelidir. Kızgınlık bitince genellikle geriler; tekrarı önlemek için ovariohisterektomi önerilir. Yaşlı hastada kitle tümör açısından değerlendirilmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Östrojen bağımlıdır
- ✓ Dokuyu nemli tutun
- ✓ Kısırlaştırma tekrarı önler

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Neonatoloji | Köpek

Vaka 168 · Yavruda göz kapakları açılmadan şişlik ve akıntı


Hasta
- Köpek
- 3 haftalık
- Erkek

Başvuru nedeni
- Kapalı göz kapağı altında şişlik

Öykü ve bağlam
- Kardeşlerin gözleri açılmış

Fiziksel muayene
- Göz kapağı altında dalgalanan şişlik
- Kapak kenarından pürülan sızıntı

Ek bulgular
- Sitoloji: nötrofiller ve kokoid bakteriler



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Neonatal oftalmi neden acildir?
2. Göz kapağı nasıl açılır?
3. Kornea neden risk altındadır?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Neonatal konjonktivit (oftalmia neonatorum)
- Dermoid
- Göz kapağı anomalisi

Yorumlu çözüm
Göz kapakları açılmadan önce biriken irin korneaya zarar verebilir ve kör bırakabilir. Kapaklar medial köşeden nazikçe ayrılır, irin temizlenir ve sık aralıklarla topikal antibiyotik uygulanır. Annenin ve yuvanın hijyeni gözden geçirilmelidir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kapalı kapak altında irin acildir
- ✓ Kapakları nazikçe açın
- ✓ Yuva hijyeni önemlidir

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Gebelik | Kedi

Vaka 169 · Gebeliğin 50. gününde karın büyümesi duran kedi


Hasta
- Kedi
- 3 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Karın küçülmüş
- İştah değişikliği

Öykü ve bağlam
- Gebelik ultrasonla 25. günde doğrulanmış

Fiziksel muayene
- Ateş yok
- Vulvadan akıntı yok

Ek bulgular
- Ultrason: fetal kalp atışı yok, fetal yapılarda mineralizasyon



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Fetal mumifikasyon nasıl oluşur?
2. Kalan fetuslar neden çıkarılmalı?
3. Gelecekteki gebelikler için ne yapılmalı?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Fetal ölüm ve mumifikasyon
- Fetal rezorpsiyon
- Psödogebelik

Yorumlu çözüm
Fetal ölümden sonra serviks kapalı kalır ve bakteri girmezse fetuslar sıvısını kaybederek mumifiye olur. Mumifiye fetuslar enfeksiyon ve kısırlık riski oluşturduğundan medikal yöntemlerle veya cerrahi olarak çıkarılır. Enfeksiyöz nedenler ve beslenme sorgulanmalıdır.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Kapalı serviks = mumifikasyon
- ✓ Fetuslar çıkarılmalı
- ✓ Nedeni araştırın

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Doğum | Sığır

Vaka 170 · Doğumdan sonra rahmin dışarı çıkması


Hasta
- Sığır
- 6 yaş
- Dişi

Başvuru nedeni
- Doğumdan hemen sonra vulvadan büyük kitle sarkması

Öykü ve bağlam
- Güç doğum ve hipokalsemi öyküsü

Fiziksel muayene
- Karunkullerin görüldüğü dışarıda uterus
- Taşikardi

Ek bulgular
- Kalsiyum düşük



KLİNİK DURAK · Çözüme geçmeden önce soruları yanıtlayın ve kendi hipotezlerinizi yazın.

Analiz soruları
1. Uterus prolapsusu neden acildir?
2. Yerine yerleştirme nasıl kolaylaştırılır?
3. Hangi komplikasyonlar izlenir?

Hipotezler ve ayırıcı tanılar
- Uterus prolapsusu
- Vajen prolapsusu
- Rektum prolapsusu

Yorumlu çözüm
Uterus prolapsusu doğum sonrası acil durumdur; kanama, şok ve uterus hasarı gelişebilir. Uterus temizlenip nemli ve korunmalı tutulur, epidural anestezi altında hayvan uygun pozisyona getirilerek yerine yerleştirilir; vulva geçici olarak dikilir. Kalsiyum, oksitosin ve antibiyotik verilir; kanama ve şok izlenir.

Akılda tutulacak noktalar
- ✓ Uterusu temiz ve nemli tutun
- ✓ Epidural yerleştirmeyi kolaylaştırır
- ✓ Hipokalsemiyi düzeltin

Yalnızca eğitim amaçlıdır