СПАСЕТЕ ЗАСЕДНАЛИЯ СЛУЧАЙ™ · БОНУС 2

Спешни ситуации: счупен брекет, бодяща дъга, счупен апарат

25 спешни ситуации между контролите: оценка, протокол и готов текст за пациента.

Библията на ортодонта

Съдържание

Първите 60 секунди при спешна ситуация

Индекс на 25-те ситуации

1 · Брекет, тубус и пръстен

2 · Дъга и лигатура

3 · Болка и меки тъкани

4 · Мини винт

5 · Апарат

6 · Ретенция и плака

7 · Травма и поглъщане

Формуляр за спешен запис

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Първите 60 секунди при спешна ситуация

При всяка спешна ситуация в същия ред: безопасност, причина, решение, запис.

1. **Безопасност:** Има ли дихателни проблеми, кървене, поглъщане или травма? Ако да, първо това.
2. **Какво се е счупило, какво боде?** Намерете частта и се уверете, че в устата не е останала свободна част.
3. **Пациентът в безопасност ли е?** Отстранете бодящата, търкащата се или свободната част.
4. **Причина?** Захапка, храна, залепване, дизайн на апарата. Отбележете.
5. **Решение:** коригирайте сега, оставете за следващия контрол или насочете.
6. **Запис:** Дата, ситуация, причина, извършена процедура и информация, дадена на пациента.

Ситуации, изискващи незабавно насочване

- Кашлица, задух или затруднено преглъщане при съмнение за поглъщане или аспирация
- Травма на зъб: луксация, фрактура, травма на челюстта
- Разпространяващ се оток, температура, секреция
- Кървене, което не спира

За текстовете към пациента

Попълнете полетата **[Име на пациента]**, **[Име на клиниката]** и **[Дата на часа]** в текстовете с Вашите данни. Текстовете са с информативна цел; изпращайте ги по канала, който използва Вашата клиника, и със свой стил.

ИНДЕКС

Индекс на 25-те ситуации

Намерете ситуацията, отидете на номера.

№	СИТУАЦИЯ	ГРУПА
01	Паднал брекет на фронтален зъб	Брекет, тубус и пръстен
02	Паднал брекет на дистален зъб	Брекет, тубус и пръстен
03	Разхлабване на моларен тубус или пръстен	Брекет, тубус и пръстен
04	Дисталният край на дъгата боде бузата	Дъга и лигатура
05	Излизане на дъгата от тубуса	Дъга и лигатура
06	Счупена дъга	Дъга и лигатура
07	Краят на лигатурната тел боде	Дъга и лигатура
08	Загуба на еластична лигатура или верижка	Дъга и лигатура
09	Разместване на отваряща пружина	Дъга и лигатура
10	Болка и чувствителност през първите дни	Болка и меки тъкани
11	Рана на бузата или устната	Болка и меки тъкани
12	Дразнене около мини винта	Мини винт
13	Подвижност или падане на мини винта	Мини винт
14	Разхлабен винт на RME или отлепен пръстен	Апарат
15	Прекъсване на транспалатиналната дъга	Апарат
16	Врастване на копчето на Nance в тъканта	Апарат
17	Счупен подвижен функционален апарат	Апарат
18	Прекъсване на връзката на фиксиран функционален апарат	Апарат
19	Дразнене на кожата или проблем с връзката на лицевата маска	Апарат

№	СИТУАЦИЯ	ГРУПА
20	Отлепване на фиксиран лингвален ретейнер	Ретенция и плака
21	Счупена или изгубена прозрачна шина или Essix	Ретенция и плака
22	Счупена плака на Hawley	Ретенция и плака
23	Паднал атачмънт при лечение с прозрачни шини	Ретенция и плака
24	Травма на зъб при пациент с брекети	Травма и поглъщане
25	Съмнение за погълната или изгубена част	Травма и поглъщане

ГРУПА 01

Брекет, тубус и пръстен

3 ситуации

СИТУАЦИЯ 01 Паднал брекет на фронтален зъб

Оценка: Брекетът виси ли на дъгата или е паднал напълно? Има ли увреждане на зъбната повърхност? Падането от захапковия контакт ли е?

ПРОТОКОЛ

1. Проверете дъгата и брекета; ако дъгата не боде, пациентът е в безопасност.
2. Отбележете причината за падането: захапка, храна, повърхност на залепване.
3. Залепете наново или планирайте за следващия контрол.
4. Ако на същия зъб брекетът пада отново, проверете захапковия контакт.

КАКВО ДА КАЖЕТЕ НА ПАЦИЕНТА

Уважаеми [Име на пациента], отлепването на брекет не е спешна ситуация. Брекетът може да остане на дъгата; ако не боде, не го пипайте. В [Име на клиниката] ще го залепим отново на контрола Ви на [Дата на часа]. Избягвайте твърди и лепкави храни.

Кога е спешно: оценете в същия ден, ако е съпроводено с фрактура на зъб или травма.

СИТУАЦИЯ 02 Паднал брекет на дистален зъб

Оценка: Върти ли се брекетът на премолара по дъгата, търка ли бузата?

ПРОТОКОЛ

1. Ако завъртян брекет търка бузата, временно го фиксирайте или свалете.
2. Проверете дъгата; боде ли дисталният край?
3. Планирайте повторно залепване.
4. Проверете захапковия контакт.

КАКВО ДА КАЖЕТЕ НА ПАЦИЕНТА

Уважаеми [Име на пациента], брекетът на задния Ви зъб може да се е отлепил. Ако търка бузата, поставете ортодонтски восък върху него. Ще го оправим на контрола на [Дата на часа].

Кога е спешно: ранен час при дълбока рана на бузата или риск от поглъщане.

СИТУАЦИЯ 03

Разхлабване на моларен тубус или пръстен

Оценка: Движи ли се пръстенът по зъба? Има ли задържане на храна под цимента?

ПРОТОКОЛ

1. Свалете пръстена, почистете зъба и оценете повърхността.
2. Циментирайте наново или изберете нов пръстен.
3. Ако има свързан апарат (TPA, RME), проверете целостта му.
4. Запишете разхлабването в дневника.

КАКВО ДА КАЖЕТЕ НА ПАЦИЕНТА

Уважаеми [Име на пациента], пръстенът на задния Ви зъб може да се е разхлабил. Почиствайте внимателно зоната, за да не се задържа храна. Препоръчително е да изтеглите часа си по-рано: [Дата на часа].

Кога е спешно: в същия ден, ако пръстенът е излязъл напълно и апаратът е свободен в устата.

ГРУПА 02

Дъга и лигатура

6 ситуации

СИТУАЦИЯ 04 Дисталният край на дъгата боде бузата

Оценка: Колко стърчи дъгата от тубуса? Удължила ли се е с движението на зъбите (при затваряне на пространството)?

ПРОТОКОЛ

1. Отрежете излишната дъга; затъпете края или го огънете и затворете.
2. Уверете се, че отрязаното парче не е останало в устата.
3. Проверете раната на бузата.
4. Ако пространството се затваря, отбележете да проверите отново на следващия контрол.

КАКВО ДА КАЖЕТЕ НА ПАЦИЕНТА

Уважаеми [Име на пациента], ако краят на дъгата боде бузата Ви, поставете ортодонтски восък върху него. Не режете дъгата сами. В [Име на клиниката] ще го оправим на [Дата на часа].

Кога е спешно: ранен час, ако телта е врасла в тъканта и има кървене.

СИТУАЦИЯ 05 Излизане на дъгата от тубуса

Оценка: Излязла ли е дъгата от тубуса, боде ли свободният край тъканта?

ПРОТОКОЛ

1. Поставете дъгата отново в тубуса.
2. Проверете причината за излизането: къса ли е дъгата, прекомерно ли е активирането?
3. При нужда сменете дъгата.
4. Ако има свободен край, затворете го.

КАКВО ДА КАЖЕТЕ НА ПАЦИЕНТА

Уважаеми [Име на пациента], дъгата може да е излязла от гнездото си на задния зъб. Ако боде, използвайте восък и не дърпайте дъгата. Вашият час: [Дата на часа].

Кога е спешно: ранен час, ако свободната тел причинява нараняване.

СИТУАЦИЯ 06 Счупена дъга

Оценка: Къде е счупена дъгата? Подвижна ли е счупената част, има ли риск от поглъщане?

ПРОТОКОЛ

1. Извадете счупените части.
2. Сменете дъгата.
3. Отбележете мястото на счупване; ако се повтаря — захапков контакт или умора на материала.
4. Проверете позицията на зъбите спрямо плана.

КАКВО ДА КАЖЕТЕ НА ПАЦИЕНТА

Уважаеми [Име на пациента], дъгата Ви може да е счупена. Ако частите се движат, не се опитвайте да ги вадите; използвайте восък и изтеглете часа си по-рано: [Дата на часа].

Кога е спешно: ако частта е изгубена и има съмнение за поглъщане, вижте Ситуация 25.

СИТУАЦИЯ 07 Краят на лигатурната тел боде

Оценка: Обърнат ли е краят на лигатурата към устната или бузата?

ПРОТОКОЛ

1. Скъсете края и го подгънете под брекета.
2. Проверете останалите лигатури.
3. Проверете раната.

КАКВО ДА КАЖЕТЕ НА ПАЦИЕНТА

Уважаеми [Име на пациента], ако краят на тънка тел боде устната Ви, поставете восък върху него. Ще го оправим на контрола: [Дата на часа].

Кога е спешно: обикновено не е спешно.

СИТУАЦИЯ 08 Загуба на еластична лигатура или верижка

Оценка: На кой зъб липсва лигатура? Излязла ли е дъгата от слота? Отворило ли се е пространство?

ПРОТОКОЛ

1. Подновете липсващите лигатури.
2. При загуба на верижка измерете пространството.
3. Ако загубите са чести, обсъдете хранителните навици.

КАКВО ДА КАЖЕТЕ НА ПАЦИЕНТА

Уважаеми [Име на пациента], едно от малките ластичета на зъбите Ви може да е паднало. Това не е спешна ситуация. Ще го подновим на контрола на [Дата на часа].

Кога е спешно: обикновено не е спешно.

СИТУАЦИЯ 09 Разместване на отваряща пружина

Оценка: Изместила ли се е пружината, притиска ли гингивата или бузата?

ПРОТОКОЛ

1. Върнете пружината на място или я свалете.
2. Проверете целта на отварянето на място; запазва ли се отвореното пространство?
3. Проверете стоповете на пружината.

КАКВО ДА КАЖЕТЕ НА ПАЦИЕНТА

Уважаеми [Име на пациента], пружината между зъбите Ви може да се е изместила. Ако Ви притеснява, използвайте восък. Вашият час: [Дата на часа].

Кога е спешно: ранен час, ако има врастване в гингивата и кървене.

ГРУПА 03

Болка и меки тъкани

2 ситуации

СИТУАЦИЯ 10 Болка и чувствителност през първите дни

Оценка: Ново активиране ли е? Болката в един зъб ли е или е дифузна?

ПРОТОКОЛ

1. Разграничете очакваната чувствителност от нормалното.
2. При силна болка в един зъб проверете за преждевременен контакт и състоянието на пулпата.
3. Дайте на пациента указания за мека храна и устна хигиена.
4. Обезболяващо при нужда по решение на лекаря; доза не се дава в този материал.

КАКВО ДА КАЖЕТЕ НА ПАЦИЕНТА

Уважаеми [Име на пациента], през първите дни след активиране е нормално зъбите да са чувствителни. Предпочитайте мека храна. Ако болката не намалее до няколко дни или се засили в един зъб, изтеглете часа си по-рано.

Кога е спешно: оценете в същия ден при оток, температура или засилваща се болка в един зъб.

СИТУАЦИЯ 11 Рана на бузата или устната

Оценка: Срещу кой апарат е раната? Има ли част с остър ръб?

ПРОТОКОЛ

1. Открийте и отстранете причината (остър край, кука, крилце на брекет).
2. Покажете на пациента как да използва восък.
3. Проследете раната.

КАКВО ДА КАЖЕТЕ НА ПАЦИЕНТА

Уважаеми [Име на пациента], раната в устата Ви може да е от триене на апарата. Поставете восък върху мястото, което търка. Ако раната не зарасне до няколко дни, изтеглете контрола по-рано.

Кога е спешно: оценка от съответния специалист при незарастваща или нарастваща рана.

ГРУПА 04

Мини винт

2 ситуации

СИТУАЦИЯ 12 Дразнене около мини винта

Оценка: Има ли зачервяване, оток или секреция около него? Почиства ли се зоната?

ПРОТОКОЛ

1. Почистете зоната и оценете тъканта.
2. Подновете указанията за хигиена.
3. Ако е под натоварване, проверете стабилността на винта.
4. Запишете ситуацията.

КАКВО ДА КАЖЕТЕ НА ПАЦИЕНТА

Уважаеми [Име на пациента], почиствайте внимателно тъканта около винта с мека четка. Ако отокът или секрецията се засилят, изтеглете часа си по-рано.

Кога е спешно: при разпространяващ се оток, температура или секреция — оценка в същия ден и при нужда насочване.

СИТУАЦИЯ 13 Подвижност или падане на мини винта

Оценка: Подвижен ли е винтът, паднал ли е? Намерен ли е падналият винт?

ПРОТОКОЛ

1. Не натоварвайте подвижен винт.
2. Ако е паднал, проверете зоната; уверете се, че винтът не е изгубен.
3. Приведете механиката в безопасно състояние без винта.
4. Планирайте решението за повторно поставяне и новото място.

КАКВО ДА КАЖЕТЕ НА ПАЦИЕНТА

Уважаеми [Име на пациента], малкият винт в устата Ви може да е паднал или да се е разхлабил. Ако сте го намерили, запазете го и го донесете на контрола. Изтеглете часа си по-рано: [Дата на часа].

Кога е спешно: ако винтът е изгубен и има съмнение за поглъщане, вижте Ситуация 25.

ГРУПА 05

Апарат

6 ситуации

СИТУАЦИЯ 14 Разхлабен винт на RME или отлепен пръстен

Оценка: Движи ли се апаратът? Върти ли се винтът? Запис на активирането?

ПРОТОКОЛ

1. Проверете апарата и пръстените.
2. При нужда свалете апарата и го циментирайте наново.
3. Спрете активирането и актуализирайте записа.
4. Измерете степента на разширение.

КАКВО ДА КАЖЕТЕ НА ПАЦИЕНТА

Уважаеми [Име на пациента], апаратът за разширение на небцето може да се е разхлабил. Спрете завъртането на винта. Изтеглете часа си по-рано: [Дата на часа].

Кога е спешно: в същия ден, ако апаратът е свободен в устата.

СИТУАЦИЯ 15 Прекъсване на транспалатиналната дъга

Оценка: Мястото на прекъсване спойката ли е или пръстенът? Свободна ли е дъгата?

ПРОТОКОЛ

1. Извадете свободната част.
2. Оценете нуждата от анкораж; планирайте временно решение.
3. Подновете апарата.

КАКВО ДА КАЖЕТЕ НА ПАЦИЕНТА

Уважаеми [Име на пациента], дъгата на небцето може да се е отделила. Ако частта се движи, внимателно я извадете или използвайте восък и изтеглете часа си по-рано.

Кога е спешно: в същия ден, ако частта е свободна и има риск от поглъщане.

СИТУАЦИЯ 16 Врастване на kопчето на Nance в тъканта

Оценка: Има ли следа, язва или възпаление по небната лигавица?

ПРОТОКОЛ

1. Отдалечете апарата от тъканта или го свалете.
2. Проследете зарастването на тъканта.
3. Подновете указанията за хигиена.
4. Планирайте временно решение за анкоража.

КАКВО ДА КАЖЕТЕ НА ПАЦИЕНТА

Уважаеми [Име на пациента], апаратът на небцето Ви може да притиска тъканта. Поддържайте зоната чиста и ще я оценим на контрола: [Дата на часа].

Кога е спешно: съответният специалист при незарастваща язва.

СИТУАЦИЯ 17 Счупен подвижен функционален апарат

Оценка: Къде е счупването? Може ли апаратът още да се поставя?

ПРОТОКОЛ

1. Оценете счупването; решете дали да се поправи или поднови.
2. Ако апаратът не може да се постави, отбележете в кой етап на лечението е пациентът.
3. Кажете на пациента да не поставя счупения апарат.

КАКВО ДА КАЖЕТЕ НА ПАЦИЕНТА

Уважаеми [Име на пациента], ако апаратът Ви се е счупил, не го поставяйте и запазете частите. Донесете ги на контрола: [Дата на часа].

Кога е спешно: обикновено не е спешно; поправка скоро, за да не се прекъсва лечението.

СИТУАЦИЯ 18 Прекъсване на връзката на фиксиран функционален апарат

Оценка: Напълно ли е прекъсната връзката? Свободен ли е апаратът в устата?

ПРОТОКОЛ

1. Вземете свободните части.
2. Подновете връзката.
3. Проверете отварянето на устата.
4. Записвайте повтарящите се отлепвания.

КАКВО ДА КАЖЕТЕ НА ПАЦИЕНТА

Уважаеми [Име на пациента], една от връзките на фиксирания апарат може да се е отделила. Не отваряйте широко устата и изтеглете часа си по-рано: [Дата на часа].

Кога е спешно: в същия ден, ако частта е свободна.

СИТУАЦИЯ 19 Дразнене на кожата или проблем с връзката на лицевата маска

Оценка: Има ли зачервяване или рана по кожата? Здрави ли са куките в устата?

ПРОТОКОЛ

1. Коригирайте точките на натиск.
2. Проверете вътреустните връзки.
3. Обсъдете отново с пациента продължителността и режима на носене.

КАКВО ДА КАЖЕТЕ НА ПАЦИЕНТА

Уважаеми [Име на пациента], ако има зачервяване там, където маската докосва кожата, ще я коригираме на контрола. Ако се появи рана по кожата, спрете носенето на маската и изтеглете часа си по-рано.

Кога е спешно: съответният лекар при рана по кожата или признаци на инфекция.

ГРУПА 06

Ретенция и плака

4 ситуации

СИТУАЦИЯ 20 Отлепване на фиксиран лингвален ретейнер

Оценка: На кой зъб е прекъсването? Преместили ли са се зъбите?

ПРОТОКОЛ

1. Запишете прекъсването и позицията на зъбите.
2. Поправете или подновете.
3. При рецидив измерете степента му.
4. Преразгледайте плана за ретенция (Ръководство 2).

КАКВО ДА КАЖЕТЕ НА ПАЦИЕНТА

Уважаеми [Име на пациента], единият край на тънката тел зад зъбите Ви може да се е отлепил. За да не се преместят зъбите, препоръчително е да изтеглите контрола по-рано: [Дата на часа]. Ако имате прозрачна шина, продължете да я носите.

Кога е спешно: ранен час, ако има бодене и рана.

СИТУАЦИЯ 21 Счупена или изгубена прозрачна шина или Essix

Оценка: От кога не се носи плаката? Преместили ли са се зъбите?

ПРОТОКОЛ

1. Планирайте отпечатък или сканиране за нова шина.
2. Проверете позицията на зъба.
3. Запишете от колко време липсва.

КАКВО ДА КАЖЕТЕ НА ПАЦИЕНТА

Уважаеми [Име на пациента], ако сте изгубили или счупили шината си, скоро е нужна нова, за да не се преместят зъбите. Изтеглете часа си по-рано: [Дата на часа].

Кога е спешно: обикновено не е спешно; забавянето може да доведе до рецидив.

СИТУАЦИЯ 22 Счупена плака на Hawley

Оценка: Счупването в акрила ли е или в телта? Ляга ли още плаката?

ПРОТОКОЛ

1. Решете дали да се поправи или поднови.
2. Проверете дали ляга.
3. Уверете се, че счупената част не боде тъканта.

КАКВО ДА КАЖЕТЕ НА ПАЦИЕНТА

Уважаеми [Име на пациента], ако плаката Ви се е счупила, не я поставяйте и запазете частите. Донесете ги на контрола: [Дата на часа].

Кога е спешно: обикновено не е спешно.

СИТУАЦИЯ 23 Паднал атачмънт при лечение с прозрачни шини

Оценка: Кой атачмънт? Ляга ли плаката?

ПРОТОКОЛ

1. Подновете атачмънта с шаблона.
2. Проверете дали ляга.
3. Покажете на пациента техниката за сваляне на плаката.

КАКВО ДА КАЖЕТЕ НА ПАЦИЕНТА

Уважаеми [Име на пациента], една от малките издатини на зъба Ви може да е паднала. Продължете да носите шината; ще я подновим на контрола: [Дата на часа].

Кога е спешно: обикновено не е спешно.

ГРУПА 07

Травма и поглъщане

2 ситуации

СИТУАЦИЯ 24 Травма на зъб при пациент с брекети

Оценка: Кои зъби са засегнати? Има ли подвижност, фрактура, разместване?

ПРОТОКОЛ

1. Оценете зъбите, костта и меките тъкани.
2. Направете рентгенография.
3. Премахнете активните сили от травмирания зъб.
4. Документирайте виталитета и планирайте проследяване (Ръководство 4 · Травма и анкилоза).
5. При нужда насочете към съответния специалист.

КАКВО ДА КАЖЕТЕ НА ПАЦИЕНТА

Уважаеми [Име на пациента], ако сте получили удар в зъбите, трябва да бъдете прегледани в същия ден. Ако зъб или част е излязла, запазете я и веднага се обърнете към нас.

Кога е спешно: в същия ден при луксация на зъб, фрактура или травма на челюстта; при нужда спешна помощ.

СИТУАЦИЯ 25 Съмнение за погълната или изгубена част

Оценка: Коя част липсва? Има ли пациентът кашлица, задух, затруднено преглъщане?

ПРОТОКОЛ

1. Огледайте внимателно устната кухина.
2. При дихателни симптоми насочете пациента незабавно за спешна медицинска оценка.
3. Ако няма симптоми, запишете ситуацията и по решение на лекаря планирайте медицинска оценка.
4. Установете защо частта е паднала.

КАКВО ДА КАЖЕТЕ НА ПАЦИЕНТА

Уважаеми [Име на пациента], ако смятате, че сте погълнали част от апарата и имате кашлица, задух или затруднено преглъщане, веднага потърсете най-близкия спешен център. Ако нямате симптоми, изтеглете часа си по-рано; заедно ще решим как да продължим.

Кога е спешно: дихателните симптоми винаги са спешни.

ФОРМУЛЯР

Формуляр за спешен запис

По един формуляр за всяка спешна ситуация. Размножете го.

Спешен запис 1

Пациент

Дата

№ и име на ситуацията

Какво се е случило (по думите на пациента)

Находка

Възможна причина

Извършена процедура

Информация, дадена на пациента

Повтаряща се ситуация ли е?

Следващ контрол

Спешен запис 2

Пациент

Дата

№ и име на ситуацията

Какво се е случило (по думите на пациента)

Находка

Възможна причина

Извършена процедура

Информация, дадена на пациента

Повтаряща се ситуация ли е?

Следващ контрол

С образователна цел. Не замества клиничната преценка на специалиста.

Следваща стъпка

Ако спешната ситуация се повтаря, попълнете анализа на първопричината в **Дневник на случаите**. Ако виждате механична причина, отворете **Атлас за отстраняване на механични проблеми**, а при травма — **Ръководство 4 · Травма и анкилоза**.