ИНСТРУМЕНТ 5 / 5

Радар за грешки в планирането

Вижте грешките, които удължават случая, преди да залепите брекетите: 20 грешки в седем групи, всяка с признак, причина и мярка.

РАЗДЕЛ 1

20 грешки в планирането

Прочетете всеки ред: разпознайте признака, вижте защо губи време и впишете мярката в плана.

> *Повечето грешки, които удължават лечението, започват не в механиката, а в планирането. Грешка, хваната преди брекетите, спестява месеци.*

1 · Диагноза

ГРЕШКА	ПРИЗНАК	ЗАЩО УДЪЛЖАВА	МЯРКА
01 **Да пропуснете функционалното отклонение**	По средата на лечението захапката се „променя“; предната кръстосана захапка или клас III се връщат.	Работи се към грешна сагитална и трансверзална цел; планът се променя по средата.	Проверете в централна релация; запишете разликата CR–CO (Инструмент 3).
02 **Да пропуснете на ОПГ липсващ, ретиниран или свръхброен зъб**	Кучешкият зъб не пробива, пространството не се затваря, числата не излизат.	Механиката и планът за екстракция се изграждат отначало; нужно е допълнително време за хирургия.	Пълен преглед с Инструмент 1; при неясна позиция – допълнителна образна диагностика.
03 **Да не запишете изходното състояние на корените**	На междинната ОПГ се виждат къси корени или резорбция, а причината е неизвестна.	Силите се намаляват, лечението спира; целта се смалява.	Отбележете късите, тъпите и дилацерирани корени от самото начало; при рисков зъб – лека сила и междинен контрол.
04 **Да планирате само зъбите, а не лицето**	Зъбите се подреждат, но профилът или устните се влошават.	Целта се пренаписва; решението за екстракция или анкораж се променя.	Впишете първо лицето в списъка на проблемите; решавайте с профилната снимка и снимката на усмивката.

2 · Място

ГРЕШКА	ПРИЗНАК	ЗАЩО УДЪЛЖАВА	МЯРКА
05 Да направите анализ на мястото без Bolton	При финиширането остава пространство или overjet не се затваря.	Финиширането се удължава със седмици; IPR или възстановително решение се добавя по-късно.	Изчислете Bolton в началото; запишете IPR или възстановителния план в Етап 2.
06 Да отлагате решението за екстракция	„Да започваме, ще видим“; резците първо отиват напред, после се връщат назад.	Двойното движение удължава времето и увеличава риска от коренова резорбция.	Решете с Картата за решение (Инструмент 2) преди брекетите.
07 Да печелите място с прекомерно разширение в областта на кучешките зъби	Дъгата се разширява, гингивата изтънява; след ретенцията скупчеността се връща.	Рецидивът означава повторно лечение; добавят се пародонтални проблеми.	Запазете ширината между кучешките зъби; при голяма нужда от място – екстракция или дистализация.

3 · Анкораж

ГРЕШКА	ПРИЗНАК	ЗАЩО УДЪЛЖАВА	МЯРКА
08 Да не изчислите нуждата от анкораж	Моларите се плъзгат напред, overjet не се затваря, при затваряне на пространствата клас II се увеличава.	Загубата на анкораж се компенсира по-късно; механиката се удължава.	Запишете минимален / умерен / максимален анкораж в Етап 2; изберете средството от началото.
09 Да добавите мини винта късно	Загубата на анкораж се забелязва във фазата на затваряне на пространства.	Изгубеното разстояние се печели отново; допълнителни посещения и време.	Ако е нужен максимален анкораж, включете мини винта в плана от самото начало.
10 Да не видите нуждата от асиметричен анкораж	От едната страна остава клас I, от другата клас II; средната линия се измества.	При финиширането са нужни асиметрични ластици и допълнителна механика.	Запишете отделно съотношението молари–кучешки зъби вдясно и вляво; планирайте анкораж за всяка страна.

4 · Вертикала

ГРЕШКА	ПРИЗНАК	ЗАЩО УДЪЛЖАВА	МЯРКА
11 **Механика с екструзия при пациент с висок ъгъл**	Отворената захапка се увеличава, брадичката се завърта назад, профилът се влошава.	За вертикален контрол са нужни допълнителен апарат и време.	Проверете FMA; ограничете ластиците клас II и екструзията на моларите.
12 **Да преминете към сагитална корекция, без да отворите дълбоката захапка**	Долните брекети се откъсват, overjet не се затваря.	Откъсванията и повторното залепване удължават лечението.	Първо изправете кривата на Spee и отворете дълбоката захапка; после сагитална корекция.

5 · Трансверзала

ГРЕШКА	ПРИЗНАК	ЗАЩО УДЪЛЖАВА	МЯРКА
13 **Да опитвате да решите скелетно стеснение с дентално разширение**	Задните зъби се накланят букално, кръстосаната захапка рецидивира.	Изгубеният торк и рецидивът изискват повторно лечение.	Определете източника на стеснението; ако е скелетно, планирайте RME според състоянието на шева.
14 **Да отложите разширението за след нивелирането**	Трансверзалната корекция с дъга отнема месеци.	Нивелирането и разширението се правят последователно, не паралелно.	Поставете разширението в началото на лечението.

6 · Механика

ГРЕШКА	ПРИЗНАК	ЗАЩО УДЪЛЖАВА	МЯРКА
15 **Да забележите късно грешките в позицията на брекетите**	Много огъвания при финиширането, нарушена паралелност на корените.	Финиширането се удължава; препозиционирането се прави късно.	На междинната ОПГ проверете паралелността на корените; препозиционирайте рано.
16 **Да прескочите серията дъги**	Твърде ранна дебела стоманена дъга или торк; брекетът се откъсва, ротацията остава.	Откъсванията и връщанията назад удължават времето.	Нивелирайте с NiTi, после стомана; планирайте торка и етапа с TMA.
17 **Да оставите ротацията и торка за финиширането**	През последните месеци се натрупват много неща за коригиране.	Финиширането трае по-дълго от очакваното.	Решете ротациите при нивелирането, а торка – преди затварянето на пространствата.

7 · Сътрудничество на пациента

ГРЕШКА	ПРИЗНАК	ЗАЩО УДЪЛЖАВА	МЯРКА
18 **Да изградите план, зависещ от сътрудничеството, без да го проверите**	Ластиците и апаратът не се носят редовно.	Сагиталната корекция не напредва; планът се променя.	Измерете сътрудничеството през първия месец; при нужда преминете към вариант без нужда от сътрудничество (мини винт, фиксиран функционален апарат).
19 **Да не поставите критерий за орална хигиена**	Бели лезии, гингивална хиперплазия, откъснати брекети.	Лечението спира; възниква въпросът за ранно сваляне.	Критерий и обучение по хигиена преди брекетите; запис при всеки контрол.
20 **Да не обсъдите продължителността и ретенцията от началото**	Пациентът пропуска посещения и иска да приключи лечението по-рано.	Интервалите се удължават, иска се сваляне преди постигане на целта.	Обяснете етапите, очакваната продължителност и плана за ретенция още на първата среща.

РАЗДЕЛ 2

Преди брекетите: последна проверка

Отпечатайте; във всеки случай отбележете преди посещението за залепване на брекетите.

Пациент / дата

Диагноза

- [ ] Централната релация е проверена; функционалното отклонение е записано
- [ ] ОПГ е прегледана изцяло с Инструмент 1; състоянието на корените е записано
- [ ] Профилът и усмивката са в списъка на проблемите

Място и анкораж

- [ ] Анализът на мястото и Bolton са изчислени
- [ ] Решението за екстракция е взето (Инструмент 2)
- [ ] Нуждата от анкораж и средството са записани; ако е нужен мини винт – в плана
- [ ] Целите за молари–кучешки зъби вдясно и вляво са записани отделно

Вертикала и трансверзала

- [ ] Рискът от екструзия е оценен според FMA
- [ ] Стъпката за отваряне на дълбоката захапка е преди сагиталната корекция
- [ ] Източникът на трансверзалния проблем е определен; разширението е в началото на лечението

Механика

- [ ] Серията дъги и редът на етапите са записани (Инструмент 4)
- [ ] Датата на междинната ОПГ е определена

Пациент

- [ ] Критерият за орална хигиена е изпълнен
- [ ] Обяснени са апаратите, изискващи сътрудничество, продължителността и ретенцията

С образователна цел. Този материал не замества клиничния преглед, решението на лекаря и мнението на специалиста.

Следваща стъпка

Отворете темата на грешката, която сте отбелязали в радара, в **Модул 03 Клинично планиране: от списъка на проблемите до механиката** . За да видите как изглеждат същите грешки в реални случаи – **Модул 09 Коментирани случаи**.