PACIENTUL SPUNE DA™ · BONUS 3

# Discuția cu părintele: ghid pentru cazuri pediatrice și adolescenți

Structura discuției, explicarea intervenției timpurii versus monitorizarea, explicarea aparatelor pe înțelesul tuturor, cooperarea copilului, gestionarea părinților reticenți și 8 mini-discuții.

Manualul Ortodontului

# Cuprins

1 · Structura discuției

2 · Momentul oportun: intervenție timpurie sau monitorizare?

3 · Explicarea aparatelor pe înțelesul tuturor

4 · Cooperarea copilului

5 · Când părinții au opinii diferite

6 · 8 mini-discuții

7 · Checklist pentru finalul discuției

MODULUL 1

# Structura discuției

Discuție în trei: părintele, copilul și tu. Fiecare are rolul său bine definit.

*La copii, decizia aparține părintelui, dar execuția aparține copilului. Dacă nu implici ambii actori în planul de tratament, complianța acasă va fi scăzută.*

| PAS | CE TREBUIE SĂ FACI | EXEMPLU DE REPLICĂ |
|---|---|---|
| 1 · Primirea | Adresează-te mai întâi copilului pe nume, apoi părintelui. | „Bună, [Numele pacientului], astăzi ne uităm împreună la dinții tăi. Îi voi explica totul și mamei tale, și tatălui tău." |
| 2 · Identificarea îngrijorării | Întreabă ce i-a adus la cabinet și care este principala lor preocupare. | „Ce v-a determinat să veniți la noi? Ce vă preocupă cel mai mult în acest moment?" |
| 3 · Analiza | Descrie ce observi, fără a învinovăți; folosește oglinda sau modelul. | „Dinții de sus sunt mult în fața celor de jos; haideți să ne uităm împreună în oglindă." |
| 4 · Momentul oportun | De ce acum sau de ce așteptăm: justifică într-o singură frază. | „Această problemă poate fi gestionată mai ușor în timpul creșterii; vă explic imediat de ce." |
| 5 · Opțiuni | Prezintă opțiunile, inclusiv monitorizarea, și motivează recomandarea ta. | „Avem două căi: monitorizare periodică sau o etapă scurtă cu aparat acum." |
| 6 · Roluri | Sarcinile copilului, ale părintelui și ale cabinetului. | „[Numele pacientului], sarcina ta este să porți aparatul seara. Dumneavoastră aveți sarcina de a-i reaminti acest lucru." |
| 7 · Rezumat și pasul următor | Roagă părintele să rezume; înmânează planul scris. | „Puteți rezuma pe scurt ce am discutat astăzi? Pasul următor este..." |

**Regulă de aur**

Folosește un ton adecvat vârstei copilului (tutuire), iar cu părintele folosește „dumneavoastră". În fața copilului, evită etichete precum „dacă se teme", „nu va reuși", „acest copil este foarte neascultător".

## Pregătirea înainte de discuție

- [ ] Înregistrările (OPG, cefalometrie, fotografii, model sau scanare) deschise pe ecran.
- [ ] Oglindă și, dacă este cazul, un model de aparat pe masă.
- [ ] Planul de tratament pe o pagină, printat (Bonus 1).
- [ ] Dacă un părinte lipsește, pregătește rezumatul scris pentru a fi transmis ulterior.
- [ ] Alocă timp suficient discuției; fără grabă.

MODULUL 2

# Momentul oportun: intervenție timpurie sau monitorizare?

Cea mai frecventă întrebare a părintelui: „Acum sau mai târziu?" Oferă un răspuns personalizat, bazat pe argumente clinice.

| SITUAȚIE | ABORDARE GENERALĂ | ARGUMENT PENTRU PĂRINTE |
|---|---|---|
| Ocluzie inversă laterală cu devierea mandibulei | Se ia în calcul corecția timpurie | „Maxilarul poate fi lărgit mai ușor în timpul creșterii; dacă devierea persistă, poate influența dezvoltarea mandibulei." |
| Ocluzie inversă frontală cu deviere (pseudo-Clasa III) | Se ia în calcul corecția timpurie | „Această ocluzie poate suprasolicita dinții și gingia; se poate corecta printr-un tratament scurt." |
| Deficit de dezvoltare a maxilarului (Clasa III osoasă) | Se evaluează tratamentul ortopedic timpuriu | „În perioada de creștere, putem susține dezvoltarea maxilarului; vom monitoriza creșterea timp de mai mulți ani." |
| Overjet accentuat, dinții nu sunt acoperiți de buze | Luăm în calcul o intervenție precoce | „Dinții care ies în afară sunt mai expuși la traumatisme; pentru a reduce riscul, poate fi util să începem din timp." |
| Suptul degetului sau interpoziție linguală | Mai întâi obiceiul | „Cât timp obiceiul persistă, efectul tratamentului poate rămâne limitat." |
| Pierderea precoce a dinților temporari | Se ia în discuție un menținător de spațiu | „Dacă nu păstrăm spațiul dintelui definitiv, dinții vecini se pot înclina în breșă." |
| Înghesuire ușoară în dentiția mixtă | De cele mai multe ori observație | „O parte din ea se poate reduce prin schimbarea dinților temporari; o urmărim cu controale regulate." |
| Clasa a II-a, saltul de creștere nu a început încă | Observație sau începere temporizată | „Urmărim prin măsurători regulate pentru a prinde perioada creșterii accelerate." |

**Prezintă așteptarea vreun un risc pentru acest copil? (pierdere de spațiu, traumatism, decalaj, dezvoltare maxilară)**

↓

**Da** → Recomandă intervenția precoce; exprimă clar riscul și obiectivul limitat. Adaugă că mai târziu ar putea fi nevoie de o a doua etapă.

**Nu** → Recomandă observația; explică faptul că observația nu înseamnă „a nu face nimic" și menționează frecvența controalelor și ce vei urmări.

**Două fraze care sunt mereu greșite**

„Dacă nu începem acum, va fi prea târziu" și „Nicio grabă, ne uităm când va fi mai mare". Ambele sunt nejustificate și unilaterale. Explică ce câștigă și ce pierde familia cu ambele variante.

## Prezentarea sinceră a tratamentului precoce

1. **Păstrează obiectivul limitat.** „Scopul acestei etape este... Alinierea completă a dinților se poate face mai târziu."
2. **Menționează posibilitatea celei de-a doua etape încă de la început.** Dacă părintele află ulterior, încrederea se zdruncină.
3. **Explică faptul că urmărești prin măsurători.** „La fiecare control voi măsura și vă voi arăta progresul."
4. **Lași decizia la latitudinea părintelui.** „Aceasta este recomandarea mea; am menționat și posibilitatea așteptării. Dumneavoastră ce credeți?"

MODULUL 03

# Aparatele în limbaj simplu

O frază pentru părinte, o frază pentru copil, un răspuns la o îngrijorare frecventă.

| APARAT | PENTRU PĂRINTE | PENTRU COPIL | ÎNGRIJORARE FRECVENTĂ ȘI RĂSPUNS |
|---|---|---|---|
| Aparat funcțional | „Menținând mandibula ușor înainte, încearcă să susțină direcția de creștere." | „Acest aparat este ca un antrenor care îți obișnuiește mandibula cu o poziție nouă." | „Nu va putea vorbi?" → „În primele zile poate fi mai greu; majoritatea copiilor se obișnuiesc în câteva săptămâni." |
| Expansiune rapidă maxilară (RME) | „Se fixează pe palat; lărgește treptat maxilarul superior." | „Punem o cheiță mică în cerul gurii tale; mama sau tata o va răsuci în fiecare zi." | „A apărut un spațiu între cei doi dinți anteriori!" → „Acest lucru este de așteptat și temporar; se va închide mai târziu." |
| Mască facială | „Susține dezvoltarea în sens anterior a maxilarului superior; trebuie purtată în principal acasă și noaptea." | „Această mască este ca o cască de super-erou de noapte; nu trebuie să o porți la școală." | „Ce va fi dacă nu o poartă?" → „Efectul depinde de timpul de purtare; să facem împreună un program orar." |
| Menținător de spațiu | „Menține spațiul până când dintele definitiv erupe." | „Rezervăm loc pentru noul tău dinte; este de gardă până sosește dintele tău." | „Cât timp rămâne în interior?" → „Când dintele definitiv începe să erupă, îl îndepărtăm." |
| Aparat miogimnastic / anti-obicei vicios | „Îngreunează presarea dinților anteriori de către deget sau limbă." | „Acest aparat este un mic ajutor care îți amintește de degetul tău." | „Aceasta este o pedeapsă?" → „Nu; un memento utilizat împreună cu recompense." |
| Aparat mobil | „Aparat care se poate insera și scoate, care mișcă dinții într-o măsură limitată." | „Îl poți pune și scoate singur; să porți mereu cutia cu tine." | „Ce se întâmplă dacă îl pierde?" → „Anunțați imediat; dacă nu îl poartă o perioadă mai lungă, progresul se oprește." |

| APARAT | PENTRU PĂRINTE | PENTRU COPIL | ÎNGRIJORARE FRECVENTĂ ȘI RĂSPUNS |
|---|---|---|---|
| Bracket fix | „Aliniem dinții cu elemente mici lipite pe dinți și arcuri.” | „Lipim butoni mici pe dinții tăi; poți alege și elastice colorate.” | „Va doare foarte tare?” → „În primele zile există o senzație de presiune; aceasta se ameliorează de obicei în câteva zile.” |

**Arată, apoi explică**

Dacă este posibil, dă modelul aparatului în mâna copilului. Vzul și pipăitul oferă siguranță mai repede decât explicația verbală.

MODULUL 04

# Colaborarea copilului

Copilul poartă aparatul; părinte reamintește; tu măsori și apreciezi.

## Când vorbești cu copilul

- Cobori la nivelul privirii lui; întreabă-l mai întâi pe el.
- Frază scurtă, sarcină concretă: „Pune-l după cină."
- Oferă opțiuni de alegere: culoarea elasticului, abțibild de calendar.
- Arată-i progresul: compară-l cu o fotografie anterioară.
- Întreabă despre zilele ratate fără a învinovăți: „În ce zi a fost greu?"

## Sarcinile de dat părintelui

- Trecerea orelor de purtare într-un tabel.
- Reamintire, dar fără să se ajungă la dispute.
- Verificarea curățeniei aparatului și a cutiei.
- Anunțarea imediată a fracturii, înțepăturii sau pierderii.
- Planificarea unor mici recompense.

| PROBLEMĂ DE COOPERARE | CAUZĂ POSIBILĂ | ACȚIUNE |
|---|---|---|
| Scoate aparatul noaptea | Disconfort, iritații sau perioada de acomodare | Verifică punctul care jenează; crește treptat timpul de purtare. |
| Nu vrea să-l poarte la școală | Aspectul estetic și cercul de prieteni | Dacă este posibil, mută timpul de purtare acasă și pe timpul nopții. |
| Uită elasticele | Lipsa unei rutine | Leagă purtarea de periajul dentar; puneți elastice de rezervă lângă pat. |
| Periaj dentar insuficient | Nu cunoaște tehnica sau se plictisește | Arată-i tehnica împreună cu el în fața oglinzii; verifică cu tablete revelatoare de placă. |
| Este tensionat în timpul controalelor | Experiențe anterioare sau nesiguranță | Explică fiecare pas înainte: „Acum doar mă uit." |

## Tabel de monitorizare a cooperării (completat de părinte)

- [ ] Luni: aparat purtat ____ ore · periaj dimineața / seara
- [ ] Marți: aparat purtat ____ ore · periaj dimineața / seara
- [ ] Miercuri: aparat purtat ____ ore · periaj dimineața / seara
- [ ] Joi: aparat purtat ____ ore · periaj dimineața / seara
- [ ] Vineri: aparat purtat ____ ore · periaj dimineața / seara
- [ ] Sâmbătă: aparat purtat ____ ore · periaj dimineața / seara
- [ ] Duminică: aparat purtat ____ ore · periaj dimineața / seara

MODULUL 5

# Când părinții au opinii diferite

Nu lua partea nimănui; rezumă ambele îngrijorări și pornește de la punctul comun.

| SITUAȚIE | ABORDARE | REPLICA |
|---|---|---|
| Un părinte vrea să înceapă „imediat”, celălalt „să mai așteptăm” | Rezumă separat ambele îngrijorări; pune în balanță consecințele așteptării versus cele ale începerii tratamentului. | „Dumneavoastră vă gândiți la avantajele începerii timpurii, iar dumneavoastră la faptul dacă este pregătit copilul. Ambele sunt importante.” |
| Unul dintre părinți nu este prezent | Oferă un rezumat scris; dacă este necesar, propune o a doua discuție. | „Aș dori să ascult și întrebările partenerului dumneavoastră. Puteți citi această fișă împreună.” |
| Părinți divorțați/separați | La decizie și consimțământ, urmează procedura și formularul de consimțământ utilizat în cabinetul tău; informează ambele părți în mod egal. | „Doresc să ofer amândurora aceleași informații despre planul de tratament.” |
| Bunicii iau decizia | Ascultă cu respect; amintește cu tact că decizia și consimțământul aparțin reprezentantului legal. | „Opinia dumneavoastră este foarte valoroasă. Haideți să finalizăm decizia împreună cu părintele.” |
| Copilul nu dorește tratamentul | Ascultă motivele copilului; spune deschis că un aparat purtat cu forța nu va funcționa. | „[Numele pacientului], ce te deranjează cel mai mult? Hai să căutăm o soluție împreună.” |
| Părintele este interesat doar de aspectul estetic | Acceptă așteptarea estetică; adaugă aspectele legate de funcție și sănătate. | „Aspectul este important; pe lângă acesta, mai sunt câteva aspecte de luat în calcul pentru ocluzie și sănătatea dinților.” |

**Evită**

Replici care aleg o tabără sau pun presiune, precum „Tatăl are dreptate”, „Ca mamă, știi mai bine”, „Decideți acum, altfel întârziem”.

MODULUL 6

# 8 mini-discuții

Dialoguri scurte, realiste. Adaptează-le la propriul tău stil.

## Propunerea intervenției timpurii

TEXT 1 / 8

Situație: ocluzie inversă, copil de aproximativ 8 ani; părintele întreabă: „Nu este prea mic încă?"

**Medic:** „Este o întrebare foarte pertinentă. Maxilarul superior al copilului este ușor îngust, iar la închidere, mandibula alunecă într-o parte. La această vârstă, maxilarul superior poate fi expandat mai ușor. Recomand un aparat de expansiune pentru o perioadă scurtă; aș vrea să știți că acest lucru nu înseamnă că ulterior nu va mai fi nevoie de un alt tratament."
**Părinte:** „Și ce se întâmplă dacă așteptăm?"
**Medic:** „Dacă alunecarea persistă mult timp, echilibrul dezvoltării mandibulare poate fi afectat. Dacă alegeți să așteptați, vom monitoriza prin controale regulate; haideți să decidem împreună."

## Propunerea de așteptare

TEXT 2 / 8

Situație: înghesuire ușoară în dentiția mixtă; părintele dorește aparat imediat.

**Medic:** „Văd și eu înghesuirile la nivelul dinților frontali. În această perioadă, o parte din ele se pot reduce odată cu schimbarea dinților temporari. Acum, în loc de aparat, recomand monitorizarea regulată."
**Părinte:** „Adică nu facem nimic?"
**Medic:** „Monitorizarea este și ea un plan. Voi verifica la intervale stabilite și, dacă observ o schimbare care necesită intervenție, vă voi anunța imediat."

## Explicarea măștii faciale

TEXT 3 / 8

Situație: copil cu tendință de Clasa a III-a scheletală; părintele se teme de mască.

**Medic:** „Masca poate părea înfricoșătoare la prima vedere. Nu trebuie purtată la școală, ci mai ales acasă și noaptea. Scopul ei este să susțină dezvoltarea maxilarului superior spre înainte în perioada de creștere."
**Părinte:** „Va funcționa cu siguranță?"
**Medic:** „Nu pot garanta un rezultat cert. Rezultatul depinde de direcția de creștere și de timpul de purtare. La fiecare control voi măsura și vă voi arăta; vom urmări creșterea timp de mai mulți ani."

## Adresarea directă către copil

TEXT 4 / 8

Situație: începutul tratamentului cu aparat funcțional; copil timid, în jur de 11 ani.

**Medic:** „[Numele pacientului], acest aparat învață maxilarul tău o poziție nouă. În primele zile s-ar putea să ți se pară puțin ciudat să vorbești cu el, dar te vei obișnui. Este suficient să îl porți după cină și să îl păstrezi în gură până dimineața."
**Copil:** „Prietenii mei o să vadă?"
**Medic:** „Pregătim un plan astfel încât să nu fie nevoie să îl porți în timpul orelor de școală. La următorul control, vom vedea împreună cât de mult ai progresat."

## Despre obiceiuri, fără a învinovăți

TEXT 5 / 8

Situație: suptul degetului și ocluzie deschisă frontală.

**Medic:** „Există un spațiu între dinții din față. La această vârstă, obiceiuri precum suptul degetului pot contribui la acest lucru. Nu este o vină; se întâmplă la mulți copii."
**Părinte:** „Îi spunem, dar nu se lasă."
**Medic:** „Mai eficient decât atenționările este să fie recompensat pentru zilele în care nu a făcut acest lucru. Dacă este necesar, putem folosi și un mic aparat de reamintire."

## Părinții nu sunt de acord

TEXT 6 / 8

Situație: mama ar începe tratamentul, tatăl ar mai aștepta.

**Medic:** „Amândoi aveți puncte de vedere întemeiate. Dumneavoastră vă gândiți la avantajele începerii timpurii, iar dumneavoastră la faptul dacă fiul/fiica dumneavoastră este pregătit(ă). Haideți să notăm împreună ce câștigăm dacă începem acum și ce riscuri ne asumăm dacă așteptăm."
**Tată:** „Am dori să ne mai gândim puțin."
**Medic:** „Este de înțeles. Citiți împreună planul scris acasă; întrebările care vor apărea le vom discuta la următoarea noastră întâlnire."

## Adolescentul nu dorește tratamentul

TEXT 7 / 8

Situație: în jur de 14 ani; părintele dorește, adolescentul nu.

**Medic:** „[Numele pacientului], este important pentru mine ce gândești. Povara tratamentului va fi purtată în mare parte de tine. Ce te deranjează cel mai mult?"
**Adolescent:** „Arată urât sârma."
**Medic:** „Înțeleg. Există și opțiuni mai puțin vizibile; haide să discutăm care se potrivește dinților tăi. Și părinții tăi știu că nu are niciun rost să porți ceva forțat, dacă nu îți dorești."

## Menționarea posibilității unei a doua etape



Situație: tratamentul ortopedic timpuriu se încheie; părintele întreabă: „S-a terminat?”

**Medic:** „Am atins în mare parte scopul acestei etape. Așa cum am discutat la început, când dentiția permanentă va fi completă, ar putea fi necesară o a doua etapă pentru alinierea dinților.”
**Părinte:** „Când vom afla?”
**Medic:** „Urmăresc erupția dinților permanenți în timpul vizitelor de control. Când va veni momentul deciziei, vă voi prezenta în scris opțiunile, pe baza unor noi investigații.”

MODULUL 7

# Checklist pentru finalul discuției

Înainte ca familia să părăsească cabinetul.

## La finalul discuției cu părinții

- [ ] M-am adresat direct copilului și l-am întrebat dacă are întrebări.
- [ ] Am ascultat principala îngrijorare a părintelui și am corelat-o cu planul.
- [ ] Am explicat într-o singură frază de ce începem acum sau de ce trebuie să așteptăm.
- [ ] Am prezentat opțiunile împreună cu monitorizarea.
- [ ] Am explicat aparatul prin fraze separate pentru părinte și pentru copil.
- [ ] Am menționat posibilitatea celei de-a doua etape încă de la început.
- [ ] Am clarificat sarcinile copilului, ale părintelui și ale cabinetului.
- [ ] Am înmânat tabelul de monitorizare a cooperării.
- [ ] Am înmânat planul scris pe o pagină; am indicat consimțământul informat utilizat în cabinetul meu.
- [ ] Am rugat părintele să facă un rezumat și am stabilit data pentru pasul următor.

Material cu scop educațional. Nu înlocuiește examinarea clinică, decizia medicului și avizul de specialitate.

# Pasul următor

Pentru planul scris ce poate fi înmânat părintelui: **1. bonus · Planul de tratament pe o pagină: șabloane explicative** (șabloanele 04, 06, 08 și 09 sunt dedicate cazurilor pediatrice). Pentru texte de discuție adaptate fiecărui caz: **Material principal · Texte de informare a pacientului pentru 40 de tipuri de cazuri**. Pentru partea clinică a cazurilor în creștere, consultați capitolul **Ghidul 5 / 5 · Atlas Clinic de Ortopedie Dento-Facială** din manual.