SALVEAZĂ CAZUL BLOCAT™ · BONUS 2

Situații de urgență în control: bracket dezlipit, arc care înțeapă, aparat rupt

25 de situații de urgență între două vizite de control: evaluare, protocol și text gata de trimis pacientului.

Manualul Ortodontului

Cuprins

Primele 60 de secunde în situații de urgență

Indexul celor 25 de situații

1 · Bracket, tub și inel

2 · Arc și ligatură

3 · Durere și țesuturi moi

4 · Mini-implant

5 · Aparat

6 · Contenție și gutieră

7 · Traumatism și ingestie

Fișă de evidență a urgențelor

INTRODUCERE

Primele 60 de secunde în situații de urgență

În orice situație de urgență, ordinea este aceeași: siguranță, cauză, soluție, înregistrare.

1. **Siguranță:** Există probleme respiratorii, sângerare, ingestie sau traumatism? Dacă da, aceasta este prioritatea.
2. **Ce s-a rupt, ce înțeapă?** Identifică piesa și asigură-te că nu a rămas nicio componentă liberă în cavitatea bucală.
3. **Pacientul este în siguranță?** Elimină sursa de înțepare, iritare sau piesa liberă.
4. **Care este cauza?** Ocluzie, alimente, colaj, designul aparatului. Notează cauza.
5. **Decizie:** reparație imediată, amânare până la următoarea vizită sau trimitere către alt specialist.
6. **Înregistrare:** dată, situație, cauză, manoperă efectuată și instrucțiunile oferite pacientului.

Situații care necesită trimitere imediată

- Suspiciune de ingestie sau aspirație cu tuse, dificultăți de respirație sau de deglutiție
- Traumatism dentar: luxație, fractură, traumatism maxilar
- Edem în expansiune, febră, secreții purulente
- Sângerare necontrolată

Despre textele pentru pacienți

În texte, completează câmpurile **[Numele pacientului]**, **[Numele cabinetului]** și **[Data programării]** cu datele tale. Textele au caracter informativ; transmite-le prin canalul de comunicare utilizat de cabinetul tău, adaptându-le stilului tău personal.

INDEX

Indexul celor 25 de situații

Identifică situația și accesează secțiunea corespunzătoare.

NR.	SITUAȚIE	GRUP
01	Dezlipirea bracketului pe dinții frontali	Bracket, tub și inel
02	Dezlipirea bracketului pe dinții laterali	Bracket, tub și inel
03	Slăbirea tubului sau a inelului molar	Bracket, tub și inel
04	Capătul distal al arcului înțeapă obrazul	Arc și ligatură
05	Arcul a ieșit din tub	Arc și ligatură
06	Arc rupt	Arc și ligatură
07	Capătul sârmei de ligatură înțeapă	Arc și ligatură
08	Pierderea ligaturii elastice sau a lanțului	Arc și ligatură
09	Deplasarea arcului de deschidere (coil spring)	Arc și ligatură
10	Durere și sensibilitate în primele zile	Durere și țesuturi moi
11	Leziune pe obraz sau pe buze	Durere și țesuturi moi
12	Iritație în jurul mini-implantului	Mini-implant
13	Mobilitatea sau pierderea mini-implantului	Mini-implant
14	Slăbirea șurubului RME sau dezlipirea inelului	Aparat
15	Dezlipirea arcului transpalatinal	Aparat
16	Butonul Nance apasă pe mucoasă	Aparat
17	Ruperea aparatului funcțional mobil	Aparat
18	Dezlipirea conexiunii aparatului funcțional fix	Aparat
19	Iritație cutanată sau problemă de fixare la masca facială	Aparat

NR.	SITUAȚIE	GRUP
20	Dezlipirea retainerului lingual fix	Contenție și gutieră
21	Gutiera transparentă sau Essix ruptă sau pierdută	Contenție și gutieră
22	Ruperea plăcuței Hawley	Contenție și gutieră
23	Căderea unui attachment în timpul tratamentului cu alignere	Contenție și gutieră
24	Traumatism dentar la pacientul cu bracketi	Traumatism și înghițire
25	Suspiciune de piesă înghițită sau pierdută	Traumatism și înghițire

MODULUL 01

Bracket, tub și inel

3 situații

SITUAȚIA 01

Dezlipirea bracketului pe dinții frontali

Evaluare: Bracketul atârnă pe arc sau a căzut complet? Există leziuni pe suprafața dintelui? Dezlipirea a fost cauzată de contactul ocluzal?

PROTOCOL

1. Verifică arcul și bracketul; dacă arcul nu înțeapă, pacientul este în siguranță.
2. Notează cauza dezlipirii: ocluzie, alimente, suprafața de colaj.
3. Recolajează sau planifică pentru următoarea vizită de control.
4. Dacă se dezlipește din nou pe același dinte, verifică contactul ocluzal.

CE ÎI POȚI SPUNE PACIENTULUI

Stimate/Stimată [Numele pacientului], dezlipirea bracketului de pe dinte nu este o urgență. Bracketul poate rămâne pe arc; dacă nu vă înțeapă, nu încercați să îl îndepărtați. Echipa [Numele cabinetului] îl va recolaja la controlul din data de [Data programării]. Evitați alimentele dure și lipicioase.

Când este urgență: Dacă este asociată cu fractură dentară sau traumatism, evaluează pacientul în aceeași zi.

SITUAȚIA 02

Dezlipirea bracketului pe dinții laterali

Evaluare: Bracketul de pe premolar se rotește pe arc și irită obrazul?

PROTOCOL

1. Dacă bracketul rotit irită obrazul, fixează-l temporar sau îndepărtează-l.
2. Verifică arcul: capătul distal înțeapă?
3. Planifică recolajarea.
4. Verifică contactul ocluzal.

CE ÎI POȚI SPUNE PACIENTULUI

Stimate/Stimată [Numele pacientului], este posibil ca bracketul de pe dintele lateral să se fi dezlipit. Dacă vă irită obrazul, aplicați ceară ortodontică. Vom remedia situația la controlul din data de [Data programării].

Când este urgență: În caz de leziune profundă a obrazului sau risc de înghițire, programează mai devreme.

SITUAȚIA 03

Slăbirea tubului sau a inelului molar

Evaluare: Inelul se mișcă pe dinte? Se acumulează resturi alimentare sub ciment?

PROTOCOL

1. Îndepărtează inelul, curăță dintele și evaluează suprafața.
2. Recimentează sau alege un inel nou.
3. Dacă există un aparat atașat (TPA, RME), verifică integritatea acestuia.
4. Notează slăbirea în fișa pacientului.

CE ÎI POȚI SPUNE PACIENTULUI

Stimate/Stimată [Numele pacientului], este posibil ca inelul de pe dintele lateral să se fi slăbit. Curățați zona cu atenție pentru a evita acumularea resturilor alimentare. Vă recomandăm să devansați programarea pentru data de [Data programării].

Când este urgență: Dacă inelul s-a desprins complet și aparatul este liber în cavitatea bucală, programează în aceeași zi.

MODULUL 02

Arc și ligatură

6 situații

SITUAȚIA 04 Capătul distal al arcului înțeapă obrazul

Evaluare: Cât de mult depășește arcul tubul? S-a lungit odată cu mișcarea dinților (prin închiderea spațiilor)?

PROTOCOL

1. Taie excesul de arc; rotunjește capătul sau pliază-l.
2. Asigură-te că fragmentul tăiat nu a rămas în cavitatea bucală.
3. Verifică leziunea de pe obraz.
4. Dacă spațiul se închide, notează pentru a verifica din nou la următorul control.

CE ÎI POȚI SPUNE PACIENTULUI

Stimate/Stimată [Numele pacientului], dacă capătul arcului te înțeapă în obraz, aplică ceară ortodontică pe acea zonă. Nu tăia singur/ă arcul. Echipa [Numele cabinetului] va remedia situația la programarea din data de [Data programării].

Când este urgent: Dacă arcul a penetrat mucoasa și sângerează, solicită o programare mai devreme.

SITUAȚIA 05 Arcul a ieșit din tub

Evaluare: Arcul a ieșit din tub, iar capătul liber înțeapă mucoasa?

PROTOCOL

1. Reintrodu arcul în tub.
2. Verifică motivul ieșirii: arcul este prea scurt sau activarea a fost excesivă?
3. Înlocuiește arcul dacă este necesar.
4. Dacă există un capăt liber, acoperă-l cu ceară.

CE ÎI POȚI SPUNE PACIENTULUI

Stimate/Stimată [Numele pacientului], este posibil ca arcul să fi ieșit din locașul său de pe molarul posterior. Dacă te înțeapă, folosește ceară și nu trage de arc. Te așteptăm la programarea din data de: [Data programării].

Când este urgent: Dacă arcul liber provoacă leziuni, solicită o programare mai devreme.

SITUAȚIA 06

Arc fracturat

Evaluare: Unde s-a rupt arcul? Fragmentul rupt este mobil, există risc de înghițire?

PROTOCOL

1. Îndepărtează fragmentele rupte.
2. Înlocuiește arcul.
3. Notează locul fracturii; dacă se repetă: verifică contactele ocluzale sau oboseala materialului.
4. Verifică poziția dinților conform planului de tratament.

CE ÎI POȚI SPUNE PACIENTULUI

Stimate/Stimată [Numele pacientului], este posibil ca arcul să se fi rupt. Dacă fragmentele se mișcă, nu încerca să le scoți; folosește ceară și devansează programarea: [Data programării].

Când este urgent: Dacă fragmentul a fost pierdut și există suspiciunea de înghițire, consultă situația 25.

SITUAȚIA 07

Capătul ligaturii metalice înțeapă

Evaluare: Capătul ligaturii este orientat spre buză sau obraz?

PROTOCOL

1. Scurtează capătul și pliază-l sub bracket.
2. Verifică celelalte ligaturi.
3. Verifică integritatea mucoasei.

CE ÎI POȚI SPUNE PACIENTULUI

Stimate/Stimată [Numele pacientului], dacă un capăt subțire de sârmă te înțeapă în buză, aplică ceară pe el. Vom remedia situația la controlul din data de: [Data programării].

Când este urgent: De regulă, nu este o urgență.

SITUAȚIA 08 Pierderea ligaturii elastice sau a lanțului

Evaluare: De pe care dinte lipsește ligatura? Arcul a ieșit din slot? S-a creat spațiu?

PROTOCOL

1. Înlocuiește ligaturile lipsă.
2. În cazul pierderii unui lanț, măsoară starea spațiului.
3. Dacă pierderea este frecventă, discută despre obiceiurile alimentare.

CE ÎI POȚI SPUNE PACIENTULUI

Stimate/Stimată [Numele pacientului], este posibil să fi căzut unul dintre inelele elastice de pe dinți. Aceasta nu este o situație urgentă. Îl vom înlocui la controlul din data de [Data programării].

Când este urgent: De regulă, nu este o urgență.

SITUAȚIA 09 Deplasarea arcului de deschidere (open coil)

Evaluare: Arcul s-a deplasat, apasă pe gingie sau pe obraz?

PROTOCOL

1. Repoziționează arcul sau îndepărtează-l.
2. Verifică scopul deschiderii spațiului: spațiul creat se menține?
3. Verifică opritoarele (stopurile) arcului.

CE ÎI POȚI SPUNE PACIENTULUI

Stimate/Stimată [Numele pacientului], este posibil ca arcul dintre dinți să se fi deplasat. Dacă este deranjant, folosește ceară. Te așteptăm la programarea din data de: [Data programării].

Când este urgent: Dacă apasă pe gingie și sângerează, solicită o programare mai devreme.

MODULUL 03

Durere și țesuturi moi

2 situații

SITUAȚIA 10 Durere și sensibilitate în primele zile

Evaluare: A avut loc o activare recentă? Durerea este localizată la un singur dinte sau este difuză?

PROTOCOL

1. Diferențiază sensibilitatea normală de cea atipică.
2. În cazul unei dureri intense localizate la un singur dinte, verifică contactele premature și starea pulpei.
3. Oferă pacientului instrucțiuni privind dieta moale și igiena orală.
4. Analgezice la nevoie, conform deciziei medicale; acest material nu conține dozaje.

CE ÎI POȚI SPUNE PACIENTULUI

Stimate/Stimată [Numele pacientului], este normal ca dinții să fie sensibili în primele zile după activare. Consumă alimente moi. Dacă durerea nu scade în câteva zile sau se intensifică la un singur dinte, devansează programarea.

Când este urgent: În caz de edem (umflătură), febră sau durere intensă la un dinte, evaluează pacientul în aceeași zi.

SITUAȚIA 11 Leziune pe obraz sau buză

Evaluare: Care componentă a aparatului cauzează leziunea? Există vreo piesă cu margini ascuțite?

PROTOCOL

1. Identifică și elimină cauza (capăt ascuțit, cârlig, aripioară de bracket).
2. Arată-i pacientului cum să folosească ceara.
3. Monitorizează vindecarea leziunii.

CE ÎI POȚI SPUNE PACIENTULUI

Stimate/Stimată [Numele pacientului], leziunea din gură poate fi cauzată de frecarea aparatului. Aplică ceară pe zona care te deranjează. Dacă leziunea nu se vindecă în câteva zile, devansează controlul.

Când este urgent: Dacă leziunea nu se vindecă sau crește în dimensiuni, solicită opinia medicului specialist.

MODULUL 04

Mini-implant

2 situații

SITUAȚIA 12 Iritație în jurul mini-implantului

Evaluare: Există roșeață, edem sau secreții în zonă? Pacientul igienizează corect?

PROTOCOL

1. Curăță zona și evaluează țesuturile moi.
2. Reiterează instrucțiunile de igienă.
3. Dacă este sub sarcină, verifică stabilitatea mini-implantului.
4. Notează starea clinică.

CE ÎI POȚI SPUNE PACIENTULUI

Stimate [Numele pacientului], vă rugăm să curățați zona din jurul mini-implantului cu o periuță moale, cu mare atenție. Dacă edemul sau secrețiile se accentuează, vă rugăm să devansați programarea.

Când este urgent: În caz de edem extensiv, febră sau secreții purulente, evaluare în aceeași zi și, dacă este necesar, trimitere către specialist.

SITUAȚIA 13 Mobilitatea sau pierderea mini-implantului

Evaluare: Mini-implantul este mobil sau a fost pierdut? A fost recuperat dispozitivul?

PROTOCOL

1. Nu aplica forțe pe mini-implantul mobil.
2. Dacă a fost pierdut, verifică zona; asigură-te că mini-implantul nu a fost înghițit.
3. Adaptează mecanica pentru a fi sigură și fără ancorajul respectiv.
4. Planifică decizia de reinserare și stabilește o nouă poziție.

CE ÎI POȚI SPUNE PACIENTULUI

Stimate [Numele pacientului], este posibil ca mini-implantul să se fi slăbit sau să fi căzut. Dacă l-ați găsit, păstrați-l și aduceți-l la control. Vă rugăm să devansați programarea: [Data programării].

Când este urgent: Dacă mini-implantul lipsește și există suspiciunea de ingestie, consultă situația 25.

MODULUL 05

Aparate

6 situații

SITUAȚIA 14 Slăbirea șurubului RME sau decimentarea inelului

Evaluare: Aparatul este mobil? Șurubul se mai rotește? Ce indică jurnalul de activare?

PROTOCOL

1. Verifică integritatea aparatului și a inelelor.
2. Dacă este necesar, îndepărtează aparatul și recimentează-l.
3. Oprește activarea și actualizează jurnalul.
4. Măsoară gradul de expansiune obținut.

CE ÎI POȚI SPUNE PACIENTULUI

Stimate [Numele pacientului], este posibil ca aparatul de expansiune de pe palat să se fi slăbit. Vă rugăm să nu mai activați șurubul până la vizita următoare. Devansați programarea: [Data programării].

Când este urgent: Dacă aparatul este liber în cavitatea bucală, prezentare în aceeași zi.

SITUAȚIA 15 Desprinderea arcului transpalatinal (TPA)

Evaluare: S-a desprins din sudură sau de pe inel? Arcul este liber?

PROTOCOL

1. Îndepărtează fragmentul liber.
2. Evaluează necesarul de ancoraj; planifică o soluție temporară.
3. Înlocuiește aparatul.

CE ÎI POȚI SPUNE PACIENTULUI

Stimate [Numele pacientului], este posibil ca arcul de pe palat să se fi desprins. Dacă fragmentul este mobil, încercați să îl scoateți cu grijă sau aplicați ceară ortodontică și devansați programarea.

Când este urgent: Dacă fragmentul este liber și există risc de ingestie, prezentare în aceeași zi.

SITUAȚIA 16

Butonul Nance traumatizează mucoasa palatinală

Evaluare: Există amprentă, ulcerație sau inflamație pe mucoasa palatinală?

PROTOCOL

1. Depărtează aparatul de mucoasă sau îndepărtează-l complet.
2. Monitorizează vindecarea țesuturilor moi.
3. Reiterează instrucțiunile de igienă.
4. Planifică o soluție temporară pentru ancoraj.

CE ÎI POȚI SPUNE PACIENTULUI

Stimate [Numele pacientului], este posibil ca aparatul de pe palat să exercite presiune asupra mucoasei. Mențineți zona curată; vom verifica situația la control: [Data programării].

Când este urgent: În caz de ulcerație care nu se vindecă, trimitere către specialistul competent.

SITUAȚIA 17

Fractura aparatului funcțional mobil

Evaluare: Unde este fractura? Aparatul mai poate fi inserat?

PROTOCOL

1. Evaluează fractura; decide dacă este necesară repararea sau înlocuirea.
2. Dacă aparatul nu poate fi purtat, notează faza tratamentului în care te afli.
3. Instruiește pacientul să nu poarte aparatul fracturat.

CE ÎI POȚI SPUNE PACIENTULUI

Stimate [Numele pacientului], dacă aparatul s-a rupt, nu îl mai purtați și păstrați toate fragmentele. Aduceți-le la control: [Data programării].

Când este urgent: De regulă nu este o urgență; reparația trebuie făcută în scurt timp pentru a menține continuitatea tratamentului.

SITUAȚIA 18 Desprinderea conexiunii aparatului funcțional fix

Evaluare: Conexiunea este complet desprinsă? Aparatul este liber în cavitatea bucală?

PROTOCOL

1. Îndepărtează fragmentele libere.
2. Refă conexiunea.
3. Verifică mișcările de deschidere a gurii.
4. Notează dacă desprinderile sunt recurente.

CE ÎI POȚI SPUNE PACIENTULUI

Stimate [Numele pacientului], este posibil ca una dintre conexiunile aparatului fix de pe dinți să se fi desprins. Evitați deschiderea largă a gurii și devansați programarea: [Data programării].

Când este urgent: Dacă fragmentul este liber, prezentare în aceeași zi.

SITUAȚIA 19 Iritație cutanată sau probleme de fixare la masca facială

Evaluare: Există roșeață sau leziuni pe piele? Cârligele din cavitatea bucală sunt stabile?

PROTOCOL

1. Ajustează punctele de presiune.
2. Verifică contactele intraorale.
3. Reevaluează împreună cu pacientul timpul și modul de purtare.

CE ÎI POȚI SPUNE PACIENTULUI

Stimate/Stimată [Numele pacientului], dacă există zone de iritație la punctele de contact ale măștii, le vom ajusta la control. Dacă apare o leziune pe piele, întrerupeți temporar purtarea măștii și reprogramați-vă mai devreme.

Când este urgent: În caz de leziuni cutanate sau semne de infecție, contactați medicul curant.

MODULUL 06

Contenție și gutieră

4 situații

SITUAȚIA 20 Dezlipirea retainerului lingual fix

Evaluare: La care dinte s-a dezlipit? Dinții s-au deplasat?

PROTOCOL

1. Înregistrează dezlipirea și poziția dinților.
2. Repară sau înlocuiește retainerul.
3. Dacă există recidivă, măsoară gradul acesteia.
4. Revizuiește planul de contenție (Ghidul 2 / 5 · Manual de Contenție Ortodontică).

CE ÎI POȚI SPUNE PACIENTULUI

Stimate/Stimată [Numele pacientului], este posibil ca unul dintre capetele firului subțire din spatele dinților să se fi dezlipit. Pentru a preveni deplasarea dinților, vă recomandăm să devansați controlul: [Data programării]. Dacă aveți o gutieră transparentă, continuați să o purtați.

Când este urgent: În caz de înțepături și leziuni, solicitați o programare mai devreme.

SITUAȚIA 21 Gutiera transparentă sau Essix ruptă sau pierdută

Evaluare: De cât timp nu mai poartă gutiera? Dinții s-au deplasat?

PROTOCOL

1. Planifică o amprentă sau o scanare pentru noua gutieră.
2. Verifică poziția dinților.
3. Notează perioada în care pacientul nu a purtat gutiera.

CE ÎI POȚI SPUNE PACIENTULUI

Stimate/Stimată [Numele pacientului], dacă ați pierdut sau ați rupt gutiera, este necesară una nouă în cel mai scurt timp pentru a preveni deplasarea dinților. Vă rugăm să devansați programarea: [Data programării].

Când este urgent: De regulă nu este urgent; întârzierea poate duce la recidivă.

SITUAȚIA 22

Aparatul Hawley rupt

Evaluare: S-a rupt acrilatul sau firul metalic? Aparatul mai prezintă adaptare?

PROTOCOL

1. Decide dacă este necesară repararea sau înlocuirea.
2. Verifică adaptarea.
3. Asigură-te că partea ruptă nu lezează țesuturile moi.

CE ÎI POȚI SPUNE PACIENTULUI

Stimate/Stimată [Numele pacientului], dacă aparatul s-a rupt, nu îl mai purtați și păstrați toate fragmentele. Aduceți-le la control: [Data programării].

Când este urgent: De regulă nu este urgent.

SITUAȚIA 23

Desprinderea unui attachment în timpul tratamentului cu aliniatori

Evaluare: Care attachment? Gutiera se mai adaptează corect?

PROTOCOL

1. Înlocuiește attachmentul folosind șablonul.
2. Verifică adaptarea.
3. Demonstrează pacientului tehnica corectă de îndepărtare a gutierei.

CE ÎI POȚI SPUNE PACIENTULUI

Stimate/Stimată [Numele pacientului], este posibil ca una dintre micile proeminențe de pe dinți să se fi desprins. Continuați să purtați gutiera; o vom înlocui la control: [Data programării].

Când este urgent: De regulă nu este urgent.

MODULUL 07

Traumatisme și ingestie

2 situații

SITUAȚIA 24 Traumatism dentar la pacientul cu aparat fix

Evaluare: Ce dinți sunt afectați? Există mobilitate, fractură, deplasare?

PROTOCOL

1. Evaluează dinții, osul și țesuturile moi.
2. Efectuează o radiografie.
3. Îndepărtează forțele active de pe dintele traumatizat.
4. Documentează vitalitatea și stabilește un plan de monitorizare (Ghidul 4 / 5 · Traumatisme și Anchiloză).
5. Dacă este necesar, trimite pacientul către medicul specialist competent.

CE ÎI POȚI SPUNE PACIENTULUI

Stimate/Stimată [Numele pacientului], dacă ați suferit un traumatism la nivelul dinților, trebuie să vă examinăm în aceeași zi. Dacă un dinte s-a deplasat sau s-a rupt un fragment, păstrați-l și prezentați-vă imediat.

Când este urgent: În caz de deplasare dentară, fractură sau traumatism maxilar, prezentați-vă în aceeași zi; dacă este necesar, apelați la serviciul de urgență.

SITUAȚIA 25

Suspiciune de ingestie sau pierdere a unui fragment

Evaluare: Ce fragment lipsește? Pacientul prezintă tuse, dificultăți de respirație sau de deglutiție?

PROTOCOL

1. Examinează cu atenție cavitatea bucală.
2. În caz de simptome respiratorii, trimite pacientul imediat la urgențe medicale.
3. Dacă nu există simptome, înregistrează cazul și planifică investigațiile medicale necesare în funcție de decizia medicală.
4. Stabilește cauza desprinderii fragmentului.

CE ÎI POȚI SPUNE PACIENTULUI

Stimate/Stimată [Numele pacientului], dacă bănuiți că ați înghițit un fragment din aparat și aveți tuse, dificultăți de respirație sau de deglutiție, adresați-vă imediat celei mai apropiate unități de primiri urgențe. Dacă nu aveți simptome, devansați programarea; vom decide împreună cum procedăm.

Când este urgent: Simptomele respiratorii reprezintă întotdeauna o urgență.

FIȘĂ

Fișă de evidență a urgențelor

O fișă pentru fiecare situație de urgență. Folosește-o multiplicată.

1. Foaie de urgență

Pacient

Dată

Numărul și numele cazului

Ce s-a întâmplat (relatarea pacientului)

Constatări

Cauză probabilă

Intervenție efectuată

Informații oferite pacientului

Situație recurentă?

Următoarea vizită de control

2. Foaie de urgență

Pacient

Dată

Numărul și numele cazului

Ce s-a întâmplat (relatarea pacientului)

Constatări

Cauză probabilă

Intervenție efectuată

Informații oferite pacientului

Situație recurentă?

Următoarea vizită de control

Material cu scop educațional. Nu înlocuiește examinarea clinică, decizia medicului și avizul de specialitate.

Pasul următor

Dacă situația de urgență se repetă, completează analiza cauzei rădăcină din **Jurnalul de Cazuri**. Dacă identifici o cauză mecanică, deschide materialul **Atlas de Depanare Mecanică**, iar în caz de traumatism, consultă **Ghidul 4 / 5 · Traumatisme și Anchiloză**.