HITTA PUNKTEN OCH VET VAD DU SKA GÖRA™

Protokoll för de 10 Vanligaste Besvären

De besvär som de flesta patienter kommer med och den muskelordning som är värd att börja med. Den detaljerade tekniken finns i de 60 protokollen.

Innehåll

1 · Så använder du det

2 · De 10 besvären

Nästa steg

AVSNITT 1

Så använder du det

Besvär → muskler i ordning → protokoll.

1. Fråga vad som har hänt och be patienten visa var det gör ont (använd Formulär för Snabb Muskelbedömning).
2. Uteslut det som står under ”Uteslut först”.
3. Bedöm musklerna i angiven ordning och behandla den muskel som återskapar besväret.
4. Ge en stretch att göra hemma och kontrollera förändringen vid nästa behandlingstillfälle.

AVSNITT 2

De 10 besvären

För varje besvär: muskler i ordning och vad du ska utesluta först.

1. Spänningshuvudvärk

ORDNING	MUSKEL	VAR DU LETAR
1	Trapezius – övre fibrer	Ovanför skuldergördeln, mitt emellan nacken och akromion, i den övre fria kanten.
2	Suboccipitala muskler	Precis under nackbenet, till höger och vänster om mittlinjen, på djupet.
3	Sternocleidomastoideus (SCM)	Längs muskelbuken, särskilt i den sternala och den klavikulära delen; den ömmaste punkten ligger i mittersta tredjedelen.
4	Temporalis	Ovanför arcus zygomaticus i fyra zoner, framifrån och bakåt; palperas lätt när patienten tuggar.
5	Semispinalis capitis	I nacken, 2–3 cm från mittlinjen, nedanför nackknölen och mitt på nacken.

Uteslut först

Plötslig huvudvärk, den värsta i patientens liv, feber och nackstelhet, syn- eller talstörning, svaghet: omedelbart till läkare.

2. Smärta och stelhet i nacken

ORDNING	MUSKEL	VAR DU LETAR
1	Levator scapulae	Strax medialt om och ovanför skulderbladets övre vinkel; på sidan av nacken, djupt under trapezius övre kant.
2	Trapezius – övre fibrer	Ovanför skuldergördeln, mitt emellan nacken och akromion, i den övre fria kanten.
3	Splenius cervicis	I nackens nedre del, ovanför skulderbladets övre vinkel, bredvid levator scapulae.

ORDNING	MUSKEL	VAR DU LETAR
4	Skalenusmusklerna (scaleni)	På sidan av halsen, bakom och nedanför SCM, ovanför nyckelbenet.
5	Semispinalis capitis	I nacken, 2–3 cm från mittlinjen, nedanför nackknölen och mitt på nacken.

> **Uteslut först**
> Nacksmärta efter trauma, domningar eller svaghet som strålar ut i armen: läkarundersökning.

3. Smärta i käke och ansikte

ORDNING	MUSKEL	VAR DU LETAR
1	Masseter	I det ytliga lagret under arcus zygomaticus och ovanför underkäksvinkeln; i det djupa lagret framför käkleden.
2	Temporalis	Ovanför arcus zygomaticus i fyra zoner, framifrån och bakåt; palperas lätt när patienten tuggar.
3	Pterygoideus lateralis	Djupt under arcus zygomaticus; intraoralt bakom de övre molarerna, uppåt och bakåt.
4	Pterygoideus medialis	På insidan av underkäksvinkeln, palpation underifrån; intraoralt bakom den sista molaren.
5	Sternocleidomastoideus (SCM)	Längs muskelbuken, särskilt i den sternala och den klavikulära delen; den ömmaste punkten ligger i mittersta tredjedelen.

> **Uteslut först**
> Dental orsak, inflammation, käke som ”låser sig”: tandläkare eller käkkirurg.

4. Skuldersmärta när armen lyfts

ORDNING	MUSKEL	VAR DU LETAR
1	Infraspinatus	På skulderbladets baksida, under spina scapulae, i mellersta och övre delen av fossa infraspinata.
2	Supraspinatus	Ovanför spina scapulae, i den mediala delen av fossa supraspinata och lateralt under akromion.

ORDNING	MUSKEL	VAR DU LETAR
3	Subscapularis	På skulderbladets framsida; du når den från armhålan, längs skulderbladets laterala kant.
4	Deltoideus	I de främre, mellersta och bakre fibrerna, 2–5 cm nedanför akromion.
5	Pectoralis minor	Under processus coracoideus, över 3:e–5:e revbenet, djupt under pectoralis major.

> **Uteslut först**
> Svag arm efter trauma, nattlig smärta som inte går över: läkarundersökning (rotatorkuffen).

5. Besvär som liknar ”tennisarmbåge”

ORDNING	MUSKEL	VAR DU LETAR
1	Underarmens extensorer (ECRL, ECRB, extensor digitorum)	På underarmens bakre laterala sida, 3–6 cm nedanför armbågen.
2	Triceps brachii	På överarmens baksida, i det långa huvudet under armhålan och 4–6 cm ovanför armbågen.
3	Supraspinatus	Ovanför spina scapulae, i den mediala delen av fossa supraspinata och lateralt under akromion.
4	Skalenusmusklerna (scaleni)	På sidan av halsen, bakom och nedanför SCM, ovanför nyckelbenet.

> **Uteslut först**
> Svullnad, lokal värme, nattliga domningar i fingrarna: läkarundersökning.

6. Smärta mellan skulderbladen

ORDNING	MUSKEL	VAR DU LETAR
1	Rhomboideus (major och minor)	Mellan skulderbladets mediala kant och ryggraden, under trapezius.
2	Trapezius – mellersta fibrer	Mellan skulderbladets mediala kant och ryggraden, i höjd med spina scapulae, ytligt.

ORDNING	MUSKEL	VAR DU LETAR
3	Serratus posterior superior	Under skulderbladets övre del, intill ryggraden; du når den när skulderbladet dras ut åt sidan.
4	Skalenusmusklerna (scaleni)	På sidan av halsen, bakom och nedanför SCM, ovanför nyckelbenet.
5	Levator scapulae	Strax medialt om och ovanför skulderbladets övre vinkel; på sidan av nacken, djupt under trapezius övre kant.

> **Uteslut först**
> Bröstsmärta vid ansträngning, andnöd, svettning: omedelbart till läkare (hjärtat).

7. Ländryggssmärta

ORDNING	MUSKEL	VAR DU LETAR
1	Quadratus lumborum	Mellan nedersta revbenet och höftbenskammen, vid erector spinaes laterala kant, djupt.
2	Iliocostalis lumborum	I ländryggen, cirka 5–7 cm från ryggraden, nedanför de nedre revbenen.
3	Multifidus	Precis intill taggutskotten, djupt, i valfritt segment av ryggraden (oftast i ländryggen).
4	Iliopsoas	På lårets framsida nedanför ljumskligamentet (lateralt om femoralisartären) samt i buken, på höftbenets insida.
5	Gluteus medius	2–5 cm nedanför höftbenskammen, i den övre laterala delen av sätesregionen.

> **Uteslut först**
> Domningar eller svaghet som strålar ut i benet, påverkad blås- eller tarmfunktion, feber, viktnedgång: omedelbart till läkare.

8. Smärta från sätet som strålar ut i låret

ORDNING	MUSKEL	VAR DU LETAR
1	Gluteus minimus	Djupt under gluteus medius, mellan höftbenskammen och trochanter major.

ORDNING	MUSKEL	VAR DU LETAR
2	Piriformis	I mellersta och laterala tredjedelen av linjen mellan korsbenets laterala kant och spetsen av trochanter major.
3	Gluteus medius	2–5 cm nedanför höftbenskammen, i den övre laterala delen av sätesregionen.
4	Quadratus lumborum	Mellan nedersta revbenet och höftbenskammen, vid erector spinaes laterala kant, djupt.

> **Uteslut först**
> Domningar, svaghet, förändrade reflexer (från nervrot): läkarundersökning.

9. Knäsmärta

ORDNING	MUSKEL	VAR DU LETAR
1	Rectus femoris	På lårets framsida, strax nedanför höften, nära spina iliaca anterior inferior.
2	Vastus medialis	På lårets främre insida, 5–10 cm ovanför knät.
3	Vastus lateralis	På lårets utsida, på flera ställen mellan höft och knä.
4	Biceps femoris	På lårets bakre utsida, i mellersta och nedre tredjedelen.
5	Adductor longus och brevis	På lårets insida, i den övre tredjedelen.

> **Uteslut först**
> Svullnad, lokal värme, ”låsning”, instabilitet, trauma: läkarundersökning.

10. Smärta i hälen och fotsulan

ORDNING	MUSKEL	VAR DU LETAR
1	Soleus	I vadens nedre del, djupt under gastrocnemius, ovanför hälsenan.
2	Gastrocnemius	I vadens övre del, på det mediala och laterala huvudet, nedanför knävecket.
3	Quadratus plantae	I fotsulans bakre del, djupt, precis framför hälen.

ORDNING	MUSKEL	VAR DU LETAR
4	Flexor digitorum brevis	Mitt under fotsulan, framför hälen.
5	Abductor hallucis	Längs fotsulans mediala kant, mellan hälen och stortåns bas.
6	Tibialis posterior	Djupt i vaden, bakom skenbenets mediala bakre kant.

> **Uteslut först**
> Ensidig svullnad i vaden (trombos), nattlig smärta, domningar: läkarundersökning.

Nästa steg

Den här veckan: avgör vilket besvär dina tre nästa patienter har och följ ordningen.