HITTA PUNKTEN OCH VET VAD DU SKA GÖRA™

# Stretchguide per Kroppsregion

Stretchövningarna för alla 60 muskler på ett ställe, per kroppsregion, i samma ordning som i atlasen och protokollen.

Triggerpunktsatlas · Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter.
Ersätter inte medicinsk diagnos.

# Innehåll

1 · Så stretchar du

2 · Huvud, ansikte och nacke

3 · Skuldra, överarm, underarm och hand

4 · Rygg, ryggrad och bål

5 · Bäcken, höft och säte

6 · Lår, underben och fot

Nästa steg

AVSNITT 1

# Så stretchar du

Tre regler för varje stretch.

## Regler

- [ ] Gå in i stretchen långsamt, på utandningen och utan att gunga.
- [ ] Det ska kännas som en lätt sträckning, aldrig smärta: gör det ont, släpp efter.
- [ ] Håll 20–30 sekunder, 3 repetitioner; stretcha alltid efter behandlingen.

AVSNITT 2

# Huvud, ansikte och nacke

För terapeuten och patienten.

### Trapezius – övre fibrer

Huvudet lutas mot motsatt sida med lätt flexion; sittande håller patienten tag under stolen med handen på samma sida.

**3 × 20–30 s**

### Sternocleidomastoideus (SCM)

Huvudet lutas mot motsatt sida och därefter vrids hakan långsamt mot den sida du behandlar; lätt extension endast om det inte ger yrsel.

**3 × 20–30 s**

### Masseter

Långsam gapning med tungspetsen mot gommen; terapeutens två fingrar för försiktigt käken nedåt.

**3 × 20–30 s**

### Temporalis

Långsam gapning medan terapeutens fingrar glider uppåt över tinningen.

**3 × 20–30 s**

### Pterygoideus lateralis

Långsam retraktion av underkäken (patienten drar hakan lätt bakåt) och därefter långsam stängning av munnen.

**3 × 20–30 s**

### Pterygoideus medialis

Långsam gapning med käken lätt förskjuten mot motsatt sida.

**3 × 20–30 s**

### Splenius capitis

Huvudet i flexion och vridet mot motsatt sida.

**3 × 20–30 s**

### Splenius cervicis

Huvudet i flexion, med lateralflexion och rotation mot motsatt sida.

**3 × 20–30 s**

### Suboccipitala muskler

Indragning av hakan (huvudet glider rakt bakåt) och därefter en lätt ”nick” framåt.

**3 × 20–30 s**

### Semispinalis capitis

Huvudet i flexion med lätt rotation åt sidan.

**3 × 20–30 s**

### Levator scapulae

Huvudet i flexion och vridet mot motsatt sida (näsan mot armhålan), handen på den behandlade sidan i nacken.

**3 × 20–30 s**

### Skalenusmusklerna (scaleni)

Huvudet lutas mot motsatt sida med lätt extension; terapeuten stabiliserar nyckelbenet på den behandlade sidan nedåt.

**3 × 20–30 s**

AVSNITT 3

# Skuldra, överarm, underarm och hand

För terapeuten och patienten.

### Infraspinatus

Armen på den behandlade sidan förs framför bröstet och den andra handen drar armbågen mot bröstet; eller handen bakom ryggen.

**3 × 20–30 s**

### Supraspinatus

Armen på den behandlade sidan bakom ryggen, den andra handen drar försiktigt handleden mot motsatt sida.

**3 × 20–30 s**

### Teres minor

Armen förs framför bröstet, armbågen dras mot bröstet.

**3 × 20–30 s**

### Subscapularis

Armen i utåtrotation, armbågen i 90°, handflatan förs försiktigt bakåt (mot dörrkarmen).

**3 × 20–30 s**

### Deltoideus

Främre fibrer: armen bakåt; bakre fibrer: armen förs framför bröstet.

**3 × 20–30 s**

### Pectoralis major

Stretch i dörröppning: underarmen mot karmen, armbågen i axelhöjd, bålen tar långsamt ett steg framåt.

**3 × 20–30 s**

### Pectoralis minor

Axlarna bakåt och nedåt; i dörröppningen armbågen ovanför axelhöjd.

**3 × 20–30 s**

### Rhomboideus (major och minor)

Armarna korsas framför kroppen (krama dig själv), ryggen kutar lätt.

**3 × 20–30 s**

### Serratus anterior

Armen bakåt och skulderbladet draget mot ryggraden; med djup inandning.

**3 × 20–30 s**

### Latissimus dorsi

Armen över huvudet, bålen i lateralflexion mot motsatt sida.

**3 × 20–30 s**

### Biceps brachii

Armbågen sträckt, underarmen i pronation, armen bakåt.

**3 × 20–30 s**

### Triceps brachii

Armen över huvudet, armbågen helt böjd, den andra handen trycker den försiktigt bakåt.

**3 × 20–30 s**

**Underarmens extensorer (ECRL, ECRB, extensor digitorum)**

Armbågen sträckt, handleden och fingrarna i flexion, den andra handen drar försiktigt nedåt.

**3 × 20–30 s**

**Underarmens flexorer**

Armbågen sträckt, handflatan uppåt, fingrarna dras bakåt.

**3 × 20–30 s**

AVSNITT 4

# Rygg, ryggrad och bål

För terapeuten och patienten.

### Trapezius – mellersta fibrer

Armarna korsas framför kroppen, ryggen rundas.

**3 × 20–30 s**

### Trapezius – nedre fibrer

Armarna framåt och uppåt, ryggen rundad.

**3 × 20–30 s**

### Serratus posterior superior

Armen korsad framför kroppen, ryggen rundad.

**3 × 20–30 s**

### Iliocostalis thoracis

Framåtböjning från sittande, med bålen lätt roterad mot motsatt sida.

**3 × 20–30 s**

### Iliocostalis lumborum

Ryggliggande med knäna dragna mot bröstet.

**3 × 20–30 s**

### Longissimus thoracis

Framåtböjning från sittande eller ryggliggande med knäna mot bröstet.

**3 × 20–30 s**

### Multifidus

Ryggliggande med knäna mot bröstet, med lätt rotation åt sidan.

**3 × 20–30 s**

### Quadratus lumborum

Sidoböjning stående eller i sidoläge, med den övre armen över huvudet.

**3 × 20–30 s**

### Rectus abdominis

Ryggliggande med en kudde under ländryggen, armarna över huvudet.

**3 × 20–30 s**

### Obliquus externus abdominis

Ryggliggande med knäna fällda åt motsatt sida, axlarna kvar mot underlaget.

**3 × 20–30 s**

AVSNITT 5

# Bäcken, höft och säte

För terapeuten och patienten.

### Gluteus maximus

Ryggliggande, knät dras mot motsatt axel.

**3 × 20–30 s**

### Gluteus medius

I sidoläge får det övre benet hänga ner över britsens kant bakom bålen; eller stående med korsade ben och sidoböjning.

**3 × 20–30 s**

### Gluteus minimus

Ryggliggande, benet korsas över mot motsatt sida.

**3 × 20–30 s**

### Piriformis

Ryggliggande, fotleden på det behandlade benet vilar på det andra knät, det andra låret dras mot bröstet (”fyran”-stretch).

**3 × 20–30 s**

### Iliopsoas

Utfallssteg (lunge): det bakre knät i golvet, bäckenet skjuts framåt.

**3 × 20–30 s**

### Tensor fasciae latae (TFL)

I sidoläge får det övre, raka benet hänga bakåt och nedåt.

**3 × 20–30 s**

### Adductor longus och brevis

Sittande med fotsulorna mot varandra (fjärilen), knäna sjunker nedåt.

**3 × 20–30 s**

### Adductor magnus

Sittande bredbent, framåtböjning.

**3 × 20–30 s**

### Pectineus

Benet i abduktion och sträckt, lätt bakåt.

**3 × 20–30 s**

### Sartorius

Höften i extension, med lätt inåtrotation (utfallsposition).

**3 × 20–30 s**

AVSNITT 6

# Lår, underben och fot

För terapeuten och patienten.

### Rectus femoris

Bukläge eller stående, hälen dras mot sätet, höften i extension.

**3 × 20–30 s**

### Vastus medialis

Knät helt böjt (hälen mot sätet).

**3 × 20–30 s**

### Vastus lateralis

Knät helt böjt, benet i lätt inåtrotation.

**3 × 20–30 s**

### Biceps femoris

Ryggliggande, lyft det raka benet med fotleden i dorsalflexion.

**3 × 20–30 s**

### Semitendinosus och semimembranosus

Ryggliggande, lyft det raka benet, lätt ut åt sidan.

**3 × 20–30 s**

### Gastrocnemius

Stående mot en vägg, det bakre benet rakt, hälen i golvet.

**3 × 20–30 s**

### Soleus

Stående mot en vägg, det bakre knät lätt böjt, hälen i golvet.

**3 × 20–30 s**

### Tibialis anterior

Fotleden och tårna i plantarflexion (sittande med fotryggen mot underlaget).

**3 × 20–30 s**

### Peroneus (fibularis) longus

Foten vriden inåt och i plantarflexion.

**3 × 20–30 s**

### Tibialis posterior

Foten vriden utåt och i dorsalflexion.

**3 × 20–30 s**

### Extensor digitorum longus

Tårna och fotleden i plantarflexion.

**3 × 20–30 s**

### Flexor digitorum brevis

Tårna dras uppåt, fotleden i dorsalflexion.

**3 × 20–30 s**

### Abductor hallucis

Stortån dras inåt (mot de andra tårna), fotleden i dorsalflexion.

**3 × 20–30 s**

### Quadratus plantae

Tårna och fotleden i dorsalflexion.

**3 × 20–30 s**

# Nästa steg

**Idag:** prova stretchövningarna för nacke och skuldra på dig själv, så att du kan förklara dem exakt för din patient.