TRYGG MED VARJE PATIENT™

30 Kliniska Fall Steg för Steg

Besvär → fynd → bedömning → behandling. Fiktiva men typiska fall, så att du har ett färdigt tankesätt även inför en svår patient.

Triggerpunktsatlas · Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter.
Ersätter inte medicinsk diagnos.

Innehåll

1 · Så använder du det

2 · 30 fall

Nästa steg

AVSNITT 1

Så använder du det

Läs det som en fallgenomgång.

Viktigt

Fallen är fiktiva utbildningsexempel, inte verkliga patienter. Numret bredvid muskeln motsvarar dess nummer i ”60 Behandlingsprotokoll per Muskel”, om du har dem. Titta i varje fall först på raden ”Uteslut först”.

1. Läs besväret och gissa, innan du läser vidare, vilka muskler som kan ligga bakom.
2. Jämför med bedömningen.
3. Gå igenom de tillstånd som måste uteslutas.
4. Hitta musklerna i atlasen.

AVSNITT 2

30 fall

Från huvud till fot.

1. Huvudvärk framför skärmen

Kvinna, 34 år, kontorsarbetare · utbildningsexempel

BESVÄR	Huvudvärk i tinningarna och i bakhuvudet som ökar framåt eftermiddagen, 3–4 gånger i veckan.
FYND	Framskjuten huvudhållning; spända band i trapezius övre fibrer och i suboccipitalregionen; trycket återskapar smärtan i tinningen.
BEDÖMNING	Smärtans lokalisation (tinning, bakhuvud) och hållningen pekar mot trapezius övre fibrer och de suboccipitala musklerna.
MUSKLER ATT BEHANDLA	Trapezius – övre fibrer (protokoll nr 1); Suboccipitala muskler (protokoll nr 9); Temporalis (protokoll nr 4)
HEMMA	Hakindragning varje timme, skärmen i ögonhöjd, lateralflexionsstretch.

Uteslut först: Plötslig, livets värsta huvudvärk, synstörning, feber: det här fallet är inte sådant.

2. Nacke som ”låser sig” på morgonen

Man, 41 år, lastbilschaufför · utbildningsexempel

BESVÄR	När han vaknar kan han inte vrida huvudet åt vänster; det gör ont i nacken och längs skulderbladets mediala kant.
FYND	Begränsad rotation åt vänster; ömt område ovanför höger skulderblads övre vinkel.
BEDÖMNING	Den begränsade rotationen och smärtan ovanför skulderbladets vinkel är den klassiska bilden av levator scapulae.
MUSKLER ATT BEHANDLA	Levator scapulae (protokoll nr 11); Trapezius – övre fibrer (protokoll nr 1); Splenius cervicis (protokoll nr 8)
HEMMA	Stretch av levator scapulae två gånger om dagen; lägre kudde.

Uteslut först: Inget trauma, ingen domning som strålar ut i armen och ingen feber.

3. Det gör ont i tanden, men tandläkaren hittade inget

Kvinna, 29 år, student under tentaperiod · utbildningsexempel

BESVÄR	Det gör ont i de övre molarerna, på morgonen är käken spänd.
FYND	Gapförmåga 2 fingrar; ömma punkter i masseter; trycket återskapar tandvärken.
BEDÖMNING	Dental orsak är utesluten, bilden är typisk för masseter; stress och tandpressning håller den vid liv.
MUSKLER ATT BEHANDLA	Masseter (protokoll nr 3); Temporalis (protokoll nr 4); Pterygoideus medialis (protokoll nr 6)
HEMMA	Självmassage, tungan mot gommen, var uppmärksam på tandpressning.

Uteslut först: Tandläkarundersökning är gjord.

4. Yrsel och huvudvärk vid nackrörelse

Kvinna, 52 år · utbildningsexempel

BESVÄR	Det gör ont i pannan och runt ögonen, periodvis lätt ostadighet.
FYND	SCM:s sternala del är öm; pincettgreppet återskapar smärtan i pannan.
BEDÖMNING	SCM kan ge smärta i pannan och runt ögonen samt störningar i balanssinnet.
MUSKLER ATT BEHANDLA	Sternocleidomastoideus (SCM) (protokoll nr 2); Trapezius – övre fibrer (protokoll nr 1)
HEMMA	Långsamma huvudrörelser, ingen tv-tittande liggande.

Uteslut först: Verklig rotationskänsla (vertigo), hörselnedsättning, syn- eller talstörning: läkare först. Här har distriktsläkaren redan uteslutit det.

5. Smärta som strålar ut i armen

Man, 38 år, tränare · utbildningsexempel

BESVÄR	Smärta i främre delen av bröstkorgen, längs skulderbladets mediala kant och mot tummen.
FYND	Lätt tryck i skalenusområdet återskapar smärtan; ingen kraftnedsättning.
BEDÖMNING	Skalenusmusklerna refererar smärta till bröstkorgen, skulderbladet och armen; övre bröstandning håller dem vid liv.
MUSKLER ATT BEHANDLA	Skalenusmusklerna (scaleni) (protokoll nr 12); Pectoralis minor (protokoll nr 19); Levator scapulae (protokoll nr 11)
HEMMA	5 minuter bukandning om dagen, ingen tung väska.

Uteslut först: Kraftnedsättning, förändrade reflexer, ihållande domning: läkare för att utesluta nervrotsorsak.

6. Axelsmärta i sömnen

Kvinna, 47 år · utbildningsexempel

BESVÄR	Djup smärta i främre delen av höger axel, kan inte ligga på höger sida.
FYND	Ömma punkter i infraspinatus; trycket strålar ut till axelns framsida.
BEDÖMNING	Infraspinatus ligger baktill men refererar smärtan till axelns framsida: en vanlig missuppfattning.
MUSKLER ATT BEHANDLA	Infraspinatus (protokoll nr 13); Teres minor (protokoll nr 15); Deltoideus (protokoll nr 17)
HEMMA	I sidoliggande en kudde under armen; stretch med armen framför bröstet.

Uteslut först: Svaghet vid armlyft efter trauma, nattlig smärta som inte går över med någonting: läkare.

7. Smärtsamt armlyft

Man, 55 år, målare · utbildningsexempel

BESVÄR	När han lyfter armen över huvudet gör det ont på axelns utsida.
FYND	Ömt område ovanför spina scapulae; trycket strålar ut till axelns utsida och armbågens laterala sida.
BEDÖMNING	Bild av supraspinatus.
MUSKLER ATT BEHANDLA	Supraspinatus (protokoll nr 14); Infraspinatus (protokoll nr 13); Deltoideus (protokoll nr 17)
HEMMA	Pendelrörelser två gånger om dagen, pauser i arbetet.

Uteslut först: Trauma, snabb kraftnedsättning, nattlig smärta: läkare för att utesluta rotatorkuffruptur.

8. Rörelseinskränkning som liknar ”frusen skuldra”

Kvinna, 58 år · utbildningsexempel

BESVÄR	Kan inte rotera armen utåt, det gör ont baktill i axeln och i handleden.
FYND	Utåtrotationen är tydligt begränsad; subscapularis, som du når via armhålan, är öm.
BEDÖMNING	Subscapularis refererar smärta till axelns baksida och handleden och begränsar utåtrotationen.
MUSKLER ATT BEHANDLA	Subscapularis (protokoll nr 16); Pectoralis major (protokoll nr 18); Teres minor (protokoll nr 15)
HEMMA	Stretch med utåtrotation i dörröppningen.

Uteslut först: Om rörelsen är begränsad i alla riktningar och det gör mycket ont nattetid (adhesiv kapsulit): läkarundersökning och gemensam plan.

9. Bröstsmärta efter träning

Man, 30 år · utbildningsexempel

BESVÄR	Efter bänkpress gör det ont i vänstra främre delen av bröstkorgen.
FYND	Spänt band i pectoralis majors laterala kant; trycket återskapar smärtan.
BEDÖMNING	Mekanisk smärta som förändras med rörelse och tryck, överbelastning efter träning.
MUSKLER ATT BEHANDLA	Pectoralis major (protokoll nr 18); Pectoralis minor (protokoll nr 19); Serratus anterior (protokoll nr 21)
HEMMA	Stretch i dörröppningen, gradvis återgång.

Uteslut först: Bröstsmärta vid ansträngning, andnöd, svettningar: OMEDELBART läkare. Det gäller inte här.

10. Tennisarmbåge

Man, 44 år, elektriker · utbildningsexempel

BESVÄR	När han skruvar och greppar föremål gör det ont på armbågens utsida.
FYND	Ömma punkter i underarmens extensorer nedanför armbågen; greppet gör ont.
BEDÖMNING	Underarmens extensorer refererar smärta till armbågens utsida.
MUSKLER ATT BEHANDLA	Underarmens extensorer (ECRL, ECRB, extensor digitorum) (protokoll nr 25); Triceps brachii (protokoll nr 24); Supraspinatus (protokoll nr 14)
HEMMA	Stretch av underarmen, verktyg med tjockare handtag.

Uteslut först: Svullnad, lokal värme, nattlig domning: läkare.

11. Handflata som värker och domnar

Kvinna, 39 år, frisör · utbildningsexempel

BESVÄR	Det gör ont i handflatan och på fingrarnas volara sida, främst efter arbetet.
FYND	Underarmens flexorer är spända; ingen nattlig domning.
BEDÖMNING	Överbelastade flexorer i underarmen.
MUSKLER ATT BEHANDLA	Underarmens flexorer (protokoll nr 26); Pectoralis minor (protokoll nr 19); Skalenusmusklerna (scaleni) (protokoll nr 12)
HEMMA	Stretch av underarmen varje timme på jobbet.

Uteslut först: Nattlig domning, klumpighet i fingrarna (karpaltunnelsyndrom): läkare.

12. Smärta mellan skulderbladen

Kvinna, 33 år, redovisningsekonom · utbildningsexempel

BESVÄR	Brännande smärta mellan skulderbladen som ökar mot kvällen.
FYND	Framåtböjd hållning; ömma punkter i rhomboideus och trapezius mellersta fibrer.
BEDÖMNING	Ofta en kombination av förlängda, svaga ryggmuskler och förkortad bröstmuskel.
MUSKLER ATT BEHANDLA	Rhomboideus (major och minor) (protokoll nr 20); Trapezius – mellersta fibrer (protokoll nr 27); Pectoralis minor (protokoll nr 19)
HEMMA	Stretch av bröstmuskeln, 10 skulderbladsindragningar varje timme.

Uteslut först: Bröstsmärta vid ansträngning, andnöd: läkare.

13. Huggande smärta på bröstkorgens sida

Man, 27 år, löpare · utbildningsexempel

BESVÄR	När han springer känner han ett stick på sidan av revbenen.
FYND	Serratus anterior är öm i höjd med 5:e–6:e revbenet.
BEDÖMNING	Ansträngd andning och löpning överbelastar serratus anterior.
MUSKLER ATT BEHANDLA	Serratus anterior (protokoll nr 21); Obliquus externus abdominis (protokoll nr 36)
HEMMA	Djupa andetag med armen uppsträckt, gradvis ökat tempo.

Uteslut först: Feber, hosta, skarp andningsrelaterad smärta: läkare.

14. Ländryggssmärta efter framåtböjning

Man, 46 år, lagerarbetare · utbildningsexempel

BESVÄR	Efter att ha lyft en låda, plötslig smärta i ländryggen; lateralflexion gör ont.
FYND	Quadratus lumborum är öm; smärtan strålar inte ut i benet, ingen domning.
BEDÖMNING	Smärta som strålar mot crista iliaca vid lateralflexion: quadratus lumborum.
MUSKLER ATT BEHANDLA	Quadratus lumborum (protokoll nr 34); Iliocostalis lumborum (protokoll nr 31); Gluteus medius (protokoll nr 38)
HEMMA	Lateralflexionsstretch, lyft med böjda knän.

Uteslut först: Domning eller svaghet som strålar ut i benet, påverkad urinering eller tarmfunktion: läkare omedelbart.

15. Ländryggssmärta efter långvarigt sittande

Kvinna, 36 år, programmerare · utbildningsexempel

BESVÄR	När hon reser sig kan hon inte räta på sig, det gör ont i ländryggen.
FYND	Iliopsoas är spänd; i utfallsställning dragkänsla i ländryggen.
BEDÖMNING	En höft som länge hålls i flexion förkortar iliopsoas, som refererar smärtan till ländryggen.
MUSKLER ATT BEHANDLA	Iliopsoas (protokoll nr 41); Rectus femoris (protokoll nr 47); Multifidus (protokoll nr 33)
HEMMA	Stretch i utfallsställning varje timme, arbeta även stående.

Uteslut först: Bukbesvär, feber: läkare.

16. Smärta i nedre delen av buken och i ryggen

Kvinna, 31 år, efter intensiv bukmuskelträning · utbildningsexempel

BESVÄR	Det gör ont i mitten av ryggen som ett horisontellt band.
FYND	Rectus abdominis är öm bredvid naveln.
BEDÖMNING	Rectus abdominis kan referera smärta till ryggen som ett horisontellt band.
MUSKLER ATT BEHANDLA	Rectus abdominis (protokoll nr 35); Obliquus externus abdominis (protokoll nr 36); Iliocostalis thoracis (protokoll nr 30)
HEMMA	Magliggande med stöd på armbågarna, färre situps.

Uteslut först: Buksmärta med feber eller kräkningar, smärta i nedre delen av buken som inte är kopplad till menstruation: läkare.

17. Smärta i sätet vid sittande

Man, 50 år, taxichaufför · utbildningsexempel

BESVÄR	Det gör ont mitt i sätet och drar ner mot baksidan av låret.
FYND	Piriformis är öm; ”4”-stretchen återskapar smärtan.
BEDÖMNING	Stillasittande arbete och plånboken i bakfickan håller besvären vid liv.
MUSKLER ATT BEHANDLA	Piriformis (protokoll nr 40); Gluteus minimus (protokoll nr 39); Gluteus maximus (protokoll nr 37)
HEMMA	”4”-stretch, tar ut plånboken ur bakfickan.

Uteslut först: Domning, svaghet, förändrade reflexer: nervrotsorsak utesluts.

18. Smärta som liknar ischias

Kvinna, 45 år · utbildningsexempel

BESVÄR	Smärta längs lårets och underbenets utsida.
FYND	Gluteus minimus är öm ovanför trochanter major; ingen domning, kraft och reflexer normala.
BEDÖMNING	Gluteus minimus ger en bild som liknar ischias.
MUSKLER ATT BEHANDLA	Gluteus minimus (protokoll nr 39); Piriformis (protokoll nr 40); Quadratus lumborum (protokoll nr 34)
HEMMA	Stretch av höften, pauser under långa bilresor.

Uteslut först: Om det hade funnits domning, svaghet eller förändrade reflexer: läkare.

19. Höftsmärta i sidoliggande

Kvinna, 60 år · utbildningsexempel

BESVÄR	Det gör ont på höftens utsida, hon kan inte ligga på den sidan.
FYND	Gluteus medius och tensor fasciae latae är ömma.
BEDÖMNING	Gluteus medius och tensor fasciae latae refererar smärta till höftens utsida och lårets utsida.
MUSKLER ATT BEHANDLA	Gluteus medius (protokoll nr 38); Tensor fasciae latae (TFL) (protokoll nr 42); Gluteus minimus (protokoll nr 39)
HEMMA	Kudde mellan knäna i sömnen, styrketräning av höftens abduktorer.

Uteslut först: Misstänkt höftartros (ljumsksmärta, begränsad rotation): läkare.

20. Ljumsksmärta hos fotbollsspelare

Man, 22 år · utbildningsexempel

BESVÄR	Vid sidosteg gör det ont i ljumsken och på lårets insida.
FYND	Adductor longus är öm i övre tredjedelen.
BEDÖMNING	Snabba sidorörelser belastar adduktorerna.
MUSKLER ATT BEHANDLA	Adductor longus och brevis (protokoll nr 43); Pectineus (protokoll nr 45); Adductor magnus (protokoll nr 44)
HEMMA	”Fjärilsstretch”, gradvis återgång.

Uteslut först: Misstänkt bråck (utbuktning i ljumsken vid hosta): läkare.

21. Knäsmärta i trappor

Kvinna, 42 år · utbildningsexempel

BESVÄR	När hon går nedför trappor gör det ont i knäts framsida.
FYND	Rectus femoris och vastus medialis är ömma; ingen svullnad i knät.
BEDÖMNING	Lårets extensorer refererar smärta till knäts framsida.
MUSKLER ATT BEHANDLA	Rectus femoris (protokoll nr 47); Vastus medialis (protokoll nr 48); Vastus lateralis (protokoll nr 49)
HEMMA	Stretch av låret, knäextension från sittande för styrka.

Uteslut först: Svullnad, ”låsning”, instabilitet, trauma: läkare.

22. Smärta på knäts utsida hos löpare

Man, 35 år, löpare · utbildningsexempel

BESVÄR	Efter långa löprundor gör det ont på knäts utsida.
FYND	Vastus lateralis och tensor fasciae latae är ömma.
BEDÖMNING	Vastus lateralis och tensor fasciae latae refererar smärta till knäts utsida.
MUSKLER ATT BEHANDLA	Vastus lateralis (protokoll nr 49); Tensor fasciae latae (TFL) (protokoll nr 42); Gluteus medius (protokoll nr 38)
HEMMA	Stretch av låret, gradvis ökad löpdistans.

Uteslut först: Svullnad, trauma: läkare.

23. Smärta bakom knät

Kvinna, 26 år, dansare · utbildningsexempel

BESVÄR	När benet är sträckt gör det ont bakom knät.
FYND	Biceps femoris och den övre delen av gastrocnemius är ömma.
BEDÖMNING	Hamstrings och vadens övre del refererar smärta bakom knät.
MUSKLER ATT BEHANDLA	Biceps femoris (protokoll nr 50); Semitendinosus och semimembranosus (protokoll nr 51); Gastrocnemius (protokoll nr 52)
HEMMA	Hamstringsstretch med handduk.

Uteslut först: Utbuktning bakom knät, svullnad i vaden (Bakercysta, trombos): läkare.

24. Nattliga vadkramper

Kvinna, 65 år · utbildningsexempel

BESVÄR	På natten får hon kramp i vaden, på dagen känns vaden stram.
FYND	Gastrocnemius är öm i båda huvudena; ingen svullnad.
BEDÖMNING	En förkortad, överbelastad vadmuskel har tendens till kramp.
MUSKLER ATT BEHANDLA	Gastrocnemius (protokoll nr 52); Soleus (protokoll nr 53)
HEMMA	Vadstretch på kvällen, vätskeintag.

Uteslut först: Ensidig svullnad, lokal värme, rodnad: misstänkt trombos, läkare omedelbart.

25. Hälsmärta

Man, 48 år, vandrare · utbildningsexempel

BESVÄR	Vid gång, främst i slutet av dagen, gör det ont i hälen.
FYND	Soleus och quadratus plantae är ömma.
BEDÖMNING	Soleus refererar smärta till hälen; detsamma gäller fotsulans djupa muskler.
MUSKLER ATT BEHANDLA	Soleus (protokoll nr 53); Quadratus plantae (protokoll nr 60); Flexor digitorum brevis (protokoll nr 58)
HEMMA	Vadstretch med böjt knä, massage av fotsulan med en boll.

Uteslut först: Skarp smärta vid de första stegen på morgonen (plantarfascian), svullnad, domning: specialist.

26. Smärta i underbenet hos ny löpare

Kvinna, 24 år · utbildningsexempel

BESVÄR	Efter löpning gör det ont på underbenets framsida.
FYND	Tibialis anterior är öm; benet ömmar inte vid tryck.
BEDÖMNING	För snabb ökning av belastningen.
MUSKLER ATT BEHANDLA	Tibialis anterior (protokoll nr 54); Extensor digitorum longus (protokoll nr 57)
HEMMA	Stretch av fotryggen, minskad löpdistans.

Uteslut först: Om benet ömmar punktvis och det ökar med belastning (stressfraktur): läkare.

27. Fotledssmärta efter stukning (6 veckor)

Man, 29 år · utbildningsexempel

BESVÄR	Ihållande smärta runt laterala malleolen, instabilitetskänsla.
FYND	Peroneus longus är öm, vid undersökning är fotleden stabil.
BEDÖMNING	Peroneusmusklerna refererar smärta till laterala malleolen och har överbelastats efter skadan.
MUSKLER ATT BEHANDLA	Peroneus (fibularis) longus (protokoll nr 55); Tibialis anterior (protokoll nr 54)
HEMMA	Stå på ett ben, stabiliseringsträning för fotleden.

Uteslut först: Nyligt trauma, kan inte belasta, kraftig svullnad: röntgen, läkare.

28. Smärta i fotsulan efter att ha stått hela dagen

Kvinna, 51 år, butiksbiträde · utbildningsexempel

BESVÄR	Det gör ont mitt i fotsulan och vid tårnas bas.
FYND	Flexor digitorum brevis och abductor hallucis är ömma.
BEDÖMNING	Långvarigt stående och olämpliga skor.
MUSKLER ATT BEHANDLA	Flexor digitorum brevis (protokoll nr 58); Abductor hallucis (protokoll nr 59); Tibialis posterior (protokoll nr 56)
HEMMA	Massage av fotsulan med en boll, bekväma skor.

Uteslut först: Domning, sveda (neurogent), svullnad: läkare.

29. Smärta i tinningarna och tandgnissling

Man, 37 år · utbildningsexempel

BESVÄR	På morgonen gör det ont i tinningarna, hans partner hör honom gnissla tänder på natten.
FYND	Temporalis och masseter är ömma.
BEDÖMNING	Nattlig bruxism tröttar ut tuggmusklerna.
MUSKLER ATT BEHANDLA	Temporalis (protokoll nr 4); Masseter (protokoll nr 3); Pterygoideus lateralis (protokoll nr 5)
HEMMA	Självmassage på kvällen, tandläkare för bettskena.

Uteslut först: Tandläkarundersökning (bettskena).

30. Smärta på hjässan

Kvinna, 44 år, sömmerska · utbildningsexempel

BESVÄR	När hon tittar nedåt länge gör det ont på hjässan.
FYND	Splenius capitis är öm.
BEDÖMNING	Splenius capitis refererar smärta till hjässan.
MUSKLER ATT BEHANDLA	Splenius capitis (protokoll nr 7); Semispinalis capitis (protokoll nr 10); Suboccipitala muskler (protokoll nr 9)
HEMMA	Höj arbetsobjektet på jobbet, hakindragning varje timme.

Uteslut först: Plötslig, ovanlig huvudvärk, neurologiskt symtom: läkare.

Nästa steg

Den här veckan: läs 3 fall om dagen och följ bedömningen på nästa liknande patient.