TRYGG MED VARJE PATIENT™

Tentaförberedelse: 150 Frågor och Svar

För praktiska prov, examensprov och klinisk praktik. Täck över svaret och testa dig själv.

Triggerpunktsatlas · Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter.
Ersätter inte medicinsk diagnos.

Innehåll

1 · Grundbegrepp och säkerhet

2 · Huvud, ansikte och nacke

3 · Skuldra, överarm, underarm och hand

4 · Rygg, ryggrad och bål

5 · Bäcken, höft och säte

6 · Lår, underben och fot

Nästa steg

AVSNITT 1

Grundbegrepp och säkerhet

30 allmänna frågor.

1. Vad är en triggerpunkt?

En öm, palpabel punkt i ett spänt band i muskeln som vid tryck kan ge lokal och refererad smärta.

2. Vad är skillnaden mellan en aktiv och en latent triggerpunkt?

Den aktiva punkten ger smärta även spontant, den latenta är öm endast vid tryck.

3. Vad är refererad smärta?

Smärta som patienten känner i ett område på avstånd från triggerpunkten.

4. Vad är ischemisk kompression?

Ihållande, gradvis ökande tryck på triggerpunkten tills spänningen släpper.

5. Hur hårt ska trycket vara?

Vanligtvis ett obehag på cirka 5–7 på skalan 0–10, beroende på patientens signal.

6. Hur länge håller du kompressionen?

Vanligtvis 30–90 sekunder, 3–5 repetitioner.

7. Varför stretchar vi efter kompressionen?

För att återställa det spända bandets längd och bibehålla resultatet.

8. Vad är ett spänt band?

En palpabel, repliknande, hårdare grupp av fibrer i muskeln.

9. Vad är ett lokalt ryckningssvar (local twitch response)?

Den korta kontraktionen av det spända bandet när du ”knäpper” tvärs över triggerpunkten.

10. Vad betyder VAS?

Visuell analog skala som bedömer smärtintensiteten från 0 till 10.

11. Vilka faktorer upprätthåller triggerpunkter?

Dålig hållning, upprepad belastning, stress, sömnbrist, förkortade muskler, inaktivitet.

12. När ska patienten inte behandlas?

Vid feber, nyligt trauma, misstänkt trombos, nattlig smärta utan känd orsak, neurologiska symtom.

13. Vad gör du om yrsel uppstår under behandlingen?

Du avbryter omedelbart; om det inte går över remitterar du patienten till läkare.

14. Varför är hemprogrammet viktigt?
Eftersom de upprätthållande faktorerna verkar hemma och på jobbet; utan hemprogram kommer besvären tillbaka.

15. Vad är pincettgreppet och när använder du det?
Att greppa muskelbuken mellan två fingrar; i ytliga muskler som går att greppa (t.ex. trapezius, SCM).

16. Vad tänker du på hos en patient som tar blodförtunnande?
Du använder endast lätt tryck och håller koll på om blåmärken uppstår.

17. Vad är skillnaden mellan en triggerpunkt och en ömmande punkt (tender point)?
Triggerpunkten i ett spänt band kan ge refererad smärta, den ömmande punkten är lokal ömhet.

18. Hur dokumenterar du behandlingen?
Besvär, VAS, behandlade muskler, teknik, reaktion, hemuppgift, nästa steg.

19. Varför bedömer du muskler på avstånd från smärtområdet?
Eftersom källan på grund av den refererade smärtan ofta sitter någon annanstans än där det gör ont.

20. Vad gör du om trycket ger domning i armen?
Du minskar trycket eller avbryter; vid ihållande domning, läkare.

21. Vilken muskel kan ge ”tandvärk” utan dental orsak?
Oftast masseter och temporalis.

22. Vilken muskel kan ge smärta i pannan och runt ögat?
SCM och de suboccipitala musklerna.

23. Vilken muskel sitter baktill men gör ont framtill?
Infraspinatus: den sitter på skulderbladet och refererar smärtan till axelns framsida.

24. Vilken muskel kan efterlikna ischias?
Gluteus minimus och piriformis.

25. Vilken muskel kan ge hälsmärta?
Soleus och quadratus plantae.

26. Vad tänker du på vid behandling av SCM?
Endast pincettgrepp; aldrig tryck bakåt på halsens framsida (arteria carotis).

27. Vad tänker du på vid behandling av vaden?
Vid ensidig svullnad, lokal värme eller rodnad, ingen massage (misstänkt trombos).

28. Vad tänker du på vid behandling av iliopsoas?
Aldrig tryck nära artären; vid bukbesvär och under graviditet inte på den abdominala delen.

29. Vilken position är lämplig för behandling av quadratus lumborum?
Sidoliggande med det övre benet hängande bakåt; då ökar avståndet mellan bäcken och revben.

30. Varför hjälper bukandning vid besvär från skalenusmusklerna?
Eftersom den ersätter övre bröstandning och minskar överbelastningen av skalenusmusklerna.

AVSNITT 2

Huvud, ansikte och nacke

24 frågor.

31. Trapezius – övre fibrer: var letar du efter triggerpunkten?
Ovanför skuldergördeln, mitt emellan nacken och akromion, i den övre fria kanten.

32. Trapezius – övre fibrer: vart kan smärtan refereras?
Tinningen, huvudets sida, halsens sida, bakom örat, underkäksvinkeln.

33. Sternocleidomastoideus (SCM): var letar du efter triggerpunkten?
Längs muskelbuken, särskilt i den sternala och den klavikulära delen; den ömmaste punkten ligger i mittersta tredjedelen.

34. Sternocleidomastoideus (SCM): vart kan smärtan refereras?
Pannan, runt ögat, kinden, djupt i örat, hjässan, bakhuvudet.

35. Masseter: var letar du efter triggerpunkten?
I det ytliga lagret under arcus zygomaticus och ovanför underkäksvinkeln; i det djupa lagret framför käkleden.

36. Masseter: vart kan smärtan refereras?
Kindtänderna i över- och underkäken, underkäken, ögonbrynet, djupt i örat.

37. Temporalis: var letar du efter triggerpunkten?
Ovanför arcus zygomaticus i fyra zoner, framifrån och bakåt; palperas lätt när patienten tuggar.

38. Temporalis: vart kan smärtan refereras?
Tinningen, ögonbrynet, bakom ögat, tänderna i överkäken, huvudets sida.

39. Pterygoideus lateralis: var letar du efter triggerpunkten?
Djupt under arcus zygomaticus; intraoralt bakom de övre molarerna, uppåt och bakåt.

40. Pterygoideus lateralis: vart kan smärtan refereras?
Käkleden, kinden (över bihålorna).

41. Pterygoideus medialis: var letar du efter triggerpunkten?
På insidan av underkäksvinkeln, palpation underifrån; intraoralt bakom den sista molaren.

42. Pterygoideus medialis: vart kan smärtan refereras?
Tungroten, halsen (svalget), under örat, käkleden.

43. Splenius capitis: var letar du efter triggerpunkten?
På nackens bakre sida, mellan SCM och trapezius, cirka 2–3 fingerbredder nedanför protuberantia occipitalis externa.

44. Splenius capitis: vart kan smärtan refereras?

Hjässan.

45. Splenius cervicis: var letar du efter triggerpunkten?

I nackens nedre del, ovanför skulderbladets övre vinkel, bredvid levator scapulae.

46. Splenius cervicis: vart kan smärtan refereras?

Bakom ögat, bakhuvudet, övergången nacke–skuldra.

47. Suboccipitala muskler: var letar du efter triggerpunkten?

Precis under nackbenet, till höger och vänster om mittlinjen, på djupet.

48. Suboccipitala muskler: vart kan smärtan refereras?

Huvudets sida, bakom ögat, pannan, bakhuvudet.

49. Semispinalis capitis: var letar du efter triggerpunkten?

I nacken, 2–3 cm från mittlinjen, nedanför nackknölen och mitt på nacken.

50. Semispinalis capitis: vart kan smärtan refereras?

Huvudets sida, tinningen, pannan, bakhuvudet.

51. Levator scapulae: var letar du efter triggerpunkten?

Strax medialt om och ovanför skulderbladets övre vinkel; på sidan av nacken, djupt under trapezius övre kant.

52. Levator scapulae: vart kan smärtan refereras?

Övergången nacke–skuldra, skulderbladets mediala kant, skuldrans baksida.

53. Skalenusmusklerna (scaleni): var letar du efter triggerpunkten?

På sidan av halsen, bakom och nedanför SCM, ovanför nyckelbenet.

54. Skalenusmusklerna (scaleni): vart kan smärtan refereras?

Bröstkorgens framsida, överarmen, skulderbladets mediala kant, handen (tumme och pekfinger).

AVSNITT 3

Skuldra, överarm, underarm och hand

28 frågor.

55. Infraspinatus: var letar du efter triggerpunkten?

På skulderbladets baksida, under spina scapulae, i mellersta och övre delen av fossa infraspinata.

56. Infraspinatus: vart kan smärtan refereras?

Skuldrans framsida (djupt), överarmens främre utsida, underarmen, handens tumsida.

57. Supraspinatus: var letar du efter triggerpunkten?

Ovanför spina scapulae, i den mediala delen av fossa supraspinata och lateralt under akromion.

58. Supraspinatus: vart kan smärtan refereras?

Skuldrans sida (deltoideusregionen), överarmens utsida, armbågens utsida.

59. Teres minor: var letar du efter triggerpunkten?

Vid skulderbladets laterala kant, nedanför infraspinatus, ovanför det bakre armhålsvecket.

60. Teres minor: vart kan smärtan refereras?

Skuldrans baksida (punktformigt), överarmens baksida.

61. Subscapularis: var letar du efter triggerpunkten?

På skulderbladets framsida; du når den från armhålan, längs skulderbladets laterala kant.

62. Subscapularis: vart kan smärtan refereras?

Skuldrans baksida, skulderbladet, överarmens baksida, handleden.

63. Deltoideus: var letar du efter triggerpunkten?

I de främre, mellersta och bakre fibrerna, 2–5 cm nedanför akromion.

64. Deltoideus: vart kan smärtan refereras?

Skuldran (runt punkten), överarmen.

65. Pectoralis major: var letar du efter triggerpunkten?

I bröstmuskelns laterala kant (främre armhålsvecket), under nyckelbenet och bredvid bröstbenet.

66. Pectoralis major: vart kan smärtan refereras?

Bröstkorgens framsida, skuldrans framsida, överarmens insida, bröstregionen.

67. Pectoralis minor: var letar du efter triggerpunkten?

Under processus coracoideus, över 3:e–5:e revbenet, djupt under pectoralis major.

68. Pectoralis minor: vart kan smärtan refereras?

Skuldrans framsida, bröstkorgen, överarmens insida, handens lillfingersida.

69. Rhomboideus (major och minor): var letar du efter triggerpunkten?

Mellan skulderbladets mediala kant och ryggraden, under trapezius.

70. Rhomboideus (major och minor): vart kan smärtan refereras?

Skulderbladets mediala kant, mellan skulderbladen.

71. Serratus anterior: var letar du efter triggerpunkten?

På bröstkorgens sida, under armhålan, i höjd med 5:e–6:e revbenet.

72. Serratus anterior: vart kan smärtan refereras?

Bröstkorgens sida, skulderbladets nedre vinkel, överarmens insida.

73. Latissimus dorsi: var letar du efter triggerpunkten?

I det bakre armhålsvecket, i höjd med skulderbladets nedre vinkel.

74. Latissimus dorsi: vart kan smärtan refereras?

Skulderbladets nedre vinkel, överarmens bakre insida, ringfinger och lillfinger.

75. Biceps brachii: var letar du efter triggerpunkten?

I mittersta tredjedelen av överarmens framsida, i båda huvudena.

76. Biceps brachii: vart kan smärtan refereras?

Skuldrans framsida, armvecket.

77. Triceps brachii: var letar du efter triggerpunkten?

På överarmens baksida, i det långa huvudet under armhålan och 4–6 cm ovanför armbågen.

78. Triceps brachii: vart kan smärtan refereras?

Skuldrans baksida, armbågens utsida, underarmens baksida.

79. Underarmens extensorer (ECRL, ECRB, extensor digitorum): var letar du efter triggerpunkten?

På underarmens bakre laterala sida, 3–6 cm nedanför armbågen.

80. Underarmens extensorer (ECRL, ECRB, extensor digitorum): vart kan smärtan refereras?

Armbågens utsida, underarmens baksida, handryggen, fingrarna.

81. Underarmens flexorer: var letar du efter triggerpunkten?

På underarmens mediala framsida, 3–6 cm nedanför armbågen.

82. Underarmens flexorer: vart kan smärtan refereras?

Handledens volarsida, handflatan, fingrarnas handflatesida.

AVSNITT 4

Rygg, ryggrad och bål

20 frågor.

83. Trapezius – mellersta fibrer: var letar du efter triggerpunkten?

Mellan skulderbladets mediala kant och ryggraden, i höjd med spina scapulae, ytligt.

84. Trapezius – mellersta fibrer: vart kan smärtan refereras?

Mellan skulderbladen, brännande intill ryggraden.

85. Trapezius – nedre fibrer: var letar du efter triggerpunkten?

Mellan skulderbladets nedre vinkel och ryggraden, mitt på ryggen.

86. Trapezius – nedre fibrer: vart kan smärtan refereras?

Nackens baksida, akromion, mellan skulderbladen.

87. Serratus posterior superior: var letar du efter triggerpunkten?

Under skulderbladets övre del, intill ryggraden; du når den när skulderbladet dras ut åt sidan.

88. Serratus posterior superior: vart kan smärtan refereras?

Djupt under skulderbladet, skuldrans baksida, överarmens baksida, lillfingret.

89. Iliocostalis thoracis: var letar du efter triggerpunkten?

Cirka 5–8 cm från ryggraden, i mellersta och nedre bröstryggen.

90. Iliocostalis thoracis: vart kan smärtan refereras?

Mitt på ryggen, buken (ibland), nedanför skulderbladet.

91. Iliocostalis lumborum: var letar du efter triggerpunkten?

I ländryggen, cirka 5–7 cm från ryggraden, nedanför de nedre revbenen.

92. Iliocostalis lumborum: vart kan smärtan refereras?

Ländryggen, sätesregionen, nedre delen av buken.

93. Longissimus thoracis: var letar du efter triggerpunkten?

2–4 cm från ryggraden, i nedre bröstryggen och övre ländryggen.

94. Longissimus thoracis: vart kan smärtan refereras?

Sätesregionen, ländryggen, höftbenskammen.

95. Multifidus: var letar du efter triggerpunkten?

Precis intill taggutskotten, djupt, i valfritt segment av ryggraden (oftast i ländryggen).

96. Multifidus: vart kan smärtan refereras?

Punktformigt intill ryggraden, korsbenet, buken (sällan).

97. Quadratus lumborum: var letar du efter triggerpunkten?

Mellan nedersta revbenet och höftbenskammen, vid erector spinaes laterala kant, djupt.

98. Quadratus lumborum: vart kan smärtan refereras?

Höftbenskammen, sätesregionen, höftens sida, ländryggen.

99. Rectus abdominis: var letar du efter triggerpunkten?

Ovanför och nedanför naveln, 2–4 cm från mittlinjen.

100. Rectus abdominis: vart kan smärtan refereras?

Vågrätt band mitt på ryggen, buken, ländryggen.

101. Obliquus externus abdominis: var letar du efter triggerpunkten?

På bukens sida, nedanför revbensbågen och ovanför höftbenskammen.

102. Obliquus externus abdominis: vart kan smärtan refereras?

Bukens sida, ländryggen, nedre bröstkorgen.

AVSNITT 5

Bäcken, höft och säte

20 frågor.

103. Gluteus maximus: var letar du efter triggerpunkten?

I den nedre mediala delen av sätesregionen, intill korsbenet och ovanför sittbensknölen.

104. Gluteus maximus: vart kan smärtan refereras?

Sätesregionen, korsbenet, runt svanskotan.

105. Gluteus medius: var letar du efter triggerpunkten?

2–5 cm nedanför höftbenskammen, i den övre laterala delen av sätesregionen.

106. Gluteus medius: vart kan smärtan refereras?

Nedre ländryggen, korsbenet, höftens sida, sätesregionen.

107. Gluteus minimus: var letar du efter triggerpunkten?

Djupt under gluteus medius, mellan höftbenskammen och trochanter major.

108. Gluteus minimus: vart kan smärtan refereras?

Lårets utsida, underbenets utsida, lårets baksida, fotleden.

109. Piriformis: var letar du efter triggerpunkten?

I mellersta och laterala tredjedelen av linjen mellan korsbenets laterala kant och spetsen av trochanter major.

110. Piriformis: vart kan smärtan refereras?

Sätesregionen, korsbenet, lårets baksida, bakom höftleden.

111. Iliopsoas: var letar du efter triggerpunkten?

På lårets framsida nedanför ljumskligamentet (lateralt om femoralisartären) samt i buken, på höftbenets insida.

112. Iliopsoas: vart kan smärtan refereras?

Ländryggen intill ryggraden, korsbenet, lårets framsida.

113. Tensor fasciae latae (TFL): var letar du efter triggerpunkten?

På höftens främre laterala del, nedanför spina iliaca anterior superior.

114. Tensor fasciae latae (TFL): vart kan smärtan refereras?

Lårets utsida, knäts utsida.

115. Adductor longus och brevis: var letar du efter triggerpunkten?

På lårets insida, i den övre tredjedelen.

116. Adductor longus och brevis: vart kan smärtan refereras?

Ljumsken, lårets insida, knäts insida.

117. Adductor magnus: var letar du efter triggerpunkten?

På lårets bakre insida, i mellersta tredjedelen och nära sittbensknölen.

118. Adductor magnus: vart kan smärtan refereras?

Ljumsken, lårets insida, djupt i bäckenet.

119. Pectineus: var letar du efter triggerpunkten?

På lårets främre insida, nedanför ljumskvecket, medialt om femoralisartären.

120. Pectineus: vart kan smärtan refereras?

Djupt i ljumsken, lårets främre insida.

121. Sartorius: var letar du efter triggerpunkten?

Snett över lårets framsida, från höftbenets främre utskott till knäts insida, ytligt.

122. Sartorius: vart kan smärtan refereras?

Lårets framsida (brännande, stickande känsla), knäts insida.

AVSNITT 6

Lår, underben och fot

28 frågor.

123. Rectus femoris: var letar du efter triggerpunkten?
På lårets framsida, strax nedanför höften, nära spina iliaca anterior inferior.

124. Rectus femoris: vart kan smärtan refereras?
Knäts framsida, runt knäskålen.

125. Vastus medialis: var letar du efter triggerpunkten?
På lårets främre insida, 5–10 cm ovanför knät.

126. Vastus medialis: vart kan smärtan refereras?
Knäts insida, knäts framsida.

127. Vastus lateralis: var letar du efter triggerpunkten?
På lårets utsida, på flera ställen mellan höft och knä.

128. Vastus lateralis: vart kan smärtan refereras?
Lårets utsida, knäts utsida, bakom knäskålen.

129. Biceps femoris: var letar du efter triggerpunkten?
På lårets bakre utsida, i mellersta och nedre tredjedelen.

130. Biceps femoris: vart kan smärtan refereras?
Knävecket, lårets baksida.

131. Semitendinosus och semimembranosus: var letar du efter triggerpunkten?
På lårets bakre insida, i mellersta och nedre tredjedelen.

132. Semitendinosus och semimembranosus: vart kan smärtan refereras?
Nedre sätesregionen, lårets baksida, knäveckets insida.

133. Gastrocnemius: var letar du efter triggerpunkten?
I vadens övre del, på det mediala och laterala huvudet, nedanför knävecket.

134. Gastrocnemius: vart kan smärtan refereras?
Fotvalvet, vaden, knävecket.

135. Soleus: var letar du efter triggerpunkten?
I vadens nedre del, djupt under gastrocnemius, ovanför hälsenan.

136. Soleus: vart kan smärtan refereras?
Hälen, vaden, korsbenet (sällan).

137. Tibialis anterior: var letar du efter triggerpunkten?
Precis lateralt om skenbenet, i underbenets övre tredjedel.

138. Tibialis anterior: vart kan smärtan refereras?
Fotledens framsida, stortån.

139. Peroneus (fibularis) longus: var letar du efter triggerpunkten?
På underbenets utsida, i den övre tredjedelen, 2–4 cm nedanför fibulahuvudet.

140. Peroneus (fibularis) longus: vart kan smärtan refereras?
Yttre malleolen, fotens utsida.

141. Tibialis posterior: var letar du efter triggerpunkten?
Djupt i vaden, bakom skenbenets mediala bakre kant.

142. Tibialis posterior: vart kan smärtan refereras?
Hälsenan, hälen, fotsulan.

143. Extensor digitorum longus: var letar du efter triggerpunkten?
På underbenets främre utsida, lateralt om tibialis anterior, i den övre tredjedelen.

144. Extensor digitorum longus: vart kan smärtan refereras?
Fotryggen, de mellersta tårna.

145. Flexor digitorum brevis: var letar du efter triggerpunkten?
Mitt under fotsulan, framför hälen.

146. Flexor digitorum brevis: vart kan smärtan refereras?
Mitt under fotsulan, tåbaserna.

147. Abductor hallucis: var letar du efter triggerpunkten?
Längs fotsulans mediala kant, mellan hälen och stortåns bas.

148. Abductor hallucis: vart kan smärtan refereras?
Hälens insida, fotvalvets mediala kant.

149. Quadratus plantae: var letar du efter triggerpunkten?
I fotsulans bakre del, djupt, precis framför hälen.

150. Quadratus plantae: vart kan smärtan refereras?
Hälens undersida.

Nästa steg

I dag: besvara de första 30 frågorna utan att titta på svaren och markera dem du inte kunde.