ΔΩΡΟ 4 / 5 · ΚΙΤ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ

Το Αλφάβητο της Εικόνας: Όροι και Συντομογραφίες Γνωματεύσεων

Υπέρπυκνο, υπερέντονο, άνηχο, T1, T2, HU και πολλά ακόμη· ταξινομημένα ανά απεικονιστική μέθοδο και εξηγημένα σε μία γραμμή, για να γράφετε τη γνωμάτευσή σας με ακρίβεια.

Η Βίβλος του Ακτινολόγου

Περιεχόμενα

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το γλωσσάριο

Κεφάλαιο 1 · Γενικοί όροι

Κεφάλαιο 2 · Ακτινογραφία

Κεφάλαιο 3 · Αξονική τομογραφία

Κεφάλαιο 4 · Μαγνητική τομογραφία

Κεφάλαιο 5 · Υπέρηχος και Doppler

Κεφάλαιο 6 · Συντομογραφίες

Κεφάλαιο 7 · Φράσεις γνωμάτευσης

Κεφάλαιο 8 · Όροι που συχνά συγχέονται

Κεφάλαιο 9 · Ασαφείς εκφράσεις προς αποφυγή

Επόμενο βήμα

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το γλωσσάριο

232 όροι, συντομογραφίες και φράσεις γνωμάτευσης· ο καθένας με επεξήγηση σε μία γραμμή και παράδειγμα χρήσης.

> *Σωστή λέξη, σωστή μέθοδος: πυκνότητα στην AT, σήμα στη MT, ηχογένεια στον υπέρηχο. Η σωστή χρήση αυτών των τριών λέξεων κάνει αμέσως τη γνωμάτευσή σας πιο αξιόπιστη.*

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ	ΛΕΞΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ	ΦΩΤΕΙΝΟ · ΣΚΟΥΡΟ · ΙΔΙΟ
Ακτινογραφία	Σκίαση / ακτινοδιαύγεια (πυκνότητα)	σκίαση · ακτινοδιαύγεια · —
AT	Πυκνότητα (HU)	υπέρπυκνο · υπόπυκνο · ισόπυκνο
MT	Σήμα (ένταση)	υπερέντονο · υπόεντονο · ισοέντονο
Υπέρηχος (US)	Ηχογένεια	υπερηχογενές · υποηχογενές (άνηχο) · ισοηχογενές

Σταθερή σειρά περιγραφής

1. **Τι** — βλάβη, όζος, μάζα, περιχαρακωμένη συλλογή, συλλογή υγρού…
2. **Πού** — όργανο, τμήμα, πλευρά, επίπεδο.
3. **Πόσο** — μέγεθος (σε δύο ή τρία επίπεδα), αριθμός.
4. **Πώς** — πυκνότητα / σήμα / ηχογένεια, όρια, περίγραμμα, εσωτερική δομή, ενίσχυση.
5. **Συγκρίνετε και συνοψίστε** — μεταβολή σε σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση· συμπέρασμα και σύσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γενικοί όροι

Λέξεις περιγραφής, εντόπισης και σύγκρισης που χρησιμοποιούνται σε κάθε απεικονιστική μέθοδο.

ΟΡΟΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
Βλάβη	Γενικός όρος για κάθε περιοχή που διαφέρει από τον φυσιολογικό ιστό· από μόνος του δεν αρκεί.	*Υπόπυκνη βλάβη … mm στον δεξιό λοβό του ήπατος.*
Εστία	Μικρή, περιγεγραμμένη βλάβη.	*Υπέρπυκνη εστία χιλιοστομετρικών διαστάσεων.*
Όζος	Στρογγυλή, περιγεγραμμένη σκίαση στον πνεύμονα έως 3 cm.	*Συμπαγής όζος 6 mm στον δεξιό άνω λοβό.*
Μάζα	Σκίαση στον πνεύμονα μεγαλύτερη από 3 cm· στη γενική χρήση, βλάβη με φαινόμενο μάζας.	*Μάζα στο μεσοθωράκιο.*
Εστιακό / διάχυτο	Σε περιορισμένη περιοχή / διάχυτα σε ολόκληρο το όργανο.	*Διάχυτη ηπατική στεάτωση.*
Πολυεστιακό	Σε περισσότερες από μία χωριστές εστίες.	*Πολυεστιακές βλάβες με ενίσχυση.*
Ομοιογενές / ετερογενές	Εσωτερική δομή με ομοιόμορφη / μικτή πυκνότητα, σήμα ή ηχογένεια.	*Μάζα με ετερογενή ενίσχυση.*
Σαφώς αφοριζόμενο	Που διαχωρίζεται από τον γειτονικό ιστό με σαφές όριο.	*Σαφώς αφοριζόμενη κύστη με ομαλό περίγραμμα.*
Ασαφώς αφοριζόμενο	Με όριο που μεταπίπτει στον γειτονικό ιστό, χωρίς σαφή διάκριση.	*Υπόπυκνη περιοχή με ασαφή όρια.*
Λοβωτό περίγραμμα	Κυματοειδές, οζώδες εξωτερικό περίγραμμα.	*Συμπαγής όζος με λοβωτό περίγραμμα.*
Ακιδωτό περίγραμμα	Περίγραμμα με ακτινωτές προσεκβολές προς τα έξω· σημαντικό όσον αφορά την κακοήθεια.	*Μάζα με ακιδωτό περίγραμμα.*
Φαινόμενο μάζας	Ώθηση και πίεση των γειτονικών δομών από τη βλάβη.	*Εξάλειψη των αυλάκων λόγω φαινομένου μάζας.*
Μετατόπιση (shift)	Μετατόπιση μιας δομής από τη φυσιολογική της θέση.	*Μετατόπιση των δομών της μέσης γραμμής κατά 6 mm.*
Εξωγενής πίεση	Πίεση μιας δομής από έξω.	*Εξωγενής πίεση στον ουρητήρα.*
Διήθηση (invasion)	Επέκταση της βλάβης στον γειτονικό ιστό με υπέρβαση των ορίων.	*Υποψία διήθησης του περινεφρικού λίπους.*
Επασβέστωση	Εναπόθεση ασβεστίου στον ιστό· πολύ πυκνή στην ακτινογραφία και την ΑΤ, με ακουστική σκίαση στον υπέρηχο.	*Όζος με αδρές επασβεστώσεις.*
Διαφραγμάτια (septations)	Λεπτά διαφραγμάτια μέσα σε κυστική βλάβη.	*Κυστική βλάβη με λεπτά διαφραγμάτια.*

ΟΡΟΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
Συμπαγές στοιχείο	Περιοχή μέσα σε κυστική βλάβη που δεν είναι υγρό, με ιστική υφή.	*Συμπαγές στοιχείο με ενίσχυση.*
Κυστικό / σύνθετο κυστικό	Βλάβη με υγρό περιεχόμενο / βλάβη με υγρό που περιέχει διαφραγμάτια, παχύ τοίχωμα ή συμπαγή περιοχή.	*Σύνθετη κυστική βλάβη των εξαρτημάτων.*
Νέκρωση	Μη βιώσιμη περιοχή χωρίς ενίσχυση μέσα στη βλάβη.	*Μάζα με κεντρική νέκρωση.*
Ενίσχυση (σκιαγραφική)	Αύξηση πυκνότητας ή σήματος μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού.	*Περιφερική δακτυλιοειδής ενίσχυση.*
Οίδημα	Αυξημένο υγρό στον ιστό.	*Αγγειογενές οίδημα γύρω από τη βλάβη.*
Συλλογή υγρού (effusion)	Υγρό σε σωματική κοιλότητα (υπεζωκότας, περικάρδιο, άρθρωση).	*Αμφοτερόπλευρη υπεζωκοτική συλλογή.*
Περιχαρακωμένη συλλογή	Περιορισμένη, περιχαρακωμένη συλλογή υγρού (απόστημα, αιμάτωμα, χολόωμα κ.λπ.).	*Περιχαρακωμένη συλλογή στην πύελο.*
Ελεύθερο υγρό / ελεύθερος αέρας	Μη περιχαρακωμένο υγρό / αέρας στην περιτοναϊκή κοιλότητα.	*Ελεύθερο υγρό στον θύλακο του Morison.*
Εγγύς / περιφερικό	Πλησιέστερα / μακρύτερα από το κέντρο ή την αφετηρία.	*Λίθος περιφερικού ουρητήρα.*
Πρόσθιο / οπίσθιο	Πρόσθιο / οπίσθιο.	*Μάζα πρόσθιου μεσοθωρακίου.*
Έσω / έξω	Κοντά / μακριά από τη μέση γραμμή.	*Έξω κνημιαίο πλατό.*
Άνω / κάτω (κρανιακά / ουραία)	Άνω / κάτω.	*Κάτω πόλος του νεφρού.*
Ομόπλευρο / ετερόπλευρο	Ομόπλευρα / ετερόπλευρα.	*Δεν παρατηρείται ετερόπλευρη υδρονέφρωση.*
Εγκάρσιο / στεφανιαίο / οβελιαίο	Επίπεδα τομής: οριζόντιο / από εμπρός / από το πλάι.	*Πιο εμφανές στις στεφανιαίες ανασυνθέσεις.*
Διαφορική διάγνωση	Κατάλογος πιθανών διαγνώσεων που μπορούν να εξηγήσουν το εύρημα.	*Στη διαφορική διάγνωση: απόστημα και νεκρωτικός όγκος.*
Τυχαίο εύρημα	Εύρημα που παρατηρήθηκε τυχαία, άσχετο με το κλινικό ερώτημα.	*Τυχαίως ανευρεθείς όζος επινεφριδίου.*
Μεταβολή από την προηγούμενη εξέταση (interval change)	Η διαφορά μεταξύ δύο εξετάσεων.	*Καμία μεταβολή σε σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση.*
Σταθερό / εξέλιξη / υποστροφή	Αμετάβλητο / σε εξέλιξη / σε υποστροφή.	*Σταθερό μέγεθος βλάβης.*
Τέχνημα	Εικόνα που οφείλεται στην απεικόνιση και όχι στην πραγματική ανατομία.	*Το τέχνημα κίνησης περιορίζει την αξιολόγηση.*
Φαινόμενο μερικού όγκου	Παραπλανητική πυκνότητα ή σήμα που προκύπτει από τον μέσο όρο διαφορετικών ιστών μέσα στην ίδια τομή.	*Μπορεί να οφείλεται σε φαινόμενο μερικού όγκου.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ακτινογραφία

Όροι πυκνότητας, πνευμονικών προτύπων, κοιλίας και οστών στην απλή ακτινογραφία.

ΟΡΟΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
Σκίαση	Λευκή περιοχή στην ακτινογραφία (απορροφά περισσότερο τη δέσμη).	*Σκίαση στο δεξιό κάτω πνευμονικό πεδίο.*
Ακτινοδιαυγαστικό	Μαύρη περιοχή στην ακτινογραφία (απορροφά λιγότερο τη δέσμη).	*Ακτινοδιαυγαστικός μηνίσκος κάτω από το διάφραγμα.*
Ακτινοσκιερό	Υλικό ή αντικείμενο που απορροφά τη δέσμη και φαίνεται στην ακτινογραφία.	*Ακτινοσκιερό ξένο σώμα.*
Πυκνότητα	Βαθμός εξασθένησης της δέσμης στην ακτινογραφία και την ΑΤ· δεν χρησιμοποιείται στη ΜΤ και τον υπέρηχο.	*Σκίαση με πυκνότητα μαλακών μορίων.*
Πύκνωση	Πλήρωση των κυψελίδων με υγρό, κύτταρα ή άλλο υλικό αντί για αέρα· τα αγγεία δεν διακρίνονται.	*Πύκνωση με αεροβρογχόγραμμα.*
Αεροβρογχόγραμμα	Απεικόνιση βρόγχων με αέρα μέσα σε πυκνωμένο παρέγχυμα.	*Αεροβρογχογράμματα μέσα στην πύκνωση.*
Σημείο της σιλουέτας	Εξάλειψη του περιγράμματος μεταξύ δύο δομών ίδιας πυκνότητας όταν εφάπτονται.	*Εξάλειψη του δεξιού καρδιακού περιγράμματος (μέσος λοβός).*
Δικτυωτό πρότυπο	Λεπτές γραμμοειδείς σκιάσεις τύπου δικτύου· διάμεση προσβολή.	*Δικτυωτές σκιάσεις στις βάσεις.*
Οζώδες πρότυπο	Πολυάριθμες μικρές οζώδεις σκιάσεις.	*Διάχυτο οζώδες πρότυπο.*
Κεγχροειδές πρότυπο	Πολυάριθμοι, διάχυτοι, ομοιόμορφοι όζοι λίγων χιλιοστών.	*Αμφοτερόπλευρο κεγχροειδές πρότυπο.*
Γραμμές Kerley B	Μικρές οριζόντιες γραμμές στην περιφέρεια, κάθετες στον υπεζωκότα· πεπαχυσμένα μεσολόβια διαφραγμάτια.	*Γραμμές Kerley B στις βάσεις.*
Περιβρογχική πάχυνση (cuffing)	Πάχυνση των τοιχωμάτων των βρόγχων που απεικονίζονται κατά μέτωπο.	*Περιβρογχική πάχυνση.*
Αγγειακή ανακατανομή (κεφαλαδοποίηση)	Τα αγγεία των άνω πνευμονικών πεδίων γίνονται πιο εμφανή από εκείνα των κάτω.	*Αγγειακή ανακατανομή στα άνω πνευμονικά πεδία.*
Καρδιοθωρακικός δείκτης (ΚΘΔ)	Λόγος της μέγιστης εγκάρσιας διαμέτρου της καρδιάς προς τη μέγιστη εσωτερική διάμετρο του θώρακα σε ακτινογραφία ΡΑ.	*Ο ΚΘΔ είναι αυξημένος.*
Αμβλύνση της πλευροδιαφραγματικής γωνίας	Απώλεια της οξείας γωνίας μεταξύ διαφράγματος και θωρακικού τοιχώματος.	*Αμβλεία αριστερή πλευροδιαφραγματική γωνία.*
Σημείο του μηνίσκου	Κοίλο άνω όριο της υπεζωκοτικής συλλογής που ανυψώνεται προς τα πλάγια.	*Σκίαση με διαμόρφωση μηνίσκου.*

ΟΡΟΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
Σημείο βαθιάς αύλακας	Βαθιά και οξεία πλευροδιαφραγματική γωνία σε πνευμοθώρακα, σε ακτινογραφία σε ύπτια θέση.	*Σημείο βαθιάς αύλακας δεξιά.*
Υπεζωκοτική γραμμή	Λεπτή γραμμή του σπλαχνικού υπεζωκότα που φαίνεται στον πνευμοθώρακα.	*Κορυφαία υπεζωκοτική γραμμή.*
Ατελεκτασία	Απώλεια όγκου τμήματος του πνεύμονα λόγω απουσίας αερισμού.	*Ατελεκτασία στον αριστερό κάτω λοβό.*
Απώλεια όγκου	Μείωση όγκου που φαίνεται από την έλξη της σχισμής, της πύλης, του διαφράγματος ή του μεσοθωρακίου.	*Συνυπάρχουν ευρήματα απώλειας όγκου.*
Σπήλαιο	Χώρος αέρα με τοίχωμα μέσα σε πύκνωση ή μάζα.	*Σπήλαιο με παχύ τοίχωμα.*
Επίπεδο αέρα-υγρού	Ευθύ οριζόντιο όριο μεταξύ αέρα και υγρού σε ακτινογραφία σε όρθια θέση ή σε κατάκλιση (decubitus).	*Πολλαπλά επίπεδα αέρα-υγρού.*
Υπερδιάταση	Υπερδιάταση των πνευμόνων (επιπέδωση διαφράγματος, αυξημένος οπισθοστερνικός χώρος).	*Ευρήματα υπερδιάτασης.*
Διεύρυνση του μεσοθωρακίου	Σκιά του μεσοθωρακίου ευρύτερη από το αναμενόμενο.	*Το άνω μεσοθωράκιο φαίνεται διευρυμένο.*
Πνευμοπεριτόναιο	Ελεύθερος αέρας στην περιτοναϊκή κοιλότητα.	*Ελεύθερος αέρας κάτω από το διάφραγμα.*
Σημείο Rigler	Απεικόνιση τόσο της έσω όσο και της έξω επιφάνειας του εντερικού τοιχώματος λόγω αέρα.	*Θετικό σημείο Rigler.*
Κερκιδοειδείς πτυχές (valvulae conniventes)	Βλεννογόνιες πτυχές του λεπτού εντέρου που εκτείνονται από τοίχωμα σε τοίχωμα.	*Διατεταμένες έλικες με διακρινόμενες κερκιδοειδείς πτυχές.*
Κολικές κυψέλες (haustra)	Πτυχές του τοιχώματος του κόλου που δεν διασχίζουν πλήρως τον αυλό.	*Διατεταμένο κόλον με διακρινόμενες κολικές κυψέλες.*
Διακοπή της συνέχειας του φλοιού	Διακοπή του οστικού φλοιού· εύρημα κατάγματος.	*Διακοπή της συνέχειας του φλοιού στο περιφερικό άκρο της κερκίδας.*
Παρεκτόπιση / γωνίωση	Μετατόπιση των άκρων του κατάγματος / γωνία μεταξύ των τεμαχίων.	*Κάταγμα με παρεκτόπιση και ραχιαία γωνίωση.*
Συντριπτικό κάταγμα	Κάταγμα με περισσότερα από δύο τεμάχια.	*Συντριπτικό κάταγμα πτέρνας.*
Αποσπαστικό κάταγμα	Μικρό οστικό τεμάχιο που αποσπάται από το σημείο πρόσφυσης τένοντα ή συνδέσμου.	*Αποσπαστικό τεμάχιο από την έξω πλευρά της κνήμης.*
Περιοστική αντίδραση	Σχηματισμός νέου οστού γύρω από το οστό.	*Πεταλιώδης περιοστική αντίδραση.*
Λυτική / σκληρυντική βλάβη	Οστική καταστροφή (ακτινοδιαυγαστική) / αύξηση της οστικής πυκνότητας.	*Πολλαπλές λυτικές βλάβες.*
Οστεοπενία	Γενική μείωση της οστικής πυκνότητας.	*Περιαρθρική οστεοπενία.*
Υποχόνδρια σκλήρυνση	Αύξηση της οστικής πυκνότητας κάτω από την αρθρική επιφάνεια.	*Υποχόνδρια σκλήρυνση και οστεόφυτα.*
Οστεόφυτο	Οστική προσεκβολή στο χείλος της άρθρωσης.	*Οστεόφυτα στα χείλη της άρθρωσης.*

ΟΡΟΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
Λιποαιμάρθρωση	Επίπεδο λίπους-υγρού εντός της άρθρωσης· σημείο ενδαρθρικού κατάγματος.	*Υπερεπιγονατιδική λιποαιμάρθρωση.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΑΤ

Όροι HU, παραθύρων, φάσεων σκιαγραφικού, πνεύμονα και νευροακτινολογικής ΑΤ.

ΟΡΟΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
HU (μονάδες Hounsfield)	Μονάδα πυκνότητας στην ΑΤ· νερό 0, αέρας περίπου −1000, λίπος σε αρνητικές τιμές.	*Μέση πυκνότητα βλάβης 12 HU.*
Υπέρπυκνο	Πιο λευκό από τους γύρω ιστούς στην ΑΤ (υψηλές HU).	*Υπέρπυκνη συλλογή συμβατή με οξεία φάση.*
Υπόπυκνο	Πιο σκούρο από τους γύρω ιστούς στην ΑΤ (χαμηλές HU).	*Υπόπυκνη ηπατική βλάβη.*
Ισόπυκνο	Ίδια πυκνότητα με τους γύρω ιστούς στην ΑΤ.	*Υποσκληρίδιο ισόπυκνο με το εγκεφαλικό παρέγχυμα.*
Εύρος (W) / επίπεδο (L) παραθύρου	Το εύρος HU που εμφανίζεται / το κέντρο αυτού του εύρους.	*Αξιολογήθηκε σε παράθυρο εγκεφαλικού επεισοδίου (στενό W).*
Παράθυρο πνεύμονα	Ευρύ παράθυρο για το παρέγχυμα, τους αεραγωγούς, τους όζους και τον πνευμοθώρακα.	*Περιοχές θολής υάλου στο παράθυρο πνεύμονα.*
Παράθυρο μεσοθωρακίου (μαλακών μορίων)	Για αγγεία, λεμφαδένες, όργανα και υγρά.	*Λεμφαδένες στο παράθυρο μεσοθωρακίου.*
Οστικό παράθυρο	Πολύ ευρύ παράθυρο για τον φλοιό και τη δοκιδώδη δομή.	*Γραμμή κατάγματος στο οστικό παράθυρο.*
Παράθυρο εγκεφαλικού επεισοδίου (stroke)	Στενό παράθυρο εγκεφάλου που αυξάνει τη διαφορά φαιάς-λευκής ουσίας.	*Απώλεια της νησιδιακής ταινίας (insular ribbon) στο παράθυρο εγκεφαλικού επεισοδίου.*
Υποσκληρίδιο παράθυρο	Παράθυρο ενδιάμεσου εύρους για λεπτές συλλογές δίπλα στο κρανίο.	*Λεπτή συλλογή στο υποσκληρίδιο παράθυρο.*
Φάση χωρίς σκιαγραφικό	Τομές πριν από τη χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικού (αιμορραγία, λίθος, επασβέστωση).	*Υπέρπυκνο στις τομές χωρίς σκιαγραφικό.*
Αρτηριακή φάση	Πρώιμη φάση με τη μέγιστη σκιαγράφηση των αρτηριών.	*Βλάβη με έντονη ενίσχυση στην αρτηριακή φάση.*
Πυλαία φλεβική φάση	Η συνήθης φάση της κοιλίας, κατά την οποία γεμίζουν η πυλαία και οι συστηματικές φλέβες.	*Αξιολογήθηκε σε πυλαία φλεβική φάση.*
Καθυστερημένη (απεκκριτική) φάση	Όψιμη φάση κατά την οποία το σκιαγραφικό περνά στο αποχετευτικό σύστημα και στην ουροδόχο κύστη.	*Διαφυγή σκιαγραφικού στην καθυστερημένη φάση.*
Washout (έκπλυση)	Βλάβη που ενισχύεται στην αρτηριακή φάση και στις επόμενες φάσεις γίνεται σκουρότερη από το περιβάλλον.	*Washout στην πυλαία φλεβική φάση.*

ΟΡΟΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
Ενεργός εξαγγείωση	Σκιαγραφικό που διαφεύγει εκτός του αγγείου και αυξάνεται μεταξύ των φάσεων· ενεργός αιμορραγία.	*Ενεργός εξαγγείωση γύρω από τον σπλήνα.*
Έλλειμμα πλήρωσης	Περιοχή χωρίς σκιαγραφικό μέσα σε αυλό γεμάτο σκιαγραφικό (θρόμβος, όγκος).	*Έλλειμμα πλήρωσης σε τμηματική αρτηρία.*
Διαχωριστικό πέταλο έσω χιτώνα (intimal flap)	Λεπτή μεμβράνη που χωρίζει τον αληθή από τον ψευδή αυλό στον διαχωρισμό.	*Διαχωριστικό πέταλο έσω χιτώνα στην ανιούσα αορτή.*
MPR	Πολυεπίπεδη ανασύνθεση (στεφανιαία, οβελιαία, λοξή).	*Κάταγμα σπονδύλου σε οβελιαία MPR.*
MIP	Προβολή μέγιστης έντασης· για αγγεία και όζους.	*Ο όζος είναι εμφανής στις εικόνες MIP.*
VR (τρισδιάστατη απεικόνιση όγκου)	Τρισδιάστατη απεικόνιση όγκου.	*Διαμόρφωση του κατάγματος σε τρισδιάστατες εικόνες.*
Πάχος τομής	Πάχος της ανασυντεθειμένης εικόνας· η λεπτή τομή αναδεικνύει τη μικρή βλάβη.	*Αξιολογήθηκε σε τομές πάχους 1 mm.*
Τέχνημα σκλήρυνσης δέσμης	Σκούρες ζώνες ανάμεσα σε πυκνό οστό ή σκιαγραφικό.	*Τέχνημα σκλήρυνσης δέσμης στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο.*
Τέχνημα μετάλλου (γραμμώσεις)	Φωτεινές και σκούρες γραμμές που ξεκινούν από μεταλλικό εμφύτευμα.	*Τέχνημα μετάλλου γύρω από την πρόθεση.*
Σκίαση θολής υάλου	Ήπια αύξηση της πυκνότητας που δεν καλύπτει τα τοιχώματα αγγείων και βρόγχων.	*Περιφερικές σκιάσεις θολής υάλου.*
Crazy paving («λιθόστρωτο»)	Πάχυνση των διαφραγματίων επί θολής υάλου.	*Εικόνα crazy paving.*
Δέντρο σε έκπτυξη (tree-in-bud)	Μικροί κεντρολοβιώδεις διακλαδιζόμενοι όζοι· προσβολή των μικρών αεραγωγών.	*Εικόνα «δέντρου σε έκπτυξη» στον δεξιό κάτω λοβό.*
Κηρήθρα	Σειρές κυστικών χώρων αέρα με τοίχωμα κάτω από τον υπεζωκότα· ίνωση.	*Βασική υποϋπεζωκοτική κηρήθρα.*
Μωσαϊκή εξασθένηση	Διαφορετική πυκνότητα μεταξύ γειτονικών περιοχών (παγίδευση αέρα ή διαφορά αιμάτωσης).	*Πρότυπο μωσαϊκής εξασθένησης.*
Βρογχεκτασία	Μόνιμη διάταση βρόγχου (ο βρόγχος είναι ευρύτερος από τη συνοδό αρτηρία).	*Κυλινδρικές βρογχεκτασίες στους κάτω λοβούς.*
Εμφύσημα	Καταστροφή του παρεγχύματος με χώρους αέρα χωρίς τοίχωμα (κεντρολοβιώδες, παραδιαφραγματικό, πανλοβιώδες).	*Κεντρολοβιώδες εμφύσημα στους άνω λοβούς.*
Εξωαξονικό / ενδοαξονικό	Εκτός του εγκεφαλικού παρεγχύματος (σκληρά μήνιγγα, αραχνοειδής) / εντός αυτού.	*Μάζα με εξωαξονική εντόπιση.*
Μετατόπιση της μέσης γραμμής	Μετατόπιση του διαφανούς διαφραγματίου ή του δρεπάνου από τη μέση γραμμή.	*Μετατόπιση της μέσης γραμμής κατά 7 mm προς τα αριστερά.*
Εγκολεασμός (εγκεφάλου)	Μετατόπιση εγκεφαλικού ιστού από ένα διαμέρισμα σε άλλο (υποδρεπανοειδής, αγκιστρωτός, παρεγκεφαλιδικών αμυγδαλών).	*Υποδρεπανοειδής εγκολεασμός.*

ΟΡΟΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
Σημείο υπέρπυκνης αρτηρίας	Η αρτηρία με θρόμβο φαίνεται φωτεινή στην ΑΤ χωρίς σκιαγραφικό.	*Σημείο υπέρπυκνης αρτηρίας στη δεξιά ΜΣΑ.*
Διαφοροποίηση φαιάς-λευκής ουσίας	Διαφορά πυκνότητας μεταξύ φλοιού και λευκής ουσίας· η απώλειά της είναι εύρημα πρώιμης ισχαιμίας.	*Εξάλειψη της διαφοροποίησης φαιάς-λευκής ουσίας.*
Θόλωση του λίπους (fat stranding)	Γραμμοειδής αύξηση πυκνότητας στο λίπος λόγω φλεγμονής.	*Θόλωση του λίπους γύρω από τη σκωληκοειδή απόφυση.*
Πνευμάτωση	Αέρας στο τοίχωμα του εντέρου.	*Πνευμάτωση στο τοίχωμα του λεπτού εντέρου.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΜΤ

Ακολουθίες, όροι σήματος, πρότυπα ενίσχυσης και τεχνήματα.

ΟΡΟΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
Τ1-σταθμισμένη (Τ1W)	Το λίπος φωτεινό, το υγρό σκούρο· ανατομία και αξιολόγηση πριν/μετά το σκιαγραφικό.	*Υπερέντονη εστία στην Τ1W.*
Τ2-σταθμισμένη (Τ2W)	Το υγρό είναι φωτεινό· αναδεικνύει το οίδημα και την παθολογία.	*Υπερέντονη βλάβη στην Τ2W.*
FLAIR	Τ2 με καταστολή του σήματος του ΕΝΥ· για περικοιλιακές βλάβες και παθολογία των αυλάκων.	*Περικοιλιακές υπερέντονες αλλοιώσεις στη FLAIR.*
PD (πυκνότητα πρωτονίων)	Στη μυοσκελετική ΜΤ για μηνίσκους και χόνδρο· συχνά με καταστολή λίπους.	*Αύξηση σήματος σε σειρά PD με καταστολή λίπους.*
STIR	Ακολουθία με καταστολή λίπους, ευαίσθητη στο υγρό· για οίδημα μυελού των οστών.	*Οίδημα μυελού των οστών στη STIR.*
Καταστολή λίπους	Τεχνική που μηδενίζει το σήμα του λίπους.	*Απώλεια σήματος σε σειρές με καταστολή λίπους (περιέχει λίπος).*
DWI (απεικόνιση σταθμισμένη ως προς τη διάχυση)	Δείχνει την κίνηση των μορίων του νερού· οξεία ισχαιμία, απόστημα, βλάβη υψηλής κυτταροβρίθειας.	*Υπερέντονη περιοχή στη DWI.*
Χάρτης ADC	Αριθμητικός χάρτης της διάχυσης· σκούρος όταν υπάρχει περιορισμός.	*Χαμηλό σήμα στον χάρτη ADC.*
Περιορισμός της διάχυσης	Φωτεινό στη DWI + σκούρο στον ADC.	*Έντονος περιορισμός της διάχυσης.*
Τ2 shine-through	Φωτεινή εικόνα στη DWI λόγω της φωτεινότητας στην Τ2· είναι φωτεινή και στον ADC, δεν πρόκειται για πραγματικό περιορισμό.	*Συμβατό με φαινόμενο Τ2 shine-through.*
SWI / GRE (Τ2*)	Ακολουθίες ευαίσθητες σε προϊόντα αίματος, ασβέστιο και σίδηρο.	*Εστίες μικροαιμορραγίας στη SWI.*
Blooming	Μεγέθυνση της απώλειας σήματος γύρω από προϊόντα αίματος ή μέταλλο σε SWI/GRE.	*Εστία με blooming στην ακολουθία GRE.*
Υπερέντονο	Φωτεινότερο σήμα από το περιβάλλον στη ΜΤ.	*Υπερέντονο στην Τ2W.*
Υπόεντονο	Σκουρότερο σήμα από το περιβάλλον στη ΜΤ.	*Υπόεντονο στην Τ1W.*
Ισοέντονο	Ίδιο σήμα με το περιβάλλον στη ΜΤ.	*Ισοέντονο με τη φαιά ουσία.*
Απώλεια σήματος	Απουσία του αναμενόμενου σήματος (ροή, μέταλλο, αέρας, ασβέστιο).	*Απώλεια σήματος στην εκτός φάσης.*
Κενό ροής (flow void)	Το ταχέως ρέον αίμα εμφανίζεται μαύρο στην Τ2.	*Διατηρημένο κενό ροής στη βασική αρτηρία.*

ΟΡΟΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
Ενίσχυση μετά από γαδολίνιο	Αύξηση σήματος στην T1 μετά από σκιαγραφικό ΜΤ.	*Μάζα με ομοιογενή ενίσχυση.*
Δυναμική σειρά με σκιαγραφικό	Χρονισμός της ενίσχυσης με διαδοχικές σειρές μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού.	*Εστία με καθυστερημένη ενίσχυση στις δυναμικές σειρές.*
Μαγνητική αγγειογραφία TOF	Αρτηριακή μαγνητική αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό.	*Απόφραξη M1 στη TOF MRA.*
Μαγνητική φλεβογραφία	Για τους φλεβώδεις κόλπους της σκληράς μήνιγγας και τις φλέβες.	*Έλλειμμα πλήρωσης στον εγκάρσιο κόλπο στη MRV.*
MRCP	Τεχνική έντονα σταθμισμένη σε T2 που απεικονίζει τους χοληφόρους και τους παγκρεατικούς πόρους.	*Έλλειμμα πλήρωσης στον χοληδόχο πόρο στη MRCP.*
Χημική μετατόπιση (εντός φάσης / εκτός φάσης)	Αναδεικνύει το ενδοκυττάριο λίπος· απώλεια σήματος στην εκτός φάσης.	*Απώλεια σήματος στην εκτός φάσης (αδένωμα).*
ΜΤ αιμάτωσης (perfusion)	Δείχνει την αιμάτωση του ιστού (βαθμός κακοήθειας όγκου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο).	*Αυξημένος rCBV.*
Σκληρομηνιγγική ουρά (dural tail)	Πάχυνση με ενίσχυση που εκτείνεται από τη μάζα προς τη σκληρά μήνιγγα.	*Σημείο σκληρομηνιγγικής ουράς.*
Λεπτομηνιγγική ενίσχυση	Ενίσχυση που ακολουθεί την επιφάνεια του εγκεφάλου και τις αύλακες (λοίμωξη, διασπορά όγκου).	*Λεπτομηνιγγική ενίσχυση κατά μήκος των αυλάκων.*
Παχυμηνιγγική ενίσχυση	Ομαλή ενίσχυση κατά μήκος της σκληράς μήνιγγας.	*Διάχυτη παχυμηνιγγική ενίσχυση.*
Αγγειογενές / κυτταροτοξικό οίδημα	Δακτυλοειδές στη λευκή ουσία, από αγγειακή διαπερατότητα / ενδοκυττάριο, με περιορισμό στη DWI (ισχαιμία).	*Αγγειογενές οίδημα γύρω από τη βλάβη.*
Οίδημα μυελού των οστών	Φωτεινότητα του μυελού των οστών σε STIR ή T2 με καταστολή λίπους.	*Οίδημα μυελού των οστών στον έξω μηριαίο κόνδυλο.*
Ακολουθία	Σειρά εικόνων ΜΤ που λαμβάνεται με συγκεκριμένες παραμέτρους.	*Συνιστώνται επιπλέον ακολουθίες.*
TR / TE	Χρόνος επανάληψης / χρόνος ηχούς· καθορίζουν τη στάθμιση.	*Τέχνημα σε σειρές με βραχύ TE.*
Τέχνημα μαγικής γωνίας (magic angle)	Ψευδής αύξηση σήματος σε σειρές με βραχύ TE, σε τένοντα με γωνία περίπου 55° ως προς το μαγνητικό πεδίο.	*Μπορεί να είναι συμβατό με τέχνημα μαγικής γωνίας.*
Τέχνημα επιδεκτικότητας (susceptibility)	Απώλεια και παραμόρφωση σήματος στα όρια μετάλλου ή αέρα.	*Τέχνημα επιδεκτικότητας από μεταλλικό εμφύτευμα.*
Στάδιο αιμορραγίας (ΜΤ)	Το σήμα του αίματος σε T1 και T2 μεταβάλλεται με τον χρόνο· λεπτομέρειες στον πίνακα στο τέλος του κεφαλαίου.	*Αιμάτωμα συμβατό με όψιμο υποξύ στάδιο.*

Στάδια αιμορραγίας: σήμα στη ΜΤ (εγκέφαλος)

ΣΤΑΔΙΟ	T1	T2
Υπεροξύ	ισοέντονο / ελαφρώς υπόεντονο	υπερέντονο
Οξύ	ισοέντονο / υπόεντονο	υπόεντονο
Πρώιμο υποξύ	υπερέντονο	υπόεντονο
Όψιμο υποξύ	υπερέντονο	υπερέντονο
Χρόνιο	υπόεντονο	υπόεντονο (δακτύλιος αιμοσιδηρίνης)

> **Προσοχή**
>
> Ο πίνακας αυτός είναι το κλασικό διδακτικό σχήμα· η πραγματική εικόνα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ένταση του πεδίου, το μέγεθος του αιματώματος και την ακολουθία. Μην προσδιορίζετε με βεβαιότητα την ηλικία της αιμορραγίας μόνο με αυτόν τον πίνακα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Υπέρηχος και Doppler

Όροι ηχογένειας, τεχνημάτων, ηχοβολέων, Doppler και υπερήχου πνεύμονα.

ΟΡΟΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
Ηχογένεια	Η ποσότητα ηχούς που ανακλά ο ιστός στον υπέρηχο· δεν χρησιμοποιούνται οι λέξεις πυκνότητα ή σήμα.	*Αυξημένη ηχογένεια του παρεγχύματος.*
Άνηχο	Χωρίς καμία ηχώ (μαύρο)· απλό υγρό.	*Άνηχη κυστική βλάβη.*
Υποηχογενές	Λιγότερη ηχώ από το περιβάλλον (πιο σκούρο).	*Υποηχογενής συμπαγής όζος.*
Ισοηχογενές	Ίδια ηχογένεια με το περιβάλλον.	*Ισοηχογενής βλάβη με το παρέγχυμα.*
Υπερηχογενές	Περισσότερη ηχώ από το περιβάλλον (πιο φωτεινό).	*Υπερηχογενής εστία.*
Ηχογενές περιεχόμενο (debris)	Σωματίδια που δίνουν ηχώ μέσα σε υγρό (αίμα, πύον, πρωτεΐνη).	*Περιχαρακωμένη συλλογή με εσωτερικό ηχογενές περιεχόμενο.*
Οπίσθια ακουστική σκίαση	Μαύρη περιοχή πίσω από δομή που δεν επιτρέπει τη διέλευση του ήχου (λίθος, επασβέστωση).	*Υπερηχογενής εστία με ακουστική σκίαση.*
Οπίσθια ακουστική ενίσχυση	Φωτεινότερη περιοχή πίσω από υγρό.	*Κύστη με οπίσθια ακουστική ενίσχυση.*
«Βρώμικη» σκίαση	Ετερογενής, γκρίζα σκίαση πίσω από αέρα.	*Εστίες αέρα με «βρώμικη» σκίαση.*
Αντήχηση (reverberation)	Παράλληλες γραμμές που επαναλαμβάνονται μεταξύ δύο ανακλαστικών επιφανειών.	*Τέχνημα αντήχησης.*
Τέχνημα ουράς κομήτη	Μικρή ουρά πίσω από μικρή φωτεινή εστία (κρύσταλλοι χοληστερόλης, αδενομυομάτωση).	*Τεχνήματα ουράς κομήτη στο τοίχωμα.*
Τέχνημα κατοπτρικού ειδώλου	Αντίγραφο μιας δομής πέρα από ισχυρά ανακλαστική επιφάνεια (διάφραγμα).	*Κατοπτρικό τέχνημα πάνω από το διάφραγμα.*
Τέχνημα twinkling	Χρωματική ανάμειξη πίσω από λίθο με ανώμαλη επιφάνεια στο έγχρωμο Doppler.	*Λίθος με τέχνημα twinkling.*
Gain (ενίσχυση λήψης)	Ρύθμιση της φωτεινότητας της εικόνας· η λάθος ρύθμιση οδηγεί σε λάθος ερμηνεία της ηχογένειας.	*Αξιολογήθηκε με κατάλληλη ρύθμιση του gain.*
Γραμμικός ηχοβολέας (linear)	Υψηλή συχνότητα, επιφανειακές δομές (θυρεοειδής, μαστός, αγγεία, υπεζωκότας).	*Αξιολογήθηκε με γραμμικό ηχοβολέα.*
Κυρτός ηχοβολέας (convex)	Χαμηλή συχνότητα, εν τω βάθει δομές της κοιλίας.	*Σάρωση της κοιλίας με κυρτό ηχοβολέα.*
Τομεακός ηχοβολέας (phased array)	Μικρή επιφάνεια επαφής· καρδιακά και μεσοπλεύρια παράθυρα.	*Υποξιφοειδής λήψη με τομεακό ηχοβολέα.*

ΟΡΟΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
B-mode / M-mode	Εικόνα κλίμακας του γκρι / κίνηση σε συνάρτηση με τον χρόνο κατά μήκος μίας γραμμής.	*Απώλεια ολίσθησης του υπεζωκότα στο M-mode.*
Έγχρωμο Doppler	Δείχνει με χρώμα την παρουσία και την κατεύθυνση της ροής.	*Δεν παρατηρείται ροή στο έγχρωμο Doppler.*
Power Doppler	Doppler χωρίς κατευθυντικότητα, πιο ευαίσθητο στη βραδεία ροή.	*Αυξημένη αγγείωση στο Power Doppler.*
Φασματικό Doppler	Κυματομορφή της ταχύτητας ροής σε συνάρτηση με τον χρόνο.	*Μονοφασική ροή στη φασματική ανάλυση.*
PSV	Μέγιστη συστολική ταχύτητα.	*Αυξημένη PSV.*
Δείκτης αντίστασης (RI)	Δείκτης που εκφράζει την αντίσταση της αγγειακής κοίτης.	*Ενδονεφρικές τιμές RI.*
Aliasing	Αναστροφή των χρωμάτων όταν η ταχύτητα ροής υπερβαίνει το όριο μέτρησης.	*Στενωτικό τμήμα με aliasing.*
Αναπνευστική φασικότητα	Μεταβολή της φλεβικής ροής με την αναπνοή· η απώλειά της υποδηλώνει κεντρικότερη απόφραξη.	*Διατηρημένη φασικότητα στην κοινή μηριαία φλέβα.*
Augmentation (ενίσχυση της ροής)	Αύξηση της φλεβικής ροής με περιφερική συμπίεση.	*Παρούσα η ενίσχυση της ροής (augmentation).*
Συμπίεση (συμπιεστότητα)	Πλήρης σύγκλειση της φλέβας με την πίεση του ηχοβολέα· η μη σύγκλειση είναι κριτήριο DVT.	*Η ιγνυακή φλέβα συμπιέζεται πλήρως.*
Υπερηχογραφικό σημείο Murphy	Μέγιστη ευαισθησία όταν πιέζετε τη χοληδόχο κύστη με τον ηχοβολέα.	*Θετικό υπερηχογραφικό σημείο Murphy.*
Ολίσθηση του υπεζωκότα	Παλινδρομική κίνηση της υπεζωκοτικής γραμμής με την αναπνοή· η παρουσία της αποκλείει πνευμοθώρακα στο συγκεκριμένο σημείο.	*Παρούσα αμφοτερόπλευρη ολίσθηση του υπεζωκότα.*
Γραμμή A	Οριζόντιες γραμμές που επαναλαμβάνονται σε ίσες αποστάσεις κάτω από την υπεζωκοτική γραμμή.	*Πρότυπο A.*
Γραμμή B	Κάθετο τέχνημα που ξεκινά από τον υπεζωκότα, φτάνει στο κάτω άκρο της οθόνης και εξαλείφει τις γραμμές A.	*Πρότυπο B.*
Lung point (σημείο του πνεύμονα)	Το σημείο όπου συναντώνται ο υπεζωκότας που ολισθαίνει και αυτός που δεν ολισθαίνει· ειδικό για πνευμοθώρακα.	*Ανιχνεύθηκε lung point.*
Ηπατοποίηση	Εικόνα του πυκνωμένου πνεύμονα που μοιάζει με ιστό ήπατος.	*Ηπατοποίηση και αεροβρογχογράμματα.*
Ιλύς (sludge)	Ηχογενές περιεχόμενο σε στρώσεις, χωρίς ακουστική σκίαση, στη χοληδόχο κύστη.	*Ιλύς στη χοληδόχο κύστη.*
Σημείο WES	Τριάδα τοίχωμα–ηχώ–σκίαση σε χοληδόχο κύστη γεμάτη λίθους.	*Παρόν σημείο WES.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Συντομογραφίες

Οι συντομογραφίες που εμφανίζονται συχνότερα στις γνωματεύσεις και στην εφημερία.

ΟΡΟΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
PA / AP	Οπισθοπρόσθια / προσθιοπίσθια προβολή.	*Ακτινογραφία AP στην κλίνη.*
ΚΘΔ	Καρδιοθωρακικός δείκτης.	*ΚΘΔ > 0,5.*
ETT	Ενδοτραχειακός σωλήνας.	*Το άκρο του ETT 4 cm πάνω από την τρόπιδα.*
NGT	Ρινογαστρικός σωλήνας.	*Το άκρο του NGT στη θέση του στομάχου.*
ΚΦΚ	Κεντρικός φλεβικός καθετήρας.	*Το άκρο του ΚΦΚ περιφερικά στην ΑΚΦ.*
AT / CTA	Αξονική τομογραφία / αξονική αγγειογραφία.	*Συνιστάται CTA.*
MT / MRA / MRV	Μαγνητική τομογραφία / μαγνητική αγγειογραφία / μαγνητική φλεβογραφία.	*Συνιστάται αξιολόγηση με MRV.*
MRCP	Μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία.	*Συνιστάται MRCP.*
Υπέρηχος (US)	Υπερηχογράφημα.	*Συνιστάται επανέλεγχος με υπέρηχο.*
POCUS	Υπέρηχος παρά την κλίνη του ασθενούς.	*Χωρίς περικαρδιακό υγρό στο POCUS.*
FAST / eFAST	Εστιασμένος υπέρηχος στο τραύμα / επεκταμένο FAST που περιλαμβάνει και τους πνεύμονες και τον υπεζωκότα.	*Αρνητικό eFAST.*
DWI / ADC	Απεικόνιση σταθμισμένη ως προς τη διάχυση / φαινόμενος συντελεστής διάχυσης.	*Συμβατός περιορισμός σε DWI/ADC.*
FLAIR / STIR / SWI / PD	Ονόματα ακολουθιών MT (βλ. κεφάλαιο MT).	*Οίδημα στη STIR.*
HU	Μονάδα Hounsfield.	*Μέση τιμή 8 HU.*
ROI	Η περιοχή ενδιαφέροντος στην οποία γίνεται η μέτρηση.	*Μέτρηση πυκνότητας με ROI.*
MPR / MIP / VR	Πολυεπίπεδη ανασύνθεση / προβολή μέγιστης έντασης / απεικόνιση όγκου.	*Στεφανιαία MPR.*
ΥΑΑ	Υπαραχνοειδής αιμορραγία.	*ΥΑΑ στις βασικές δεξαμενές.*
SDH / EDH	Υποσκληρίδιο / επισκληρίδιο αιμάτωμα.	*Οξύ SDH.*
ΕΕΑ	Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία.	*ΕΕΑ στα δεξιά βασικά γάγγλια.*
DVT	Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση.	*Οξεία DVT.*
ΠΕ / ΠΘΕ	Πνευμονική εμβολή / πνευμονική θρομβοεμβολή.	*Τμηματική ΠΕ.*

ΟΡΟΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΚΑ	Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής.	*Υπονεφρικό ΑΚΑ.*
ΑΚΦ / ΚΚΦ	Άνω κοίλη φλέβα / κάτω κοίλη φλέβα.	*Παλινδρόμηση σκιαγραφικού στην ΚΚΦ.*
ΑΜΑ / ΑΜΦ	Άνω μεσεντέρια αρτηρία / φλέβα.	*Η ΑΜΑ είναι βατή.*
ICA / MCA / ACA / PCA	Έσω καρωτίδα / μέση, πρόσθια, οπίσθια εγκεφαλική αρτηρία.	*Απόφραξη του τμήματος M1 της αριστερής MCA.*
ΔΚ / ΑΚ	Δεξιά / αριστερή κοιλία.	*Αυξημένος λόγος ΔΚ/ΑΚ.*
ΠΧΣ / ΟΧΣ	Πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος / οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος.	*Ρήξη ολικού πάχους του ΠΧΣ.*
MCL / LCL	Έσω / έξω πλάγιος σύνδεσμος.	*Κάκωση MCL βαθμού 1.*
ΠΟΣ / ΟΚΣ	Πυελοουρητηρική / ουρητηροκυστική συμβολή.	*Λίθος της ΟΚΣ.*
ΓΠΓ	Γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία.	*Μάζα αριστερής ΓΠΓ.*
GCS	Κλίμακα κώματος της Γλασκώβης.	*GCS 13.*
ASPECTS	Σύστημα βαθμολόγησης πρώιμης ισχαιμίας στην περιοχή της MCA.	*ASPECTS 8.*
PSV / RI	Μέγιστη συστολική ταχύτητα / δείκτης αντίστασης.	*Αυξημένη PSV.*
PLAPS	Οπισθοπλάγιο σημείο κυψελιδικού και/ή υπεζωκοτικού συνδρόμου στον υπέρηχο πνεύμονα.	*Θετικό PLAPS δεξιά.*
BI-RADS / TI-RADS / LI-RADS	Συστήματα γνωμάτευσης και ταξινόμησης για μαστό / θυρεοειδή / ήπαρ.	*Κατηγορία TI-RADS …*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Φράσεις γνωμάτευσης

Φράσεις που εκφράζουν σωστά τον βαθμό βεβαιότητας, τη σύγκριση και τη σύσταση.

ΟΡΟΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
Συμβατό με ...	Υψηλή βεβαιότητα· το εύρημα υποστηρίζει έντονα μία μόνο διάγνωση.	*Συμβατό με οξεία σκωληκοειδίτιδα.*
Υπέρ ... / πρωτίστως θεωρείται ...	Μέτρια προς υψηλή βεβαιότητα· η πιθανότερη διάγνωση.	*Πρωτίστως θεωρείται απόστημα.*
Μπορεί να είναι σημαντικό όσον αφορά ...	Μέτρια βεβαιότητα· το εύρημα υποστηρίζει τη διάγνωση αλλά δεν είναι ειδικό.	*Σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα, μπορεί να είναι σημαντικό όσον αφορά λοίμωξη.*
Στη διαφορική διάγνωση πρέπει να ληφθεί υπόψη ...	Περισσότερες από μία πιθανότητες· γράψτε τες με σειρά.	*Στη διαφορική διάγνωση πρέπει να ληφθούν υπόψη μετάσταση και απόστημα.*
Δεν μπορεί να αποκλειστεί ...	Χαμηλή πιθανότητα αλλά σημαντικό· χρησιμοποιήστε το, αν χρειάζεται, μαζί με σύσταση.	*Δεν μπορεί να αποκλειστεί πρώιμη ισχαιμία· συνιστάται ΜΤ.*
Δεν παρατηρείται / δεν ανιχνεύεται ...	Απουσία του ευρήματος που αναζητείται (αρνητικό εύρημα).	*Δεν παρατηρείται ελεύθερος αέρας.*
Στις τομές που αξιολογήθηκαν	Δηλώνει ότι το αρνητικό εύρημα αφορά μόνο την περιοχή που απεικονίστηκε.	*Στις τομές που αξιολογήθηκαν δεν παρατηρείται οξεία παθολογία.*
Σε σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση (ημερομηνία)	Δείχνει ότι έγινε σύγκριση και με ποια εξέταση αναφοράς.	*Αύξηση μεγέθους σε σύγκριση με ...*
Δεν παρατηρείται σημαντική μεταβολή	Σταθερό εύρημα.	*Δεν παρατηρείται σημαντική μεταβολή στο μέγεθος του όζου.*
Συνιστάται συνεκτίμηση με τα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα	Κατάσταση που η απεικόνιση δεν μπορεί να διακρίνει μόνη της· γράψτε με τι χρειάζεται συσχέτιση.	*Συνιστάται συνεκτίμηση με CRP και καλλιέργεια.*
Συνιστάται περαιτέρω απεικονιστικός έλεγχος με ...	Σύσταση συγκεκριμένης εξέτασης με την αιτιολόγησή της.	*Για χαρακτηρισμό συνιστάται ΜΤ με σκιαγραφικό.*
Συνιστάται επανέλεγχος μετά από ...	Παρακολούθηση· γράψτε το διάστημα σύμφωνα με τη σύσταση του ιδρύματός σας ή της σχετικής κατευθυντήριας οδηγίας.	*Συνιστάται επανέλεγχος με ΑΤ σε διάστημα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες.*
Τεχνικός περιορισμός: ...	Αναφέρει τον παράγοντα που περιορίζει την αξιολόγηση.	*Περιορισμένη αξιολόγηση λόγω τεχνήματος κίνησης.*

ΟΡΟΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
Το εύρημα γνωστοποιήθηκε στις … μετά από επικοινωνία με …	Καταγραφή γνωστοποίησης κρίσιμου ευρήματος.	*Γνωστοποιήθηκε στον γιατρό των επειγόντων στις 03:40.*
Συμπέρασμα:	Σύντομη, σαφής απάντηση στο κλινικό ερώτημα στο τέλος της γνωμάτευσης.	*Συμπέρασμα: Οξεία πνευμονική εμβολή· χωρίς ευρήματα καταπόνησης της δεξιάς καρδιάς.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Όροι που συχνά συγχέονται

Ζεύγη όρων που μοιάζουν αλλά λένε διαφορετικά πράγματα.

ΟΡΟΙ	ΔΙΑΦΟΡΑ	ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Υπέρπυκνο · υπερέντονο · υπερηχογενές	Και τα τρία σημαίνουν «πιο φωτεινό», αλλά είναι ειδικά για κάθε μέθοδο: υπέρπυκνο = ΑΤ (και πυκνότητα στην ακτινογραφία), υπερέντονο = ΜΤ, υπερηχογενές = υπέρηχος.	Μη γράφετε «υπερέντονο» στην ΑΤ ούτε «υπέρπυκνο» στη ΜΤ.
Σκίαση · πυκνότητα	Σκίαση είναι το όνομα της περιοχής που φαίνεται λευκή στην ακτινογραφία· πυκνότητα είναι ο βαθμός εξασθένησης της δέσμης (ακτινογραφία και ΑΤ).	Όχι «αύξηση σκίασης», αλλά «σκίαση» ή «αύξηση πυκνότητας».
Υπόπυκνο · υπόεντονο · υποηχογενές	Σκούρα εικόνα: ΑΤ / ΜΤ / υπέρηχος.	Στον υπέρηχο ήπατος δεν γράφεται «υπόπυκνη βλάβη».
Ακτινοδιαυγαστικό · ακτινοσκιερό	Μαύρο (η δέσμη διέρχεται) / λευκό (η δέσμη απορροφάται) στην ακτινογραφία.	Ακτινοσκιερός λίθος, ακτινοδιαυγαστικός αέρας.
Άνηχο · υποηχογενές	Άνηχο: καμία ηχώ (απλό υγρό)· υποηχογενές: λίγη ηχώ (μπορεί να είναι ιστός).	Μην αποκαλείτε «κύστη» μια υποηχογενή βλάβη.
Κύστη · κυστικό	Η κύστη είναι κοιλότητα υγρού με τοίχωμα· το «κυστικό» περιγράφει μόνο εικόνα που μοιάζει με υγρό.	Βλάβη με κυστική εικόνα ≠ απλή κύστη.
Όζος · μάζα	Στον πνεύμονα διακρίνονται βάσει μεγέθους (όριο 3 cm)· γενικά, βάσει μεγέθους και φαινομένου μάζας.	Μην αποκαλείτε «όζο» μια βλάβη 4 cm.
Πύκνωση · θολή ύαλος	Στην πύκνωση τα αγγεία δεν διακρίνονται· στη θολή ύαλο διακρίνονται.	Αν τα αγγεία διακρίνονται, πρόκειται για θολή ύαλο.
Πύκνωση · ατελεκτασία	Στην ατελεκτασία υπάρχει απώλεια όγκου· στην πύκνωση όχι.	Αν η σχισμή έλκεται, πρόκειται για ατελεκτασία.
Συλλογή υγρού · περιχαρακωμένη συλλογή · ασκίτης	Συλλογή υγρού: υγρό σε κοιλότητα· περιχαρακωμένη συλλογή: εγκυστωμένο υγρό· ασκίτης: ελεύθερο υγρό στην περιτοναϊκή κοιλότητα.	Για περιχαρακωμένο υγρό, όχι «συλλογή υγρού» αλλά «περιχαρακωμένη συλλογή».
Ενίσχυση · υπερπυκνότητα	Η ενίσχυση είναι αύξηση μετά το σκιαγραφικό· η υπερπυκνότητα μπορεί να υπάρχει και χωρίς σκιαγραφικό (αίμα, ασβέστιο).	Μη γράφετε «ενισχύεται» χωρίς σύγκριση με την τομή χωρίς σκιαγραφικό.
Περιορισμός της διάχυσης · T2 shine-through	Στον περιορισμό ο ADC είναι σκούρος· στο T2 shine-through ο ADC είναι επίσης φωτεινός.	Μην αποφασίζετε κοιτάζοντας τη DWI χωρίς να δείτε τον χάρτη ADC.
Αγγειογενές · κυτταροτοξικό οίδημα	Αγγειογενές: στη λευκή ουσία, γύρω από όγκο· κυτταροτοξικό: φαιά και λευκή ουσία, ισχαιμία, περιορισμός στη DWI.	Το περιογκικό οίδημα είναι αγγειογενές.

ΟΡΟΙ	ΔΙΑΦΟΡΑ	ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Επισκληρίδιο · υποσκληρίδιο	Επισκληρίδιο: αμφίκυρτο, δεν υπερβαίνει τις ραφές· υποσκληρίδιο: μηνοειδές, υπερβαίνει τις ραφές.	Περιγράψτε το σχήμα και μετά δώστε του όνομα.
Ενδοαξονικό · εξωαξονικό	Ενδοπαρεγχυματικό / εξωπαρεγχυματικό (σκληρά μήνιγγα, αραχνοειδής).	Το μηνιγγίωμα είναι εξωαξονικό.
Προβολή · εξώθηση	Στην προβολή η βάση είναι ευρεία· στην εξώθηση ο αυχένας είναι στενός ή υπάρχει μετανάστευση τεμαχίου.	Αν υπάρχει μετανάστευση προς τα πάνω, πρόκειται για εξώθηση.
Ακουστική σκίαση · ακουστική ενίσχυση	Η σκίαση είναι μαύρη πίσω από λίθο/ασβέστιο· η ενίσχυση είναι φωτεινή πίσω από υγρό.	Η κύστη δίνει ενίσχυση, ο λίθος σκίαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Ασαφείς εκφράσεις προς αποφυγή

Εκφράσεις που δυσκολεύουν την απόφαση του γιατρού που διαβάζει, και τι να γράφετε αντί γι' αυτές.

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ	ΓΙΑΤΙ	ΑΝΤΙ ΓΙ' ΑΥΤΟ
«Διήθημα»	Δεν λέει ποιο πρότυπο είναι.	Πύκνωση, θολή ύαλος, δικτυωτή ή οζώδης σκίαση.
«Δεν υπάρχει παθολογία»	Δεν είναι σαφές τι αξιολογήθηκε ούτε ποια είναι τα όριά του.	«Στις τομές που αξιολογήθηκαν δεν παρατηρείται οξεία παθολογία.»
«Συσχέτιση με την κλινική εικόνα» (μόνο αυτό)	Δεν αναφέρεται με ποια κλινικά δεδομένα θα γίνει η συσχέτιση.	«Συνιστάται συνεκτίμηση με CRP και κλινική εξέταση όσον αφορά …»
«Ύποπτη εικόνα»	Δεν είναι σαφές τι υποψιάζεστε.	«Ύποπτο για …· στη διαφορική διάγνωση …»
«Μάζα;» (ερωτηματικό)	Το ερωτηματικό στη γνωμάτευση θολώνει τον βαθμό βεβαιότητας.	Κατάλληλη φράση βεβαιότητας: «υπέρ …», «δεν μπορεί να αποκλειστεί …».
«Ήπιο / σημαντικό» (χωρίς μέτρηση)	Διαφέρει ανάλογα με τον αναγνώστη· δεν είναι συγκρίσιμο στην παρακολούθηση.	Δώστε μέτρηση: «… mm», «μετατόπιση μέσης γραμμής 5 mm».
«Βλάβη» (μόνο αυτό)	Χωρίς πυκνότητα/σήμα, μέγεθος, όρια και θέση δεν μεταφέρει πληροφορία.	«Υπόπυκνη βλάβη 14 mm, σαφώς αφοριζόμενη, στο τμήμα 7 του δεξιού λοβού.»
«Όγκος»	Αποτελεί ιστολογική κρίση χωρίς ιστολογική διάγνωση.	«Μάζα» ή «χωροκατακτητική βλάβη»· με διαφορική διάγνωση.
«Πυκνότητα» στη ΜΤ, «σκίαση» στον υπέρηχο	Όρος που δεν ανήκει στη μέθοδο.	«Σήμα» στη ΜΤ, «ηχογένεια» στον υπέρηχο.
«Εντός φυσιολογικών ορίων» (για τα πάντα)	Παραμένει ασαφές τι αξιολογήθηκε.	Γράψτε τα σχετικά όργανα ένα προς ένα, συνοπτικά.
«Πιθανώς τέχνημα»	Ο αναγνώστης δεν ξέρει αν πρέπει να λάβει υπόψη το εύρημα.	Αναφέρετε το είδος του τεχνήματος και, αν χρειάζεται, προτείνετε επανάληψη της λήψης.

Χρυσός κανόνας

Κάθε πρόταση πρέπει να απαντά στο ερώτημα: τι θα κάνει ο γιατρός που τη διαβάζει με αυτή την πρόταση; Αν η απάντηση είναι ασαφής, κάντε την πρόταση σαφέστερη με μέτρηση, βαθμό βεβαιότητας ή σύσταση.

Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν αντικαθιστά την εκπαίδευση της ειδικότητας, την εποπτεία, την κλινική κρίση ή τη γνωμάτευση ειδικού.

Επόμενο βήμα

Ανοίξτε τώρα το Δώρο 5 · Τετράδιο Εξάσκησης: Από το Εύρημα στη Γνωμάτευση. Τους όρους και τις φράσεις γνωμάτευσης αυτού του γλωσσαρίου θα τους χρησιμοποιήσετε οι ίδιοι στις ασκήσεις και στα πρότυπα γνωμάτευσης ανά απεικονιστική μέθοδο.

Για να δείτε τους όρους πάνω σε πραγματικά ευρήματα, μπορείτε να επιστρέψετε στο **Δώρο 1 · Άτλαντας Συχνότερων Ευρημάτων**.