Warnsignale

Wenn Sie eines dieser Anzeichen bemerken: Bleiben Sie nicht allein, überweisen Sie an eine andere Fachperson.

Bei unmittelbarer Gefahr: Rufen Sie die 112. Lassen Sie die Klient:in bis zum Eintreffen der Hilfe nicht allein.

Immer, unabhängig vom Themenbereich

- Suizidgedanken, -pläne oder frühere Suizidversuche
- Selbstverletzung und autoaggressives Verhalten
- Ausgeübte oder erlittene Gewalt (besonders wenn Minderjährige betroffen sind)
- Realitätsverlust (Halluzinationen, Wahn)
- Schwere Störungen von Schlaf, Essverhalten oder Alltagsfunktion über Wochen

Angst und Stress

- Körperliche Symptome ohne medizinische Erklärung (Brustschmerz, Ohnmacht)
- Alkohol oder Beruhigungsmittel, um die Angst zu dämpfen
- Extremer Rückzug: Die Klient:in verlässt das Haus nicht mehr

Stimmung und Emotionen

- Anhaltend gedrückte Stimmung über Wochen, Freudlosigkeit, Hoffnungslosigkeit
- Ungewöhnliche Euphorie, vermindertes Schlafbedürfnis, riskantes Verhalten
- Unkontrollierte Wutausbrüche, die eine Gefahr darstellen

Beziehungen und Familie

- Anzeichen von Gewalt in der Partnerschaft oder Familie
- Kontrollierendes Verhalten oder Drohungen im Umfeld der Klient:in
- Gefährdung des Kindeswohls oder der Sicherheit Minderjähriger

Trauma und Sicherheit

- Akute Symptome unmittelbar nach einem kürzlichen traumatischen Ereignis
- Häufige dissoziative Zustände
- Die Klient:in lebt weiterhin in einer akuten Gefahrensituation

Körper und Essverhalten

- Deutlicher Gewichtsverlust, Nahrungsverweigerung, selbst herbeigeführtes Erbrechen
- Zwanghafte Bewegung trotz Verletzungen und Erschöpfung
- Körperliche Beschwerden ohne vorherige ärztliche Abklärung

Trauer und Verlust

- Die trauernde Person äußert den Wunsch zu sterben, will der verstorbenen Person „folgen“
- Anhaltende Beeinträchtigung des Alltags über mehrere Monate
- Alkohol oder Substanzen, um den Schmerz zu betäuben