THEMENBEREICH 6 · 10 MINDMAPS

Stress, Trauma und Sicherheit

10 emotionale Mindmaps mit je 2 Seiten und derselben Struktur in sechs Schritten.

Visueller Therapie-Atlas · Psychoedukatives Material. Ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch eine Fachperson.

Kampfreaktion

Kampfreaktion

01 Verstehen

Die Kampfreaktion ist eine der automatischen Abwehrreaktionen des Nervensystems bei Gefahr: Energie, Kraft und der Impuls zur Konfrontation. Bei realer Gefahr ist sie funktional. Aktiviert sie sich jedoch in Alltagssituationen, führt sie oft zu Gereiztheit, Wut und Konflikten.

> Die Kampfreaktion ist kein Charakterfehler, sondern eine Schutzfunktion des Nervensystems. Du kannst lernen, sie zu beruhigen.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Hitzewallungen, angespannte Muskeln
- Zusammengepresste Kiefer, geballte Fäuste
- Beschleunigter Herzschlag


IN DEN GEDANKEN

- „Ich lasse mich nicht unterkriegen."
- „Ich muss mich verteidigen."
- „Sie greifen mich an."

IM VERHALTEN

- Wird laut
- Streitet, leistet Widerstand
- Versucht, die Kontrolle zu übernehmen

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Kritik, Ungerechtigkeit, Gefühl von Kontrollverlust.

Was verstärkt es? Müdigkeit, Stress und belastende Erfahrungen aus der Vergangenheit.

Was hält es aufrecht? Dass das Nervensystem keine beruhigende und sichere Regulation erfährt.

Kampfreaktion

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. In welchen Situationen aktiviert sich bei dir die Kampfreaktion?
2. Was spürst du in diesen Momenten zuerst im Körper?
3. Was versuchst du zu schützen?
4. Was hilft dir, wieder zur Ruhe zu kommen?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Respekt
- Kontrolle

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn ich nicht angreife, werde ich verletzt."
- „Schwäche ist gefährlich."
- „Ich muss immer auf der Hut sein."

Verwandte Mindmaps: 11 · Wut, 56 · Toleranzfenster, 57 · Hyperaktivierung

06 Nächste Schritte

→ Erkenne die Körpersignale und mache eine kurze Pause.

→ Verlängere die Ausatmung und lockere die Muskeln.

→ Baue die aufgestaute Energie durch Bewegung ab.

→ Kehre zum Gespräch zurück, wenn du dich ruhiger fühlst.

Wenn dich Erinnerungen an schwierige Erfahrungen regelmäßig überwältigen oder dich im Alltag behindern, kann es hilfreich sein, die Unterstützung einer auf Traumata spezialisierten Fachkraft zu suchen.

Fluchtreaktion

Fluchtreaktion

01 Verstehen

Die Fluchtreaktion ist ein automatischer Impuls des Nervensystems, um sich von einer Gefahr zu entfernen. In einem echten Notfall rettet sie Leben. Im Alltag kann sie sich durch Angst, Vermeidung, Ruhelosigkeit oder die Flucht in ständige Aktivität äußern.

> Die Fluchtreaktion sagt: „Hier bist du nicht sicher". Es lohnt sich zu prüfen, ob das im Hier und Jetzt stimmt.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Angst, Schwierigkeit, stillzusitzen
- Schneller Atem
- Angespannte Beine


IN DEN GEDANKEN

- „Ich muss hier weg."
- „Ich halte das nicht aus."
- „Schnell, ich muss einfach fliehen."

IM VERHALTEN

- Verlässt die Situation
- Arbeitet zu viel oder ist ständig in Bewegung
- Vermeidet schwierige Gespräche

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Überfüllte Orte, Konflikte, emotionale Nähe.

Was verstärkt es? Frühere Erfahrungen, in denen Flucht Sicherheit garantierte.

Was hält es aufrecht? Die Vermeidung, die neue Sicherheitserfahrungen verhindert.

Fluchtreaktion

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Aus welchen Situationen möchtest du am häufigsten fliehen?
2. Was signalisiert dir dein Körper in diesen Momenten?
3. Was würde passieren, wenn du nur eine Minute länger bliebest?
4. Wovor fliehst du wirklich: vor der Situation oder vor dem Gefühl?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Freiheit
- Ruhe

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn ich bleibe, passiert etwas Schreckliches."
- „Ich ertrage dieses unangenehme Gefühl nicht."
- „Flucht ist der einzige Ausweg."

Verwandte Mindmaps: 6 · Angstbedingte Vermeidung, 56 · Toleranzfenster, 57 · Hyperaktivierung

06 Nächste Schritte

→ Bemerke den Fluchtimpuls und benenne ihn.

→ Spüre deine Füße auf dem Boden und verlangsame den Atem.

→ Bleibe für eine kurze, festgelegte Zeit in der Situation.

→ Plane vorab einen sicheren Rückzugsweg.

Wenn dich Erinnerungen an schwierige Erfahrungen regelmäßig überwältigen oder dich im Alltag behindern, kann es hilfreich sein, die Unterstützung einer auf Traumata spezialisierten Fachkraft zu suchen.

Erstarrungsreaktion

Erstarrungsreaktion

01 Verstehen

Die Erstarrungsreaktion (Freeze) tritt ein, wenn weder Kampf noch Flucht möglich scheinen. Der Körper erstarrt, der Geist wird leer, die Stimme versagt. Danach empfindet man oft Scham („Warum habe ich nichts getan?“), obwohl es eine automatische, ungewollte Reaktion ist.

> Erstarren darf nicht mit Schwäche oder Zustimmung verwechselt werden: Es ist die Überlebensstrategie des Nervensystems.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Starre Muskeln, Unbeweglichkeit
- Angehaltener Atem
- Kalte Hände und Füße, Kribbeln


IN DEN GEDANKEN

- „Ich habe eine totale Leere im Kopf.“
- „Ich kann kein Wort herausbringen.“
- „Es ist, als wäre ich nicht anwesend.“

IM VERHALTEN

- Reagiert nicht, blockiert völlig
- Kann keine Entscheidung treffen
- Macht sich im Nachhinein Vorwürfe

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Schreie, plötzliche Konflikte, Situationen, die an alte Traumata erinnern.

Was verstärkt es? Scham und Selbstvorwürfe, die das Nervensystem zusätzlich belasten.

Was hält es aufrecht? Dass der Körper keinen sicheren Ausweg aus dem Zustand der Erstarrung erfährt.

Erstarrungsreaktion

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Hast du schon einmal erlebt, dass du völlig blockiert warst?
2. Was hast du danach im Körper gespürt?
3. Was sagst du dir normalerweise über diese Momente?
4. Was hilft dir, in den Körper „zurückzukehren“?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Verständnis
- Selbstakzeptanz

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich war schwach, weil ich nichts getan habe.“
- „Es war meine Schuld.“
- „Ich kann meinem Körper nicht vertrauen.“

Verwandte Mindmaps: 56 · Toleranzfenster, 58 · Abkopplung und Hypoaktivierung, 13 · Scham

06 Nächste Schritte

→ Sage dir: „Mein Körper hat mich so gut geschützt, wie er konnte“.

→ Bewege sanft deine Finger und Zehen.

→ Schau dich um und benenne die Farben im Raum.

→ Suche dir bei häufigem Auftreten Hilfe bei spezialisierten Therapeut:innen.

Wenn dich Erinnerungen an schwierige Erfahrungen regelmäßig überwältigen oder dich im Alltag behindern, kann es hilfreich sein, die Unterstützung einer auf Traumata spezialisierten Fachkraft zu suchen.

Unterwerfungsreaktion

Unterwerfungsreaktion

01 Verstehen

Die Unterwerfungsreaktion (Fawn) ist eine Strategie des Nervensystems, bei der wir versuchen, Gefahr abzuwenden, indem wir anderen gefallen und nachgiebig sind. Sie entsteht oft in der Kindheit als einziger Weg zur Sicherheit. Im Erwachsenenalter führt sie zu Überanpassung und Grenzüberschreitungen.

> Gefallenwollen gab früher Sicherheit. Heute führt es dazu, dass kein Raum für deine Bedürfnisse bleibt.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Spannung bei drohendem Konflikt
- Ein Lächeln, das die innere Angst verbirgt
- Erschöpfung


IN DEN GEDANKEN

- „Hauptsache, er/sie wird nicht wütend."
- „Was will die andere Person hören?"
- „Meine Bedürfnisse sind nicht wichtig."

IM VERHALTEN

- Sagt zu allem Ja
- Entschuldigt sich, noch bevor etwas passiert ist
- Vermeidet das Wort „Nein"

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Angespannte Mimik, Kritik, Autoritätspersonen.

Was verstärkt es? Frühere Erfahrungen, in denen Widerstand gefährlich war.

Was hält es aufrecht? Dass kurzfristige Nachgiebigkeit die Spannung tatsächlich reduziert.

Unterwerfungsreaktion

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wann sagst du Ja, obwohl du Nein denkst?

2. Was befürchtest du bei einer Ablehnung?

3. Wer hat dir beigebracht, dass Anpassung Sicherheit garantiert?

4. Was könnte ein kleiner Schritt sein, um auf deine Bedürfnisse zu hören?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Akzeptanz
- Eigene Stimme

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn ich Nein sage, bin ich in Gefahr."
- „Die Gefühle anderer sind wichtiger."
- „Ich bin nur liebenswert, wenn ich mich anpasse."

Verwandte Mindmaps: 68 · Bedürfnis, es allen recht zu machen, 72 · Schwierigkeiten, Nein zu sagen, 71 · Persönliche Grenzen

06 Nächste Schritte

→ Bitte um Bedenkzeit, bevor du Ja sagst.

→ Übe ein kleines „Nein" in sicherem Rahmen.

→ Schreibe auf, was du dir in der Situation wirklich wünschst.

→ Achte auf Körpersignale, wenn du beginnst, dich zu verbiegen.

Wenn dich Erinnerungen an schwierige Erfahrungen regelmäßig überwältigen oder dich im Alltag behindern, kann es hilfreich sein, die Unterstützung einer auf Traumata spezialisierten Fachkraft zu suchen.

Emotionale Trigger

Emotionale Trigger

01 Verstehen

Emotionale Trigger sind Sinnesreize – Geräusche, Worte, Situationen, Gerüche –, die mit einer schmerzhaften Erfahrung verknüpft sind und eine im Hier und Jetzt unverhältnismäßig starke Reaktion auslösen. Die Reaktion gehört zur Vergangenheit, zeigt sich aber in der Gegenwart.

> Wenn die Reaktion stärker ist, als es die Situation erfordert, meldet sich oft eine alte Wunde.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Plötzliches Herzrasen
- Kloß im Hals
- Kribbeln oder Zittern


IN DEN GEDANKEN

- „Genau wie damals."
- „Es passiert schon wieder."
- Eine plötzliche, überwältigende Gefühlswelle

IM VERHALTEN

- Explodiert plötzlich oder zieht sich zurück
- Vermeidet Situationen, die als Trigger wirken
- Versteht die eigene Reaktion im Nachhinein nicht

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Tonfall, Gesichtsausdruck, Jahrestage, Gerüche.

Was verstärkt es? Müdigkeit und Stress, die die psychische Resilienz schwächen.

Was hält es aufrecht? Mangelndes Bewusstsein für Trigger, sodass die Reaktion dich überrascht.

Emotionale Trigger

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Welche Situationen lösen bei dir eine starke Reaktion aus?
2. Woran erinnert dich diese Situation?
3. Wie alt fühlst du dich in einem solchen Moment?
4. Was kann dir helfen, dich auf solche Anlässe vorzubereiten?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Vorhersehbarkeit
- Verständnis

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich bin überempfindlich."
- „Ich kann meine Reaktionen nicht kontrollieren."
- „Die Vergangenheit lässt mich nie los."

Verwandte Mindmaps: 56 · Toleranzfenster, 59 · Gefühl von Sicherheit, 89 · Trauer-Trigger

06 Nächste Schritte

→ Führe ein Tagebuch über Trigger und deine Reaktionen.

→ Sage dir: „Das ist ein altes Gefühl, nicht die Situation im Hier und Jetzt".

→ Nutze eine Grounding-Technik (5-4-3-2-1).

→ Plane vorab, was du tust, wenn du auf einen bekannten Trigger triffst.

Wenn dich Erinnerungen an schwierige Erfahrungen regelmäßig überwältigen oder dich im Alltag behindern, kann es hilfreich sein, die Unterstützung einer auf Traumata spezialisierten Fachkraft zu suchen.

Toleranzfenster

Toleranzfenster

01 Verstehen

Das Toleranzfenster (nach Daniel Siegel) ist der optimale Bereich, in dem das Aktivierungsniveau die Aufmerksamkeit fördert, ohne die Reflexionsfähigkeit zu stören. Hier können wir lernen, Beziehungen aufbauen und gute Entscheidungen treffen. Oberhalb liegt die Hyperaktivierung (Angst, Wut), unterhalb die Hypoaktivierung (Leere, Abschalten).

> Das Ziel ist nicht Ruhe um jeden Preis, sondern das Fenster zu erweitern und Wege zurück zu lernen.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Im Fenster: ruhiger Atem, entspannte Muskeln
- Über dem Fenster: Herzrasen, Spannung
- Unter dem Fenster: Abschalten, Schwere


IN DEN GEDANKEN

- Im Fenster: „Ich kann das bewältigen."
- Über dem Fenster: „Es ist zu viel."
- Unter dem Fenster: „Alles egal."

IM VERHALTEN

- Im Fenster: sucht Kontakt, reflektiert
- Über dem Fenster: explodiert, flieht
- Unter dem Fenster: zieht sich zurück, erstarrt

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Stress, Konflikte, Erschöpfung, alte Erinnerungen.

Was verstärkt es? Mangel an Erholung und Isolation.

Was hält es aufrecht? Fehlen gefestigter Selbstregulationsmethoden, die die Rückkehr erleichtern.

Toleranzfenster

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wie fühlst du dich, wenn du innerhalb deines Toleranzfensters bist?

2. Woran merkst du, dass du das Fenster nach oben verlässt?

3. Und woran merkst du, dass du nach unten rutschst?

4. Was hilft dir, den Weg zurück zu finden?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Regulation
- Beziehung

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich habe keine Kontrolle über meinen inneren Zustand."
- „Ich reagiere immer zu stark oder zu schwach."
- „Innerer Frieden ist nur was für andere."

Verwandte Mindmaps: 57 · Hyperaktivierung, 58 · Abkopplung und Hypoaktivierung, 19 · Emotionale Überforderung

06 Nächste Schritte

→ Zeichne dein Toleranzfenster und trage deine persönlichen Signale ein.

→ Schreibe auf, was dir oben hilft und was dir unten hilft.

→ Eine Minute am Tag: Wo befinde ich mich gerade im Bezug zum Fenster?

→ Achte auf regelmäßige Ruhe, Bewegung und Kontakt zu anderen.

Wenn dich Erinnerungen an schwierige Erfahrungen regelmäßig überwältigen oder dich im Alltag behindern, kann es hilfreich sein, die Unterstützung einer auf Traumata spezialisierten Fachkraft zu suchen.

Hyperaktivierung

Hyperaktivierung

01 Verstehen

Hyperaktivierung (Hyperarousal) ist ein Zustand, in dem das Nervensystem oberhalb des Toleranzfensters arbeitet: zu viel Energie, übermäßige Wachsamkeit und überwältigende Emotionen. Klares Denken, Entscheidungen oder Schlaf werden schwierig. Nach chronischem Stress oder Trauma kann dies zum Dauerzustand werden.

> In der Hyperaktivierung braucht der Körper zuerst Beruhigung, keine rationalen Argumente. Ruhe beginnt immer im Körper.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Schneller Puls, flacher Atem
- Schwitzen, Zittern
- Schlafstörungen, unruhige Nächte


IN DEN GEDANKEN

- „Etwas Schreckliches wird passieren."
- Gedankenrasen
- Konzentrationsschwierigkeiten

IM VERHALTEN

- Gereiztheit, überstürzte Reaktionen
- Schwierigkeit, zur Ruhe zu kommen
- Übernimmt sich mit zu vielen Aufgaben

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Konflikte, enge Fristen, Lärm, alte Erinnerungen.

Was verstärkt es? Koffein, Schlafmangel und chronischer Mangel an Erholung.

Was hält es aufrecht? Fehlen von Alltagsmethoden, um Spannung abzubauen und Ruhe zu finden.

Hyperaktivierung

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Woran merkst du, dass du „auf tausend“ bist?
2. Was hilft dir normalerweise in diesen Momenten?
3. Wie viel Zeit hast du täglich für echte Erholung?
4. Worauf kannst du diese Woche verzichten?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Ruhe
- Erholung
- Sicherheit

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Wenn ich anhalte, bricht alles zusammen.“
- „Ausruhen ist Zeitverschwendung.“
- „Ich muss immer wachsam sein.“

Verwandte Mindmaps: 56 · Toleranzfenster, 51 · Kampfreaktion, 97 · Spannung und Alarmbereitschaft

06 Nächste Schritte

→ Langes Ausatmen: 4 Sek. ein, 7–8 Sek. aus, mehrmals wiederholen.

→ Kaltes Wasser im Gesicht oder an den Handgelenken.

→ Regelmäßige Bewegung, um überschüssige Energie abzubauen.

→ Reduziere Koffein und achte auf regelmäßige Schlafenszeiten.

Wenn dich Erinnerungen an schwierige Erfahrungen regelmäßig überwältigen oder dich im Alltag behindern, kann es hilfreich sein, die Unterstützung einer auf Traumata spezialisierten Fachkraft zu suchen.

Abkopplung und Hypoaktivierung

Abkopplung und Hypoaktivierung

01 Verstehen

Hypoaktivierung (Hypoarousal) ist ein Zustand, in dem das Nervensystem unterhalb des Toleranzfensters arbeitet: Leere, emotionales Abschalten, Energiemangel und Abkopplung von Körper und Gefühlen. Dies geschieht oft nach überwältigendem Stress, wenn das System in den Notmodus schaltet.

> Abkopplung ist ein Schutz vor unerträglichen Reizen. Die Rückkehr zur Verbindung braucht Zeit und kleine, sichere Schritte.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Müdigkeit, schwere Glieder
- Gefühlslosigkeit, Kälteempfinden
- Verlangsamte Bewegungen


IN DEN GEDANKEN

- „Ich fühle nichts."
- „Es ist, als wäre ich im Nebel."
- „Mir ist alles egal."

IM VERHALTEN

- Zieht sich in sich selbst zurück
- Schläft ständig oder starrt auf Bildschirme
- Kann nicht aktiv werden

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Zu viel Stress, Konflikte oder Verlusterfahrungen.

Was verstärkt es? Isolation und Bewegungsmangel.

Was hält es aufrecht? Mangel an Sinnesreizen, die helfen, sicher in den Körper zurückzukehren.

Abkopplung und Hypoaktivierung

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wann fühlst du dich „abgekoppelt“?
2. Was war kurz davor passiert?
3. Was hilft dir, deinen Körper wieder ein wenig zu spüren?
4. Wer vermittelt dir allein durch seine Anwesenheit Erleichterung?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Kontakt
- Vitalität

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Es ist besser, nichts zu fühlen.“
- „Ich habe ohnehin keine Kraft für nichts.“
- „Es wird sich sowieso nichts ändern.“

Verwandte Mindmaps: 56 · Toleranzfenster, 53 · Erstarrungsreaktion, 14 · Traurigkeit

06 Nächste Schritte

→ Beginne mit sanften Bewegungen: Stretching, Spaziergang, Rhythmus.

→ Nutze starke Sinnesreize: kaltes Wasser, frischer Duft, kräftiger Geschmack.

→ Kontaktiere jemanden, auch nur mit einer kurzen Nachricht.

→ Setze dir eine kleine, absolut machbare Aufgabe.

Wenn dich Erinnerungen an schwierige Erfahrungen regelmäßig überwältigen oder dich im Alltag behindern, kann es hilfreich sein, die Unterstützung einer auf Traumata spezialisierten Fachkraft zu suchen.

Gefühl von Sicherheit

Gefühl von Sicherheit

01 Verstehen

Das Gefühl von Sicherheit ist ein Zustand des Nervensystems, in dem Körper und Geist wissen, dass keine unmittelbare Gefahr besteht. Dies ermöglicht Ruhe, Neugier und Nähe. Es hängt nicht nur von äußeren Umständen ab, sondern entsteht auch durch Körpersignale, gute Beziehungen und innere Ressourcen.

> Sicherheit ist nicht nur die Abwesenheit von Gefahr, sondern die Anwesenheit von Verbindung und innerer Ruhe.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Tieferer und ruhigerer Atem
- Entspannte Muskeln
- Wärme im Körper


IN DEN GEDANKEN

- „Hier und jetzt bin ich sicher."
- „Ich kann jemandem vertrauen."
- „Ich habe alle Zeit der Welt."

IM VERHALTEN

- Größere Offenheit und Neugier
- Leichteres Knüpfen von Bindungen
- Fähigkeit zur Erholung

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Eine Vertrauensperson, ein sicherer Ort, ein beruhigendes Ritual.

Was verstärkt es? Regelmäßige Ruhe, unterstützende Beziehungen und Vorhersehbarkeit.

Was hält es aufrecht? Wiederholung: Jede sichere Erfahrung stärkt das Nervensystem.

Gefühl von Sicherheit

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Wo und mit wem fühlst du dich am sichersten?

2. Was spürst du in diesen Momenten im Körper?

3. Welche Gegenstände, Düfte oder Klänge vermitteln dir Sicherheit?

4. Wie kannst du diese in deinen Alltag integrieren?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Beziehung
- Vorhersehbarkeit

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich bin nirgendwo sicher."
- „Die Ruhe hält nie lange an."
- „Ich verdiene keinen Frieden."

Verwandte Mindmaps: 56 · Toleranzfenster, 115 · Unterstützungsnetzwerk, 117 · Innere Ressourcen

06 Nächste Schritte

→ Erstelle eine „Sicherheitsliste": Personen, Orte, Dinge und Aktivitäten.

→ Schaffe ein tägliches Ritual zum Abschalten.

→ Visualisiere einen sicheren Ort und kehre gedanklich täglich dorthin zurück.

→ Achte darauf, was deinem Körper hilft, völlig loszulassen.

Wenn dich Erinnerungen an schwierige Erfahrungen regelmäßig überwältigen oder dich im Alltag behindern, kann es hilfreich sein, die Unterstützung einer auf Traumata spezialisierten Fachkraft zu suchen.

Stabilisierung und Erholung nach schwierigen Erfahrungen

Stabilisierung und Erholung nach schwierigen Erfahrungen

01 Verstehen

Stabilisierung und Erholung nach belastenden Ereignissen sind ein Weg, auf dem zuerst Sicherheit und Stabilität im Alltag gefestigt werden, um das Erlebte dann mit passender Unterstützung zu verarbeiten. Heilung ist keine gerade Linie: Positive und negative Phasen wechseln sich ab.

> Zuerst die Sicherheit, dann die Integration der Erfahrungen. Dein Sicherheitsgefühl bestimmt das Tempo.

02 Erkennen

IM KÖRPER

- Schwankendes Energieniveau
- Veränderungen bei Schlaf und Appetit
- Höhere körperliche Verletzlichkeit


IN DEN GEDANKEN

- „Wann werde ich wieder ich selbst sein?“
- „Etwas in mir ist für immer zerbrochen.“
- „Mit der Zeit wird es besser werden.“

IM VERHALTEN

- Etabliert stabile Alltagsroutinen
- Wechselt zwischen Rückzug und Nähe
- Sucht Unterstützung

03 Den Kreislauf beobachten



Was löst es aus? Unfälle, Trauer, Gewalt, Krisen.

Was verstärkt es? Sicherheit, unterstützende Beziehungen und professionelle Orientierung.

Was hält es aufrecht? Zu frühe oder zu schnelle Konfrontation mit dem Trauma, mit dem Risiko, erneut überwältigt zu werden.

Stabilisierung und Erholung nach schwierigen Erfahrungen

Vertiefung und nächste Schritte

04 Erkunden

1. Was gibt dir aktuell im Alltag das größte Gefühl von Sicherheit?
2. Wer unterstützt dich in dieser Zeit?
3. Woran merkst du, dass es dir ein wenig besser geht?
4. Was brauchst du für den nächsten Schritt?

05 Vertiefen

VERBORGENE BEDÜRFNISSE

- Sicherheit
- Geduld
- Unterstützung

HÄUFIGE ÜBERZEUGUNGEN

- „Ich hätte es längst überwunden haben müssen."
- „Ein Rückschlag bedeutet, dass ich versagt habe."
- „Ich muss das ganz allein schaffen."

Verwandte Mindmaps: 56 · Toleranzfenster, 59 · Gefühl von Sicherheit, 117 · Innere Ressourcen

06 Nächste Schritte

→ Schaffe einfache Alltagsroutinen: Schlaf, Mahlzeiten, Bewegung.

→ Identifiziere Personen und Orte, die dir Sicherheit geben.

→ Lerne mindestens zwei verschiedene Grounding-Techniken.

→ Verarbeite schwierige Erfahrungen gemeinsam mit einer auf Traumata spezialisierten Fachkraft.

Wenn dich Erinnerungen an schwierige Erfahrungen regelmäßig überwältigen oder dich im Alltag behindern, kann es hilfreich sein, die Unterstützung einer auf Traumata spezialisierten Fachkraft zu suchen.