PACIENTUL CONTINUĂ ACASĂ™

Planuri de 4 săptămâni pe afecțiune

10 afecțiuni frecvente: banda, exercițiul și ce urmărești, săptămână de săptămână. Pentru ca pacientul să nu revină la fel.

Cuprins

1 · Cum folosești planurile

2 · Cele 10 planuri

Pasul următor

PARTEA 1

Cum folosești planurile

Planul e un cadru, nu o rețetă.

Regula

Banda scade treptat, exercițiul crește. Dacă în două săptămâni nu e nicio schimbare la retest, reevaluezi pacientul sau îl trimiți la medic.

PARTEA 2

Cele 10 planuri

Hărțile din atlas, exercițiul și controlul.

1. Umăr dureros la ridicarea brațului

SĂPTĂMÂNA	BANDA	EXERCIȚIUL	CE URMĂREȘTI
Săptămâna 1	Harta 1 la ședință; banda 3–5 zile, apoi 1–2 zile pauză.	Pendulul: Aplecat înainte, sprijinit cu mâna sănătoasă de masă, lași brațul să atârne și faci cercuri mici, 1 minut, de 2 ori pe zi.	Durerea 0–10 în fiecare seară.
Săptămâna 2	Harta 62 dacă testul încă e pozitiv; altfel aceeași hartă.	Pendulul, plus o serie în plus.	Retest la ședință: Arcul dureros · Jobe.
Săptămâna 3	Banda doar în zilele cu mai multă activitate.	Exercițiul de două ori pe zi, fără durere.	Ce activitate a devenit mai ușoară?
Săptămâna 4	Banda doar dacă e nevoie; scopul e să nu mai fie nevoie.	Exercițiul păstrat ca obicei, o dată pe zi.	Comparăm cu ziua 1. Dacă nu e nicio schimbare: reevaluare.

2. Ceafă și umeri încordați

SĂPTĂMÂNA	BANDA	EXERCIȚIUL	CE URMĂREȘTI
Săptămâna 1	Harta 6 la ședință; banda 3–5 zile, apoi 1–2 zile pauză.	Retracția bărbiei: Stând drept, tragi ușor bărbia înapoi, ca și cum ai face „bărbie dublă”. 5 secunde, de 10 ori, de 3 ori pe zi.	Durerea 0–10 în fiecare seară.
Săptămâna 2	Harta 65 dacă testul încă e pozitiv; altfel aceeași hartă.	Retracția bărbiei, plus o serie în plus.	Retest la ședință: Palparea trapezului · Postura capului.
Săptămâna 3	Banda doar în zilele cu mai multă activitate.	Exercițiul de două ori pe zi, fără durere.	Ce activitate a devenit mai ușoară?

SĂPTĂMÂNA	BANDA	EXERCIȚIUL	CE URMĂREȘTI
Săptămâna 4	Banda doar dacă e nevoie; scopul e să nu mai fie nevoie.	Exercițiul păstrat ca obicei, o dată pe zi.	Comparăm cu ziua 1. Dacă nu e nicio schimbare: reevaluare.

3. Durere între omoplați

SĂPTĂMÂNA	BANDA	EXERCIȚIUL	CE URMĂREȘTI
Săptămâna 1	Harta 41 la ședință; banda 3–5 zile, apoi 1–2 zile pauză.	Apropierea omoplaților: Stând drept, apropii omoplații unul de altul, fără să ridici umerii. 5 secunde, de 10 ori, de 3 ori pe zi.	Durerea 0–10 în fiecare seară.
Săptămâna 2	Harta 71 dacă testul încă e pozitiv; altfel aceeași hartă.	Apropierea omoplaților, plus o serie în plus.	Retest la ședință: Retracția scapulelor.
Săptămâna 3	Banda doar în zilele cu mai multă activitate.	Exercițiul de două ori pe zi, fără durere.	Ce activitate a devenit mai ușoară?
Săptămâna 4	Banda doar dacă e nevoie; scopul e să nu mai fie nevoie.	Exercițiul păstrat ca obicei, o dată pe zi.	Comparăm cu ziua 1. Dacă nu e nicio schimbare: reevaluare.

4. Durere lombară fără iradiere

SĂPTĂMÂNA	BANDA	EXERCIȚIUL	CE URMĂREȘTI
Săptămâna 1	Harta 11 la ședință; banda 3–5 zile, apoi 1–2 zile pauză.	Pisica și cămila: În patru labe, rotunjești ușor spatele, apoi îl lași să coboare. Lent, de 10 ori, dimineața și seara.	Durerea 0–10 în fiecare seară.
Săptămâna 2	Harta 61 dacă testul încă e pozitiv; altfel aceeași hartă.	Pisica și cămila, plus o serie în plus.	Retest la ședință: Flexia trunchiului.
Săptămâna 3	Banda doar în zilele cu mai multă activitate.	Exercițiul de două ori pe zi, fără durere.	Ce activitate a devenit mai ușoară?

SĂPTĂMÂNA	BANDA	EXERCIȚIUL	CE URMĂREȘTI
Săptămâna 4	Banda doar dacă e nevoie; scopul e să nu mai fie nevoie.	Exercițiul păstrat ca obicei, o dată pe zi.	Comparăm cu ziua 1. Dacă nu e nicio schimbare: reevaluare.

5. Durere laterală la șold

SĂPTĂMÂNA	BANDA	EXERCIȚIUL	CE URMĂREȘTI
Săptămâna 1	Harta 49 la ședință; banda 3–5 zile, apoi 1–2 zile pauză.	Podul: Culcat pe spate cu genunchii îndoiți, ridici bazinul până corpul face o linie dreaptă. 3 secunde sus, de 10 ori, o dată pe zi.	Durerea 0–10 în fiecare seară.
Săptămâna 2	Harta 46 dacă testul încă e pozitiv; altfel aceeași hartă.	Podul, plus o serie în plus.	Retest la ședință: Trendelenburg · Palparea trohanterului.
Săptămâna 3	Banda doar în zilele cu mai multă activitate.	Exercițiul de două ori pe zi, fără durere.	Ce activitate a devenit mai ușoară?
Săptămâna 4	Banda doar dacă e nevoie; scopul e să nu mai fie nevoie.	Exercițiul păstrat ca obicei, o dată pe zi.	Comparăm cu ziua 1. Dacă nu e nicio schimbare: reevaluare.

6. Durere în jurul rotulei

SĂPTĂMÂNA	BANDA	EXERCIȚIUL	CE URMĂREȘTI
Săptămâna 1	Harta 21 la ședință; banda 3–5 zile, apoi 1–2 zile pauză.	Contracția coapsei: Așezat cu piciorul întins, apeși genunchiul în jos strângând mușchiul din față al coapsei. 5 secunde, de 10 ori, de 3 ori pe zi.	Durerea 0–10 în fiecare seară.
Săptămâna 2	Harta 63 dacă testul încă e pozitiv; altfel aceeași hartă.	Contracția coapsei, plus o serie în plus.	Retest la ședință: Genuflexiunea pe un picior.

SĂPTĂMÂNA	BANDA	EXERCIȚIUL	CE URMĂREȘTI
Săptămâna 3	Banda doar în zilele cu mai multă activitate.	Exercițiul de două ori pe zi, fără durere.	Ce activitate a devenit mai ușoară?
Săptămâna 4	Banda doar dacă e nevoie; scopul e să nu mai fie nevoie.	Exercițiul păstrat ca obicei, o dată pe zi.	Comparăm cu ziua 1. Dacă nu e nicio schimbare: reevaluare.

7. Tendonul lui Ahile

SĂPTĂMÂNA	BANDA	EXERCIȚIUL	CE URMĂREȘTI
Săptămâna 1	Harta 36 la ședință; banda 3–5 zile, apoi 1–2 zile pauză.	Alfabetul cu glezna: Așezat, cu piciorul în aer, „scrii” literele alfabetului cu degetul mare al piciorului. O dată, de 2 ori pe zi.	Durerea 0–10 în fiecare seară.
Săptămâna 2	Harta 72 dacă testul încă e pozitiv; altfel aceeași hartă.	Alfabetul cu glezna, plus o serie în plus.	Retest la ședință: Ridicarea pe un călcâi.
Săptămâna 3	Banda doar în zilele cu mai multă activitate.	Exercițiul de două ori pe zi, fără durere.	Ce activitate a devenit mai ușoară?
Săptămâna 4	Banda doar dacă e nevoie; scopul e să nu mai fie nevoie.	Exercițiul păstrat ca obicei, o dată pe zi.	Comparăm cu ziua 1. Dacă nu e nicio schimbare: reevaluare.

8. Durere sub călcâi

SĂPTĂMÂNA	BANDA	EXERCIȚIUL	CE URMĂREȘTI
Săptămâna 1	Harta 39 la ședință; banda 3–5 zile, apoi 1–2 zile pauză.	Alfabetul cu glezna: Așezat, cu piciorul în aer, „scrii” literele alfabetului cu degetul mare al piciorului. O dată, de 2 ori pe zi.	Durerea 0–10 în fiecare seară.
Săptămâna 2	Harta 39 dacă testul încă e pozitiv; altfel aceeași hartă.	Alfabetul cu glezna, plus o serie în plus.	Retest la ședință: Windlass.

SĂPTĂMÂNA	BANDA	EXERCIȚIUL	CE URMĂREȘTI
Săptămâna 3	Banda doar în zilele cu mai multă activitate.	Exercițiul de două ori pe zi, fără durere.	Ce activitate a devenit mai ușoară?
Săptămâna 4	Banda doar dacă e nevoie; scopul e să nu mai fie nevoie.	Exercițiul păstrat ca obicei, o dată pe zi.	Comparăm cu ziua 1. Dacă nu e nicio schimbare: reevaluare.

9. Cot dureros (tenis)

SĂPTĂMÂNA	BANDA	EXERCIȚIUL	CE URMĂREȘTI
Săptămâna 1	Harta 56 la ședință; banda 3–5 zile, apoi 1–2 zile pauză.	Întinderea antebrațului: Brațul întins înainte, cu cealaltă mână tragi ușor degetele spre tine. 30 de secunde, de 3 ori pe zi.	Durerea 0–10 în fiecare seară.
Săptămâna 2	Harta 67 dacă testul încă e pozitiv; altfel aceeași hartă.	Întinderea antebrațului, plus o serie în plus.	Retest la ședință: Cozen.
Săptămâna 3	Banda doar în zilele cu mai multă activitate.	Exercițiul de două ori pe zi, fără durere.	Ce activitate a devenit mai ușoară?
Săptămâna 4	Banda doar dacă e nevoie; scopul e să nu mai fie nevoie.	Exercițiul păstrat ca obicei, o dată pe zi.	Comparăm cu ziua 1. Dacă nu e nicio schimbare: reevaluare.

10. Furnicături în mână

SĂPTĂMÂNA	BANDA	EXERCIȚIUL	CE URMĂREȘTI
Săptămâna 1	Harta 51 la ședință; banda 3–5 zile, apoi 1–2 zile pauză.	Alunecarea tendoanelor: Deschizi mâna, apoi faci pumn, apoi îndoi doar vârfurile degetelor. Lent, de 10 ori, de 3 ori pe zi.	Durerea 0–10 în fiecare seară.
Săptămâna 2	Harta 66 dacă testul încă e pozitiv; altfel aceeași hartă.	Alunecarea tendoanelor, plus o serie în plus.	Retest la ședință: Phalen.

SĂPTĂMÂNA	BANDA	EXERCIȚIUL	CE URMĂREȘTI
Săptămâna 3	Banda doar în zilele cu mai multă activitate.	Exercițiul de două ori pe zi, fără durere.	Ce activitate a devenit mai ușoară?
Săptămâna 4	Banda doar dacă e nevoie; scopul e să nu mai fie nevoie.	Exercițiul păstrat ca obicei, o dată pe zi.	Comparăm cu ziua 1. Dacă nu e nicio schimbare: reevaluare.

Pasul următor

La următorul pacient cu una din aceste 10 probleme, dă-i planul printat la prima ședință și bifați împreună săptămânile.