DE LA TEST LA BANDĂ™

40 de teste clinice rapide pe regiuni

Atlasul îți arată cum se aplică fiecare bandă. Aceste teste îți arată care dintre ele se potrivește pacientului din fața ta.

Atlas de Taping · Material educațional pentru profesioniști și studenți din domeniul sănătății. Nu înlocuiește diagnosticul medical.

Cuprins

1 · Cum le folosești

2 · Umăr

3 · Cervicală și trapez

4 · Coloana toracică și scapula

5 · Zona lombară și sacrul

6 · Abdomen

7 · Șold și fesieri

8 · Coapsă și ischiogambieri

9 · Genunchi și rotulă

10 · Gambă

11 · Gleznă, picior și tendonul lui Ahile

12 · Încheietura mâinii și mâna

13 · Cot și antebraț

Pasul următor

PARTEA 1

Cum le folosești

De la test la hartă în două minute.

Pentru cine

Material educațional pentru kinetoterapeuți, maseuri, antrenori și studenți. Testele sunt teste clinice uzuale; un test pozitiv orientează alegerea benzii, nu pune un diagnostic. Când apare un semnal de alarmă, trimite pacientul la medic.

PAS	CE FACI
1. Întreabă	Unde doare, de când, ce mișcare o agravează.
2. Testează	1–3 teste din regiune, întotdeauna comparând cu partea sănătoasă.
3. Alege harta	Testul pozitiv îți arată harta din atlas: tăietura, tensiunea și poziția.
4. Aplică	Pe pielea curată și uscată, după testul prealabil de toleranță (Bonus 2).
5. Retestează	Același test după aplicare: notează schimbarea în fișa pacientului.

PARTEA 2

Umăr

5 teste și harta potrivită din atlas.

1. Testul Jobe (cutia goală)

test clinic

CUM ÎL FACI

Brațul la 90° în plan scapular, rotit intern (degetul mare în jos). Pacientul menține poziția, tu apeși în jos pe antebraț.

DACĂ E POZITIV

Durere sau slăbiciune: suprasolicitare a supraspinosului.

HARTA DIN ATLAS

Harta 1 · Umăr — Supraspinos · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%

Harta 62 · Combinată — Umăr: Deltoid + Supraspinos · Y + I · Ambele 15–25%

Atenție: Slăbiciune marcată după un traumatism: posibilă ruptură, trimite la medic înainte de a aplica banda.

2. Rotație externă contra rezistenței

test clinic

CUM ÎL FACI

Cotul la 90°, lipit de trunchi. Pacientul rotește antebrațul spre exterior, tu te opui.

DACĂ E POZITIV

Durere sau slăbiciune: infraspinos și rotund mic.

HARTA DIN ATLAS

Harta 2 · Umăr — Infraspinos · tăietură în Y · Ancoră 0% · cozi 15–25%

Atenție: Dacă brațul nu poate fi menținut deloc în rotație externă, cere evaluare medicală.

3. Testul Speed

test clinic

CUM ÎL FACI

Cotul întins, antebrațul în supinație, brațul ridicat înainte la 90°. Tu apeși în jos pe antebraț.

DACĂ E POZITIV

Durere în partea din față a umărului: porțiunea lungă a bicepsului.

HARTA DIN ATLAS

Harta 4 · Umăr — Biceps (Porțiunea Lungă) · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%

4. Arcul dureros

test clinic

CUM ÎL FACI Pacientul ridică lateral brațul întins până sus, lent, apoi îl coboară.

DACĂ E POZITIV Durere între 60° și 120°: structurile subacromiale (supraspinos, deltoid).

HARTA DIN ATLAS

- **Harta 1** · Umăr — Supraspinos · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%
- **Harta 3** · Umăr — Deltoid · tăietură în Y · Ancoră 0% · benzi 15–25%
- **Harta 62** · Combinată — Umăr: Deltoid + Supraspinos · Y + I · Ambele 15–25%

Atenție: Durere și la sfârșitul mișcării sau blocaj: limitează aplicarea și cere evaluare.

5. Testul de aprehensiune

test clinic

CUM ÎL FACI Pacientul pe spate, brațul la 90° abducție și cotul la 90°. Rotești lent brațul spre exterior.

DACĂ E POZITIV Senzația că umărul „iese”: instabilitate; banda de stabilizare ca suport, nu ca tratament unic.

HARTA DIN ATLAS

- **Harta 5** · Umăr — Stabilizare (Y + I) · tăietură în Y + I · Y 15–25% · I în centru 50%

Atenție: Antecedente de luxație sau senzație de instabilitate la mișcări uzuale: trimite la medic și la program de exerciții.

PARTEA 3

Cervicală și trapez

3 teste și harta potrivită din atlas.

6. Palparea trapezului superior

test clinic

CUM ÎL FACI

Pacientul șezând. Prinzi în pensă fibrele superioare ale trapezului, de la gât spre umăr.

DACĂ E POZITIV

Punct dureros care reproduce durerea de ceafă sau de cap: trapez superior.

HARTA DIN ATLAS

Harta 6 · Cervicală — Trapez Superior · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%

Harta 7 · Cervicală Și Trapez · Y inversat · Ancoră 0% · cozi 15–25%

7. Testul de lungime al ridicătorului scapulei

test clinic

CUM ÎL FACI

Pacientul înclină capul înainte și îl rotește spre partea opusă, privind spre axilă.

DACĂ E POZITIV

Tensiune sau durere la unghiul superior al scapulei: ridicătorul scapulei.

HARTA DIN ATLAS

Harta 8 · Cervicală — Ridicătorul Scapulei · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%

8. Observarea posturii capului

test clinic

CUM ÎL FACI

Privești pacientul din profil, în picioare: urechea ar trebui să fie deasupra umărului.

DACĂ E POZITIV

Capul proiectat înainte și umerii rotați: suport postural cu două benzi în I.

HARTA DIN ATLAS

Harta 9 · Cervicală — Postură (Două Benzi În I) · două tăieturi în I · Ancore 0% · benzi 15–25%

Atenție: Durere care iradiază în braț, amorțeală sau slăbiciune în mână: nu aplica, trimite la medic.

PARTEA 4

Coloana toracică și scapula

3 teste și harta potrivită din atlas.

9. Observarea scapulei la ridicarea brațelor

test clinic

CUM ÎL FACI Pacientul ridică lent ambele brațe înainte, de mai multe ori. Privești omoplații din spate.

DACĂ E POZITIV Marginea medială se dezlipește sau mișcarea e asimetrică: suport scapular.

HARTA DIN ATLAS

- **Harta 45** · Regiunea Scapulară · tăietură în X · Centru 25–50% · capete 0%
- **Harta 41** · Toracic — Romboizi · tăietură în Y · Ancoră 0% · cozi 15–25%

10. Retracția scapulelor contra rezistenței

test clinic

CUM ÎL FACI Pacientul apropie omoplații; tu te opui la nivelul umerilor.

DACĂ E POZITIV Durere între omoplați: romboizi sau trapez mijlociu.

HARTA DIN ATLAS

- **Harta 41** · Toracic — Romboizi · tăietură în Y · Ancoră 0% · cozi 15–25%
- **Harta 42** · Toracic — Trapez Mijlociu · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 25–35%

11. Testul de lungime al dorsalului mare

test clinic

CUM ÎL FACI Pacientul pe spate, genunchii îndoiți, ridică brațele întinse deasupra capului.

DACĂ E POZITIV Brațele nu ajung la masă sau spatele se arcuiește: dorsalul mare scurtat.

HARTA DIN ATLAS

- **Harta 43** · Toracic — Dorsalul Mare · tăietură în Y · Ancoră 0% · cozi 15–25%

Atenție: Durere toracică la efort, cu dificultăți de respirație: trimite urgent la medic.

PARTEA 5

Zona lombară și sacrul

4 teste și harta potrivită din atlas.

12. Flexia trunchiului din picioare

test clinic

CUM ÎL FACI Pacientul se apleacă lent înainte, cu genunchii întinși, apoi revine.

DACĂ E POZITIV Durere locală, fără iradiere în picior: banda în stea sau în I pe zona lombară.

HARTA DIN ATLAS

Harta 11 · Lombar — Stea (Durere Locală) · stea din benzi în I · Centru 25–50% · capete 0%

Harta 12 · Regiunea Lombară · două tăieturi în I · Ancore 0% · corpul benzii 15–25%

13. Înclinarea laterală

test clinic

CUM ÎL FACI Pacientul se înclină lateral, alunecând mâna pe coapsă.

DACĂ E POZITIV Durere pe partea opusă înclinării, între coastă și creasta iliacă: pătratul lombar.

HARTA DIN ATLAS

Harta 13 · Lombar — Pătratul Lombar · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%

14. Testul FABER (Patrick)

test clinic

CUM ÎL FACI Pacientul pe spate, glezna pe genunchiul opus, lași genunchiul să coboare spre lateral.

DACĂ E POZITIV Durere în zona sacroiliacă (fesă, spate jos): articulația sacroiliacă.

HARTA DIN ATLAS

Harta 14 · Sacru — Articulația Sacroiliacă · tăietură în X · Centru 25–50% · capete 0%

15. Ridicarea piciorului întins (SLR)

test clinic

CUM ÎL FACI Pacientul pe spate. Ridici lent piciorul întins.

DACĂ E POZITIV Durere care coboară pe picior sub genunchi, cu amorțeală: posibilă iritație de nerv; banda NU e prima alegere.

HARTA DIN ATLAS

Harta 15 · Lombar — Fascia Toracolombară · tăietură în Y · Ancoră 0% · cozi 10–25%

Atenție: Amorțeală, slăbiciune, tulburări de urinare sau de scaun: trimite imediat la medic.

PARTEA 6

Abdomen

2 teste și harta potrivită din atlas.

16. Testul diastazei drepților abdominali

test clinic

CUM ÎL FACI

Pacienta pe spate, genunchii îndoiți, ridică ușor capul. Palpezi linia mediană deasupra și sub ombilic.

DACĂ E POZITIV

Spațiu de peste două degete între mușchi: suport pentru diastază, împreună cu exerciții.

HARTA DIN ATLAS

Harta 18 · Abdomen — Diastază (Suport) · tăietură în I · Centru 25–35% · capete 0%

17. Observarea edemului sau a echimozei

test clinic

CUM ÎL FACI

Privești și palpezi zona: umflătură moale, urma degetului rămâne după apăsare.

DACĂ E POZITIV

Edem sau echimoză după efort ori intervenție: aplicare de drenaj limfatic.

HARTA DIN ATLAS

Harta 19 · Abdomen — Drenaj Limfatic · tăietură în evantai · Ancore 0% · benzi 0–20%

Atenție: Durere abdominală cu febră, vărsături sau sarcină: nu aplica fără acordul medicului.

PARTEA 7

Șold și fesieri

4 teste și harta potrivită din atlas.

18. Testul Trendelenburg

test clinic

CUM ÎL FACI Pacientul stă într-un picior timp de 30 de secunde. Privești bazinul din spate.

DACĂ E POZITIV Bazinul coboară pe partea piciorului ridicat: fesierul mijlociu slab.

HARTA DIN ATLAS **Harta 46** · Șold — Fesierul Mijlociu · tăietură în Y · Ancoră 0% · cozi 15–25%

19. Testul FAIR (piriform)

test clinic

CUM ÎL FACI Pacientul pe partea sănătoasă, șoldul și genunchiul flectate; apeși ușor genunchiul spre masă.

DACĂ E POZITIV Durere în fesă: piriform.

HARTA DIN ATLAS **Harta 47** · Șold — Piriform · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%

Atenție: Amorțeală în picior: verifică și coloana; dacă persistă, trimite la medic.

20. Testul Thomas

test clinic

CUM ÎL FACI Pacientul pe spate la marginea mesei, trage un genunchi la piept; celălalt picior atârnă liber.

DACĂ E POZITIV Coapsa se ridică de pe masă: iliopsoasul scurtat.

HARTA DIN ATLAS **Harta 48** · Șold — Iliopsoas · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%

21. Palparea trohanterului mare

test clinic

CUM ÎL FACI Pacientul pe partea sănătoasă. Apeși pe proeminența osoasă laterală a șoldului.

DACĂ E POZITIV Durere locală, care se agravează culcat pe acea parte: zona bursei trohanteriene.

HARTA DIN ATLAS **Harta 49** · Șold — Bursită Trohanteriană · stea din benzi în I · Centru 25–50% · capete 0%

PARTEA 8

Coapsă și ischiogambieri

3 teste și harta potrivită din atlas.

22. Lungimea ischiogambierilor (90/90)

test clinic

CUM ÎL FACI Pacientul pe spate, șoldul la 90°, întinde genunchiul cât poate.

DACĂ E POZITIV Lipsesc peste 20° până la extensie completă: ischiogambieri scurtați.

HARTA DIN ATLAS **Harta 26** · Coapsă — Ischiogambieri · tăietură în Y · Ancoră 0% · cozi 15–25%

23. Testul Ober

test clinic

CUM ÎL FACI Pacientul pe partea sănătoasă; piciorul de sus întins, dus înapoi și lăsat să coboare.

DACĂ E POZITIV Piciorul nu coboară sub orizontală: banda iliotibială tensionată.

HARTA DIN ATLAS **Harta 29** · Coapsă — Banda Iliotibială · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%

24. Testul Ely

test clinic

CUM ÎL FACI Pacientul pe burtă. Îndoi genunchiul spre fesă.

DACĂ E POZITIV Bazinul se ridică sau doare în fața coapsei: dreptul femural (cvadriceps).

HARTA DIN ATLAS **Harta 27** · Coapsă Anterioară · tăietură în evantai · Ancoră 0% · benzi 0–15%

Harta 28 · Coapsă — Cvadriceps · tăietură în Y · Ancoră 0% · cozi 25–35%

PARTEA 9

Genunchi și rotulă

4 teste și harta potrivită din atlas.

25. Mobilitatea rotulei

test clinic

CUM ÎL FACI

Genunchiul relaxat, întins. Miști rotula în sus, în jos și lateral, comparând cu cealaltă parte.

DACĂ E POZITIV

Durere sau mobilitate redusă în jurul rotulei: banda în Y pentru rotulă.

HARTA DIN ATLAS

Harta 21 · Genunchi — Rotulă · tăietură în Y + I · Y 15–25% · I 50% în centru

Harta 63 · Combinată — Genunchi: Rotulă + Tendon · Y + I · Y 15–25% · I centru 50–75%

26. Testul în valgus

test clinic

CUM ÎL FACI

Genunchiul la 20–30°. Împingi genunchiul spre interior, ținând glezna.

DACĂ E POZITIV

Durere sau deschidere pe partea internă: ligamentul colateral medial.

HARTA DIN ATLAS

Harta 24 · Genunchi — Ligament Colateral Medial · tăietură în I · Centru 50–75% · capete 0%

Atenție: Instabilitate mare după traumatism: trimite la medic înainte de bandă.

27. Genuflexiunea pe un picior

test clinic

CUM ÎL FACI

Pacientul coboară încet pe un picior, cât poate, apoi urcă.

DACĂ E POZITIV

Durere sub rotulă, pe tendon: tendonul rotulian.

HARTA DIN ATLAS

Harta 23 · Genunchi — Tendon Rotulian · tăietură în I · Centru 50–75% · capete 0%

Harta 63 · Combinată — Genunchi: Rotulă + Tendon · Y + I · Y 15–25% · I centru 50–75%

28. Testul de balotare (edem)

test clinic

CUM ÎL FACI Genunchiul întins. Apeși zona de deasupra rotulei și împingi rotula în jos.

DACĂ E POZITIV Rotula „plutește”: lichid în articulație; aplicare de drenaj doar ca suport.

HARTA DIN ATLAS **Harta 25** · Genunchi — Edem · tăietură în evantai · Ancore 0% · benzi 0–20%

Atenție: Genunchi umflat, cald și roșu sau blocat: trimite la medic.

PARTEA 10

Gambă

3 teste și harta potrivită din atlas.

29. Dorsiflexia cu genunchiul îndoit

test clinic

CUM ÎL FACI Pacientul în picioare, fandare cu genunchiul din față îndoit spre perete; călcâiul rămâne jos.

DACĂ E POZITIV Tensiune sau durere jos în gambă: solear.

HARTA DIN ATLAS **Harta 31** · Gambă — Solear · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%

30. Ridicări pe vârfuri

test clinic

CUM ÎL FACI Pacientul face ridicări pe vârfuri pe un picior, până la oboseală. Compari părțile.

DACĂ E POZITIV Mai puține repetări sau crampe: oboseala gambei.

HARTA DIN ATLAS **Harta 33** · Gambă · tăietură în Y · Ancoră 0% · cozi 15–25%

Harta 35 · Gambă — Crampe Și Oboseală · tăietură în plasă · Ancore 0% · benzi 0–20%

31. Palparea marginii tibiei

test clinic

CUM ÎL FACI Apeși de-a lungul marginii anterioare a tibiei.

DACĂ E POZITIV Durere difuză pe mușchiul tibial anterior: suport pentru tibial anterior.

HARTA DIN ATLAS **Harta 32** · Gambă — Tibial Anterior · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%

> **Atenție:** Durere pe un singur punct al osului, care crește la alergare: posibilă fractură de stres, trimite la medic.

PARTEA 11

Gleznă, picior și tendonul lui Ahile

4 teste și harta potrivită din atlas.

32. Ridicarea pe un călcâi

test clinic

CUM ÎL FACI Pacientul se ridică pe vârful unui singur picior de 10 ori.

DACĂ E POZITIV Durere pe tendonul lui Ahile: tendonul lui Ahile.

HARTA DIN ATLAS **Harta 36** · Gleznă — Tendonul Lui Ahile · tăietură în Y + I · Y 15–25% · I în centru 50%

Atenție: Pocnitură bruscă și imposibilitatea de a sta pe vârf: posibilă ruptură, trimite urgent la medic.

33. Sertarul anterior al gleznei

test clinic

CUM ÎL FACI Pacientul șezând, tu ții tibia și tragi călcâiul înainte.

DACĂ E POZITIV Durere sau mobilitate crescută pe partea externă: ligamentele gleznei, suport cu bandă.

HARTA DIN ATLAS **Harta 38** · Gleznă · etrier în U · Centru 50% · capete 0%

Atenție: După o entorsă recentă cu durere pe os sau imposibilitatea de a călca: cere radiografie.

34. Testul Windlass

test clinic

CUM ÎL FACI Pacientul în picioare; ridici degetul mare al piciorului în sus.

DACĂ E POZITIV Durere sub călcâi, în talpă: fascia plantară.

HARTA DIN ATLAS **Harta 39** · Picior — Fascia Plantară · tăietură în evantai · Ancoră 0% · benzi 15–25%

35. Observarea edemului la gleznă

test clinic

CUM ÎL FACI Apeși cu degetul în jurul maleolelor câteva secunde.

DACĂ E POZITIV Urma rămâne: edem; aplicare de drenaj limfatic.

HARTA DIN ATLAS **Harta 37** · Gleznă — Edem · tăietură în evantai · Ancore 0% · benzi 0–20%

Atenție: Gambă umflată, caldă și roșie pe o singură parte: posibilă tromboză, nu aplica, trimite urgent la medic.

PARTEA 12

Încheietura mâinii și mâna

3 teste și harta potrivită din atlas.

36. Testul Phalen

test clinic

CUM ÎL FACI Pacientul ține dosul mâinilor lipit, încheieturile flectate, timp de 60 de secunde.

DACĂ E POZITIV Furnicături în degetul mare, arătător și mijlociu: zona tunelului carpian.

HARTA DIN ATLAS **Harta 51** · Încheietură — Tunel Carpian · tăietură în Y · Ancoră 0% · cozi 15–25%

> **Atenție:** Amorțeală noaptea, mâna stângace sau slăbiciune: trimite la medic.

37. Testul Finkelstein

test clinic

CUM ÎL FACI Pacientul închide pumnul peste degetul mare; înclini încheietura spre degetul mic.

DACĂ E POZITIV Durere pe marginea încheieturii, spre degetul mare: De Quervain.

HARTA DIN ATLAS **Harta 54** · Încheietură — De Quervain · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%

38. Strângerea pumnului

test clinic

CUM ÎL FACI Pacientul strânge mâna ta cu putere, compari cu cealaltă parte.

DACĂ E POZITIV Durere în încheietură sau antebraț: suport pentru încheietură și antebraț.

HARTA DIN ATLAS **Harta 52** · Încheietură Și Antebraț · tăietură în I · Ancoră 0% · corpul benzii 15–25%

Harta 53 · Încheietură — Stabilizare · tăietură în I · Centru 25–50% · capete 0%

PARTEA 13

Cot și antebraț

2 teste și harta potrivită din atlas.

39. Testul Cozen

test clinic

CUM ÎL FACI Cotul întins, pumnul închis; pacientul ridică încheietura, tu te opui.

DACĂ E POZITIV Durere pe partea externă a cotului: epicondilita laterală.

HARTA DIN ATLAS

Harta 56 · Cot — Epicondilită Laterală · tăietură în Y + I · Y 15–25% · I în centru 50%

40. Flexia încheieturii contra rezistenței

test clinic

CUM ÎL FACI Cotul întins, palma în sus; pacientul îndoaie încheietura, tu te opui.

DACĂ E POZITIV Durere pe partea internă a cotului: epicondilita medială și flexorii.

HARTA DIN ATLAS

Harta 57 · Cot — Epicondilită Medială · tăietură în Y + I · Y 15–25% · I în centru 50%

Harta 58 · Antebraț — Flexori · tăietură în Y · Ancoră 0% · cozi 15–25%

Pasul următor

Azi: citește pașii din Partea 1. **La următorul pacient:** alege regiunea, fă 1–3 teste, aplică harta indicată și retestează după aplicare.