JISTOTA U KAŽDÉHO PACIENTA™

30 klinických případů krok za krokem

Obtíže → nález → úvaha → ošetření. Smyšlené, ale typické případy, abyste i u obtížného pacienta měli připravený postup uvažování.

Obsah

1 · Jak používat

2 · 30 případů

Další krok

ČÁST 1

Jak používat

Čtěte je jako kazuistický seminář.

Důležité

Případy jsou smyšlené výukové příklady, nejde o skutečné pacienty. Číslo u svalu odpovídá číslu v „60 protokolech ošetření“, pokud je máte. U každého případu se nejprve podívejte na řádek „Nejprve vylučte“.

1. Přečtěte si obtíže a než budete pokračovat, odhadněte, které svaly přicházejí v úvahu.
2. Porovnejte to s úvahou.
3. Projděte stavy, které je třeba vyloučit.
4. Najděte svaly v atlasu.

ČÁST 2

30 případů

Od hlavy k chodidlu.

1. Bolest hlavy u obrazovky

Žena, 34 let, kancelářská práce · výukový modelový případ

OBTÍŽE	Bolest hlavy ve spáncích a v týle, která k odpoledni sílí, 3–4× týdně.
NÁLEZ	Předsunuté držení hlavy; napjaté pruhy v horních vláknech trapezia a v subokcipitální oblasti; tlak reprodukuje bolest ve spánku.
ÚVAHA	Místo bolesti (spánek, týl) a držení těla ukazují na horní vlákna trapezia a subokcipitální svaly.
SVALY K OŠETŘENÍ	Trapezius – horní vlákna (protokol č. 1); Subokcipitální svaly (protokol č. 9); Temporalis (spánkový sval) (protokol č. 4)
DOMŮ	Zasunutí brady každou hodinu, monitor ve výši očí, protažení do úklonu.

Nejprve vylučte: Náhlá, nejsilnější bolest hlavy v životě, porucha vidění, horečka: o takový případ nejde.

2. Ztuhlý krk ráno

Muž, 41 let, řidič nákladního auta · výukový modelový případ

OBTÍŽE	Po probuzení nemůže otočit hlavu doleva; bolí krk a vnitřní okraj lopatky.
NÁLEZ	Rotace doleva omezená; citlivý bod nad horním úhlem pravé lopatky.
ÚVAHA	Omezená rotace a bolest nad úhlem lopatky jsou klasickým obrazem levator scapulae.
SVALY K OŠETŘENÍ	Levator scapulae (zdvihač lopatky) (protokol č. 11); Trapezius – horní vlákna (protokol č. 1); Splenius cervicis (protokol č. 8)
DOMŮ	Protažení levator scapulae dvakrát denně; nižší polštář.

Nejprve vylučte: Úraz, necitlivost šířící se do paže ani horečka nejsou přítomny.

3. Bolest zubů, ale zubař nic nenašel

Žena, 29 let, studentka ve zkouškovém · výukový modelový případ

OBTÍŽE	Bolí horní stoličky, ráno ztuhlá čelist.
NÁLEZ	Otevření úst na 2 prsty; citlivé body v masseteru; tlak reprodukuje bolest zubů.
ÚVAHA	Zubní příčina vyloučena, vzorec je typický pro masseter; stres a zatínání zubů ho udržují.
SVALY K OŠETŘENÍ	Masseter (žvýkací sval) (protokol č. 3); Temporalis (spánkový sval) (protokol č. 4); Pterygoideus medialis (protokol č. 6)
DOMŮ	Automasáž, jazyk na patře, sledovat zatínání zubů.

Nejprve vylučte: Zubní vyšetření proběhlo.

4. Závrať a bolest hlavy při pohybu krku

Žena, 52 let · výukový modelový případ

OBTÍŽE	Bolí čelo a okolí očí, občas mírná porucha rovnováhy.
NÁLEZ	Sternální část SCM je citlivá; klešťový úchop reprodukuje bolest čela.
ÚVAHA	SCM může způsobovat bolest čela a okolí očí i poruchy vnímání rovnováhy.
SVALY K OŠETŘENÍ	Sternocleidomastoideus (SCM) (protokol č. 2); Trapezius – horní vlákna (protokol č. 1)
DOMŮ	Pomalé pohyby hlavou, nedívat se na televizi vleže.

Nejprve vylučte: Skutečná rotační závrať, ztráta sluchu, porucha vidění, porucha řeči: nejprve lékař. Zde praktický lékař už vyloučil.

5. Bolest šířící se do ruky

Muž, 38 let, trenér · výukový modelový případ

OBTÍŽE	Bolest v přední části hrudníku, na vnitřním okraji lopatky a směrem k palci.
NÁLEZ	Jemný tlak v oblasti skalenů ji reprodukuje; bez snížení síly.
ÚVAHA	Skaleny přenášejí bolest do hrudníku, k lopatce a do ruky; horní hrudní dýchání je udržuje.
SVALY K OŠETŘENÍ	Skalenové svaly (protokol č. 12); Pectoralis minor (protokol č. 19); Levator scapulae (zdvihač lopatky) (protokol č. 11)
DOMŮ	Břišní dýchání 5 minut denně, nenosit těžkou tašku.

Nejprve vylučte: Snížení síly, změna reflexů, trvalá necitlivost: k vyloučení kořenového původu lékař.

6. Bolest ramene ve spánku

Žena, 47 let · výukový modelový případ

OBTÍŽE	Hluboko vpředu v pravém rameni bolí, nemůže spát na pravém boku.
NÁLEZ	Citlivé body v infraspinatu; tlak se šíří do přední části ramene.
ÚVAHA	Infraspinatus přenáší bolest do přední části ramene, přestože je vzadu: častý omyl.
SVALY K OŠETŘENÍ	Infraspinatus (protokol č. 13); Teres minor (protokol č. 15); Deltoideus (protokol č. 17)
DOMŮ	Vlež na boku polštář pod paži; protažení přetažením paže přes hrudník.

Nejprve vylučte: Slabé zvedání paže po úrazu, noční bolest, kterou nic nezmírní: lékař.

7. Bolestivé zvedání paže

Muž, 55 let, malíř · výukový modelový případ

OBTÍŽE	Bolí boční strana ramene, když zvedá paži nad hlavu.
NÁLEZ	Citlivý bod nad hřebenem lopatky; tlak se šíří na boční stranu ramene a zevní stranu lokte.
ÚVAHA	Vzorec supraspinatu.
SVALY K OŠETŘENÍ	Supraspinatus (protokol č. 14); Infraspinatus (protokol č. 13); Deltoideus (protokol č. 17)
DOMŮ	Kyvadlový pohyb dvakrát denně, přestávky při práci.

Nejprve vylučte: Úraz, rychlá ztráta síly, noční bolest: k vyloučení ruptury rotátorové manžety lékař.

8. Omezení podobné zmrzlému rameni

Žena, 58 let · výukový modelový případ

OBTÍŽE	Nemůže vytočit paži zevně, bolí zadní část ramene a zápěstí.
NÁLEZ	Zevní rotace výrazně omezená; subscapularis dosažený z podpaží je citlivý.
ÚVAHA	Subscapularis přenáší bolest do zadní části ramene a do zápěstí a omezuje zevní rotaci.
SVALY K OŠETŘENÍ	Subscapularis (protokol č. 16); Pectoralis major (protokol č. 18); Teres minor (protokol č. 15)
DOMŮ	Protažení ve dveřích se zevní rotací.

Nejprve vylučte: Pokud je pohyb omezený do všech směrů a v noci silně bolí (adhezivní kapsulitida), lékařské vyšetření a společný plán.

9. Bolest na hrudi po tréninku

Muž, 30 let · výukový modelový případ

OBTÍŽE	Bolí levá přední strana hrudníku po bench pressu.
NÁLEZ	Napjatý pruh na zevním okraji pectoralis major; tlak bolest reprodukuje.
ÚVAHA	Mechanická bolest měnící se s pohybem a tlakem, přetížení po tréninku.
SVALY K OŠETŘENÍ	Pectoralis major (protokol č. 18); Pectoralis minor (protokol č. 19); Serratus anterior (protokol č. 21)
DOMŮ	Protažení ve dveřích, postupný návrat.

Nejprve vylučte: Bolest na hrudi při námaze, dušnost, pocení: OKAMŽITĚ lékař. O takovou situaci zde nejde.

10. Tenisový loket

Muž, 44 let, elektrikář · výukový modelový případ

OBTÍŽE	Zevní strana lokte bolí při šroubování a úchopu.
NÁLEZ	Citlivé body v extenzorech předloktí pod loktem; úchop bolí.
ÚVAHA	Extenzory předloktí přenášejí bolest na zevní stranu lokte.
SVALY K OŠETŘENÍ	Extenzory předloktí (ECRL, ECRB, extensor digitorum) (protokol č. 25); Triceps brachii (protokol č. 24); Supraspinatus (protokol č. 14)
DOMŮ	Protažení předloktí, silnější rukojeť nářadí.

Nejprve vylučte: Otok, teplota, noční necitlivost: lékař.

11. Necitlivá, bolavá dlaň

Žena, 39 let, kadeřnice · výukový modelový případ

OBTÍŽE	Bolí dlaň a dlaňová strana prstů, hlavně po práci.
NÁLEZ	Flexory předloktí jsou napjaté; v noci necitlivost není.
ÚVAHA	Přetížené flexory předloktí.
SVALY K OŠETŘENÍ	Flexory předloktí (protokol č. 26); Pectoralis minor (protokol č. 19); Skalenové svaly (protokol č. 12)
DOMŮ	Protažení předloktí během práce každou hodinu.

Nejprve vylučte: Noční necitlivost, neobratnost prstů (syndrom karpálního tunelu): lékař.

12. Bolest mezi lopatkami

Žena, 33 let, účetní · výukový modelový případ

OBTÍŽE	Pálivá bolest mezi lopatkami, k večeru horší.
NÁLEZ	Shrbené držení; citlivé body v rhomboideu a ve středních vláknech trapezia.
ÚVAHA	Kombinace často přetažených, slabých zádových svalů a zkráceného prsního svalu.
SVALY K OŠETŘENÍ	Rhomboideus (protokol č. 20); Trapezius – střední vlákna (protokol č. 27); Pectoralis minor (protokol č. 19)
DOMŮ	Protažení prsního svalu, stažení lopatek 10× každou hodinu.

Nejprve vylučte: Bolest na hrudi při námaze, dušnost: lékař.

13. Bodavá bolest na boku hrudníku

Muž, 27 let, běžec · výukový modelový případ

OBTÍŽE	Při běhu píchá na boku u žeber.
NÁLEZ	Serratus anterior je citlivý u 5.–6. žebra.
ÚVAHA	Intenzivní dýchání a běh přetěžují serratus anterior.
SVALY K OŠETŘENÍ	Serratus anterior (protokol č. 21); Obliquus externus abdominis (protokol č. 36)
DOMŮ	Hluboké dýchání se zvednutou paží, postupné tempo.

Nejprve vylučte: Horečka, kašel, ostrá bolest související s dýcháním: lékař.

14. Bolest kříže po předklonu

Muž, 46 let, skladník · výukový modelový případ

OBTÍŽE	Náhlá bolest kříže po zvednutí krabice; úklon bolí.
NÁLEZ	Quadratus lumborum je citlivý; bolest se nešíří do nohy, bez necitlivosti.
ÚVAHA	Bolest při úklonu šířící se k hřebenu kosti kyčelní: quadratus lumborum.
SVALY K OŠETŘENÍ	Quadratus lumborum (protokol č. 34); Iliocostalis lumborum (protokol č. 31); Gluteus medius (protokol č. 38)
DOMŮ	Protažení do úklonu, zvedání z kolen.

Nejprve vylučte: Necitlivost nebo slabost šířící se do nohy, porucha močení nebo vyprazdňování: okamžitě lékař.

15. Bolest kříže po dlouhém sezení

Žena, 36 let, programátorka · výukový modelový případ

OBTÍŽE	Při vstávání se nemůže narovnat, bolí kříž.
NÁLEZ	Iliopsoas je napjatý; v poloze výpadu tah v kříži.
ÚVAHA	Dlouhodobě ohnutá kyčel zkracuje iliopsoas, který přenáší bolest do kříže.
SVALY K OŠETŘENÍ	Iliopsoas (protokol č. 41); Rectus femoris (protokol č. 47); Multifidus (protokol č. 33)
DOMŮ	Protažení ve výpadu každou hodinu, práce ve stoje.

Nejprve vylučte: Břišní potíže, horečka: lékař.

16. Bolest v podbřišku a v zádech

Žena, 31 let, po intenzivním posilování břicha · výukový modelový případ

OBTÍŽE	Bolí střed zad ve vodorovném pruhu.
NÁLEZ	Rectus abdominis je citlivý vedle pupku.
ÚVAHA	Rectus abdominis může přenášet bolest do zad ve vodorovném pruhu.
SVALY K OŠETŘENÍ	Rectus abdominis (protokol č. 35); Obliquus externus abdominis (protokol č. 36); Iliocostalis thoracis (protokol č. 30)
DOMŮ	Opora o lokty vleže na břiše, méně sklapovaček.

Nejprve vylučte: Bolest břicha s horečkou, zvracením, bolest v podbřišku nesouvisející s menstruací: lékař.

17. Bolest hýždě při sezení

Muž, 50 let, taxikář · výukový modelový případ

OBTÍŽE	Bolí střed hýždě, táhne se na zadní stranu stehna.
NÁLEZ	Piriformis je citlivý; protažení do čtyřky bolest reprodukuje.
ÚVAHA	Sedavá práce a peněženka v zadní kapse obtíže udržují.
SVALY K OŠETŘENÍ	Piriformis (protokol č. 40); Gluteus minimus (protokol č. 39); Gluteus maximus (protokol č. 37)
DOMŮ	Protažení do čtyřky, peněženku vyndat ze zadní kapsy.

Nejprve vylučte: Necitlivost, slabost, změna reflexů: vyloučení kořenového původu.

18. Bolest podobná ischiasu

Žena, 45 let · výukový modelový případ

OBTÍŽE	Bolest táhnoucí se po zevní straně stehna a bérce.
NÁLEZ	Gluteus minimus je citlivý nad velkým trochanterem; bez necitlivosti, síla i reflexy v pořádku.
ÚVAHA	Gluteus minimus vytváří vzorec podobný ischiasu.
SVALY K OŠETŘENÍ	Gluteus minimus (protokol č. 39); Piriformis (protokol č. 40); Quadratus lumborum (protokol č. 34)
DOMŮ	Protažení kyčle, přerušovat dlouhé jízdy autem.

Nejprve vylučte: Pokud by byla přítomna necitlivost, slabost nebo změna reflexů: lékař.

19. Bolest kyčle vleže na boku

Žena, 60 let · výukový modelový případ

OBTÍŽE	Bolí boční strana kyčle, nemůže na té straně spát.
NÁLEZ	Gluteus medius a TFL jsou citlivé.
ÚVAHA	Gluteus medius a TFL přenášejí bolest na boční stranu kyčle a zevní stranu stehna.
SVALY K OŠETŘENÍ	Gluteus medius (protokol č. 38); Tensor fasciae latae (TFL) (protokol č. 42); Gluteus minimus (protokol č. 39)
DOMŮ	Polštář mezi kolena při spánku, posilování abduktorů kyčle.

Nejprve vylučte: Podezření na artrózu kyčle (bolest v třísle, omezená rotace): lékař.

20. Bolest v třísle u fotbalisty

Muž, 22 let · výukový modelový případ

OBTÍŽE	Bolí tříslo a vnitřní strana stehna při úkroku.
NÁLEZ	Adductor longus je citlivý v horní třetině.
ÚVAHA	Prudké boční pohyby zatěžují adduktory.
SVALY K OŠETŘENÍ	Adductor longus (protokol č. 43); Pectineus (protokol č. 45); Adductor magnus (protokol č. 44)
DOMŮ	Protažení v motýlku, postupný návrat.

Nejprve vylučte: Podezření na kýlu (otok v třísle při kašli): lékař.

21. Bolest kolena na schodech

Žena, 42 let · výukový modelový případ

OBTÍŽE	Přední část kolena bolí při chůzi ze schodů.
NÁLEZ	Rectus femoris a vastus medialis jsou citlivé; koleno není oteklé.
ÚVAHA	Extenzory stehna přenášejí bolest do přední části kolena.
SVALY K OŠETŘENÍ	Rectus femoris (protokol č. 47); Vastus medialis (protokol č. 48); Vastus lateralis (protokol č. 49)
DOMŮ	Protažení stehna, natahování kolena vsedě jako posilování.

Nejprve vylučte: Otok, zasekávání, podklesnutí, úraz: lékař.

22. Bolest zevní strany kolena u běžců

Muž, 35 let, běžec · výukový modelový případ

OBTÍŽE	Po dlouhém běhu bolí zevní strana kolena.
NÁLEZ	Vastus lateralis a TFL jsou citlivé.
ÚVAHA	Vastus lateralis a TFL přenášejí bolest na zevní stranu kolena.
SVALY K OŠETŘENÍ	Vastus lateralis (protokol č. 49); Tensor fasciae latae (TFL) (protokol č. 42); Gluteus medius (protokol č. 38)
DOMŮ	Protažení stehna, postupné prodlužování běžecké vzdálenosti.

Nejprve vylučte: Otok, úraz: lékař.

23. Bolavá podkolenní jamka

Žena, 26 let, tanečnice · výukový modelový případ

OBTÍŽE	Podkolenní jamka bolí s nataženou nohou.
NÁLEZ	Biceps femoris a horní část gastrocnemiu jsou citlivé.
ÚVAHA	Hamstringy a horní část lýtka přenášejí bolest do podkolenní jamky.
SVALY K OŠETŘENÍ	Biceps femoris (protokol č. 50); Semitendinosus / semimembranosus (protokol č. 51); Gastrocnemius (protokol č. 52)
DOMŮ	Protažení hamstringů s ručníkem.

Nejprve vylučte: Otok v podkolenní jamce, otok lýtka (Bakerova cysta, trombóza): lékař.

24. Noční křeče v lýtku

Žena, 65 let · výukový modelový případ

OBTÍŽE	V noci ji chytá křeč v lýtku, přes den lýtko táhne.
NÁLEZ	Gastrocnemius je citlivý v obou hlavách; bez otoku.
ÚVAHA	Zkrácený, přetížený lýtkový sval má sklon ke křečím.
SVALY K OŠETŘENÍ	Gastrocnemius (protokol č. 52); Soleus (protokol č. 53)
DOMŮ	Večerní protažení lýtka, příjem tekutin.

Nejprve vylučte: Jednostranný otok, teplota, zarudnutí: podezření na trombózu, okamžitě lékař.

25. Bolest paty

Muž, 48 let, turista · výukový modelový případ

OBTÍŽE	Pata bolí při chůzi, hlavně na konci dne.
NÁLEZ	Soleus a quadratus plantae jsou citlivé.
ÚVAHA	Soleus přenáší bolest do paty; stejně tak hluboké svaly chodidla.
SVALY K OŠETŘENÍ	Soleus (protokol č. 53); Quadratus plantae (protokol č. 60); Flexor digitorum brevis (protokol č. 58)
DOMŮ	Protažení lýtka s pokrčeným kolenem, masáž chodidla míčkem.

Nejprve vylučte: Ostrá bolest při prvních ranních krocích (plantární fascie), otok, necitlivost: specialista.

26. Bolest holeně u začínající běžkyně

Žena, 24 let · výukový modelový případ

OBTÍŽE	Přední strana bérce bolí po běhu.
NÁLEZ	Tibialis anterior je citlivý; kost na tlak nebolí.
ÚVAHA	Příliš rychlé zvyšování zátěže.
SVALY K OŠETŘENÍ	Tibialis anterior (protokol č. 54); Extensor digitorum longus (protokol č. 57)
DOMŮ	Protažení nártu, snížení běžecké vzdálenosti.

Nejprve vylučte: Pokud kost bolí v jednom bodě a při zátěži se to zhoršuje (únavová zlomenina): lékař.

27. Bolest kotníku po podvrtnutí (6 týdnů)

Muž, 29 let · výukový modelový případ

OBTÍŽE	Trvalá bolest kolem zevního kotníku, pocit nestability.
NÁLEZ	Peroneus longus je citlivý, kotník je při vyšetření stabilní.
ÚVAHA	Peroneální svaly přenášejí bolest k zevnímu kotníku a po úrazu jsou přetížené.
SVALY K OŠETŘENÍ	Peroneus (fibularis) longus (protokol č. 55); Tibialis anterior (protokol č. 54)
DOMŮ	Stoj na jedné noze, stabilizace kotníku.

Nejprve vylučte: Čerstvý úraz, noha nesnese zátěž, velký otok: rentgen, lékař.

28. Bolest chodidla po celodenním stání

Žena, 51 let, prodavačka · výukový modelový případ

OBTÍŽE	Bolí střed chodidla a kořeny prstů.
NÁLEZ	Flexor digitorum brevis a abductor hallucis jsou citlivé.
ÚVAHA	Dlouhodobé stání a nevhodná obuv.
SVALY K OŠETŘENÍ	Flexor digitorum brevis (protokol č. 58); Abductor hallucis (protokol č. 59); Tibialis posterior (protokol č. 56)
DOMŮ	Masáž chodidla míčkem, pohodlná obuv.

Nejprve vylučte: Necitlivost, pálení (nervová příčina), otok: lékař.

29. Bolest ve spáncích a skřípání zuby

Muž, 37 let · výukový modelový případ

OBTÍŽE	Ráno bolest ve spáncích, partnerka v noci slyší skřípání zuby.
NÁLEZ	Temporalis a masseter jsou citlivé.
ÚVAHA	Noční bruxismus zatěžuje žvýkací svaly.
SVALY K OŠETŘENÍ	Temporalis (spánkový sval) (protokol č. 4); Masseter (žvýkací sval) (protokol č. 3); Pterygoideus lateralis (protokol č. 5)
DOMŮ	Večerní automasáž, zubní lékař kvůli dlaze.

Nejprve vylučte: Zubní vyšetření (okluzní dlaha).

30. Bolest na temeni

Žena, 44 let, švadlena · výukový modelový případ

OBTÍŽE	Bolí temeno, když se dlouho dívá dolů.
NÁLEZ	Splenius capitis je citlivý.
ÚVAHA	Splenius capitis přenáší bolest na temeno.
SVALY K OŠETŘENÍ	Splenius capitis (protokol č. 7); Semispinalis capitis (protokol č. 10); Subokcipitální svaly (protokol č. 9)
DOMŮ	Při práci mít výrobek výš, každou hodinu zasunutí brady.

Nejprve vylučte: Náhlá, neobvyklá bolest hlavy, neurologický příznak: lékař.

Další krok

Tento týden: čtěte 3 případy denně a u dalšího podobného pacienta postupujte podle úvahy.