PACIENT POKRAČUJE I DOMA™

4týdenní plány péče o sebe podle obtíží

Pro 10 častých obtíží vždy čtyřtýdenní domácí plán, který můžete pacientovi dát do ruky na konci ošetření.

Obsah

1 · Pro pacienta

2 · 10 plánů

Další krok

ČÁST 1

Pro pacienta

Jak plán používat.

Důležité

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

ČÁST 2

10 plánů

Tři cvičení, čtyři týdny, jedna rada pro každý den.

Tenzní bolest hlavy

1. **Trapezius – horní vlákna:** Seďte rovně, chyťte se za spodek židle na bolestivé straně a pomalu ukloňte hlavu na druhou stranu, dokud neucítíte na straně krku mírný tah. Vydržte 30 sekund, 3×, dvakrát denně.

2. **Subokcipitální svaly:** Lehněte si na záda, pod zátylek si dejte dva tenisové míčky v ponožce a odpočívejte na nich 2 minuty. Potom pomalu 10× zasuňte bradu.

3. **Temporalis (spánkový sval):** Když cítíte, že začíná bolest hlavy, masírujte krouživými pohyby spánky na obou stranách po dobu 1 minuty, pomalu, a přitom se zhluboka nadechujte.

TÝDEN	CO DĚLAT
1. týden · Seznámení	1× denně první cvičení. Sledujte, kdy se bolest zhoršuje.
2. týden · Pravidelnost	2× denně první dvě cvičení a zavedení každodenní rady.
3. týden · Celý program	2× denně všechna tři cvičení.
4. týden · Udržení	1× denně všechna tři cvičení a zapište si, co pomohlo nejvíc.

> **Každý den**
>
> Obrazovka ve výši očí, každou hodinu 1 minuta pauza, večerní uvolnění.

Bolest a ztuhlost krku

1. **Levator scapulae (zdvihač lopatky):** Otočte hlavu na druhou stranu a podívejte se dolů k podpaží. Ruku na bolestivé straně si položte na zátylek. Vydržte 30 sekund, 3×, dvakrát denně.

2. **Trapezius – horní vlákna:** Seďte rovně, chyťte se za spodek židle na bolestivé straně a pomalu ukloňte hlavu na druhou stranu, dokud neucítíte na straně krku mírný tah. Vydržte 30 sekund, 3×, dvakrát denně.

3. **Splenius cervicis:** Jednou za hodinu zasuňte bradu rovně dozadu (jako byste dělali dvojitou bradu) a vydržte 5 sekund. 5×.

TÝDEN	CO DĚLAT
1. týden · Seznámení	1× denně první cvičení. Sledujte, kdy se bolest zhoršuje.
2. týden · Pravidelnost	2× denně první dvě cvičení a zavedení každodenní rady.
3. týden · Celý program	2× denně všechna tři cvičení.
4. týden · Udržení	1× denně všechna tři cvičení a zapište si, co pomohlo nejvíc.

> **Každý den**
> Nižší polštář, telefon nedržet mezi ramenem a uchem.

Bolest čelisti a obličeje

1. **Masseter (žvýkací sval):** Bříšky prstů masírujte krouživými pohyby tvář před ušním lalůčkem a pod ním po dobu 1 minuty. Během dne si všímejte: pokud zatínáte zuby, povolte, jazyk ať odpočívá na patře.

2. **Temporalis (spánkový sval):** Když cítíte, že začíná bolest hlavy, masírujte krouživými pohyby spánky na obou stranách po dobu 1 minuty, pomalu, a přitom se zhluboka nadechujte.

3. **Pterygoideus medialis:** Během dne si několikrát zkontrolujte: zuby se nedotýkají, rty jsou zavřené, čelist je volná.

TÝDEN	CO DĚLAT
1. týden · Seznámení	1× denně první cvičení. Sledujte, kdy se bolest zhoršuje.
2. týden · Pravidelnost	2× denně první dvě cvičení a zavedení každodenní rady.
3. týden · Celý program	2× denně všechna tři cvičení.
4. týden · Udržení	1× denně všechna tři cvičení a zapište si, co pomohlo nejvíc.

> **Každý den**
> Sledovat zatínání zubů, vyhýbat se žvýkačkám.

Bolest ramene

1. **Infraspinatus:** Přetáhněte bolestivou paži přes hrudník k druhému rameni, druhou rukou chyťte loket a jemně přitáhněte. 30 sekund, 3×.
2. **Supraspinatus:** Nechte paži volně viset a dělejte s ní malé kroužky dopředu a dozadu jako kyvadlo, 1 minutu. Dvakrát denně.
3. **Pectoralis minor:** Vsedě stáhněte lopatky dozadu a dolů, jako byste je chtěli zastrčit do zadní kapsy. Vydržte 5 sekund, 10×.

TÝDEN	CO DĚLAT
1. týden · Seznámení	1× denně první cvičení. Sledujte, kdy se bolest zhoršuje.
2. týden · Pravidelnost	2× denně první dvě cvičení a zavedení každodenní rady.
3. týden · Celý program	2× denně všechna tři cvičení.
4. týden · Udržení	1× denně všechna tři cvičení a zapište si, co pomohlo nejvíc.

> **Každý den**
> Nespěte na bolestivé straně, pod paži polštář.

Bolest lokte a předloktí

1. **Extenzory předloktí (ECRL, ECRB, extensor digitorum):** Natáhněte paži před sebe dlaní dolů a druhou rukou ohněte zápěstí a prsty dolů. 30 sekund, 3×.
2. **Flexory předloktí:** Natáhněte paži dlaní nahoru a druhou rukou táhněte prsty dolů a dozadu. 30 sekund, 3×.
3. **Triceps brachii:** Zvedněte paži nad hlavu, pokrčte loket a druhou rukou ho jemně tlačte dozadu. 30 sekund, 3×.

TÝDEN	CO DĚLAT
1. týden · Seznámení	1× denně první cvičení. Sledujte, kdy se bolest zhoršuje.
2. týden · Pravidelnost	2× denně první dvě cvičení a zavedení každodenní rady.
3. týden · Celý program	2× denně všechna tři cvičení.
4. týden · Udržení	1× denně všechna tři cvičení a zapište si, co pomohlo nejvíc.

> **Každý den**
> Při práci každou hodinu protažení předloktí, volnější úchop.

Bolest mezi lopatkami

1. **Rhomboideus:** Obejměte se, jako by vám byla zima, a vyhrbte záda, dokud neucítíte mezi lopatkami tah. 30 sekund, 3×.
2. **Trapezius – střední vlákna:** Obejměte se a vyhrbte záda. 30 sekund, 3×. Potom 10× stáhněte lopatky dozadu.
3. **Pectoralis major:** Postavte se do dveří, předloktí opřete o zárubeň ve výši ramene a pomalu vykročte dopředu, dokud neucítíte tah na hrudníku. 30 sekund, 3×.

TÝDEN	CO DĚLAT
1. týden · Seznámení	1× denně první cvičení. Sledujte, kdy se bolest zhoršuje.
2. týden · Pravidelnost	2× denně první dvě cvičení a zavedení každodenní rady.
3. týden · Celý program	2× denně všechna tři cvičení.
4. týden · Udržení	1× denně všechna tři cvičení a zapište si, co pomohlo nejvíc.

> **Každý den**
> Rovný sed, stažení lopatek každou hodinu.

Bolest kříže

1. **Quadratus lumborum:** Ve stoje zvedněte paži nad hlavu a pomalu se ukloňte na druhou stranu, pánev zůstává na místě. 30 sekund, 3×.
2. **Iliopsoas:** Klekněte si na jedno koleno, druhou nohu máte před sebou. Pomalu tlačte pánev dopředu, dokud neucítíte tah na přední straně zadního stehna. 30 sekund, 3×.
3. **Multifidus:** Na všech čtyřech natáhněte jednu paži dopředu a opačnou nohu dozadu a vydržte 5 sekund. 10× na každou stranu.

TÝDEN	CO DĚLAT
1. týden · Seznámení	1× denně první cvičení. Sledujte, kdy se bolest zhoršuje.

TÝDEN	CO DĚLAT
2. týden · Pravidelnost	2× denně první dvě cvičení a zavedení každodenní rady.
3. týden · Celý program	2× denně všechna tři cvičení.
4. týden · Udržení	1× denně všechna tři cvičení a zapište si, co pomohlo nejvíc.

> **Každý den**
> Každou hodinu se postavte, zvedejte z kolen.

Bolest šířící se z hýždě do stehna

1. **Piriformis:** Lehněte si na záda, kotník bolestivé nohy položte na druhé koleno a přitáhněte druhé stehno k hrudníku. 30 sekund, 3×.
2. **Gluteus minimus:** Lehněte si na záda, kotník bolestivé nohy položte na druhé koleno a přitáhněte druhé stehno k hrudníku. 30 sekund, 3×.
3. **Gluteus medius:** Ve stoje dejte bolestivou nohu zkříženě za druhou a vysuňte pánev do strany, dokud neucítíte tah. 30 sekund, 3×.

TÝDEN	CO DĚLAT
1. týden · Seznámení	1× denně první cvičení. Sledujte, kdy se bolest zhoršuje.
2. týden · Pravidelnost	2× denně první dvě cvičení a zavedení každodenní rady.
3. týden · Celý program	2× denně všechna tři cvičení.
4. týden · Udržení	1× denně všechna tři cvičení a zapište si, co pomohlo nejvíc.

> **Každý den**
> Peněženku nenoste v zadní kapse, nekřižte nohy.

Bolest kolena

1. **Rectus femoris:** Ve stoje se přidržte, chyťte se za kotník a přitáhněte patu k hýždi, kolena vedle sebe. 30 sekund, 3×.
2. **Vastus medialis:** Sedněte si na židli, pomalu natáhněte koleno, vydržte 5 sekund a pak ho spusťte. 10× na každou nohu.

3. **Vastus lateralis:** Ve stoje se chyťte za kotník a přitáhněte patu k hýždi. 30 sekund, 3×.

TÝDEN	CO DĚLAT
1. týden · Seznámení	1× denně první cvičení. Sledujte, kdy se bolest zhoršuje.
2. týden · Pravidelnost	2× denně první dvě cvičení a zavedení každodenní rady.
3. týden · Celý program	2× denně všechna tři cvičení.
4. týden · Udržení	1× denně všechna tři cvičení a zapište si, co pomohlo nejvíc.

> **Každý den**
> Na schodech pomalu, postupná zátěž.

Bolest paty a chodidla

1. **Soleus:** Postavte se ke zdi, bolestivou nohu dejte dozadu, mírně pokrčte koleno, pata zůstává na zemi. 30 sekund, 3×.
2. **Gastrocnemius:** Postavte se ke zdi, bolestivou nohu dejte dozadu s nataženým kolenem, pata na zemi, a opřete se o zeď. 30 sekund, 3×.
3. **Flexor digitorum brevis:** Vsedě pomalu kutálejte pod chodidlem tenisový míček dopředu a dozadu 2 minuty. Jednou denně.

TÝDEN	CO DĚLAT
1. týden · Seznámení	1× denně první cvičení. Sledujte, kdy se bolest zhoršuje.
2. týden · Pravidelnost	2× denně první dvě cvičení a zavedení každodenní rady.
3. týden · Celý program	2× denně všechna tři cvičení.
4. týden · Udržení	1× denně všechna tři cvičení a zapište si, co pomohlo nejvíc.

> **Každý den**
> Pohodlná obuv, večerní masáž chodidla míčkem.

Další krok

Pro terapeuta: u dalšího pacienta vytiskněte plán, který odpovídá jeho obtížím, a na konec 4. týdne naplánujte kontrolu.