Domácí cvičení

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Trapezius – horní vlákna**. Tento sval často přenáší bolest sem: spánek, strana hlavy, strana krku, za uchem, úhel dolní čelisti.

Cvičení

Seďte rovně, chyťte se za spodek židle na bolestivé straně a pomalu ukloňte hlavu na druhou stranu, dokud neucítíte na straně krku mírný tah. Vydržte 30 sekund, 3×, dvakrát denně.

V běžném dni

Protažení do úklonu dvakrát denně; monitor ve výši očí; nedržet telefon mezi uchem a ramenem.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Sternocleidomastoideus (SCM)**. Tento sval často přenáší bolest sem: čelo, okolí oka, tvář, hluboko v uchu, temeno, týl.

Cvičení

Vsedě uvolněte ramena a pomalu otáčejte hlavu doprava a pak doleva, jak je vám to příjemné. 10× na každou stranu, dvakrát denně. Pokud se vám zatočí hlava, přestaňte.

V běžném dni

Pomalé kývání a otáčení hlavou; vyhýbat se sledování televize vleže a čtení s podloženou hlavou.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

HLAVA, OBLIČEJ A KRK · MASSETER (ŽVÝKACÍ SVAL)

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Masseter (žvýkací sval)**. Tento sval často přenáší bolest sem: horní a dolní stoličky, dolní čelist, obočí, hluboko v uchu.

Cvičení

Bříšky prstů masírujte krouživými pohyby tvář před ušním lalůčkem a pod ním po dobu 1 minuty. Během dne si všímejte: pokud zatínáte zuby, povolte, jazyk ať odpočívá na patře.

V běžném dni

Denní automasáž krouživými pohyby; vyhýbat se žvýkačkám; sledovat denní zatínání zubů.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

HLAVA, OBLIČEJ A KRK · TEMPORALIS (SPÁNKOVÝ SVAL)

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Temporalis (spánkový sval)**. Tento sval často přenáší bolest sem: spánek, obočí, za okem, horní zuby, strana hlavy.

Cvičení

Když cítíte, že začíná bolest hlavy, masírujte krouživými pohyby spánky na obou stranách po dobu 1 minuty, pomalu, a přitom se zhluboka nadechujte.

V běžném dni

Automasáž spánků na začátku bolesti hlavy; sledovat noční skřípání zuby.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Pterygoideus lateralis**. Tento sval často přenáší bolest sem: čelistní kloub, tvář (nad čelistní dutinou).

Cvičení

Před zrcadlem pomalu otevírejte ústa v přímé linii, brada nesmí uhýbat do strany. 10×, dvakrát denně.

V běžném dni

Vyhýbat se tvrdým a velkým soustům; vědomě pomalu otevírat ústa v přímé linii.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

HLAVA, OBLIČEJ A KRK · PTERYGOIDEUS MEDIALIS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Pterygoideus medialis**. Tento sval často přenáší bolest sem: kořen jazyka, hrdlo, pod uchem, čelistní kloub.

Cvičení

Během dne si několikrát zkontrolujte: zuby se nedotýkají, rty jsou zavřené, čelist je volná.

V běžném dni

Vědomě povolovat zaťaté zuby; ve dnech s bolestí měkká strava.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

HLAVA, OBLIČEJ A KRK · SPLENIUS CAPITIS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Splenius capitis**. Tento sval často přenáší bolest sem: temeno.

Cvičení

Vsedě skloňte bradu k hrudníku a mírně ji otočte na druhou stranu, dokud neucítíte na zátylku mírný tah. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Vyhýbat se dlouhému dívání nahoru (malování, skládání do polic); vhodná výška polštáře.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

HLAVA, OBLIČEJ A KRK · SPLENIUS CERVICIS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Splenius cervicis**. Tento sval často přenáší bolest sem: za okem, týl, přechod krku a ramene.

Cvičení

Jednou za hodinu zasuňte bradu rovně dozadu (jako byste dělali dvojitou bradu) a vydržte 5 sekund. 5×.

V běžném dni

Korekce předsunutého držení hlavy; každou hodinu pohybová přestávka.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

HLAVA, OBLIČEJ A KRK · SUBOKCIPITÁLNÍ SVALY

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Subokcipitální svaly**. Tento sval často přenáší bolest sem: strana hlavy, za okem, čelo, týl.

Cvičení

Lehněte si na záda, pod zátylek si dejte dva tenisové míčky v ponožce a odpočívejte na nich 2 minuty. Potom pomalu 10× zasuňte bradu.

V běžném dni

Zasunutí brady 10× denně; obrazovka ve výši očí; každou hodinu krátká přestávka.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

HLAVA, OBLIČEJ A KRK · SEMISPINALIS CAPITIS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Semispinalis capitis**. Tento sval často přenáší bolest sem: strana hlavy, spánek, čelo, týl.

Cvičení

Vsedě si položte ruce na zátylek a nechte váhu paží pomalu sklonit hlavu dopředu. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Vyhýbat se předsunutému držení hlavy; při čtení knihu ve výši očí.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

HLAVA, OBLIČEJ A KRK · LEVATOR SCAPULAE (ZDVIHAČ LOPATKY)

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Levator scapulae (zdvihač lopatky)**. Tento sval často přenáší bolest sem: přechod krku a ramene, vnitřní okraj lopatky, zadní část ramene.

Cvičení

Otočte hlavu na druhou stranu a podívejte se dolů k podpaží. Ruku na bolestivé straně si položte na zátylek. Vydržte 30 sekund, 3×, dvakrát denně.

V běžném dni

Totéž protažení dvakrát denně; vyhýbat se vysokému polštáři a otáčení hlavy do strany při práci.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

HLAVA, OBLIČEJ A KRK · SKALENOVÉ SVALY

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Skalenové svaly**. Tento sval často přenáší bolest sem: přední strana hrudníku, paže, vnitřní okraj lopatky, ruka (palec a ukazovák).

Cvičení

Lehněte si na záda, položte ruku na břicho a dýchejte tak, aby se při nádechu zvedalo břicho, ne ramena. 5 minut denně.

V běžném dni

Nácvik břišního (bráničního) dýchání; nenosit těžkou tašku na rameni.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

RAMENO, PAŽE A RUKA · INFRASPINATUS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Infraspinatus**. Tento sval často přenáší bolest sem: přední část ramene (hluboko), přední zevní strana paže, předloktí, palcová strana ruky.

Cvičení

Přetáhněte bolestivou paži přes hrudník k druhému rameni, druhou rukou chyťte loket a jemně přitáhněte. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Nespat na bolestivé straně; vleže na boku podložit paži polštářem.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

RAMENO, PAŽE A RUKA · SUPRASPINATUS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Supraspinatus**. Tento sval často přenáší bolest sem: strana ramene (oblast deltoideu), zevní strana paže, zevní strana lokte.

Cvičení

Nechte paži volně viset a dělejte s ní malé kroužky dopředu a dozadu jako kyvadlo, 1 minutu. Dvakrát denně.

V běžném dni

Vyhýbat se zvedání těžkých předmětů nad hlavu; denně kroužení rameny.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

RAMENO, PAŽE A RUKA · TERES MINOR

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Teres minor**. Tento sval často přenáší bolest sem: zadní část ramene (bodově), zadní strana paže.

Cvičení

Přetáhněte bolestivou paži přes hrudník, druhou rukou ji jemně držte u lokte. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Stejně jako u infraspinatu; nespat s paží nad hlavou.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

RAMENO, PAŽE A RUKA · SUBSCAPULARIS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Subscapularis**. Tento sval často přenáší bolest sem: zadní část ramene, lopatka, zadní strana paže, zápěstí.

Cvičení

Postavte se do dveří, loket pokrčený, dlaň na zárubni. Pomalu se otáčejte od paže, dokud neucítíte v přední části ramene mírný tah. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Nácvik zevní rotace; paže nemá zůstávat dlouho přitisknutá k tělu.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

RAMENO, PAŽE A RUKA · DELTOIDEUS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Deltoideus**. Tento sval často přenáší bolest sem: rameno (kolem bodu), paže.

Cvičení

Masírujte prsty krouživými pohyby zevní část ramene 1 minutu, potom na 30 sekund přetáhněte paži přes hrudník.

V běžném dni

Přestávky při opakovaném zvedání.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

RAMENO, PAŽE A RUKA · PECTORALIS MAJOR

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Pectoralis major**. Tento sval často přenáší bolest sem: přední část hrudníku, přední část ramene, vnitřní strana paže, prsa.

Cvičení

Postavte se do dveří, předloktí opřete o zárubeň ve výši ramene a pomalu vykročte dopředu, dokud neucítíte tah na hrudníku. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Korekce shrbeného držení; ramena dozadu a dolů.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

RAMENO, PAŽE A RUKA · PECTORALIS MINOR

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Pectoralis minor**. Tento sval často přenáší bolest sem: přední část ramene, hrudník, vnitřní strana paže, malíková strana ruky.

Cvičení

Vsedě stáhněte lopatky dozadu a dolů, jako byste je chtěli zastrčit do zadní kapsy. Vydržte 5 sekund, 10×.

V běžném dni

Korekce předsunutého ramene; posilování zádových svalů.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

RAMENO, PAŽE A RUKA · RHOMBOIDEUS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Rhomboideus**. Tento sval často přenáší bolest sem: vnitřní okraj lopatky, mezi lopatkami.

Cvičení

Obejměte se, jako by vám byla zima, a vyhrbte záda, dokud neucítíte mezi lopatkami tah. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Protahování prsního svalu (rhomboideus bývá často přetažený a slabý).

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

RAMENO, PAŽE A RUKA · SERRATUS ANTERIOR

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Serratus anterior**. Tento sval často přenáší bolest sem: boční strana hrudníku, dolní úhel lopatky, vnitřní strana paže.

Cvičení

Lehněte si na záda, zvedněte paži nad hlavu a pětkrát se pomalu a zhluboka nadechněte mezi žebra.

V běžném dni

Častý po kašli a intenzivním běhu: postupná zátěž.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

RAMENO, PAŽE A RUKA · LATISSIMUS DORSI

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Latissimus dorsi**. Tento sval často přenáší bolest sem: dolní úhel lopatky, zadní vnitřní strana paže, prsteník a malíček.

Cvičení

Ve stoje zvedněte paži nad hlavu a pomalu se ukloňte na druhou stranu, dokud neucítíte tah v boku. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Protažení po shybech a tažných pohybech.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

RAMENO, PAŽE A RUKA · BICEPS BRACHII

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Biceps brachii**. Tento sval často přenáší bolest sem: přední část ramene, loketní jamka.

Cvičení

Položte dlaň za sebe na hranu stolu s nataženým loktem a pomalu se otáčejte, dokud neucítíte tah na přední straně paže. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Vyhýbat se nošení těžkých předmětů s pokrčeným loktem.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

RAMENO, PAŽE A RUKA · TRICEPS BRACHII

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Triceps brachii**. Tento sval často přenáší bolest sem: zadní část ramene, zevní strana lokte, zadní strana předloktí.

Cvičení

Zvedněte paži nad hlavu, pokrčte loket a druhou rukou ho jemně tlačte dozadu. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Přestávky při chůzi o berlích a při klicích.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

RAMENO, PAŽE A RUKA · EXTENZORY PŘEDLOKTÍ (ECRL, ECRB, EXTENSOR DIGITORUM)

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Extenzory předloktí (ECRL, ECRB, extensor digitorum)**. Tento sval často přenáší bolest sem: zevní strana lokte, zadní strana předloktí, hřbet ruky, prsty.

Cvičení

Natáhněte paži před sebe dlaní dolů a druhou rukou ohněte zápěstí a prsty dolů. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Přestávky při práci s myší a šroubování; povolit stisk.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

RAMENO, PAŽE A RUKA · FLEXORY PŘEDLOKTÍ

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Flexory předloktí**. Tento sval často přenáší bolest sem: dlaňová strana zápěstí, dlaň, dlaňová strana prstů.

Cvičení

Natáhněte paži dlaní nahoru a druhou rukou táhněte prsty dolů a dozadu. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Přestávky při manuální práci (zahrada, montáž); povolit úchop.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

ZÁDA A TRUP · TRAPEZIUS – STŘEDNÍ VLÁKNA

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Trapezius – střední vlákna**. Tento sval často přenáší bolest sem: mezi lopatkami, pálení vedle páteře.

Cvičení

Obejměte se a vyhrbte záda. 30 sekund, 3×. Potom 10× stáhněte lopatky dozadu.

V běžném dni

Korekce shrbeného sedu; protahování prsního svalu.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

ZÁDA A TRUP · TRAPEZIUS – DOLNÍ VLÁKNA

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Trapezius – dolní vlákna**. Tento sval často přenáší bolest sem: zadní strana krku, akromion, mezi lopatkami.

Cvičení

Lehněte si na břicho, čelo na ručníku. Pomalu zvedněte paže do tvaru Y a vydržte 3 sekundy. 10×.

V běžném dni

Posilování: vleže na břiše zvedání paží do tvaru Y.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

ZÁDA A TRUP · SERRATUS POSTERIOR SUPERIOR

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Serratus posterior superior**. Tento sval často přenáší bolest sem: hluboko pod lopatkou, zadní část ramene, zadní strana paže, malíček.

Cvičení

Vsedě si položte ruku na břicho a dýchejte pomalu tak, aby se břicho zvedalo. 5 minut denně.

V běžném dni

Místo horního hrudního (překotného) dýchání břišní dýchání.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

ZÁDA A TRUP · ILIOCOSTALIS THORACIS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Iliocostalis thoracis**. Tento sval často přenáší bolest sem: střed zad, břicho (někdy), pod lopatkou.

Cvičení

Sedněte si na okraj židle a pomalu se předkloňte, paže ať visí mezi nohama. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Pohybové přestávky při dlouhém sezení.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

ZÁDA A TRUP · ILIOCOSTALIS LUMBORUM

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Iliocostalis lumborum**. Tento sval často přenáší bolest sem: kříž, hýždě, dolní část břicha.

Cvičení

Lehněte si na záda, přitáhněte obě kolena k hrudníku a obejměte je. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Zvedat z kolen s rovnými zády; přerušovat dlouhé sezení.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

ZÁDA A TRUP · LONGISSIMUS THORACIS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Longissimus thoracis**. Tento sval často přenáší bolest sem: hýždě, kříž, hřeben kosti kyčelní.

Cvičení

Na všech čtyřech vyhrbte záda (kočka) a pak je pomalu prohněte (kráva). 10×.

V běžném dni

Každou hodinu přerušit sedavou práci.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

ZÁDA A TRUP · MULTIFIDUS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Multifidus**. Tento sval často přenáší bolest sem: bodově vedle páteře, kost křížová, břicho (vzácně).

Cvičení

Na všech čtyřech natáhněte jednu paži dopředu a opačnou nohu dozadu a vydržte 5 sekund. 10× na každou stranu.

V běžném dni

Aktivace hlubokého stabilizačního systému (vtažení břicha bez zatnutí břišního lisu).

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

ZÁDA A TRUP · QUADRATUS LUMBORUM

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Quadratus lumborum**. Tento sval často přenáší bolest sem: hřeben kosti kyčelní, hýždě, strana kyčle, kříž.

Cvičení

Ve stoje zvedněte paži nad hlavu a pomalu se ukloňte na druhou stranu, pánev zůstává na místě. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Vyhýbat se stání na jedné noze a nošení tašky na jedné straně.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

ZÁDA A TRUP · RECTUS ABDOMINIS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Rectus abdominis**. Tento sval často přenáší bolest sem: vodorovný pruh přes střed zad, břicho, kříž.

Cvičení

Lehněte si na břicho, opřete se o lokty a nechte břicho volně protáhnout. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Protažení po přehnaném posilování břišních svalů.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

ZÁDA A TRUP · OBLIQUUS EXTERNUS ABDOMINIS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Obliquus externus abdominis**. Tento sval často přenáší bolest sem: strana břicha, kříž, dolní část hrudníku.

Cvičení

Lehněte si na záda, pokrčte kolena a pomalu je obě spusťte na jednu stranu, ramena zůstávají dole. 30 sekund na každou stranu.

V běžném dni

Postupná zátěž při rotačních pohybech.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

PÁNEV A KYČEL · GLUTEUS MAXIMUS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Gluteus maximus**. Tento sval často přenáší bolest sem: hýždě, kost křížová, okolí kostrče.

Cvičení

Lehněte si na záda a oběma rukama přitáhněte jedno koleno k opačnému rameni. 30 sekund na každou stranu, 3×.

V běžném dni

Přerušovat dlouhé sezení; na tvrdé židli polštář.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

PÁNEV A KYČEL · GLUTEUS MEDIUS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Gluteus medius**. Tento sval často přenáší bolest sem: dolní část kříže, kost křížová, strana kyčle, hýždě.

Cvičení

Ve stoje dejte bolestivou nohu zkříženě za druhou a vysuňte pánev do strany, dokud neucítíte tah. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Vyhýbat se stání na jedné noze a křížení nohou; posilování abduktorů kyčle.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

PÁNEV A KYČEL · GLUTEUS MINIMUS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Gluteus minimus**. Tento sval často přenáší bolest sem: zevní strana stehna, zevní strana bérce, zadní strana stehna, kotník.

Cvičení

Lehněte si na záda, kotník bolestivé nohy položte na druhé koleno a přitáhněte druhé stehno k hrudníku. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Přerušovat dlouhé řízení auta a sezení.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

PÁNEV A KYČEL · PIRIFORMIS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Piriformis**. Tento sval často přenáší bolest sem: hýždě, kost křížová, zadní strana stehna, zadní část kyčelního kloubu.

Cvičení

Lehněte si na záda, kotník bolestivé nohy položte na druhé koleno a přitáhněte druhé stehno k hrudníku. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Nesedět na peněžence; vyhýbat se křížení nohou.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

PÁNEV A KYČEL · ILIOPSOAS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Iliopsoas**. Tento sval často přenáší bolest sem: kříž vedle páteře, kost křížová, přední strana stehna.

Cvičení

Klekněte si na jedno koleno, druhou nohu máte před sebou. Pomalu tlačte pánev dopředu, dokud neucítíte tah na přední straně zadního stehna. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Po dlouhém sezení protažení ve výpadu.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

PÁNEV A KYČEL · TENSOR FASCIAE LATAE (TFL)

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Tensor fasciae latae (TFL)**. Tento sval často přenáší bolest sem: zevní strana stehna, zevní strana kolena.

Cvičení

Ve stoje dejte bolestivou nohu zkříženě za druhou a ukloňte se na druhou stranu. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Při sezení nemít stehna příliš ohnutá.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

PÁNEV A KYČEL · ADDUCTOR LONGUS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Adductor longus**. Tento sval často přenáší bolest sem: tříslo, vnitřní strana stehna, vnitřní strana kolena.

Cvičení

Sedněte si, přiložte chodidla k sobě a pomalu spouštějte kolena dolů. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Zahřátí před prudkými bočními pohyby.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

PÁNEV A KYČEL · ADDUCTOR MAGNUS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Adductor magnus**. Tento sval často přenáší bolest sem: třísla, vnitřní strana stehna, hluboko v pánvi.

Cvičení

Sedněte si do roznožení a pomalu se s rovnými zády předkloňte. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Postupná zátěž, zahřátí.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

PÁNEV A KYČEL · PECTINEUS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Pectineus**. Tento sval často přenáší bolest sem: hluboko v třísle, vnitřně-přední strana stehna.

Cvičení

Sedněte si, přiložte chodidla k sobě a pomalu spouštějte kolena dolů. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Při sezení nemít stehna stisknutá k sobě.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

PÁNEV A KYČEL · SARTORIUS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Sartorius**. Tento sval často přenáší bolest sem: přední strana stehna (pálivý, bodavý pocit), vnitřní strana kolena.

Cvičení

Klekněte si na jedno koleno a pomalu tlačte pánev dopředu. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Vyhýbat se dlouhému sezení v tureckém sedu.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

STEHNO, BÉREC A CHODIDLO · RECTUS FEMORIS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Rectus femoris**. Tento sval často přenáší bolest sem: přední část kolena, kolem čéšky.

Cvičení

Ve stoje se přidržte, chyťte se za kotník a přitáhněte patu k hýždi, kolena vedle sebe. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Postupná zátěž při chůzi do schodů a dřepech.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

STEHNO, BÉREC A CHODIDLO · VASTUS MEDIALIS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Vastus medialis**. Tento sval často přenáší bolest sem: vnitřní strana kolena, přední část kolena.

Cvičení

Sedněte si na židli, pomalu natáhněte koleno, vydržte 5 sekund a pak ho spusťte. 10× na každou nohu.

V běžném dni

Posilování: vsedě natažení kolena s výdrží.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

STEHNO, BÉREC A CHODIDLO · VASTUS LATERALIS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Vastus lateralis**. Tento sval často přenáší bolest sem: zevní strana stehna, zevní strana kolena, za čéškou.

Cvičení

Ve stoje se chyťte za kotník a přitáhněte patu k hýždi. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Neležet na boku na bolestivé straně.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

STEHNO, BÉREC A CHODIDLO · BICEPS FEMORIS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Biceps femoris**. Tento sval často přenáší bolest sem: podkolenní jamka, zadní strana stehna.

Cvičení

Sedněte si na okraj židle, natáhněte jednu nohu s patou na zemi a předkloňte se s rovnými zády. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Při dlouhém sezení nesmí hrana židle tlačit na stehno.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

STEHNO, BÉREC A CHODIDLO · SEMITENDINOSUS / SEMIMEMBRANOSUS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Semitendinosus / semimembranosus**. Tento sval často přenáší bolest sem: dolní část hýždě, zadní strana stehna, vnitřní strana podkolenní jamky.

Cvičení

Lehněte si na záda, dejte si ručník pod chodidlo a pomalu zvedejte nataženou nohu, dokud neucítíte tah na zadní straně stehna. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Zahřátí před během.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

STEHNO, BÉREC A CHODIDLO · GASTROCNEMIUS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Gastrocnemius**. Tento sval často přenáší bolest sem: klenba nohy, lýtko, podkolenní jamka.

Cvičení

Postavte se ke zdi, bolestivou nohu dejte dozadu s nataženým kolenem, pata na zemi, a opřete se o zeď. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Při nočních křečích večerní protažení; dostatek tekutin.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

STEHNO, BÉREC A CHODIDLO · SOLEUS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Soleus**. Tento sval často přenáší bolest sem: pata, lýtko, kost křížová (vzácně).

Cvičení

Postavte se ke zdi, bolestivou nohu dejte dozadu, mírně pokrčte koleno, pata zůstává na zemi. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Vyhýbat se botám na vysokém podpatku.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

STEHNO, BÉREC A CHODIDLO · TIBIALIS ANTERIOR

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Tibialis anterior**. Tento sval často přenáší bolest sem: přední strana kotníku, palec nohy.

Cvičení

Vsedě si dejte nohu pod hýždě tak, aby se nárt dotýkal země. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Postupná běžecká zátěž; méně běhat po tvrdém povrchu.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

STEHNO, BÉREC A CHODIDLO · PERONEUS (FIBULARIS) LONGUS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Peroneus (fibularis) longus**. Tento sval často přenáší bolest sem: zevní kotník, zevní strana nohy.

Cvičení

Stůjte 30 sekund na jedné noze, v případě potřeby se přidržte. 3× denně na každou nohu.

V běžném dni

Stabilizační cvičení kotníku ve stoji na jedné noze.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

STEHNO, BÉREC A CHODIDLO · TIBIALIS POSTERIOR

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Tibialis posterior**. Tento sval často přenáší bolest sem: Achillova šlacha, pata, chodidlo.

Cvičení

Vsedě si dejte pod chodidlo ručník a prsty ho postupně přitahujte k sobě. 1 minuta.

V běžném dni

Vhodná podpora klenby; při ploché noze specialista.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

STEHNO, BÉREC A CHODIDLO · EXTENSOR DIGITORUM LONGUS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Extensor digitorum longus**. Tento sval často přenáší bolest sem: hřbet nohy, prostřední prsty nohy.

Cvičení

Vsedě ohněte prsty a nohu dolů, dokud neucítíte tah na nártu. 30 sekund, 3×.

V běžném dni

Vyhýbat se těsné obuvi.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

STEHNO, BÉREC A CHODIDLO · FLEXOR DIGITORUM BREVIS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Flexor digitorum brevis**. Tento sval často přenáší bolest sem: střed chodidla, kořeny prstů nohy.

Cvičení

Vsedě pomalu kutálejte pod chodidlem tenisový míček dopředu a dozadu 2 minuty. Jednou denně.

V běžném dni

Vhodná obuv; masáž chodidla míčkem.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

STEHNO, BÉREC A CHODIDLO · ABDUCTOR HALLUCIS

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Abductor hallucis**. Tento sval často přenáší bolest sem: vnitřní strana paty, vnitřní okraj klenby.

Cvičení

Vsedě se snažte oddálit palec nohy od ostatních prstů a vydržte 5 sekund. 10×.

V běžném dni

Obuv se širší špičkou; posilování palce nohy.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.

Domácí cvičení

STEHNO, BÉREC A CHODIDLO · QUADRATUS PLANTAE

Proč jste dostali tento list?

Část vaší bolesti může vycházet z tohoto svalu: **Quadratus plantae**. Tento sval často přenáší bolest sem: plantární plocha paty.

Cvičení

Vsedě kutálejte pod chodidlem zmraženou lahev s vodou 2 minuty, hlavně před patou.

V běžném dni

Masáž chodidla míčkem, pohodlná obuv.

Zaškrtněte, když cvičení uděláte

	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. týden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Poznámka vašeho terapeuta

Tento list vám dal váš terapeut. Nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud se bolest zhorší nebo se objeví necitlivost či slabost, přestaňte cvičit a dejte vědět svému terapeutovi nebo lékaři.