01 · HLAVA, OBLIČEJ A KRK

Trapezius – horní vlákna

Kde: Nahoře na ramenním pletenci, v polovině vzdálenosti mezi krkem a akromionem, na horním volném okraji.

Přenesená bolest: spánek, strana hlavy, strana krku, za uchem, úhel dolní čelisti

Protažení: Hlava ukloněná na opačnou stranu s mírnou flexí; vsedě se pacient drží rukou na stejné straně za spodek židle.

02 · HLAVA, OBLIČEJ A KRK

Levator scapulae (zdvihač lopatky)

Kde: Mírně mediálně nad horním úhlem lopatky a na straně krku v hloubce pod horním okrajem trapezia.

Přenesená bolest: přechod krku a ramene, vnitřní okraj lopatky, zadní část ramene

Protažení: Hlava v předklonu a otočená na opačnou stranu (nosem k podpaží), ruka ošetřované strany za zátylkem.

03 · HLAVA, OBLIČEJ A KRK

Sternocleidomastoideus (SCM)

Kde: Podél bříška svalu, zvlášť na sternální a klavikulární části; nejcitlivější ve střední třetině.

Přenesená bolest: čelo, okolí oka, tvář, hluboko v uchu, temeno, týl

Protažení: Hlava ukloněná na opačnou stranu, poté se brada pomalu otáčí k ošetřované straně; mírný záklon jen tehdy, pokud nevyvolává závrať.

04 · HLAVA, OBLIČEJ A KRK

Subokcipitální svaly

Kde: Přímo pod kostí týlní, po obou stranách střední čáry, v hloubce.

Přenesená bolest: strana hlavy, za okem, čelo, týl

Protažení: Zasunutí brady (hlava klouže rovně dozadu), poté mírné kývnutí dopředu.

05 · HLAVA, OBLIČEJ A KRK

Masseter (žvýkací sval)

Kde: V povrchové vrstvě pod jařmovým obloukem a nad úhlem dolní čelisti; v hluboké vrstvě před čelistním kloubem.

Přenesená bolest: horní a dolní stoličky, dolní čelist, obočí, hluboko v uchu

Protažení: Pomalé otevírání úst se špičkou jazyka na patře; dva prsty terapeuta jemně pomáhají čelisti dolů.

06 · HLAVA, OBLIČEJ A KRK

Temporalis (spánkový sval)

Kde: Ve čtyřech oblastech nad jařmovým obloukem, zepředu dozadu; při žvýkání dobře hmatný.

Přenesená bolest: spánek, obočí, za okem, horní zuby, strana hlavy

Protažení: Pomalé otevírání úst, zatímco prsty terapeuta hladí na spánku směrem nahoru.

07 · HLAVA, OBLIČEJ A KRK

Skalenové svaly

Kde: Na straně krku, za SCM a pod ním, nad klíční kostí.

Přenesená bolest: přední strana hrudníku, paže, vnitřní okraj lopatky, ruka (palec a ukazovák)

Protažení: Hlava ukloněná na opačnou stranu s mírným záklonem; terapeut fixuje klíční kost ošetřované strany směrem dolů.

08 · RAMENO, PAŽE A RUKA

Infraspinatus

Kde: Na zadní ploše lopatky, pod hřebenem lopatky, ve střední a horní části fossa infraspinata.

Přenesená bolest: přední část ramene (hluboko), přední zevní strana paže, předloktí, palcová strana ruky

Protažení: Paže ošetřované strany zkřížená přes hrudník, druhou rukou přitahujte loket k hrudníku; nebo ruka za zády.

09 · RAMENO, PAŽE A RUKA

Supraspinatus

Kde: Nad hřebenem lopatky, v mediální části fossa supraspinata a laterálně pod akromionem.

Přenesená bolest: strana ramene (oblast deltoideu), zevní strana paže, zevní strana lokte

Protažení: Ruka ošetřované strany za zády, druhá ruka jemně táhne zápěstí na opačnou stranu.

10 · RAMENO, PAŽE A RUKA

Pectoralis minor

Kde: Pod processus coracoideus, nad 3.–5. žebrem, hluboko pod pectoralis major.

Přenesená bolest: přední část ramene, hrudník, vnitřní strana paže, malíková strana ruky

Protažení: Ramena dozadu a dolů; u zárubně loket nad výší ramene.

11 · RAMENO, PAŽE A RUKA

Rhomboideus

Kde: Mezi vnitřním okrajem lopatky a páteří, pod trapeziem.

Přenesená bolest: vnitřní okraj lopatky, mezi lopatkami

Protažení: Paže zkřížené vpředu (objetí sebe sama), záda mírně vyhrbená.

12 · RAMENO, PAŽE A RUKA

Extenzory předloktí (ECRL, ECRB, extensor digitorum)

Kde: Na zadní zevní straně předloktí, 3–6 cm pod loktem.

Přenesená bolest: zevní strana lokte, zadní strana předloktí, hřbet ruky, prsty

Protažení: Loket natažený, zápěstí a prsty ve flexi, druhá ruka jemně táhne dolů.

13 · ZÁDA A TRUP

Quadratus lumborum

Kde: Mezi posledním žebrem a hřebenem kosti kyčelní, na zevním okraji vzpřimovače páteře, v hloubce.

Přenesená bolest: hřeben kosti kyčelní, hýždě, strana kyčle, kříž

Protažení: Ve stoje nebo vleže na boku úklon, horní paže nad hlavou.

14 · PÁNEV A KYČEL

Iliopsoas

Kde: Na přední straně stehna pod tříselným vazem (laterálně od a. femoralis) a v břiše na vnitřní straně lopaty kosti kyčelní.

Přenesená bolest: kříž vedle páteře, kost křížová, přední strana stehna

Protažení: Poloha ve výpadu: zadní koleno na zemi, pánev tlačená dopředu.

15 · PÁNEV A KYČEL

Gluteus medius

Kde: 2–5 cm pod hřebenem kosti kyčelní, v horní zevní části hýždě.

Přenesená bolest: dolní část kříže, kost křížová, strana kyčle, hýždě

Protažení: Vleže na boku horní noha visí za tělem přes okraj lehátka; nebo ve stoje se zkříženýma nohama úklon do strany.

16 · PÁNEV A KYČEL

Gluteus minimus

Kde: Hluboko pod gluteus medius, mezi hřebenem kosti kyčelní a velkým trochanterem.

Přenesená bolest: zevní strana stehna, zevní strana bérce, zadní strana stehna, kotník

Protažení: Vleže na zádech noha zkřížená na opačnou stranu.

17 · PÁNEV A KYČEL

Piriformis

Kde: Ve střední a zevní třetině spojnice mezi zevním okrajem kosti křížové a vrcholem velkého trochanteru.

Přenesená bolest: hýždě, kost křížová, zadní strana stehna, zadní část kyčelního kloubu

Protažení: Vleže na zádech kotník ošetřované nohy na druhém koleni, druhé stehno přitažené k hrudníku (protažení do čtyřky).

18 · STEHNO, BÉREC A CHODIDLO

Vastus lateralis

Kde: Na zevní straně stehna, v několika bodech mezi kyčlí a kolenem.

Přenesená bolest: zevní strana stehna, zevní strana kolena, za čéškou

Protažení: Koleno plně pokrčené, noha mírně ve vnitřní rotaci.

19 · STEHNO, BÉREC A CHODIDLO

Gastrocnemius

Kde: V horní části lýtka, ve vnitřní a zevní hlavě, pod podkolenní jamkou.

Přenesená bolest: klenba nohy, lýtko, podkolenní jamka

Protažení: Ve stoje u zdi, zadní noha natažená, pata na zemi.

20 · STEHNO, BÉREC A CHODIDLO

Soleus

Kde: V dolní části lýtka, hluboko pod gastrocnemiem, nad Achillovou šlachou.

Přenesená bolest: pata, lýtko, kost křížová (vzácně)

Protažení: Ve stoje u zdi, zadní koleno mírně pokrčené, pata na zemi.