NAJDETE HO A VÍTE, CO DĚLAT™

Protokoly 10 nejčastějších obtíží

Obtíže, se kterými přichází většina pacientů, a pořadí svalů, kterými je vhodné začít. Podrobná technika je v 60 protokolech.

Obsah

1 · Jak používat

2 · 10 obtíží

Další krok

ČÁST 1

Jak používat

Obtíž → svaly v pořadí → protokol.

1. Zeptejte se a nechte pacienta zakreslit, kde ho to bolí (použijte Karty pro rychlé vyšetření svalů).
2. Vylučte to, co je uvedeno v bodě „Nejprve vylučte“.
3. Vyšetřete svaly v uvedeném pořadí a ošetřete ten, který reprodukuje obtíže.
4. Dejte domácí protažení a při další návštěvě zkontrolujte změnu.

ČÁST 2

10 obtíží

U každé: svaly v pořadí a co je třeba nejprve vyloučit.

1. Tenzní bolest hlavy

POŘADÍ	SVAL	KDE HLEDAT
1	Trapezius – horní vlákna	Nahoře na ramenním pletenci, v polovině vzdálenosti mezi krkem a akromionem, na horním volném okraji.
2	Subokcipitální svaly	Přímo pod kostí týlní, po obou stranách střední čáry, v hloubce.
3	Sternocleidomastoideus (SCM)	Podél bříška svalu, zvlášť na sternální a klavikulární části; nejcitlivější ve střední třetině.
4	Temporalis (spánkový sval)	Ve čtyřech oblastech nad jařmovým obloukem, zepředu dozadu; při žvýkání dobře hmatný.
5	Semispinalis capitis	Na zátylku, 2–3 cm od střední čáry, pod týlem a uprostřed krku.

Nejprve vylučte

Náhlá, nejsilnější bolest hlavy v životě, horečka a ztuhlá šíje, porucha vidění, porucha řeči, slabost: okamžitě k lékaři.

2. Bolest a ztuhlost krku

POŘADÍ	SVAL	KDE HLEDAT
1	Levator scapulae (zdvihač lopatky)	Mírně mediálně nad horním úhlem lopatky a na straně krku v hloubce pod horním okrajem trapezia.
2	Trapezius – horní vlákna	Nahoře na ramenním pletenci, v polovině vzdálenosti mezi krkem a akromionem, na horním volném okraji.
3	Splenius cervicis	V dolní části krku, nad horním úhlem lopatky, vedle levator scapulae.
4	Skalenové svaly	Na straně krku, za SCM a pod ním, nad klíční kostí.

POŘADÍ	SVAL	KDE HLEDAT
5	Semispinalis capitis	Na zátylku, 2–3 cm od střední čáry, pod týlem a uprostřed krku.

> **Nejprve vylučte**
> Bolest krku po úrazu, necitlivost nebo slabost šířící se do paže: lékařské vyšetření.

3. Bolest čelisti a obličeje

POŘADÍ	SVAL	KDE HLEDAT
1	Masseter (žvýkací sval)	V povrchové vrstvě pod jařmovým obloukem a nad úhlem dolní čelisti; v hluboké vrstvě před čelistním kloubem.
2	Temporalis (spánkový sval)	Ve čtyřech oblastech nad jařmovým obloukem, zepředu dozadu; při žvýkání dobře hmatný.
3	Pterygoideus lateralis	Hluboko pod jařmovým obloukem; intraorálně za horními stoličkami, směrem nahoru a dozadu.
4	Pterygoideus medialis	Na vnitřní straně úhlu dolní čelisti, palpace zespodu; intraorálně za poslední stoličkou.
5	Sternocleidomastoideus (SCM)	Podél bříška svalu, zvlášť na sternální a klavikulární části; nejcitlivější ve střední třetině.

> **Nejprve vylučte**
> Zubní příčina, zánět, zasekávající se čelist: zubní lékař nebo stomatochirurg.

4. Bolest ramene při zvedání paže

POŘADÍ	SVAL	KDE HLEDAT
1	Infraspinatus	Na zadní ploše lopatky, pod hřebenem lopatky, ve střední a horní části fossa infraspinata.
2	Supraspinatus	Nad hřebenem lopatky, v mediální části fossa supraspinata a laterálně pod akromionem.
3	Subscapularis	Na přední ploše lopatky, dosažitelný z podpaží, podél zevního okraje lopatky.
4	Deltoideus	V předních, středních a zadních vláknech, 2–5 cm pod akromionem.

POŘADÍ	SVAL	KDE HLEDAT
5	Pectoralis minor	Pod processus coracoideus, nad 3.–5. žebrem, hluboko pod pectoralis major.

> **Nejprve vylučte**
> Slabá paže po úrazu, noční bolest, která nepolevuje: lékařské vyšetření (rotátorová manžeta).

5. Obtíže podobné tenisovému lokti

POŘADÍ	SVAL	KDE HLEDAT
1	Extenzory předloktí (ECRL, ECRB, extensor digitorum)	Na zadní zevní straně předloktí, 3–6 cm pod loktem.
2	Triceps brachii	Na zadní straně paže, v dlouhé hlavě pod podpažím a 4–6 cm nad loktem.
3	Supraspinatus	Nad hřebenem lopatky, v mediální části fossa supraspinata a laterálně pod akromionem.
4	Skalenové svaly	Na straně krku, za SCM a pod ním, nad klíční kostí.

> **Nejprve vylučte**
> Otok, teplota, noční necitlivost prstů: lékařské vyšetření.

6. Bolest mezi lopatkami

POŘADÍ	SVAL	KDE HLEDAT
1	Rhomboideus	Mezi vnitřním okrajem lopatky a páteří, pod trapeziem.
2	Trapezius – střední vlákna	Mezi vnitřním okrajem lopatky a páteří, ve výši hřebene lopatky, povrchově.
3	Serratus posterior superior	Pod horní částí lopatky, vedle páteře; dosažitelný po odtažení lopatky do strany.
4	Skalenové svaly	Na straně krku, za SCM a pod ním, nad klíční kostí.
5	Levator scapulae (zdvihač lopatky)	Mírně mediálně nad horním úhlem lopatky a na straně krku v hloubce pod horním okrajem trapezia.

Nejprve vylučte

Bolest na hrudi při námaze, dušnost, pocení: okamžitě k lékaři (srdce).

7. Bolest kříže

POŘADÍ	SVAL	KDE HLEDAT
1	Quadratus lumborum	Mezi posledním žebrem a hřebenem kosti kyčelní, na zevním okraji vzpřimovače páteře, v hloubce.
2	Iliocostalis lumborum	V bederní oblasti asi 5–7 cm od páteře, pod dolními žebry.
3	Multifidus	Těsně vedle trnových výběžků, v hloubce, v kterékoli oblasti páteře (nejčastěji bederní).
4	Iliopsoas	Na přední straně stehna pod tříselným vazem (laterálně od a. femoralis) a v břiše na vnitřní straně lopaty kosti kyčelní.
5	Gluteus medius	2–5 cm pod hřebenem kosti kyčelní, v horní zevní části hýždě.

Nejprve vylučte

Necitlivost nebo slabost šířící se do nohy, porucha močení nebo vyprazdňování, horečka, hubnutí: okamžitě k lékaři.

8. Bolest šířící se z hýždě do stehna

POŘADÍ	SVAL	KDE HLEDAT
1	Gluteus minimus	Hluboko pod gluteus medius, mezi hřebenem kosti kyčelní a velkým trochanterem.
2	Piriformis	Ve střední a zevní třetině spojnice mezi zevním okrajem kosti křížové a vrcholem velkého trochanteru.
3	Gluteus medius	2–5 cm pod hřebenem kosti kyčelní, v horní zevní části hýždě.
4	Quadratus lumborum	Mezi posledním žebrem a hřebenem kosti kyčelní, na zevním okraji vzpřimovače páteře, v hloubce.

> **Nejprve vylučte**
>
> Necitlivost, slabost, změna reflexů (kořenový původ): lékařské vyšetření.

9. Bolest kolena

POŘADÍ	SVAL	KDE HLEDAT
1	Rectus femoris	Na přední straně stehna, těsně pod kyčlí, v blízkosti spina iliaca anterior inferior.
2	Vastus medialis	Na vnitřní přední straně stehna, 5–10 cm nad kolenem.
3	Vastus lateralis	Na zevní straně stehna, v několika bodech mezi kyčlí a kolenem.
4	Biceps femoris	Na zadní zevní straně stehna, ve střední a dolní třetině.
5	Adductor longus	Na vnitřní straně stehna, v horní třetině.

> **Nejprve vylučte**
>
> Otok, teplota, zasekávání, podklesnutí, úraz: lékařské vyšetření.

10. Bolest paty a chodidla

POŘADÍ	SVAL	KDE HLEDAT
1	Soleus	V dolní části lýtka, hluboko pod gastrocnemiem, nad Achillovou šlachou.
2	Gastrocnemius	V horní části lýtka, ve vnitřní a zevní hlavě, pod podkolenní jamkou.
3	Quadratus plantae	V zadní části chodidla, v hloubce, těsně před patní kostí.
4	Flexor digitorum brevis	Uprostřed chodidla, před patou.
5	Abductor hallucis	Na vnitřním okraji chodidla, mezi patou a kořenem palce.
6	Tibialis posterior	Hluboko pod lýtkem, za vnitřně-zadním okrajem holenní kosti.

> **Nejprve vylučte**
>
> Jednostranný otok lýtka (trombóza), noční bolest, necitlivost: lékařské vyšetření.

Další krok

Tento týden: u dalších tří pacientů určete, ke které obtíži patří, a postupujte podle pořadí.