ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΗ™

30 Κλινικές Περιπτώσεις Βήμα Βήμα

Ενόχλημα → εύρημα → αξιολόγηση → εφαρμογή. Φανταστικές αλλά τυπικές περιπτώσεις, για να έχεις έτοιμο τρόπο σκέψης και σε έναν δύσκολο ασθενή.

Άτλαντας Σημείων Πυροδότησης · Εκπαιδευτικό υλικό για επαγγελματίες υγείας και φοιτητές. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση.

Περιεχόμενα

1 · Πώς χρησιμοποιείται

2 · 30 περιπτώσεις

Επόμενο βήμα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Πώς χρησιμοποιείται

Διάβασέ το σαν συζήτηση περιστατικού.

Σημαντικό

Οι περιπτώσεις είναι φανταστικά εκπαιδευτικά παραδείγματα, όχι πραγματικοί ασθενείς. Ο αριθμός δίπλα στον μυ αντιστοιχεί στον αριθμό του στα «60 Πρωτόκολλα Εφαρμογής ανά Μυ», αν τα έχεις. Σε κάθε περίπτωση δες πρώτα τη γραμμή «Πρώτα αποκλείεις».

1. Διάβασε το ενόχλημα και, πριν συνεχίσεις, μάντεψε ποιοι μύες μπορεί να ευθύνονται.
2. Σύγκρινέ το με την αξιολόγηση.
3. Πέρασε τις καταστάσεις που πρέπει να αποκλειστούν.
4. Βρες τους μύες στον άτλαντα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

30 περιπτώσεις

Από το κεφάλι ως τα πόδια.

1. Πονοκέφαλος μπροστά στην οθόνη

Γυναίκα, 34 ετών, υπάλληλος γραφείου · εκπαιδευτικό παράδειγμα

ΕΝΟΧΛΗΜΑ	Πονοκέφαλος στους κροτάφους και στο πίσω μέρος του κεφαλιού, που αυξάνεται προς το απόγευμα, 3–4 φορές την εβδομάδα.
ΕΥΡΗΜΑ	Προβολή του κεφαλιού προς τα εμπρός· ταινίες τάσης στις άνω ίνες του τραπεζοειδούς και στην υπινιακή περιοχή· η πίεση αναπαράγει τον πόνο στον κρόταφο.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	Η θέση του πόνου (κρόταφος, πίσω μέρος του κεφαλιού) και η στάση δείχνουν τις άνω ίνες του τραπεζοειδούς και τους υπινιακούς μύες.
ΜΥΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Τραπεζοειδής – άνω ίνες (πρωτόκολλο αρ. 1); Υπινιακοί μύες (πρωτόκολλο αρ. 9); Κροταφίτης (πρωτόκολλο αρ. 4)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Ανάσυρση του πηγουνιού κάθε ώρα, οθόνη στο ύψος των ματιών, πλάγια κλίση-διάταση.

Πρώτα αποκλείεις: Αιφνίδιος, ο πιο δυνατός πονοκέφαλος της ζωής της, διαταραχή της όρασης, πυρετός: αυτή η περίπτωση δεν είναι τέτοια.

2. Αυχένας που «πιάνεται» το πρωί

Άνδρας, 41 ετών, οδηγός φορτηγού · εκπαιδευτικό παράδειγμα

ΕΝΟΧΛΗΜΑ	Όταν ξυπνά δεν μπορεί να γυρίσει το κεφάλι αριστερά· πονάει ο αυχένας και το έσω χείλος της ωμοπλάτης.
ΕΥΡΗΜΑ	Περιορισμένη στροφή προς τα αριστερά· ευαίσθητο σημείο πάνω από την άνω γωνία της δεξιάς ωμοπλάτης.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	Η περιορισμένη στροφή και ο πόνος πάνω από τη γωνία της ωμοπλάτης είναι η κλασική εικόνα του ανελκτήρα της ωμοπλάτης.
ΜΥΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Ανελκτήρας της ωμοπλάτης (πρωτόκολλο αρ. 11); Τραπεζοειδής – άνω ίνες (πρωτόκολλο αρ. 1); Σπληνοειδής τραχήλου (πρωτόκολλο αρ. 8)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διάταση του ανελκτήρα της ωμοπλάτης δύο φορές τη μέρα· πιο χαμηλό μαξιλάρι.

Πρώτα αποκλείεις: Δεν υπάρχει τραυματισμός, μούδιασμα που απλώνεται στο χέρι ή πυρετός.

3. Πονάει το δόντι, αλλά ο οδοντίατρος δεν βρήκε τίποτα

Γυναίκα, 29 ετών, φοιτήτρια σε εξεταστική · εκπαιδευτικό παράδειγμα

ΕΝΟΧΛΗΜΑ	Πονάνε οι πάνω γομφίοι, το πρωί η γνάθος είναι σφιγμένη.
ΕΥΡΗΜΑ	Άνοιγμα στόματος 2 δάχτυλα· ευαίσθητα σημεία στον μασητήρα· η πίεση αναπαράγει τον πονόδοντο.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	Η οδοντική αιτία έχει αποκλειστεί, η εικόνα είναι τυπική του μασητήρα· το άγχος και το σφίξιμο των δοντιών τη διατηρούν.
ΜΥΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Μασητήρας (πρωτόκολλο αρ. 3); Κροταφίτης (πρωτόκολλο αρ. 4); Έσω πτερυγοειδής (πρωτόκολλο αρ. 6)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Αυτομασάζ, γλώσσα στον ουρανίσκο, να προσέχει το σφίξιμο των δοντιών.

Πρώτα αποκλείεις: Έχει γίνει οδοντιατρική εξέταση.

4. Ζάλη και πονοκέφαλος με την κίνηση του αυχένα

Γυναίκα, 52 ετών · εκπαιδευτικό παράδειγμα

ΕΝΟΧΛΗΜΑ	Πονάει το μέτωπο και γύρω από τα μάτια, κατά διαστήματα ελαφριά αστάθεια.
ΕΥΡΗΜΑ	Η στερνική μοίρα του ΣΚΜ είναι ευαίσθητη· η λαβή τσιμπίδας αναπαράγει τον πόνο στο μέτωπο.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	Ο ΣΚΜ μπορεί να προκαλέσει πόνο στο μέτωπο και γύρω από τα μάτια και διαταραχές στην αίσθηση της ισορροπίας.
ΜΥΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Στερνοκλειδομαστοειδής (ΣΚΜ) (πρωτόκολλο αρ. 2); Τραπεζοειδής – άνω ίνες (πρωτόκολλο αρ. 1)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Αργές κινήσεις του κεφαλιού, όχι τηλεόραση ξαπλωμένη.

Πρώτα αποκλείεις: Πραγματικό αίσθημα περιστροφής (ίλιγγος), απώλεια ακοής, διαταραχή όρασης ή ομιλίας: πρώτα γιατρός. Εδώ ο οικογενειακός γιατρός τα έχει ήδη αποκλείσει.

5. Πόνος που απλώνεται στο χέρι

Άνδρας, 38 ετών, προπονητής · εκπαιδευτικό παράδειγμα

ΕΝΟΧΛΗΜΑ	Πόνος στο μπροστινό μέρος του θώρακα, στο έσω χείλος της ωμοπλάτης και προς τον αντίχειρα.
ΕΥΡΗΜΑ	Η ήπια πίεση στην περιοχή των σκαληνών αναπαράγει τον πόνο· δεν υπάρχει απώλεια δύναμης.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	Οι σκαληνοί αντανακλούν πόνο στον θώρακα, στην ωμοπλάτη και στο χέρι· η άνω θωρακική αναπνοή τους διατηρεί.
ΜΥΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Σκαληνοί μύες (πρωτόκολλο αρ. 12); Ελάσσων θωρακικός (πρωτόκολλο αρ. 19); Ανελκτήρας της ωμοπλάτης (πρωτόκολλο αρ. 11)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	5 λεπτά κοιλιακή αναπνοή τη μέρα, όχι βαριά τσάντα.

Πρώτα αποκλείεις: Απώλεια δύναμης, αλλαγή αντανακλαστικών, επίμονο μούδιασμα: γιατρός για να αποκλειστεί αιτία από νευρική ρίζα.

6. Πόνος στον ώμο στον ύπνο

Γυναίκα, 47 ετών · εκπαιδευτικό παράδειγμα

ΕΝΟΧΛΗΜΑ	Βαθύς πόνος στο μπροστινό μέρος του δεξιού ώμου, δεν μπορεί να ξαπλώσει στη δεξιά πλευρά.
ΕΥΡΗΜΑ	Ευαίσθητα σημεία στον υπακάνθιο· η πίεση απλώνεται στο μπροστινό μέρος του ώμου.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	Ο υπακάνθιος, αν και βρίσκεται πίσω, αντανακλά τον πόνο στο μπροστινό μέρος του ώμου: συχνή παρανόηση.
ΜΥΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Υπακάνθιος (πρωτόκολλο αρ. 13); Ελάσσων στρογγύλος (πρωτόκολλο αρ. 15); Δελτοειδής (πρωτόκολλο αρ. 17)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Στο πλάγιο ξάπλωμα μαξιλάρι κάτω από το χέρι· διάταση με το χέρι μπροστά από το στήθος.

Πρώτα αποκλείεις: Αδυναμία στο σήκωμα του χεριού μετά από τραυματισμό, νυχτερινός πόνος που δεν περνά με τίποτα: γιατρός.

7. Επώδυνο σήκωμα του χεριού

Άνδρας, 55 ετών, ελαιοχρωματιστής · εκπαιδευτικό παράδειγμα

ΕΝΟΧΛΗΜΑ	Όταν σηκώνει το χέρι πάνω από το κεφάλι, πονάει το πλάι του ώμου.
ΕΥΡΗΜΑ	Ευαίσθητο σημείο πάνω από την άκανθα της ωμοπλάτης· η πίεση απλώνεται στο πλάι του ώμου και στην έξω πλευρά του αγκώνα.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	Εικόνα υπερακάνθιου.
ΜΥΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Υπερακάνθιος (πρωτόκολλο αρ. 14); Υπακάνθιος (πρωτόκολλο αρ. 13); Δελτοειδής (πρωτόκολλο αρ. 17)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Κινήσεις εκκρεμούς δύο φορές τη μέρα, διαλείμματα στη δουλειά.

Πρώτα αποκλείεις: Τραυματισμός, γρήγορη απώλεια δύναμης, νυχτερινός πόνος: γιατρός για να αποκλειστεί ρήξη του στροφικού πετάλου.

8. Περιορισμός που μοιάζει με «παγωμένο ώμο»

Γυναίκα, 58 ετών · εκπαιδευτικό παράδειγμα

ΕΝΟΧΛΗΜΑ	Δεν μπορεί να στρέψει το χέρι προς τα έξω, πονάει το πίσω μέρος του ώμου και ο καρπός.
ΕΥΡΗΜΑ	Η έξω στροφή είναι σαφώς περιορισμένη· ο υποπλάτιος, που τον φτάνεις από τη μασχάλη, είναι ευαίσθητος.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	Ο υποπλάτιος αντανακλά πόνο στο πίσω μέρος του ώμου και στον καρπό και περιορίζει την έξω στροφή.
ΜΥΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Υποπλάτιος (πρωτόκολλο αρ. 16); Μείζων θωρακικός (πρωτόκολλο αρ. 18); Ελάσσων στρογγύλος (πρωτόκολλο αρ. 15)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διάταση με έξω στροφή στο άνοιγμα της πόρτας.

Πρώτα αποκλείεις: Αν η κίνηση είναι περιορισμένη προς όλες τις κατευθύνσεις και πονάει πολύ τη νύχτα (συμφυτική θυλακίτιδα), ιατρική εξέταση και κοινό πλάνο.

9. Πόνος στο στήθος μετά την προπόνηση

Άνδρας, 30 ετών · εκπαιδευτικό παράδειγμα

ΕΝΟΧΛΗΜΑ	Μετά από πιέσεις πάγκου πονάει το αριστερό μπροστινό μέρος του θώρακα.
ΕΥΡΗΜΑ	Ταινία τάσης στο έξω χείλος του μείζονος θωρακικού· η πίεση αναπαράγει τον πόνο.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	Μηχανικός πόνος που αλλάζει με την κίνηση και την πίεση, υπερφόρτωση μετά την προπόνηση.
ΜΥΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Μείζων θωρακικός (πρωτόκολλο αρ. 18); Ελάσσων θωρακικός (πρωτόκολλο αρ. 19); Πρόσθιος οδοντωτός (πρωτόκολλο αρ. 21)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διάταση στην πόρτα, σταδιακή επιστροφή.

Πρώτα αποκλείεις: Πόνος στο στήθος με την κόπωση, δύσπνοια, εφίδρωση: ΑΜΕΣΩΣ γιατρός. Εδώ δεν ισχύει αυτό.

10. Αγκώνας του τενίστα

Άνδρας, 44 ετών, ηλεκτρολόγος · εκπαιδευτικό παράδειγμα

ΕΝΟΧΛΗΜΑ	Όταν βιδώνει και πιάνει αντικείμενα, πονάει η έξω πλευρά του αγκώνα.
ΕΥΡΗΜΑ	Ευαίσθητα σημεία στους εκτείνοντες του αντιβραχίου κάτω από τον αγκώνα· το πιάσιμο πονάει.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	Οι εκτείνοντες του αντιβραχίου αντανακλούν πόνο στην έξω πλευρά του αγκώνα.
ΜΥΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Εκτείνοντες του αντιβραχίου (ECRL, ECRB, εκτείνων τους δακτύλους) (πρωτόκολλο αρ. 25); Τρικέφαλος βραχιόνιος (πρωτόκολλο αρ. 24); Υπερακάνθιος (πρωτόκολλο αρ. 14)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διάταση του αντιβραχίου, εργαλείο με πιο χοντρή λαβή.

Πρώτα αποκλείεις: Οίδημα, τοπική θερμότητα, νυχτερινό μούδιασμα: γιατρός.

11. Παλάμη που πονάει και μουδιάζει

Γυναίκα, 39 ετών, κομμώτρια · εκπαιδευτικό παράδειγμα

ΕΝΟΧΛΗΜΑ	Πονάει η παλάμη και η παλαμιαία πλευρά των δαχτύλων, κυρίως μετά τη δουλειά.
ΕΥΡΗΜΑ	Οι καμπτήρες του αντιβραχίου είναι σφιγμένοι· δεν υπάρχει νυχτερινό μούδιασμα.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	Υπερφορτωμένοι καμπτήρες του αντιβραχίου.
ΜΥΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Καμπτήρες του αντιβραχίου (πρωτόκολλο αρ. 26); Ελάσσων θωρακικός (πρωτόκολλο αρ. 19); Σκαληνοί μύες (πρωτόκολλο αρ. 12)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διάταση του αντιβραχίου κάθε ώρα στη δουλειά.

Πρώτα αποκλείεις: Νυχτερινό μούδιασμα, αδεξιότητα στα δάχτυλα (σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα): γιατρός.

12. Πόνος ανάμεσα στις ωμοπλάτες

Γυναίκα, 33 ετών, λογίστρια · εκπαιδευτικό παράδειγμα

ΕΝΟΧΛΗΜΑ	Καυστικός πόνος ανάμεσα στις ωμοπλάτες, που αυξάνεται προς το βράδυ.
ΕΥΡΗΜΑ	Κυρτή στάση· ευαίσθητα σημεία στους ρομβοειδείς και στις μέσες ίνες του τραπεζοειδούς.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	Συχνά συνδυασμός επιμηκυμένων, αδύναμων μυών της πλάτης και βραχυμένου θωρακικού μυός.
ΜΥΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Ρομβοειδείς μύες (πρωτόκολλο αρ. 20); Τραπεζοειδής – μέσες ίνες (πρωτόκολλο αρ. 27); Ελάσσων θωρακικός (πρωτόκολλο αρ. 19)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διάταση του θωρακικού, 10 τραβήγματα των ωμοπλατών προς τα πίσω κάθε ώρα.

Πρώτα αποκλείεις: Πόνος στο στήθος με την κόπωση, δύσπνοια: γιατρός.

13. Διαξιφιστικός πόνος στο πλάι του θώρακα

Άνδρας, 27 ετών, δρομέας · εκπαιδευτικό παράδειγμα

ΕΝΟΧΛΗΜΑ	Όταν τρέχει νιώθει τσίμπημα στο πλάι των πλευρών.
ΕΥΡΗΜΑ	Ο πρόσθιος οδοντωτός είναι ευαίσθητος στο ύψος της 5ης–6ης πλευράς.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	Η έντονη αναπνοή και το τρέξιμο υπερφορτώνουν τον πρόσθιο οδοντωτό.
ΜΥΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Πρόσθιος οδοντωτός (πρωτόκολλο αρ. 21); Έξω λοξός κοιλιακός (πρωτόκολλο αρ. 36)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Βαθιές ανάσες με το χέρι ψηλά, σταδιακός ρυθμός.

Πρώτα αποκλείεις: Πυρετός, βήχας, οξύς πόνος που σχετίζεται με την αναπνοή: γιατρός.

14. Οσφυαλγία μετά από σκύψιμο

Άνδρας, 46 ετών, εργαζόμενος σε αποθήκη · εκπαιδευτικό παράδειγμα

ΕΝΟΧΛΗΜΑ	Μετά το σήκωμα ενός κιβωτίου, αιφνίδιος πόνος στη μέση· πονάει η πλάγια κλίση.
ΕΥΡΗΜΑ	Ο τετράγωνος οσφυϊκός είναι ευαίσθητος· ο πόνος δεν απλώνεται στο πόδι, δεν υπάρχει μούδιασμα.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	Πόνος που απλώνεται στη λαγόνια ακρολοφία στην πλάγια κλίση: τετράγωνος οσφυϊκός.
ΜΥΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Τετράγωνος οσφυϊκός (πρωτόκολλο αρ. 34); Οσφυϊκός λαγονοπλευρικός (πρωτόκολλο αρ. 31); Μέσος γλουτιαίος (πρωτόκολλο αρ. 38)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Πλάγια κλίση-διάταση, σήκωμα από τα γόνατα.

Πρώτα αποκλείεις: Μούδιασμα ή αδυναμία που απλώνεται στο πόδι, διαταραχή ούρησης ή αφόδευσης: αμέσως γιατρός.

15. Οσφυαλγία μετά από πολύωρο κάθισμα

Γυναίκα, 36 ετών, προγραμματίστρια · εκπαιδευτικό παράδειγμα

ΕΝΟΧΛΗΜΑ	Όταν σηκώνεται δεν μπορεί να ισιώσει, πονάει η μέση.
ΕΥΡΗΜΑ	Ο λαγονοψοΐτης είναι σφιγμένος· στη θέση προβολής τέντωμα στη μέση.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	Το ισχίο που μένει πολλή ώρα λυγισμένο βραχύνει τον λαγονοψοΐτη, που αντανακλά τον πόνο στη μέση.
ΜΥΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Λαγονοψοΐτης (πρωτόκολλο αρ. 41); Ορθός μηριαίος (πρωτόκολλο αρ. 47); Πολυσχιδής (πρωτόκολλο αρ. 33)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διάταση σε θέση προβολής κάθε ώρα, δουλειά και όρθια.

Πρώτα αποκλείεις: Κοιλιακά ενοχλήματα, πυρετός: γιατρός.

16. Πόνος στην κάτω κοιλιά και στην πλάτη

Γυναίκα, 31 ετών, μετά από έντονη προπόνηση κοιλιακών · εκπαιδευτικό παράδειγμα

ΕΝΟΧΛΗΜΑ	Πονάει η μέση της πλάτης σαν οριζόντια ζώνη.
ΕΥΡΗΜΑ	Ο ορθός κοιλιακός είναι ευαίσθητος δίπλα στον ομφαλό.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	Ο ορθός κοιλιακός μπορεί να αντανακλά πόνο στην πλάτη σαν οριζόντια ζώνη.
ΜΥΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Ορθός κοιλιακός (πρωτόκολλο αρ. 35); Έξω λοξός κοιλιακός (πρωτόκολλο αρ. 36); Θωρακικός λαγονοπλευρικός (πρωτόκολλο αρ. 30)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Πρηνής στήριξη στους αγκώνες, λιγότεροι κοιλιακοί.

Πρώτα αποκλείεις: Κοιλιακός πόνος με πυρετό ή εμετό, πόνος στην κάτω κοιλιά που δεν σχετίζεται με την περίοδο: γιατρός.

17. Πόνος στον γλουτό στο κάθισμα

Άνδρας, 50 ετών, οδηγός ταξί · εκπαιδευτικό παράδειγμα

ΕΝΟΧΛΗΜΑ	Πονάει η μέση του γλουτού και τραβάει προς το πίσω μέρος του μηρού.
ΕΥΡΗΜΑ	Ο απιοειδής είναι ευαίσθητος· η διάταση «4» αναπαράγει τον πόνο.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	Η καθιστική δουλειά και το πορτοφόλι στην πίσω τσέπη διατηρούν τα ενοχλήματα.
ΜΥΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Απιοειδής (πρωτόκολλο αρ. 40); Μικρός γλουτιαίος (πρωτόκολλο αρ. 39); Μέγας γλουτιαίος (πρωτόκολλο αρ. 37)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διάταση «4», βγάζει το πορτοφόλι από την πίσω τσέπη.

Πρώτα αποκλείεις: Μούδιασμα, αδυναμία, αλλαγή αντανακλαστικών: αποκλείεται αιτία από νευρική ρίζα.

18. Πόνος που μοιάζει με ισχιαλγία

Γυναίκα, 45 ετών · εκπαιδευτικό παράδειγμα

ΕΝΟΧΛΗΜΑ	Πόνος κατά μήκος της έξω πλευράς του μηρού και της κνήμης.
ΕΥΡΗΜΑ	Ο μικρός γλουτιαίος είναι ευαίσθητος πάνω από τον μείζονα τροχαντήρα· δεν υπάρχει μούδιασμα, δύναμη και αντανακλαστικά φυσιολογικά.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	Ο μικρός γλουτιαίος δημιουργεί εικόνα που μοιάζει με ισχιαλγία.
ΜΥΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Μικρός γλουτιαίος (πρωτόκολλο αρ. 39); Απιοειδής (πρωτόκολλο αρ. 40); Τετράγωνος οσφυϊκός (πρωτόκολλο αρ. 34)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διάταση του ισχίου, διακοπή των μακρινών διαδρομών με αυτοκίνητο.

Πρώτα αποκλείεις: Αν υπήρχε μούδιασμα, αδυναμία ή αλλαγή αντανακλαστικών: γιατρός.

19. Πόνος στο ισχίο στο πλάγιο ξάπλωμα

Γυναίκα, 60 ετών · εκπαιδευτικό παράδειγμα

ΕΝΟΧΛΗΜΑ	Πονάει το πλάι του ισχίου, δεν μπορεί να ξαπλώσει σε εκείνη την πλευρά.
ΕΥΡΗΜΑ	Ο μέσος γλουτιαίος και ο τείνων την πλατεία περιτονία είναι ευαίσθητοι.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	Ο μέσος γλουτιαίος και ο τείνων την πλατεία περιτονία αντανακλούν πόνο στο πλάι του ισχίου και στην έξω πλευρά του μηρού.
ΜΥΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Μέσος γλουτιαίος (πρωτόκολλο αρ. 38); Τείνων την πλατεία περιτονία (πρωτόκολλο αρ. 42); Μικρός γλουτιαίος (πρωτόκολλο αρ. 39)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Μαξιλάρι ανάμεσα στα γόνατα στον ύπνο, ενδυνάμωση των απαγωγών του ισχίου.

Πρώτα αποκλείεις: Υποψία αρθρίτιδας ισχίου (πόνος στον βουβώνα, περιορισμένη στροφή): γιατρός.

20. Πόνος στον βουβώνα σε ποδοσφαιριστή

Άνδρας, 22 ετών · εκπαιδευτικό παράδειγμα

ΕΝΟΧΛΗΜΑ	Στα πλάγια βήματα πονάει ο βουβώνας και η έσω πλευρά του μηρού.
ΕΥΡΗΜΑ	Ο μακρός προσαγωγός είναι ευαίσθητος στο άνω τριτημόριο.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	Οι απότομες πλάγιες κινήσεις επιβαρύνουν τους προσαγωγούς.
ΜΥΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Μακρός και βραχύς προσαγωγός (πρωτόκολλο αρ. 43); Κτενιαίος (πρωτόκολλο αρ. 45); Μεγάλος προσαγωγός (πρωτόκολλο αρ. 44)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διάταση «πεταλούδα», σταδιακή επιστροφή.

Πρώτα αποκλείεις: Υποψία κήλης (διόγκωση στον βουβώνα όταν βήχει): γιατρός.

21. Πόνος στο γόνατο στις σκάλες

Γυναίκα, 42 ετών · εκπαιδευτικό παράδειγμα

ΕΝΟΧΛΗΜΑ	Όταν κατεβαίνει σκάλες πονάει το μπροστινό μέρος του γονάτου.
ΕΥΡΗΜΑ	Ο ορθός μηριαίος και ο έσω πλατύς είναι ευαίσθητοι· δεν υπάρχει οίδημα στο γόνατο.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	Οι εκτείνοντες του μηρού αντανακλούν πόνο στο μπροστινό μέρος του γονάτου.
ΜΥΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Ορθός μηριαίος (πρωτόκολλο αρ. 47); Έσω πλατύς (πρωτόκολλο αρ. 48); Έξω πλατύς (πρωτόκολλο αρ. 49)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διάταση του μηρού, τέντωμα του γονάτου από καθιστή θέση για ενδυνάμωση.

Πρώτα αποκλείεις: Οίδημα, «κλείδωμα», αστάθεια, τραυματισμός: γιατρός.

22. Πόνος στην έξω πλευρά του γονάτου σε δρομείς

Άνδρας, 35 ετών, δρομέας · εκπαιδευτικό παράδειγμα

ΕΝΟΧΛΗΜΑ	Μετά από μεγάλο τρέξιμο πονάει η έξω πλευρά του γονάτου.
ΕΥΡΗΜΑ	Ο έξω πλατύς και ο τείνων την πλατεία περιτονία είναι ευαίσθητοι.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	Ο έξω πλατύς και ο τείνων την πλατεία περιτονία αντανακλούν πόνο στην έξω πλευρά του γονάτου.
ΜΥΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Έξω πλατύς (πρωτόκολλο αρ. 49); Τείνων την πλατεία περιτονία (πρωτόκολλο αρ. 42); Μέσος γλουτιαίος (πρωτόκολλο αρ. 38)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διάταση του μηρού, σταδιακή αύξηση της απόστασης τρεξίματος.

Πρώτα αποκλείεις: Οίδημα, τραυματισμός: γιατρός.

23. Πόνος πίσω από το γόνατο

Γυναίκα, 26 ετών, χορεύτρια · εκπαιδευτικό παράδειγμα

ΕΝΟΧΛΗΜΑ	Όταν το πόδι είναι τεντωμένο πονάει πίσω από το γόνατο.
ΕΥΡΗΜΑ	Ο δικέφαλος μηριαίος και το άνω μέρος του γαστροκνήμιου είναι ευαίσθητα.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	Οι οπίσθιοι μηριαίοι και το άνω μέρος της γάμπας αντανακλούν πόνο πίσω από το γόνατο.
ΜΥΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Δικέφαλος μηριαίος (πρωτόκολλο αρ. 50); Ημιτενοντώδης και ημιυμενώδης (πρωτόκολλο αρ. 51); Γαστροκνήμιος (πρωτόκολλο αρ. 52)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διάταση των οπίσθιων μηριαίων με πετσέτα.

> **Πρώτα αποκλείεις:** Διόγκωση πίσω από το γόνατο, οίδημα στη γάμπα (κύστη Baker, θρόμβωση): γιατρός.

24. Νυχτερινές κράμπες στη γάμπα

Γυναίκα, 65 ετών · εκπαιδευτικό παράδειγμα

ΕΝΟΧΛΗΜΑ	Τη νύχτα την πιάνει κράμπα στη γάμπα, τη μέρα η γάμπα τραβάει.
ΕΥΡΗΜΑ	Ο γαστροκνήμιος είναι ευαίσθητος και στις δύο κεφαλές· δεν υπάρχει οίδημα.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	Ο βραχυμένος, υπερφορτωμένος μυς της γάμπας έχει τάση για κράμπες.
ΜΥΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Γαστροκνήμιος (πρωτόκολλο αρ. 52); Υποκνημίδιος (πρωτόκολλο αρ. 53)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Βραδινή διάταση της γάμπας, πρόσληψη υγρών.

> **Πρώτα αποκλείεις:** Μονόπλευρο οίδημα, τοπική θερμότητα, κοκκίνισμα: υποψία θρόμβωσης, αμέσως γιατρός.

25. Πόνος στην πτέρνα

Άνδρας, 48 ετών, πεζοπόρος · εκπαιδευτικό παράδειγμα

ΕΝΟΧΛΗΜΑ	Στο περπάτημα, κυρίως στο τέλος της μέρας, πονάει η πτέρνα.
ΕΥΡΗΜΑ	Ο υποκνημίδιος και ο τετράγωνος πελματιαίος είναι ευαίσθητοι.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	Ο υποκνημίδιος αντανακλά πόνο στην πτέρνα· το ίδιο και οι βαθιοί μύες του πέλματος.
ΜΥΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Υποκνημίδιος (πρωτόκολλο αρ. 53); Τετράγωνος πελματιαίος (πρωτόκολλο αρ. 60); Βραχύς καμπτήρας των δακτύλων (πρωτόκολλο αρ. 58)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διάταση της γάμπας με λυγισμένο γόνατο, μασάζ του πέλματος με μπαλάκι.

> **Πρώτα αποκλείεις:** Οξύς πόνος στα πρώτα βήματα το πρωί (πελματιαία περιτονία), οίδημα, μούδιασμα: ειδικός.

26. Πόνος στην κνήμη σε νέα δρομέα

Γυναίκα, 24 ετών · εκπαιδευτικό παράδειγμα

ΕΝΟΧΛΗΜΑ	Μετά το τρέξιμο πονάει το μπροστινό μέρος της κνήμης.
ΕΥΡΗΜΑ	Ο πρόσθιος κνημιαίος είναι ευαίσθητος· το οστό δεν πονάει στην πίεση.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	Πολύ γρήγορη αύξηση του φορτίου.
ΜΥΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Πρόσθιος κνημιαίος (πρωτόκολλο αρ. 54); Μακρός εκτείνων τους δακτύλους (πρωτόκολλο αρ. 57)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διάταση της ράχης του ποδιού, μείωση της απόστασης τρεξίματος.

Πρώτα αποκλείεις: Αν το οστό πονάει σε ένα σημείο και αυξάνεται με το φορτίο (κάταγμα κόπωσης): γιατρός.

27. Πόνος στον αστράγαλο μετά από διάστρεμμα (6 εβδομάδες)

Άνδρας, 29 ετών · εκπαιδευτικό παράδειγμα

ΕΝΟΧΛΗΜΑ	Επίμονος πόνος γύρω από το έξω σφυρό, αίσθημα αστάθειας.
ΕΥΡΗΜΑ	Ο μακρός περονιαίος είναι ευαίσθητος, στην εξέταση ο αστράγαλος σταθερός.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	Οι περονιαίοι αντανακλούν πόνο στο έξω σφυρό και έχουν υπερφορτωθεί μετά τον τραυματισμό.
ΜΥΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Μακρός περονιαίος (πρωτόκολλο αρ. 55); Πρόσθιος κνημιαίος (πρωτόκολλο αρ. 54)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Στήριξη στο ένα πόδι, σταθεροποίηση του αστραγάλου.

Πρώτα αποκλείεις: Πρόσφατος τραυματισμός, δεν μπορεί να πατήσει, μεγάλο οίδημα: ακτινογραφία, γιατρός.

28. Πόνος στο πέλμα μετά από ορθοστασία όλη μέρα

Γυναίκα, 51 ετών, πωλήτρια · εκπαιδευτικό παράδειγμα

ΕΝΟΧΛΗΜΑ	Πονάει η μέση του πέλματος και η βάση των δαχτύλων.
ΕΥΡΗΜΑ	Ο βραχύς καμπτήρας των δακτύλων και ο απαγωγός του μεγάλου δακτύλου είναι ευαίσθητοι.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	Πολύωρη ορθοστασία και ακατάλληλα παπούτσια.
ΜΥΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Βραχύς καμπτήρας των δακτύλων (πρωτόκολλο αρ. 58); Απαγωγός του μεγάλου δακτύλου (πρωτόκολλο αρ. 59); Οπίσθιος κνημιαίος (πρωτόκολλο αρ. 56)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Μασάζ του πέλματος με μπαλάκι, άνετα παπούτσια.

Πρώτα αποκλείεις: Μούδιασμα, κάψιμο (νευρογενές), οίδημα: γιατρός.

29. Πόνος στους κροτάφους και τρίξιμο των δοντιών

Άνδρας, 37 ετών · εκπαιδευτικό παράδειγμα

ΕΝΟΧΛΗΜΑ	Το πρωί πονάνε οι κρόταφοι, η σύντροφός του τον ακούει να τρίζει τα δόντια τη νύχτα.
ΕΥΡΗΜΑ	Ο κροταφίτης και ο μασητήρας είναι ευαίσθητοι.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	Ο νυχτερινός βρουξισμός κουράζει τους μασητήρες μύες.
ΜΥΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Κροταφίτης (πρωτόκολλο αρ. 4); Μασητήρας (πρωτόκολλο αρ. 3); Έξω πτερυγοειδής (πρωτόκολλο αρ. 5)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Βραδινό αυτομασάζ, οδοντίατρος για νάρθηκα νυκτός.

Πρώτα αποκλείεις: Οδοντιατρική εξέταση (νάρθηκας νυκτός).

30. Πόνος στην κορυφή του κεφαλιού

Γυναίκα, 44 ετών, μοδίστρα · εκπαιδευτικό παράδειγμα

ΕΝΟΧΛΗΜΑ	Όταν κοιτάζει πολλή ώρα προς τα κάτω, πονάει η κορυφή του κεφαλιού.
ΕΥΡΗΜΑ	Ο σπληνοειδής κεφαλής είναι ευαίσθητος.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	Ο σπληνοειδής κεφαλής αντανακλά πόνο στην κορυφή του κεφαλιού.
ΜΥΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Σπληνοειδής κεφαλής (πρωτόκολλο αρ. 7); Ημιακανθώδης κεφαλής (πρωτόκολλο αρ. 10); Υπινιακοί μύες (πρωτόκολλο αρ. 9)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Στη δουλειά το αντικείμενο πιο ψηλά, ανάσυρση του πηγουνιού κάθε ώρα.

Πρώτα αποκλείεις: Αιφνίδιος, ασυνήθιστος πονοκέφαλος, νευρολογικό σύμπτωμα: γιατρός.

Επόμενο βήμα

Αυτή την εβδομάδα: διάβαζε 3 περιπτώσεις τη μέρα και ακολούθησε την αξιολόγηση στον επόμενο παρόμοιο ασθενή.