Σημάδια Κινδύνου

Αν υπάρχει έστω και ένα: χωρίς εφαρμογή, παράπεμψε τον ασθενή στον γιατρό. Κρέμασε αυτή τη σελίδα δίπλα στο κρεβάτι.

Γενικά

- Πυρετός, ρίγη, ανεξήγητη απώλεια βάρους
- Νυχτερινός πόνος που δεν περνά ούτε με ξεκούραση
- Ιστορικό καρκίνου
- Πρόσφατος τραυματισμός, πτώση, κάκωση
- Συμπτώματα που χειροτερεύουν γρήγορα

Κεφάλι και αυχένας

- Αιφνίδιος, ο πιο δυνατός πονοκέφαλος της ζωής του
- Διαταραχή όρασης, ομιλίας, κατάποσης, αδυναμία στο πρόσωπο ή στα άκρα
- Δυσκαμψία του αυχένα με πυρετό
- Πραγματικό αίσθημα περιστροφής (ίλιγγος) με απώλεια ακοής
- Ζάλη ή ναυτία κατά την εφαρμογή: σταμάτα αμέσως

Ώμος και χέρι

- Πόνος στο στήθος ή στο αριστερό χέρι με την κόπωση, δύσπνοια, εφίδρωση (καρδιά)
- Αδύναμο χέρι μετά από τραυματισμό
- Επίμονο μούδιασμα ή αδεξιότητα στο χέρι ή στα δάχτυλα
- Οίδημα, τοπική θερμότητα γύρω από άρθρωση

Πλάτη και κορμός

- Μούδιασμα ή αδυναμία που απλώνεται στο πόδι
- Διαταραχή ούρησης ή αφόδευσης, μούδιασμα στο περίνεο: ΑΜΕΣΩΣ στον γιατρό
- Κοιλιακός πόνος με πυρετό ή εμετό
- Πόνος στην περιοχή των νεφρών με ουρολογικά ενοχλήματα
- Οξύς θωρακικός πόνος που σχετίζεται με την αναπνοή

Λεκάνη και ισχίο

- Διόγκωση στον βουβώνα όταν βήχει (κήλη)
- Περιορισμένη στροφή του ισχίου, πόνος στον βουβώνα (αρθρίτιδα)
- Ενοχλήσεις της ελάσσονος πυέλου ή γυναικολογικά ενοχλήματα
- Εγκυμοσύνη (αποφυγή εφαρμογής στην κοιλιά και στη λεκάνη)

Κάτω άκρο

- Μονόπλευρο οίδημα, τοπική θερμότητα, κοκκίνισμα στη γάμπα (θρόμβωση): χωρίς μασάζ
- Μετά από τραυματισμό το πόδι δεν σηκώνει βάρος
- Σημειακή ευαισθησία στο οστό που αυξάνεται με το φορτίο (κάταγμα κόπωσης)
- Κάψιμο και μούδιασμα στο πέλμα (νευρογενές, διαβήτης)