ΤΟ ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΚΑΙ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ™

60 Πρωτόκολλα Εφαρμογής ανά Μυ

Ο άτλαντας σου δείχνει πού είναι το σημείο. Αυτός ο οδηγός σου λέει τι να κάνεις με αυτό: θέση, τεχνική, διάταση, δόση και εργασία για το σπίτι, μυ προς μυ.

Άτλαντας Σημείων Πυροδότησης · Εκπαιδευτικό υλικό για επαγγελματίες υγείας και φοιτητές. Δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση.

Περιεχόμενα

1 · Γενικές αρχές

2 · Κεφαλή, πρόσωπο και αυχένας

3 · Ώμος, βραχίονας, αντιβράχιο και άκρα χείρα

4 · Πλάτη, σπονδυλική στήλη και κορμός

5 · Λεκάνη, ισχίο και γλουτός

6 · Μηρός, κνήμη και άκρο πόδι

Επόμενο βήμα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Γενικές αρχές

Κάθε πρωτόκολλο ακολουθεί αυτή τη σειρά.

Για ποιους είναι

Εκπαιδευτικό υλικό για φυσικοθεραπευτές, θεραπευτές μασάζ, οστεοπαθητικούς, προπονητές και φοιτητές επιστημών υγείας. Τα πρωτόκολλα συνοψίζουν τεχνικές που χρησιμοποιούνται συχνά στη χειροθεραπευτική εφαρμογή στα μυοπεριτονιακά σημεία πυροδότησης. Δεν αντικαθιστούν την ιατρική διάγνωση ούτε τη δική σου επαγγελματική αξιολόγηση.

ΒΗΜΑ	ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ	ΠΟΣΟ
1. Εντοπισμός	Βρες την ταινία τάσης και το πιο ευαίσθητο σημείο μέσα της (σύμφωνα με την κάρτα του άτλαντα).	—
2. Ισχαιμική συμπίεση	Σταδιακή, σταθερή πίεση στο σημείο μέχρι ο ασθενής να αναφέρει ενόχληση περίπου 5–7 στην κλίμακα 0–10. Καθώς η τάση υποχωρεί, ακολούθησε πιο βαθιά.	30–90 δλ., 3–5 επαναλήψεις
3. Διάταση	Αργή και ανώδυνη διάταση του μυός που δούλεψες, στην εκπνοή.	3 × 20–30 δλ.
4. Ενεργητική κίνηση	Ο ασθενής κινεί τον μυ μερικές φορές σε όλο το εύρος κίνησης.	3–5 επαναλήψεις
5. Εργασία για το σπίτι	Δώσε μια απλή διάταση ή άσκηση (δες το τέλος του πρωτοκόλλου).	1–2 φορές τη μέρα

Πότε ΔΕΝ εφαρμόζεις (και παραπέμπεις στον γιατρό)

Πρόσφατος τραυματισμός ή οίδημα, πυρετός, νυχτερινός πόνος χωρίς γνωστή αιτία, μούδιασμα ή αδυναμία που δεν ταιριάζει με τον χάρτη αντανακλώμενου πόνου, υποψία θρόμβωσης, δερματική πάθηση στην περιοχή. Σε ασθενή που παίρνει αντιπηκτικά, εφάρμοσε μόνο ήπια πίεση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Κεφαλή, πρόσωπο και αυχένας

12 μύες, με τη σειρά του άτλαντα.

1. Τραπεζοειδής – άνω ίνες

Musculus trapezius, pars descendens

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Πάνω από τη ζώνη του ώμου, στη μέση της απόστασης ανάμεσα στον αυχένα και το ακρώμιο, στο άνω ελεύθερο χείλος.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	κρόταφος, πλάι του κεφαλιού, πλάι του αυχένα, πίσω από το αυτί, γωνία της κάτω γνάθου
ΑΣΘΕΝΗΣ	Ύπτια ή καθιστή θέση, τα χέρια χαλαρά στα πόδια.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Λαβή τσιμπίδας των άνω ινών (αντίχειρας και δείκτης), παρατεταμένη ισχαιμική συμπίεση πάνω στην ταινία τάσης. • Εναλλακτικά: επίπεδη πίεση με τις άκρες των δαχτύλων πάνω από τη ζώνη του ώμου.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Το κεφάλι γέρνει προς την αντίθετη πλευρά με ελαφριά κάμψη· σε καθιστή θέση ο ασθενής κρατιέται με το χέρι της ίδιας πλευράς από κάτω από την καρέκλα.
ΔΟΣΗ	3–5 × 30–90 δλ. συμπίεση, μετά 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Πλάγια κλίση-διάταση δύο φορές τη μέρα· οθόνη στο ύψος των ματιών· όχι κινητό ανάμεσα σε αυτί και ώμο.

2. Στερνοκλειδομαστοειδής (ΣΚΜ)

Musculus sternocleidomastoideus

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Κατά μήκος της γαστέρας του μυός, ιδίως στη στερνική και στην κλειδική μοίρα· το πιο ευαίσθητο σημείο είναι στο μεσαίο τριτημόριο.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	μέτωπο, γύρω από το μάτι, μάγουλο, βαθιά στο αυτί, κορυφή του κεφαλιού, πίσω μέρος του κεφαλιού
ΑΣΘΕΝΗΣ	Ύπτια θέση, το κεφάλι ελαφρά γερμένο προς την πλευρά που δουλεύεις, για να χαλαρώσει ο μυς.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Μόνο λαβή τσιμπίδας: πιάσε τη γαστέρα του μυός με δύο δάχτυλα και σήκωσέ την απαλά, απομακρύνοντάς την από τις βαθιές δομές του αυχένα. • Δούλεψε χωριστά τη στερνική και την κλειδική μοίρα, από κάτω προς τα πάνω.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Το κεφάλι γέρνει προς την αντίθετη πλευρά και μετά το πηγούνι στρέφεται αργά προς την πλευρά που δουλεύεις· ελαφριά έκταση μόνο αν δεν προκαλεί ζάλη.
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ. συμπίεση με λαβή τσιμπίδας σε κάθε μοίρα, μετά 2–3 × 20 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Αργές κινήσεις και στροφές του κεφαλιού· όχι τηλεόραση ξαπλωμένος ούτε διάβασμα με ανασηκωμένο κεφάλι.

> **Προσοχή:** Η καρωτίδα περνά ακριβώς κάτω από τον μυ: ποτέ μην πιέζεις προς τα πίσω στο μπροστινό μέρος του αυχένα. Σε ζάλη, ναυτία ή διαταραχή της όρασης σταμάτα αμέσως.

3. Μασητήρας

Musculus masseter

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στην επιπολής στιβάδα κάτω από το ζυγωματικό τόξο και πάνω από τη γωνία της κάτω γνάθου· στη βαθιά στιβάδα μπροστά από την κροταφογναθική άρθρωση.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	πάνω και κάτω γομφίοι, κάτω γνάθος, φρύδι, βαθιά στο αυτί
ΑΣΘΕΝΗΣ	Ύπτια θέση, το στόμα ελαφρά ανοιχτό.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Εξωτερικά: επίπεδη συμπίεση με τις άκρες των δαχτύλων κάτω από το ζυγωματικό τόξο και πάνω από τη γωνία της γνάθου. • Ενδοστοματικά (με γάντι): λαβή τσιμπίδας, ένα δάχτυλο μέσα στο στόμα και ένα έξω· αργή εγκάρσια τριβή στις ίνες.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Αργό άνοιγμα του στόματος με την άκρη της γλώσσας στον ουρανίσκο· δύο δάχτυλα του θεραπευτή οδηγούν απαλά τη γνάθο προς τα κάτω.
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ. συμπίεση, 2–3 × 20 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Καθημερινό αυτομασάζ με κυκλικές κινήσεις· αποφυγή τσίχλας· να προσέχει αν σφίγγει τα δόντια μέσα στη μέρα.

> **Προσοχή:** Σε πρόσφατο πόνο στην κροταφογναθική άρθρωση ή σε προβλήματα στα δόντια, πρώτα εξέταση από οδοντίατρο. Μέσα στο στόμα πάντα με γάντι.

4. Κροταφίτης

Musculus temporalis

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Πάνω από το ζυγωματικό τόξο σε τέσσερις ζώνες, από μπροστά προς τα πίσω· ψηλαφάται εύκολα όταν ο ασθενής μασάει.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	κρόταφος, φρύδι, πίσω από το μάτι, πάνω δόντια, πλάι του κεφαλιού
ΑΣΘΕΝΗΣ	Ύπτια ή καθιστή θέση, τα δόντια ελαφρά ανοιχτά.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Επίπεδη συμπίεση με τις άκρες των δαχτύλων στις τέσσερις ομάδες ινών πάνω από το ζυγωματικό τόξο, από μπροστά προς τα πίσω. • Αργή εγκάρσια τριβή στις ταινίες τάσης.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Αργό άνοιγμα του στόματος ενώ τα δάχτυλα του θεραπευτή γλιστρούν προς τα πάνω στον κρόταφο.
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ. σε κάθε σημείο, μετά 3–5 αργές επαλείψεις.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Αυτομασάζ στους κροτάφους στην αρχή του πονοκεφάλου· παρακολούθηση του νυχτερινού τριγμού των δοντιών.

5. Έξω πτερυγοειδής

Musculus pterygoideus lateralis

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Βαθιά κάτω από το ζυγωματικό τόξο· ενδοστοματικά πίσω από τους πάνω γομφίους, προς τα πάνω και πίσω.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	κροταφογναθική άρθρωση, μάγουλο (πάνω από τα ιγμόρεια)
ΑΣΘΕΝΗΣ	Ύπτια θέση, το στόμα μισάνοιχτο.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Ενδοστοματικά, με γάντι: προσεκτική, αργή πίεση με το μικρό δάχτυλο πίσω από τους πάνω γομφίους. • Εξωτερικά: συμπίεση στο βύθισμα κάτω από το ζυγωματικό τόξο με το στόμα ανοιχτό.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Αργή ανάσυρση της κάτω γνάθου (ο ασθενής τραβάει ελαφρά το πηγούνι προς τα πίσω) και μετά αργό κλείσιμο του στόματος.
ΔΟΣΗ	2–3 × 20–30 δλ. ήπια πίεση, 2 × 20 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Αποφυγή σκληρών και μεγάλων μπουκιών· συνειδητό αργό και ευθύ άνοιγμα του στόματος.

> **Προσοχή:** Μέσα στο στόμα δούλευε μόνο με γάντι και πολύ απαλά· σε επώδυνο ήχο ή «κόλλημα» της γνάθου, οδοντίατρος ή γναθοχειρουργός.

6. Έσω πτερυγοειδής

Musculus pterygoideus medialis

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στην έσω επιφάνεια της γωνίας της κάτω γνάθου, ψηλάφηση από κάτω· ενδοστοματικά πίσω από τον τελευταίο γομφίο.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	ρίζα της γλώσσας, λαιμός, κάτω από το αυτί, κροταφογναθική άρθρωση
ΑΣΘΕΝΗΣ	Ύπτια θέση, το κεφάλι ελαφρά στραμμένο προς την πλευρά που δουλεύεις.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Εξωτερικά: πίεση με τις άκρες των δαχτύλων προς τα πάνω στην έσω επιφάνεια της γωνίας της γνάθου. • Ενδοστοματικά (με γάντι): προσεκτική πίεση πίσω από τον τελευταίο γομφίο προς τον ουρανίσκο.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Αργό άνοιγμα του στόματος με τη γνάθο ελαφρά μετατοπισμένη προς την αντίθετη πλευρά.
ΔΟΣΗ	2–3 × 20–30 δλ. συμπίεση, 2 × 20 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Συνειδητή χαλάρωση των σφιγμένων δοντιών· μαλακές τροφές τις μέρες με πόνο.

> **Προσοχή:** Αν υπάρχει πόνος στην κατάποση ή ενόχληση στον λαιμό, πρώτα ιατρική εξέταση.

7. Σπληνοειδής κεφαλής

Musculus splenius capitis

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στο οπίσθιο πλάγιο μέρος του αυχένα, ανάμεσα στον ΣΚΜ και τον τραπεζοειδή, περίπου 2–3 δάχτυλα κάτω από το ινίο.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	κορυφή του κεφαλιού
ΑΣΘΕΝΗΣ	Ύπτια ή πρηνής θέση, το κεφάλι στη μέση γραμμή.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Επίπεδη συμπίεση με τις άκρες των δαχτύλων στο τρίγωνο ανάμεσα σε ΣΚΜ και τραπεζοειδή, προς τα πάνω και μέσα. • Επιμήκεις επαλείψεις προς το ινίο.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Το κεφάλι σε κάμψη και στραμμένο προς την αντίθετη πλευρά.
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ. συμπίεση, 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Αποφυγή του να κοιτάζει πολλή ώρα προς τα πάνω (βάψιμο, τακτοποίηση ραφιών)· μαξιλάρι στο σωστό ύψος.

8. Σπληνοειδής τραχήλου

Musculus splenius cervicis

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στο κάτω μέρος του αυχένα, πάνω από την άνω γωνία της ωμοπλάτης, δίπλα στον ανελκτήρα της ωμοπλάτης.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	πίσω από το μάτι, πίσω μέρος του κεφαλιού, μετάβαση αυχένα-ώμου
ΑΣΘΕΝΗΣ	Πρηνής θέση, με στήριξη στο μέτωπο.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Συμπίεση με τις άκρες των δαχτύλων στη βάση του αυχένα, δίπλα στη σπονδυλική στήλη. • Αργή εγκάρσια τριβή πάνω στην ταινία τάσης.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Το κεφάλι σε κάμψη, με πλάγια κλίση και στροφή προς την αντίθετη πλευρά.
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ., μετά 3 × 20 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διόρθωση της προβολής του κεφαλιού προς τα εμπρός· διάλειμμα κίνησης κάθε ώρα.

9. Υπινιακοί μύες

Mm. recti capitis posteriores et obliqui capitis

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Ακριβώς κάτω από το ινιακό οστό, δεξιά και αριστερά από τη μέση γραμμή, σε βάθος.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	πλάι του κεφαλιού, πίσω από το μάτι, μέτωπο, πίσω μέρος του κεφαλιού
ΑΣΘΕΝΗΣ	Ύπτια θέση, ο θεραπευτής κάθεται στην κεφαλή του κρεβατιού.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Οι άκρες των δαχτύλων του θεραπευτή κάτω από το ινίο· την πίεση τη δίνει το βάρος του κεφαλιού (υπινιακή απελευθέρωση). • Περίμενε μέχρι να χαλαρώσει ο ιστός και τα δάχτυλα να βυθιστούν αργά.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Ανάσυρση του πηγουνιού (το κεφάλι γλιστράει ευθεία προς τα πίσω) και μετά ελαφρύ «νεύμα» προς τα εμπρός.
ΔΟΣΗ	1–2 × 60–120 δλ. απελευθέρωση, μετά 5–10 αργές ανασύρσεις του πηγουνιού.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	10 ανασύρσεις του πηγουνιού τη μέρα· οθόνη στο ύψος των ματιών· σύντομο διάλειμμα κάθε ώρα.

> **Προσοχή:** Σε ζάλη, διαταραχή της όρασης, μούδιασμα ή δυσκολία στην κατάποση σταμάτα αμέσως και παράπεμψε τον ασθενή στον γιατρό.

10. Ημιακανθώδης κεφαλής

Musculus semispinalis capitis

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στον σβέρκο, 2–3 εκ. από τη μέση γραμμή, κάτω από το ινίο και στη μέση του αυχένα.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	πλάι του κεφαλιού, κρόταφος, μέτωπο, πίσω μέρος του κεφαλιού
ΑΣΘΕΝΗΣ	Πρηνής θέση ή ύπτια με το κεφάλι στραμμένο στο πλάι.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Συμπίεση με τις άκρες των δαχτύλων δίπλα στη σπονδυλική στήλη, από κάτω προς τα πάνω. • Επιμήκεις επαλείψεις προς το ινίο.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Το κεφάλι σε κάμψη με ελαφριά πλάγια στροφή.
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ., μετά 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Αποφυγή της προβολής του κεφαλιού προς τα εμπρός· στο διάβασμα το βιβλίο στο ύψος των ματιών.

11. Ανελκτήρας της ωμοπλάτης

Musculus levator scapulae

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Λίγο μέσα και πάνω από την άνω γωνία της ωμοπλάτης· στο πλάι του αυχένα, βαθιά κάτω από το άνω χείλος του τραπεζοειδούς.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	μετάβαση αυχένα-ώμου, έσω χείλος της ωμοπλάτης, πίσω μέρος του ώμου
ΑΣΘΕΝΗΣ	Πρηνής ή καθιστή θέση, τα χέρια χαλαρά.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Συμπίεση λίγο μέσα και πάνω από την άνω γωνία της ωμοπλάτης. • Δεύτερο σημείο: στο πλάι του αυχένα, βαθιά κάτω από το άνω χείλος του τραπεζοειδούς.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Το κεφάλι σε κάμψη και στραμμένο προς την αντίθετη πλευρά (η μύτη προς τη μασχάλη), το χέρι της πλευράς που δουλεύεις στον σβέρκο.
ΔΟΣΗ	3–5 × 30–90 δλ. συμπίεση, 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Η ίδια διάταση δύο φορές τη μέρα· αποφυγή ψηλού μαξιλαριού και στραμμένου κεφαλιού στη δουλειά.

12. Σκαληνοί μύες

Mm. scaleni anterior, medius et posterior

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στο πλάι του αυχένα, πίσω και κάτω από τον ΣΚΜ, πάνω από την κλείδα.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	μπροστινός θώρακας, βραχίονας, έσω χείλος της ωμοπλάτης, χέρι (αντίχειρας και δείκτης)
ΑΣΘΕΝΗΣ	Ύπτια θέση, το κεφάλι ελαφρά γερμένο προς την πλευρά που δουλεύεις.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Επίπεδη, πολύ απαλή πίεση με τις άκρες των δαχτύλων πίσω από το οπίσθιο χείλος του ΣΚΜ, πάνω από την κλείδα. • Σύντομες λαβές 20–30 δλ.· ο ασθενής παίρνει βαθιές κοιλιακές ανάσες.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Το κεφάλι γέρνει προς την αντίθετη πλευρά με ελαφριά έκταση· ο θεραπευτής σταθεροποιεί την κλείδα της πλευράς που δουλεύει προς τα κάτω.
ΔΟΣΗ	3 × 20–30 δλ. ήπια πίεση, 3 × 20 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Εξάσκηση στη διαφραγματική (κοιλιακή) αναπνοή· όχι βαριά τσάντα στον ώμο.

> **Προσοχή:** Από αυτή την περιοχή περνούν το βραχιόνιο πλέγμα και αγγεία: αν εμφανιστεί μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα που απλώνεται στο χέρι, μείωσε την πίεση ή σταμάτα. Σε επίμονο μούδιασμα, ιατρική εξέταση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Ώμος, βραχίονας, αντιβράχιο και άκρα χείρα

14 μύες, με τη σειρά του άτλαντα.

13. Υπακάνθιος

Musculus infraspinatus

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στην οπίσθια επιφάνεια της ωμοπλάτης, κάτω από την άκανθα, στο μεσαίο και άνω τμήμα του υπακάνθιου βόθρου.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	μπροστινό μέρος του ώμου (βαθιά), πρόσθια έξω πλευρά του βραχίονα, αντιβράχιο, πλευρά του αντίχειρα
ΑΣΘΕΝΗΣ	Πρηνής θέση ή πλάγια με την πλευρά που δουλεύεις από πάνω.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Επίπεδη συμπίεση με τις άκρες των δαχτύλων ή τον αντίχειρα στην οπίσθια επιφάνεια της ωμοπλάτης. • Προχώρα σημείο προς σημείο από την άκανθα της ωμοπλάτης προς τα κάτω.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Το χέρι της πλευράς που δουλεύεις περνά μπροστά από το στήθος και το άλλο χέρι τραβάει τον αγκώνα προς το στήθος· ή το χέρι πίσω στην πλάτη.
ΔΟΣΗ	3–5 × 30–90 δλ., μετά 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Όχι ύπνος πάνω στην πλευρά που πονάει· στο πλάγιο ξάπλωμα μαξιλάρι κάτω από το χέρι.

14. Υπερακάνθιος

Musculus supraspinatus

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Πάνω από την άκανθα της ωμοπλάτης, στο έσω τμήμα του υπερακάνθιου βόθρου και έξω κάτω από το ακρώμιο.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	πλάι του ώμου (δελτοειδής περιοχή), έξω πλευρά του βραχίονα, έξω πλευρά του αγκώνα
ΑΣΘΕΝΗΣ	Καθιστή ή πρηνής θέση.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Βαθιά συμπίεση με τις άκρες των δαχτύλων πάνω από την άκανθα της ωμοπλάτης, μέσα από τις ίνες του τραπεζοειδούς. • Έξω, κοντά στον τένοντα, μόνο ήπια πίεση.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Το χέρι της πλευράς που δουλεύεις πίσω στην πλάτη, το άλλο χέρι τραβάει απαλά τον καρπό προς την αντίθετη πλευρά.
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ., 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Αποφυγή σηκώματος βαριών αντικειμένων πάνω από το κεφάλι· καθημερινές περιστροφές του ώμου.

> **Προσοχή:** Οξύς διαξιφιστικός πόνος στον ώμο ή νυχτερινός πόνος που δεν περνά: ιατρική εξέταση για να αποκλειστεί κάκωση του στροφικού πετάλου.

15. Ελάσσων στρογγύλος

Musculus teres minor

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στο έξω χείλος της ωμοπλάτης, κάτω από τον υπακάνθιο, πάνω από την οπίσθια μασχαλιαία πτυχή.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	πίσω μέρος του ώμου (σημειακά), πίσω πλευρά του βραχίονα
ΑΣΘΕΝΗΣ	Πρηνής ή πλάγια θέση, με το χέρι να κρέμεται από την άκρη του κρεβατιού.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Λαβή τσιμπίδας ή συμπίεση με τον αντίχειρα στο έξω χείλος της ωμοπλάτης, πάνω από την οπίσθια μασχαλιαία πτυχή.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Το χέρι περνά μπροστά από το στήθος, ο αγκώνας τραβιέται προς το στήθος.
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ., 3 × 20 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Όπως στον υπακάνθιο· όχι ύπνος με το χέρι πάνω από το κεφάλι.

16. Υποπλάτιος

Musculus subscapularis

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στην πρόσθια επιφάνεια της ωμοπλάτης· τη φτάνεις από τη μασχάλη, κατά μήκος του έξω χείλους της ωμοπλάτης.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	πίσω μέρος του ώμου, ωμοπλάτη, πίσω πλευρά του βραχίονα, καρπός
ΑΣΘΕΝΗΣ	Ύπτια θέση, το χέρι σε απαγωγή περίπου 45° και σε έξω στροφή.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Από τη μασχάλη, με τις άκρες των δαχτύλων προς την πρόσθια επιφάνεια της ωμοπλάτης, πολύ αργά. • Σύντομες λαβές, ανάλογα με το σήμα του ασθενούς.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Το χέρι σε έξω στροφή, ο αγκώνας στις 90°, η παλάμη πηγαίνει απαλά προς τα πίσω (στην κάσα της πόρτας).
ΔΟΣΗ	2–3 × 20–30 δλ., 3 × 20 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Ασκήσεις έξω στροφής· το χέρι να μη μένει πολλή ώρα κολλημένο στον κορμό.

> **Προσοχή:** Από τη μασχάλη περνούν αγγεία και νεύρα: δούλευε αργά και απαλά· αν εμφανιστεί μούδιασμα, μείωσε την πίεση.

17. Δελτοειδής

Musculus deltoideus

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στις πρόσθιες, μέσες και οπίσθιες ίνες, 2–5 εκ. κάτω από το ακρώμιο.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	ώμος (γύρω από το σημείο), βραχίονας
ΑΣΘΕΝΗΣ	Καθιστή ή ύπτια θέση.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Επίπεδη συμπίεση ή λαβή τσιμπίδας χωριστά σε καθεμία από τις τρεις ομάδες ινών. • Εγκάρσια τριβή στις ταινίες τάσης.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Πρόσθιες ίνες: το χέρι προς τα πίσω· οπίσθιες ίνες: το χέρι περνά μπροστά από το στήθος.
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ. σε κάθε ομάδα ινών, 2–3 × 20 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διαλείμματα σε επαναλαμβανόμενες εργασίες σηκώματος.

18. Μείζων Θωρακικός

Musculus pectoralis major

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στο έξω χείλος του θωρακικού μυός (πρόσθια μασχαλιαία πτυχή), κάτω από την κλείδα και δίπλα στο στέρνο.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	μπροστινός θώρακας, μπροστινό μέρος του ώμου, έσω πλευρά του βραχίονα, περιοχή του μαστού
ΑΣΘΕΝΗΣ	Ύπτια θέση, το χέρι σε ελαφριά απαγωγή.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Λαβή τσιμπίδας στην πρόσθια μασχαλιαία πτυχή. • Επίπεδη συμπίεση κάτω από την κλείδα και δίπλα στο στέρνο.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Διάταση στην πόρτα: το αντιβράχιο στην κάσα, ο αγκώνας στο ύψος του ώμου, ο κορμός κάνει αργά ένα βήμα μπροστά.
ΔΟΣΗ	3 × 30–90 δλ., 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διόρθωση της κυρτής στάσης· ώμοι πίσω και κάτω.

> **Προσοχή:** Σε πόνο στην αριστερή πλευρά του θώρακα, ιδίως με την κόπωση, με δύσπνοια ή εφίδρωση: πρώτα αποκλείεται καρδιακή αιτία, άμεσα στον γιατρό.

19. Ελάσσων Θωρακικός

Musculus pectoralis minor

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Κάτω από την κορακοειδή απόφυση, πάνω από την 3η–5η πλευρά, βαθιά κάτω από τον μείζονα θωρακικό.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	μπροστινό μέρος του ώμου, θώρακας, έσω πλευρά του βραχίονα, πλευρά του μικρού δαχτύλου
ΑΣΘΕΝΗΣ	Ύπτια θέση, τα χέρια δίπλα στον κορμό.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Επίπεδη πίεση με τις άκρες των δαχτύλων κάτω από τον μείζονα θωρακικό, από τη μασχάλη προς τα μέσα και πάνω. • Σύντομες λαβές με αργή αναπνοή.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Οι ώμοι πίσω και κάτω· στην κάσα της πόρτας ο αγκώνας πάνω από το ύψος του ώμου.
ΔΟΣΗ	3 × 20–30 δλ., 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διόρθωση του ώμου που έχει έρθει μπροστά· ενδυνάμωση των μυών της πλάτης.

> **Προσοχή:** Αν εμφανιστεί μούδιασμα που απλώνεται στο χέρι, μείωσε την πίεση.

20. Ρομβοειδείς μύες

Mm. rhomboidei major et minor

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Ανάμεσα στο έσω χείλος της ωμοπλάτης και τη σπονδυλική στήλη, κάτω από τον τραπεζοειδή.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	έσω χείλος της ωμοπλάτης, ανάμεσα στις ωμοπλάτες
ΑΣΘΕΝΗΣ	Πρηνής θέση, τα χέρια χαλαρά δίπλα στο κρεβάτι.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Συμπίεση με τον αντίχειρα κατά μήκος του έσω χείλους της ωμοπλάτης, από πάνω προς τα κάτω. • Εγκάρσια τριβή στις ίνες.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Τα χέρια σταυρώνουν μπροστά (αγκαλιά στον εαυτό), η πλάτη καμπουριάζει ελαφρά.
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ., 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διάταση του θωρακικού μυός (οι ρομβοειδείς είναι συχνά επιμηκυμένοι και αδύναμοι).

21. Πρόσθιος οδοντωτός

Musculus serratus anterior

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στο πλάι του θώρακα, κάτω από τη μασχάλη, στο ύψος της 5ης–6ης πλευράς.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	πλάι του θώρακα, κάτω γωνία της ωμοπλάτης, έσω πλευρά του βραχίονα
ΑΣΘΕΝΗΣ	Πλάγια θέση με την πλευρά που δουλεύεις από πάνω, το χέρι μπροστά.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Επίπεδη πίεση με τις άκρες των δαχτύλων κάτω από τη μασχάλη, ανάμεσα στις πλευρές. • Αργές επαλείψεις κατά μήκος των πλευρών.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Το χέρι προς τα πίσω και η ωμοπλάτη τραβηγμένη προς τη σπονδυλική στήλη· με βαθιά εισπνοή.
ΔΟΣΗ	3 × 20–30 δλ., 3 × 20 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Συχνός μετά από βήχα και έντονο τρέξιμο: σταδιακή αύξηση του φορτίου.

> **Προσοχή:** Σε οξύ πλάγιο πόνο που σχετίζεται με την αναπνοή, πυρετό ή βήχα, πρώτα ιατρική εξέταση.

22. Πλατύς ραχιαίος

Musculus latissimus dorsi

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στην οπίσθια μασχαλιαία πτυχή, στο ύψος της κάτω γωνίας της ωμοπλάτης.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	κάτω γωνία της ωμοπλάτης, οπίσθια έσω πλευρά του βραχίονα, παράμεσος και μικρό δάχτυλο
ΑΣΘΕΝΗΣ	Πρηνής ή πλάγια θέση, το χέρι σηκωμένο πάνω από το κεφάλι.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Λαβή τσιμπίδας στην οπίσθια μασχαλιαία πτυχή. • Επίπεδη συμπίεση δίπλα στην κάτω γωνία της ωμοπλάτης.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Το χέρι πάνω από το κεφάλι, ο κορμός σε πλάγια κλίση προς την αντίθετη πλευρά.
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ., 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διάταση μετά από έλξεις και ασκήσεις τραβήγματος.

23. Δικέφαλος βραχιόνιος

Musculus biceps brachii

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στο μεσαίο τριτημόριο της πρόσθιας επιφάνειας του βραχίονα, και στις δύο κεφαλές.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	μπροστινό μέρος του ώμου, βόθρος του αγκώνα
ΑΣΘΕΝΗΣ	Ύπτια θέση, ο αγκώνας ελαφρά λυγισμένος.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Λαβή τσιμπίδας στη γαστέρα του μυός. • Επίπεδη συμπίεση στο μεσαίο τριτημόριο.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Ο αγκώνας τεντωμένος, το αντιβράχιο σε πρηνισμό, το χέρι προς τα πίσω.
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ., 3 × 20 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Αποφυγή μεταφοράς βαριών αντικειμένων με λυγισμένο αγκώνα.

24. Τρικέφαλος βραχιόνιος

Musculus triceps brachii

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στην πίσω πλευρά του βραχίονα, στη μακρά κεφαλή κάτω από τη μασχάλη και 4–6 εκ. πάνω από τον αγκώνα.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	πίσω μέρος του ώμου, έξω πλευρά του αγκώνα, πίσω πλευρά του αντιβραχίου
ΑΣΘΕΝΗΣ	Πρηνής θέση με το χέρι να κρέμεται ή ύπτια με το χέρι πάνω από το κεφάλι.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Λαβή τσιμπίδας στη μακρά κεφαλή. • Επίπεδη συμπίεση πάνω από τον αγκώνα.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Το χέρι πάνω από το κεφάλι, ο αγκώνας πλήρως λυγισμένος, το άλλο χέρι τον σπρώχνει απαλά προς τα πίσω.
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ., 3 × 20 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διαλείμματα στο περπάτημα με πατερίτσες και στις κάμψεις.

25. Εκτείνοντες του αντιβραχίου (ECRL, ECRB, εκτείνων τους δακτύλους)

Mm. extensores carpi radiales et extensor digitorum

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στην οπίσθια έξω επιφάνεια του αντιβραχίου, 3–6 εκ. κάτω από τον αγκώνα.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	έξω πλευρά του αγκώνα, πίσω πλευρά του αντιβραχίου, ράχη του χεριού, δάχτυλα
ΑΣΘΕΝΗΣ	Καθιστή θέση, το αντιβράχιο στο τραπέζι, η παλάμη προς τα κάτω.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Συμπίεση με τον αντίχειρα στις γαστέρες των μυών κάτω από τον αγκώνα. • Εγκάρσια τριβή στη γαστέρα του μυός (όχι στην οστική πρόσφυση).
ΔΙΑΤΑΣΗ	Ο αγκώνας τεντωμένος, ο καρπός και τα δάχτυλα σε κάμψη, το άλλο χέρι τραβάει απαλά προς τα κάτω.
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ., 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διαλείμματα στη χρήση ποντικιού και στο βίδωμα· χαλάρωμα της λαβής.

> **Προσοχή:** Σε οίδημα, τοπική θερμότητα ή νυχτερινό μούδιασμα, πρώτα ιατρική εξέταση.

26. Καμπτήρες του αντιβραχίου

Mm. flexores carpi et digitorum

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στην έσω πρόσθια επιφάνεια του αντιβραχίου, 3–6 εκ. κάτω από τον αγκώνα.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	παλαμιαία πλευρά του καρπού, παλάμη, παλαμιαία πλευρά των δαχτύλων
ΑΣΘΕΝΗΣ	Καθιστή θέση, το αντιβράχιο στο τραπέζι, η παλάμη προς τα πάνω.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Συμπίεση με τον αντίχειρα στις γαστέρες των μυών. • Επιμήκεις επαλείψεις προς τον καρπό.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Ο αγκώνας τεντωμένος, η παλάμη προς τα πάνω, τα δάχτυλα τραβηγμένα προς τα πίσω.
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ., 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διαλείμματα στις χειρωνακτικές εργασίες (κήπος, συναρμολόγηση)· χαλάρωμα της λαβής.

> **Προσοχή:** Σε νυχτερινό μούδιασμα που απλώνεται στα δάχτυλα (π.χ. σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα), ιατρική εξέταση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Πλάτη, σπονδυλική στήλη και κορμός

10 μύες, με τη σειρά του άτλαντα.

27. Τραπεζοειδής – μέσες ίνες

Musculus trapezius, pars transversa

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Ανάμεσα στο έσω χείλος της ωμοπλάτης και τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος της άκανθας της ωμοπλάτης, επιφανειακά.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	ανάμεσα στις ωμοπλάτες, κάψιμο δίπλα στη σπονδυλική στήλη
ΑΣΘΕΝΗΣ	Πρηνής θέση, τα χέρια δίπλα στο κρεβάτι.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Επίπεδη συμπίεση με τον αντίχειρα δίπλα στο έσω χείλος της ωμοπλάτης. • Εγκάρσια τριβή στις ίνες.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Τα χέρια σταυρώνουν μπροστά, η πλάτη καμπουριάζει.
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ., 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διόρθωση του κυρτού καθίσματος· διάταση του θωρακικού μυός.

28. Τραπεζοειδής – κάτω ίνες

Musculus trapezius, pars ascendens

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Ανάμεσα στην κάτω γωνία της ωμοπλάτης και τη σπονδυλική στήλη, στη μέση της πλάτης.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	πίσω μέρος του αυχένα, ακρώμιο, ανάμεσα στις ωμοπλάτες
ΑΣΘΕΝΗΣ	Πρηνής θέση.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Λαβή τσιμπίδας ή συμπίεση με τον αντίχειρα δίπλα στην κάτω γωνία της ωμοπλάτης, από μέσα.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Τα χέρια μπροστά και πάνω, η πλάτη καμπουριασμένη.
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ., 3 × 20 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Ενδυνάμωση: από πρηνή θέση σήκωμα των χεριών σε σχήμα Υ.

29. Άνω οπίσθιος οδοντωτός

Musculus serratus posterior superior

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Κάτω από το άνω μέρος της ωμοπλάτης, δίπλα στη σπονδυλική στήλη· τον φτάνεις όταν η ωμοπλάτη τραβηχτεί στο πλάι.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	βαθιά κάτω από την ωμοπλάτη, πίσω μέρος του ώμου, πίσω πλευρά του βραχίονα, μικρό δάχτυλο
ΑΣΘΕΝΗΣ	Καθιστή θέση, το χέρι της πλευράς που δουλεύεις σταυρωμένο μπροστά από τον κορμό για να ανοίξει η ωμοπλάτη.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Επίπεδη συμπίεση με τις άκρες των δαχτύλων πάνω στην πλευρά, κάτω από το άνω έσω χείλος της ωμοπλάτης. • Σύντομες λαβές με αργή αναπνοή.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Το χέρι σταυρωμένο μπροστά, η πλάτη καμπουριασμένη.
ΔΟΣΗ	2–3 × 20–30 δλ., 3 × 20 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Κοιλιακή αναπνοή αντί για ρηχή (γρήγορη) θωρακική.

30. Θωρακικός λαγονοπλευρικός

Musculus iliocostalis thoracis

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Περίπου 5–8 εκ. από τη σπονδυλική στήλη, στη μέση και κάτω θωρακική μοίρα.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	μέση της πλάτης, κοιλιά (μερικές φορές), κάτω από την ωμοπλάτη
ΑΣΘΕΝΗΣ	Πρηνής θέση, ένα μικρό μαξιλάρι κάτω από την κοιλιά.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Συμπίεση με τον αντίχειρα στο έξω χείλος του ορθωτήρα του κορμού. • Επιμήκεις επαλείψεις προς τα κάτω.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Από καθιστή θέση κάμψη προς τα εμπρός, με τον κορμό ελαφρά στραμμένο προς την αντίθετη πλευρά.
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ., 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διαλείμματα κίνησης στο πολύωρο κάθισμα.

> **Προσοχή:** Σε πόνο στην πλάτη μαζί με κοιλιακό πόνο, πυρετό ή ουρολογικά ενοχλήματα, πρώτα ιατρική εξέταση.

31. Οσφυϊκός λαγονοπλευρικός

Musculus iliocostalis lumborum

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στην οσφυϊκή περιοχή, περίπου 5–7 εκ. από τη σπονδυλική στήλη, κάτω από τις κάτω πλευρές.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	μέση, γλουτιαία περιοχή, κάτω κοιλιά
ΑΣΘΕΝΗΣ	Πρηνής θέση, μαξιλάρι κάτω από την κοιλιά.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Συμπίεση με τον αντίχειρα ή τον αγκώνα στο έξω χείλος του ορθωτήρα του κορμού.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Ύπτια θέση με τα γόνατα τραβηγμένα στο στήθος.
ΔΟΣΗ	3–5 × 30–90 δλ., 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Σήκωμα από τα γόνατα με ίσια πλάτη· διακοπή του πολύωρου καθίσματος.

> **Προσοχή:** Μούδιασμα ή αδυναμία που απλώνεται στο πόδι, διαταραχή ούρησης ή αφόδευσης: αμέσως στον γιατρό.

32. Επιμήκης θωρακικός

Musculus longissimus thoracis

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	2–4 εκ. από τη σπονδυλική στήλη, στην κάτω θωρακική και άνω οσφυϊκή μοίρα.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	γλουτιαία περιοχή, μέση, λαγόνια ακρολοφία
ΑΣΘΕΝΗΣ	Πρηνής θέση.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Συμπίεση με τον αντίχειρα δίπλα στη σπονδυλική στήλη, από κάτω προς τα πάνω.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Κάμψη προς τα εμπρός από καθιστή θέση ή ύπτια με τα γόνατα στο στήθος.
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ., 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διακοπή της δουλειάς γραφείου κάθε ώρα.

> **Προσοχή:** Σε μούδιασμα ή αδυναμία που απλώνεται στο πόδι, ιατρική εξέταση.

33. Πολυσχιδής *Musculus multifidus*

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Ακριβώς δίπλα στις ακανθώδεις αποφύσεις, σε βάθος, σε οποιοδήποτε τμήμα της σπονδυλικής στήλης (συχνότερα στο οσφυϊκό).
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	σημειακά δίπλα στη σπονδυλική στήλη, ιερό οστό, κοιλιά (σπάνια)
ΑΣΘΕΝΗΣ	Πρηνής θέση, μαξιλάρι κάτω από την κοιλιά.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Βαθιά και αργή συμπίεση με τον αντίχειρα δίπλα στην ακανθώδη απόφυση, με λοξή κατεύθυνση προς τα μέσα.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Ύπτια θέση με τα γόνατα στο στήθος, με ελαφριά πλάγια στροφή.
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ., 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Ενεργοποίηση του βαθιού συστήματος σταθεροποίησης (ελαφρύ τράβηγμα της κοιλιάς προς τα μέσα χωρίς σφίξιμο των κοιλιακών).

34. Τετράγωνος οσφυϊκός *Musculus quadratus lumborum*

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Ανάμεσα στην τελευταία πλευρά και τη λαγόνια ακρολοφία, στο έξω χείλος του ορθωτήρα του κορμού, σε βάθος.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	λαγόνια ακρολοφία, γλουτιαία περιοχή, πλάι του ισχίου, μέση
ΑΣΘΕΝΗΣ	Πλάγια θέση με την πλευρά που δουλεύεις από πάνω, το πάνω πόδι να κρέμεται προς τα πίσω (ανοίγει ο χώρος ανάμεσα σε λεκάνη και πλευρές).
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Συμπίεση με τον αντίχειρα στο χείλος του ορθωτήρα του κορμού, προς τα μέσα, προς τη σπονδυλική στήλη. • Δύο σημεία: κάτω από την τελευταία πλευρά και πάνω από το λαγόνιο οστό.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Πλάγια κλίση όρθιος ή σε πλάγια θέση, με το πάνω χέρι πάνω από το κεφάλι.
ΔΟΣΗ	3–5 × 30–90 δλ., 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Αποφυγή στήριξης στο ένα πόδι και μεταφοράς τσάντας μόνο από τη μία πλευρά.

> **Προσοχή:** Πόνος στην περιοχή των νεφρών μαζί με πυρετό ή ουρολογικά ενοχλήματα: πρώτα ιατρική εξέταση.

35. Ορθός κοιλιακός

Musculus rectus abdominis

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Πάνω και κάτω από τον ομφαλό, 2–4 εκ. από τη μέση γραμμή.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	οριζόντια ζώνη στη μέση της πλάτης, κοιλιά, μέση
ΑΣΘΕΝΗΣ	Ύπτια θέση, μαξιλάρι κάτω από τα γόνατα.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Λαβή τσιμπίδας ή επίπεδη συμπίεση στο χείλος του μυός.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Ύπτια θέση με μαξιλάρι κάτω από τη μέση, τα χέρια πάνω από το κεφάλι.
ΔΟΣΗ	3 × 20–30 δλ., 3 × 20 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διάταση μετά από υπερβολική προπόνηση κοιλιακών.

> **Προσοχή:** Κοιλιακός πόνος με πυρετό, εμετό ή αλλαγή στα κόπρανα ή στα ούρα: ιατρική εξέταση, χωρίς εφαρμογή.

36. Έξω λοξός κοιλιακός

Musculus obliquus externus abdominis

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στο πλάι της κοιλιάς, κάτω από το πλευρικό τόξο και πάνω από τη λαγόνια ακρολοφία.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	πλάι της κοιλιάς, μέση, κάτω θώρακας
ΑΣΘΕΝΗΣ	Ύπτια ή πλάγια θέση.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Επίπεδη συμπίεση με τις άκρες των δαχτύλων κάτω από το πλευρικό τόξο. • Λαβή τσιμπίδας στο πλάι της κοιλιάς.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Ύπτια θέση με τα γόνατα να πέφτουν προς την αντίθετη πλευρά, οι ώμοι στο έδαφος.
ΔΟΣΗ	3 × 20–30 δλ., 3 × 20 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Σταδιακή αύξηση του φορτίου στις κινήσεις στροφής.

> **Προσοχή:** Σε κοιλιακά ενοχλήματα, πρώτα αποκλείονται αιτίες από τα εσωτερικά όργανα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Λεκάνη, ισχίο και γλουτός

10 μύες, με τη σειρά του άτλαντα.

37. Μέγας γλουτιαίος

Musculus gluteus maximus

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στο κάτω έσω τμήμα της γλουτιαίας περιοχής, δίπλα στο ιερό οστό και πάνω από το ισχιακό κύρτωμα.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	γλουτιαία περιοχή, ιερό οστό, γύρω από τον κόκκυγα
ΑΣΘΕΝΗΣ	Πρηνής ή πλάγια θέση.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Συμπίεση με τον αγκώνα ή τον αντίχειρα δίπλα στο ιερό οστό και πάνω από το ισχιακό κύρτωμα.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Ύπτια θέση, το γόνατο τραβιέται προς τον αντίθετο ώμο.
ΔΟΣΗ	3–5 × 30–90 δλ., 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διακοπή του πολύωρου καθίσματος· μαξιλαράκι σε σκληρή καρέκλα.

38. Μέσος γλουτιαίος

Musculus gluteus medius

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	2–5 εκ. κάτω από τη λαγόνια ακρολοφία, στο άνω έξω τμήμα της γλουτιαίας περιοχής.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	χαμηλή μέση, ιερό οστό, πλάι του ισχίου, γλουτιαία περιοχή
ΑΣΘΕΝΗΣ	Πλάγια θέση με την πλευρά που δουλεύεις από πάνω.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Συμπίεση με τον αντίχειρα κάτω από τη λαγόνια ακρολοφία, από μπροστά προς τα πίσω.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Σε πλάγια θέση το πάνω πόδι κρέμεται από την άκρη του κρεβατιού πίσω από τον κορμό· ή όρθιος με σταυρωμένα πόδια, πλάγια κλίση.
ΔΟΣΗ	3–5 × 30–90 δλ., 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Αποφυγή στήριξης στο ένα πόδι και σταυροπόδι· ενδυνάμωση των απαγωγών του ισχίου.

39. Μικρός γλουτιαίος

Musculus gluteus minimus

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Βαθιά κάτω από τον μέσο γλουτιαίο, ανάμεσα στη λαγόνια ακρολοφία και τον μείζονα τροχαντήρα.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	έξω πλευρά του μηρού, έξω πλευρά του ποδιού (κνήμη), πίσω μηρός, ποδοκνημική
ΑΣΘΕΝΗΣ	Πλάγια θέση με την πλευρά που δουλεύεις από πάνω, το πάνω γόνατο στηριγμένο.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Βαθιά, αργή συμπίεση με τον αντίχειρα ή τον αγκώνα πάνω και μπροστά από τον μείζονα τροχαντήρα.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Ύπτια θέση, το πόδι σταυρώνει προς την αντίθετη πλευρά.
ΔΟΣΗ	3–5 × 30–90 δλ., 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διακοπή των μακρινών διαδρομών με αυτοκίνητο και του πολύωρου καθίσματος.

> **Προσοχή:** Η κατανομή του πόνου θυμίζει ισχιαλγία: αν υπάρχει μούδιασμα, αδυναμία ή αλλαγή αντανακλαστικών, ιατρική εξέταση για να αποκλειστεί αιτία από νευρική ρίζα.

40. Απιοειδής

Musculus piriformis

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στο μεσαίο και έξω τριτημόριο της γραμμής ανάμεσα στο έξω χείλος του ιερού οστού και την κορυφή του μείζονος τροχαντήρα.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	γλουτιαία περιοχή, ιερό οστό, πίσω μηρός, πίσω από την άρθρωση του ισχίου
ΑΣΘΕΝΗΣ	Πρηνής θέση ή πλάγια με το πάνω γόνατο λυγισμένο.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Βαθιά συμπίεση με τον αντίχειρα ή τον αγκώνα στη γραμμή ανάμεσα σε ιερό οστό και μείζονα τροχαντήρα.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Ύπτια θέση, ο αστράγαλος του ποδιού που δουλεύεις πάνω στο άλλο γόνατο, ο άλλος μηρός τραβηγμένος στο στήθος (διάταση «4»).
ΔΟΣΗ	3–5 × 30–90 δλ., 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Όχι κάθισμα πάνω στο πορτοφόλι· αποφυγή σταυροποδιού.

> **Προσοχή:** Κοντά περνά το ισχιακό νεύρο: αν εμφανιστεί μούδιασμα, μείωσε την πίεση· σε επίμονο μούδιασμα στο πόδι, γιατρός.

41. Λαγονοψοΐτης

Musculus iliopsoas

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στο μπροστινό μέρος του μηρού κάτω από τον βουβωνικό σύνδεσμο (έξω από τη μηριαία αρτηρία) και στην κοιλιά, στην έσω επιφάνεια του λαγόνιου οστού.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	μέση δίπλα στη σπονδυλική στήλη, ιερό οστό, μπροστινός μηρός
ΑΣΘΕΝΗΣ	Ύπτια θέση, τα γόνατα λυγισμένα για να χαλαρώσει το κοιλιακό τοίχωμα.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Στην εκπνοή, αργή επίπεδη πίεση με τις άκρες των δαχτύλων από την κοιλιά προς την έσω επιφάνεια του λαγόνιου οστού. • Στον μηρό, κάτω από τον βουβωνικό σύνδεσμο, έξω από την αρτηρία.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Θέση προβολής (lunge): το πίσω γόνατο στο έδαφος, η λεκάνη σπρώχνεται μπροστά.
ΔΟΣΗ	2–3 × 20–30 δλ., 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διάταση σε θέση προβολής μετά από πολύωρο κάθισμα.

> **Προσοχή:** Κοντά περνά η αρτηρία (πάλλεται): ποτέ μην πιέζεις πάνω της. Σε κοιλιακά ενοχλήματα και στην εγκυμοσύνη μη δουλεύεις το κοιλιακό τμήμα.

42. Τείνων την πλατεία περιτονία

Musculus tensor fasciae latae

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στο πρόσθιο έξω μέρος του ισχίου, κάτω από την πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	έξω πλευρά του μηρού, έξω πλευρά του γονάτου
ΑΣΘΕΝΗΣ	Ύπτια ή πλάγια θέση.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Συμπίεση με τον αντίχειρα κάτω και έξω από την πρόσθια προεξοχή του λαγόνιου οστού.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Σε πλάγια θέση το πάνω πόδι τεντωμένο, να κρέμεται προς τα πίσω και κάτω.
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ., 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Στο κάθισμα να μη λυγίζουν υπερβολικά οι μηροί.

43. Μακρός και βραχύς προσαγωγός

Musculus adductor longus

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στην έσω πλευρά του μηρού, στο άνω τριτημόριο.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	βουβώνας, έσω πλευρά του μηρού, έσω πλευρά του γονάτου
ΑΣΘΕΝΗΣ	Ύπτια θέση, το γόνατο λυγισμένο και ανοιχτό στο πλάι.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Λαβή τσιμπίδας στη γαστέρα του μυός. • Επίπεδη συμπίεση στην έσω πλευρά του μηρού.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Καθιστή θέση με ενωμένα πέλματα (πεταλούδα), τα γόνατα να πέφτουν προς τα κάτω.
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ., 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Ζέσταμα πριν από απότομες πλάγιες κινήσεις.

44. Μεγάλος προσαγωγός

Musculus adductor magnus

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στην έσω οπίσθια πλευρά του μηρού, στο μεσαίο τριτημόριο και κοντά στο ισχιακό κύρτωμα.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	βουβώνας, έσω πλευρά του μηρού, βαθιά στη λεκάνη
ΑΣΘΕΝΗΣ	Ύπτια θέση με το γόνατο λυγισμένο και ανοιχτό στο πλάι, ή πλάγια θέση.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Επίπεδη συμπίεση στην έσω οπίσθια πλευρά του μηρού.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Καθιστή θέση με ανοιχτά πόδια, κάμψη προς τα εμπρός.
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ., 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Σταδιακή αύξηση του φορτίου, ζέσταμα.

> **Προσοχή:** Σε ενοχλήσεις της ελάσσονος πυέλου ή γυναικολογικά ενοχλήματα, πρώτα ιατρική εξέταση.

45. Κτενιαίος

Musculus pectineus

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στην πρόσθια έσω πλευρά του μηρού, κάτω από τη βουβωνική πτυχή, μέσα από τη μηριαία αρτηρία.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	βαθιά στον βουβώνα, πρόσθια έσω πλευρά του μηρού
ΑΣΘΕΝΗΣ	Ύπτια θέση, το πόδι σε ελαφριά απαγωγή και έξω στροφή.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Αργή επίπεδη πίεση με τις άκρες των δαχτύλων κάτω από τη βουβωνική πτυχή, μέσα από την αρτηρία.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Το πόδι σε απαγωγή και τεντωμένο, ελαφρά προς τα πίσω.
ΔΟΣΗ	2–3 × 20–30 δλ., 3 × 20 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Στο κάθισμα να μη σφίγγονται οι μηροί μεταξύ τους.

> **Προσοχή:** Κοντά βρίσκονται αρτηρία, φλέβα και βουβωνικοί λεμφαδένες: δούλευε απαλά και ποτέ μην πιέζεις περιοχή που πάλλεται.

46. Ραπτικός

Musculus sartorius

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Λοξά στο μπροστινό μέρος του μηρού, από την πρόσθια προεξοχή του λαγόνιου οστού ως την έσω πλευρά του γονάτου, επιφανειακά.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	μπροστινός μηρός (κάψιμο, τσίμπημα), έσω πλευρά του γονάτου
ΑΣΘΕΝΗΣ	Ύπτια θέση.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Λαβή τσιμπίδας στη λεπτή μυϊκή ταινία, από πάνω προς τα κάτω.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Το ισχίο σε έκταση, με ελαφριά έσω στροφή (θέση προβολής).
ΔΟΣΗ	3 × 20–30 δλ., 3 × 20 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Αποφυγή του πολύωρου οκλαδόν καθίσματος.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

Μηρός, κνήμη και άκρο πόδι

14 μύες, με τη σειρά του άτλαντα.

47. Ορθός μηριαίος

Musculus rectus femoris

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στο μπροστινό μέρος του μηρού, ακριβώς κάτω από το ισχίο, κοντά στην πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	μπροστινό μέρος του γονάτου, γύρω από την επιγονατίδα
ΑΣΘΕΝΗΣ	Ύπτια θέση.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Επίπεδη συμπίεση ή λαβή τσιμπίδας στο άνω πρόσθιο τμήμα του μηρού.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Πρηνής ή όρθια θέση, η φτέρνα τραβιέται προς τον γλουτό, το ισχίο σε έκταση.
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ., 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Σταδιακή αύξηση του φορτίου στις σκάλες και στα καθίσματα (squat).

48. Έσω πλατύς

Musculus vastus medialis

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στην πρόσθια έσω πλευρά του μηρού, 5–10 εκ. πάνω από το γόνατο.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	έσω πλευρά του γονάτου, μπροστινό μέρος του γονάτου
ΑΣΘΕΝΗΣ	Ύπτια θέση, ένα μικρό μαξιλάρι κάτω από το γόνατο.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Επίπεδη συμπίεση με τον αντίχειρα πάνω από το γόνατο, στην έσω πλευρά.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Το γόνατο πλήρως λυγισμένο (η φτέρνα στον γλουτό).
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ., 3 × 20 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Ενδυνάμωση: από καθιστή θέση τέντωμα του γονάτου και κράτημα.

49. Έξω πλατύς

Musculus vastus lateralis

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στην έξω πλευρά του μηρού, σε διάφορα σημεία ανάμεσα σε ισχίο και γόνατο.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	έξω πλευρά του μηρού, έξω πλευρά του γονάτου, πίσω από την επιγονατίδα
ΑΣΘΕΝΗΣ	Πλάγια θέση με την πλευρά που δουλεύεις από πάνω.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Συμπίεση με τον αγκώνα ή τον αντίχειρα στην έξω πλευρά του μηρού, από κάτω προς τα πάνω.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Το γόνατο πλήρως λυγισμένο, το πόδι σε ελαφριά έσω στροφή.
ΔΟΣΗ	3–5 × 30–90 δλ., 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Όχι πλάγιο ξάπλωμα πάνω στην πλευρά που πονάει.

50. Δικέφαλος μηριαίος

Musculus biceps femoris

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στην οπίσθια έξω πλευρά του μηρού, στο μεσαίο και κάτω τριτημόριο.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	ιγνυακός βόθρος, πίσω μηρός
ΑΣΘΕΝΗΣ	Πρηνής θέση, μαξιλάρι κάτω από τον αστράγαλο.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Λαβή τσιμπίδας ή συμπίεση με τον αντίχειρα στην οπίσθια έξω πλευρά του μηρού.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Ύπτια θέση, σήκωμα του τεντωμένου ποδιού με τον αστράγαλο σε ραχιαία κάμψη.
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ., 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Στο πολύωρο κάθισμα η άκρη της καρέκλας να μην πιέζει τον μηρό.

51. Ημιτενοντώδης και ημιυμενώδης

Mm. semitendinosus et semimembranosus

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στην οπίσθια έσω πλευρά του μηρού, στο μεσαίο και κάτω τριτημόριο.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	κάτω γλουτιαία περιοχή, πίσω μηρός, έσω πλευρά του ιγνυακού βόθρου
ΑΣΘΕΝΗΣ	Πρηνής θέση.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Λαβή τσιμπίδας στην οπίσθια έσω πλευρά του μηρού.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Ύπτια θέση, σήκωμα του τεντωμένου ποδιού, ελαφρά προς τα πλάγια.
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ., 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Ζέσταμα πριν από το τρέξιμο.

52. Γαστροκνήμιος

Musculus gastrocnemius

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στο άνω μέρος της γάμπας, στην έσω και έξω κεφαλή, κάτω από τον ιγνυακό βόθρο.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	καμάρα του ποδιού, γάμπα, ιγνυακός βόθρος
ΑΣΘΕΝΗΣ	Πρηνής θέση, μαξιλάρι κάτω από τον αστράγαλο.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Λαβή τσιμπίδας ή συμπίεση με τον αντίχειρα και στις δύο κεφαλές.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Όρθιος μπροστά σε τοίχο, το πίσω πόδι τεντωμένο, η φτέρνα στο έδαφος.
ΔΟΣΗ	3–5 × 30–90 δλ., 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Σε νυχτερινές κράμπες, βραδινή διάταση· επαρκή υγρά.

Προσοχή: Μονόπλευρο οίδημα, τοπική θερμότητα ή κοκκίνισμα στη γάμπα (υποψία θρόμβωσης): χωρίς μασάζ, αμέσως στον γιατρό.

53. Υποκνημίδιος

Musculus soleus

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στο κάτω μέρος της γάμπας, βαθιά κάτω από τον γαστροκνήμιο, πάνω από τον αχίλλειο τένοντα.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	πτέρνα, γάμπα, ιερό οστό (σπάνια)
ΑΣΘΕΝΗΣ	Πρηνής θέση, το γόνατο λυγισμένο στις 90°.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Επίπεδη συμπίεση και από τις δύο πλευρές στο κάτω μέρος της γάμπας.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Όρθιος μπροστά σε τοίχο, το πίσω γόνατο ελαφρά λυγισμένο, η φτέρνα στο έδαφος.
ΔΟΣΗ	3–5 × 30–90 δλ., 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Αποφυγή ψηλοτάκουνων παπουτσιών.

Προσοχή: Σε μονόπλευρο οίδημα ή τοπική θερμότητα στη γάμπα, χωρίς εφαρμογή: στον γιατρό για να αποκλειστεί θρόμβωση.

54. Πρόσθιος κνημιαίος

Musculus tibialis anterior

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Ακριβώς έξω από την κνήμη, στο άνω τριτημόριο της κνήμης.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	μπροστινό μέρος της ποδοκνημικής, μεγάλο δάχτυλο του ποδιού
ΑΣΘΕΝΗΣ	Ύπτια θέση.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Συμπίεση με τον αντίχειρα στη γαστέρα του μυός, δίπλα στην κνήμη.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Ο αστράγαλος και τα δάχτυλα σε πελματιαία κάμψη (καθιστή θέση με τη ράχη του ποδιού από κάτω).
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ., 3 × 20–30 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Σταδιακή αύξηση του φορτίου στο τρέξιμο· λιγότερο τρέξιμο σε σκληρή επιφάνεια.

> **Προσοχή:** Σε έντονο πόνο στην κνήμη που αυξάνεται με το φορτίο (υποψία κατάγματος κόπωσης), ιατρική εξέταση.

55. Μακρός περονιαίος

Musculus fibularis longus

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στην έξω πλευρά της κνήμης, στο άνω τριτημόριο, 2–4 εκ. κάτω από την κεφαλή της περόνης.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	έξω σφυρό, έξω πλευρά του ποδιού
ΑΣΘΕΝΗΣ	Πλάγια θέση με την πλευρά που δουλεύεις από πάνω.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Συμπίεση με τον αντίχειρα στην έξω πλευρά της κνήμης.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Το πόδι στραμμένο προς τα μέσα και σε πελματιαία κάμψη.
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ., 3 × 20 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Ασκήσεις σταθεροποίησης του αστραγάλου στο ένα πόδι.

> **Προσοχή:** Πίσω από την κεφαλή της περόνης περνά το περονιαίο νεύρο: μην πιέζεις εκεί.

56. Οπίσθιος κνημιαίος

Musculus tibialis posterior

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Βαθιά στη γάμπα, πίσω από το έσω οπίσθιο χείλος της κνήμης.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	αχίλλειος τένοντας, πτέρνα, πέλμα
ΑΣΘΕΝΗΣ	Πρηνής θέση, το γόνατο λυγισμένο.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Βαθιά, αργή συμπίεση πίσω από το έσω οπίσθιο χείλος της κνήμης.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Το πόδι στραμμένο προς τα έξω και σε ραχιαία κάμψη.
ΔΟΣΗ	2–3 × 30–60 δλ., 3 × 20 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Κατάλληλη στήριξη της καμάρας· σε πλατυποδία, ειδικός.

57. Μακρός εκτείνων τους δακτύλους

Musculus extensor digitorum longus

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στην πρόσθια έξω πλευρά της κνήμης, έξω από τον πρόσθιο κνημιαίο, στο άνω τριτημόριο.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	ράχη του ποδιού, μεσαία δάχτυλα του ποδιού
ΑΣΘΕΝΗΣ	Ύπτια θέση.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Συμπίεση με τον αντίχειρα στην πρόσθια έξω πλευρά της κνήμης.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Τα δάχτυλα και ο αστράγαλος σε πελματιαία κάμψη.
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ., 3 × 20 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Αποφυγή στενών παπουτσιών.

58. Βραχύς καμπτήρας των δακτύλων

Musculus flexor digitorum brevis

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στη μέση του πέλματος, μπροστά από την πτέρνα.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	μέση του πέλματος, βάση των δαχτύλων του ποδιού
ΑΣΘΕΝΗΣ	Πρηνής θέση, το πόδι έξω από την άκρη του κρεβατιού.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Συμπίεση με τον αντίχειρα στη μέση του πέλματος. • Αργές επαλείψεις με μπαλάκι ή με την άρθρωση του δαχτύλου.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Τα δάχτυλα του ποδιού τραβηγμένα προς τα πάνω, ο αστράγαλος σε ραχιαία κάμψη.
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ., 3 × 20 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Κατάλληλα παπούτσια· μασάζ του πέλματος με μπαλάκι.

> **Προσοχή:** Σε οξύ πόνο στην πτέρνα στα πρώτα βήματα το πρωί (πελματιαία απονευρωσίτιδα), γιατρός ή ειδικός.

59. Απαγωγός του μεγάλου δακτύλου

Musculus abductor hallucis

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στο έσω χείλος του πέλματος, ανάμεσα στην πτέρνα και τη βάση του μεγάλου δαχτύλου.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	έσω πλευρά της πτέρνας, έσω χείλος της καμάρας
ΑΣΘΕΝΗΣ	Πλάγια θέση με την έσω πλευρά του ποδιού που δουλεύεις από πάνω.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Συμπίεση με τον αντίχειρα στο έσω χείλος του πέλματος.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Το μεγάλο δάχτυλο τραβηγμένο προς τα μέσα (προς τα άλλα δάχτυλα), ο αστράγαλος σε ραχιαία κάμψη.
ΔΟΣΗ	3 × 30–60 δλ., 3 × 20 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Παπούτσια με πιο φαρδιά μύτη· ενδυνάμωση του μεγάλου δαχτύλου.

60. Τετράγωνος πελματιαίος

Musculus quadratus plantae

ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ	Στο πίσω μέρος του πέλματος, σε βάθος, ακριβώς μπροστά από την πτέρνα.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ	πελματιαία πλευρά της πτέρνας
ΑΣΘΕΝΗΣ	Πρηνής θέση, το πόδι έξω από την άκρη του κρεβατιού.
ΤΕΧΝΙΚΗ	• Βαθιά, αργή συμπίεση με τον αντίχειρα μπροστά από την πτέρνα.
ΔΙΑΤΑΣΗ	Τα δάχτυλα και ο αστράγαλος σε ραχιαία κάμψη.
ΔΟΣΗ	2–3 × 30–60 δλ., 3 × 20 δλ. διάταση.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ	Μασάζ του πέλματος με μπαλάκι, άνετα παπούτσια.

Προσοχή: Σε οίδημα, μούδιασμα ή νυχτερινό πόνο στην πτέρνα, ιατρική εξέταση.

Επόμενο βήμα

Σήμερα: διάβασε τις γενικές αρχές. **Αύριο:** στον επόμενο ασθενή με πόνο στον αυχένα ή στον ώμο, ακολούθησε το πρωτόκολλο του τραπεζοειδούς και του ανελκτήρα της ωμοπλάτης και σημείωσε τι βρήκες.