ΤΟ ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΚΑΙ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ™

Οδηγός Διατάσεων ανά Περιοχή του Σώματος

Οι διατάσεις και των 60 μυών σε ένα σημείο, ανά περιοχή του σώματος, με την ίδια σειρά που έχουν ο άτλαντας και τα πρωτόκολλα.

Περιεχόμενα

1 · Πώς κάνεις διάταση

2 · Κεφαλή, πρόσωπο και αυχένας

3 · Ώμος, βραχίονας, αντιβράχιο και άκρα χείρα

4 · Πλάτη, σπονδυλική στήλη και κορμός

5 · Λεκάνη, ισχίο και γλουτός

6 · Μηρός, κνήμη και άκρο πόδι

Επόμενο βήμα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Πώς κάνεις διάταση

Τρεις κανόνες για κάθε διάταση.

Κανόνες

- [ ] Μπες στη διάταση αργά, στην εκπνοή και χωρίς αναπηδήσεις.
- [ ] Πρέπει να νιώθεις ελαφρύ τέντωμα, ποτέ πόνο: αν πονάει, χαλάρωσε.
- [ ] Κράτα 20–30 δευτερόλεπτα, 3 επαναλήψεις· μετά την εφαρμογή κάνε πάντα διάταση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Κεφαλή, πρόσωπο και αυχένας

Για τον θεραπευτή και τον ασθενή.

Τραπεζοειδής – άνω ίνες

Το κεφάλι γέρνει προς την αντίθετη πλευρά με ελαφριά κάμψη· σε καθιστή θέση ο ασθενής κρατιέται με το χέρι της ίδιας πλευράς από κάτω από την καρέκλα.

3 × 20–30 δλ.

Στερνοκλειδομαστοειδής (ΣΚΜ)

Το κεφάλι γέρνει προς την αντίθετη πλευρά και μετά το πηγούνι στρέφεται αργά προς την πλευρά που δουλεύεις· ελαφριά έκταση μόνο αν δεν προκαλεί ζάλη.

3 × 20–30 δλ.

Μασητήρας

Αργό άνοιγμα του στόματος με την άκρη της γλώσσας στον ουρανίσκο· δύο δάχτυλα του θεραπευτή οδηγούν απαλά τη γνάθο προς τα κάτω.

3 × 20–30 δλ.

Κροταφίτης

Αργό άνοιγμα του στόματος ενώ τα δάχτυλα του θεραπευτή γλιστρούν προς τα πάνω στον κρόταφο.

3 × 20–30 δλ.

Έξω πτερυγοειδής

Αργή ανάσυρση της κάτω γνάθου (ο ασθενής τραβάει ελαφρά το πηγούνι προς τα πίσω) και μετά αργό κλείσιμο του στόματος.

3 × 20–30 δλ.

Έσω πτερυγοειδής

Αργό άνοιγμα του στόματος με τη γνάθο ελαφρά μετατοπισμένη προς την αντίθετη πλευρά.

3 × 20–30 δλ.

Σπληνοειδής κεφαλής

Το κεφάλι σε κάμψη και στραμμένο προς την αντίθετη πλευρά.

3 × 20–30 δλ.

Σπληνοειδής τραχήλου

Το κεφάλι σε κάμψη, με πλάγια κλίση και στροφή προς την αντίθετη πλευρά.

3 × 20–30 δλ.

Υπινιακοί μύες

Ανάσυρση του πηγουνιού (το κεφάλι γλιστράει ευθεία προς τα πίσω) και μετά ελαφρύ «νεύμα» προς τα εμπρός.

3 × 20–30 δλ.

Ημιακανθώδης κεφαλής

Το κεφάλι σε κάμψη με ελαφριά πλάγια στροφή.

3 × 20–30 δλ.

Ανελκτήρας της ωμοπλάτης

Το κεφάλι σε κάμψη και στραμμένο προς την αντίθετη πλευρά (η μύτη προς τη μασχάλη), το χέρι της πλευράς που δουλεύεις στον σβέρκο.

3 × 20–30 δλ.

Σκαληνοί μύες

Το κεφάλι γέρνει προς την αντίθετη πλευρά με ελαφριά έκταση· ο θεραπευτής σταθεροποιεί την κλείδα της πλευράς που δουλεύει προς τα κάτω.

3 × 20–30 δλ.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Ώμος, βραχίονας, αντιβράχιο και άκρα χείρα

Για τον θεραπευτή και τον ασθενή.

Υπακάνθιος

Το χέρι της πλευράς που δουλεύεις περνά μπροστά από το στήθος και το άλλο χέρι τραβάει τον αγκώνα προς το στήθος· ή το χέρι πίσω στην πλάτη.

3 × 20–30 δλ.

Υπερακάνθιος

Το χέρι της πλευράς που δουλεύεις πίσω στην πλάτη, το άλλο χέρι τραβάει απαλά τον καρπό προς την αντίθετη πλευρά.

3 × 20–30 δλ.

Ελάσσων στρογγύλος

Το χέρι περνά μπροστά από το στήθος, ο αγκώνας τραβιέται προς το στήθος.

3 × 20–30 δλ.

Υποπλάτιος

Το χέρι σε έξω στροφή, ο αγκώνας στις 90°, η παλάμη πηγαίνει απαλά προς τα πίσω (στην κάσα της πόρτας).

3 × 20–30 δλ.

Δελτοειδής

Πρόσθιες ίνες: το χέρι προς τα πίσω· οπίσθιες ίνες: το χέρι περνά μπροστά από το στήθος.

3 × 20–30 δλ.

Μείζων θωρακικός

Διάταση στην πόρτα: το αντιβράχιο στην κάσα, ο αγκώνας στο ύψος του ώμου, ο κορμός κάνει αργά ένα βήμα μπροστά.

3 × 20–30 δλ.

Ελάσσων θωρακικός

Οι ώμοι πίσω και κάτω· στην κάσα της πόρτας ο αγκώνας πάνω από το ύψος του ώμου.

3 × 20–30 δλ.

Ρομβοειδείς μύες

Τα χέρια σταυρώνουν μπροστά (αγκαλιά στον εαυτό), η πλάτη καμπουριάζει ελαφρά.

3 × 20–30 δλ.

Πρόσθιος οδοντωτός

Το χέρι προς τα πίσω και η ωμοπλάτη τραβηγμένη προς τη σπονδυλική στήλη· με βαθιά εισπνοή.

3 × 20–30 δλ.

Πλατύς ραχιαίος

Το χέρι πάνω από το κεφάλι, ο κορμός σε πλάγια κλίση προς την αντίθετη πλευρά.

3 × 20–30 δλ.

Δικέφαλος βραχιόνιος

Ο αγκώνας τεντωμένος, το αντιβράχιο σε πρηνισμό, το χέρι προς τα πίσω.

3 × 20–30 δλ.

Τρικέφαλος βραχιόνιος

Το χέρι πάνω από το κεφάλι, ο αγκώνας πλήρως λυγισμένος, το άλλο χέρι τον σπρώχνει απαλά προς τα πίσω.

3 × 20–30 δλ.

Εκτείνοντες του αντιβραχίου (ECRL, ECRB, εκτείνων τους δακτύλους)

Ο αγκώνας τεντωμένος, ο καρπός και τα δάχτυλα σε κάμψη, το άλλο χέρι τραβάει απαλά προς τα κάτω.

3 × 20–30 δλ.

Καμπτήρες του αντιβραχίου

Ο αγκώνας τεντωμένος, η παλάμη προς τα πάνω, τα δάχτυλα τραβηγμένα προς τα πίσω.

3 × 20–30 δλ.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Πλάτη, σπονδυλική στήλη και κορμός

Για τον θεραπευτή και τον ασθενή.

Τραπεζοειδής – μέσες ίνες

Τα χέρια σταυρώνουν μπροστά, η πλάτη καμπουριάζει.

3 × 20–30 δλ.

Τραπεζοειδής – κάτω ίνες

Τα χέρια μπροστά και πάνω, η πλάτη καμπουριασμένη.

3 × 20–30 δλ.

Άνω οπίσθιος οδοντωτός

Το χέρι σταυρωμένο μπροστά, η πλάτη καμπουριασμένη.

3 × 20–30 δλ.

Θωρακικός λαγονοπλευρικός

Από καθιστή θέση κάμψη προς τα εμπρός, με τον κορμό ελαφρά στραμμένο προς την αντίθετη πλευρά.

3 × 20–30 δλ.

Οσφυϊκός λαγονοπλευρικός

Ύπτια θέση με τα γόνατα τραβηγμένα στο στήθος.

3 × 20–30 δλ.

Επιμήκης θωρακικός

Κάμψη προς τα εμπρός από καθιστή θέση ή ύπτια με τα γόνατα στο στήθος.

3 × 20–30 δλ.

Πολυσχιδής

Ύπτια θέση με τα γόνατα στο στήθος, με ελαφριά πλάγια στροφή.

3 × 20–30 δλ.

Τετράγωνος οσφυϊκός

Πλάγια κλίση όρθιος ή σε πλάγια θέση, με το πάνω χέρι πάνω από το κεφάλι.

3 × 20–30 δλ.

Ορθός κοιλιακός

Ύπτια θέση με μαξιλάρι κάτω από τη μέση, τα χέρια πάνω από το κεφάλι.

3 × 20–30 δλ.

Έξω λοξός κοιλιακός

Ύπτια θέση με τα γόνατα να πέφτουν προς την αντίθετη πλευρά, οι ώμοι στο έδαφος.

3 × 20–30 δλ.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Λεκάνη, ισχίο και γλουτός

Για τον θεραπευτή και τον ασθενή.

Μέγας γλουτιαίος

Ύπτια θέση, το γόνατο τραβιέται προς τον αντίθετο ώμο.

3 × 20–30 δλ.

Μέσος γλουτιαίος

Σε πλάγια θέση το πάνω πόδι κρέμεται από την άκρη του κρεβατιού πίσω από τον κορμό· ή όρθιος με σταυρωμένα πόδια, πλάγια κλίση.

3 × 20–30 δλ.

Μικρός γλουτιαίος

Ύπτια θέση, το πόδι σταυρώνει προς την αντίθετη πλευρά.

3 × 20–30 δλ.

Απιοειδής

Ύπτια θέση, ο αστράγαλος του ποδιού που δουλεύεις πάνω στο άλλο γόνατο, ο άλλος μηρός τραβηγμένος στο στήθος (διάταση «4»).

3 × 20–30 δλ.

Λαγονοψοΐτης

Θέση προβολής (lunge): το πίσω γόνατο στο έδαφος, η λεκάνη σπρώχνεται μπροστά.

3 × 20–30 δλ.

Τείνων την πλατεία περιτονία

Σε πλάγια θέση το πάνω πόδι τεντωμένο, να κρέμεται προς τα πίσω και κάτω.

3 × 20–30 δλ.

Μακρός και βραχύς προσαγωγός

Καθιστή θέση με ενωμένα πέλματα (πεταλούδα), τα γόνατα να πέφτουν προς τα κάτω.

3 × 20–30 δλ.

Μεγάλος προσαγωγός

Καθιστή θέση με ανοιχτά πόδια, κάμψη προς τα εμπρός.

3 × 20–30 δλ.

Κτενιαίος

Το πόδι σε απαγωγή και τεντωμένο, ελαφρά προς τα πίσω.

3 × 20–30 δλ.

Ραπτικός

Το ισχίο σε έκταση, με ελαφριά έσω στροφή (θέση προβολής).

3 × 20–30 δλ.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

Μηρός, κνήμη και άκρο πόδι

Για τον θεραπευτή και τον ασθενή.

Ορθός μηριαίος

Πρηνής ή όρθια θέση, η φτέρνα τραβιέται προς τον γλουτό, το ισχίο σε έκταση.

3 × 20–30 δλ.

Έσω πλατύς

Το γόνατο πλήρως λυγισμένο (η φτέρνα στον γλουτό).

3 × 20–30 δλ.

Έξω πλατύς

Το γόνατο πλήρως λυγισμένο, το πόδι σε ελαφριά έσω στροφή.

3 × 20–30 δλ.

Δικέφαλος μηριαίος

Ύπτια θέση, σήκωμα του τεντωμένου ποδιού με τον αστράγαλο σε ραχιαία κάμψη.

3 × 20–30 δλ.

Ημιτενοντώδης και ημιυμενώδης

Ύπτια θέση, σήκωμα του τεντωμένου ποδιού, ελαφρά προς τα πλάγια.

3 × 20–30 δλ.

Γαστροκνήμιος

Όρθιος μπροστά σε τοίχο, το πίσω πόδι τεντωμένο, η φτέρνα στο έδαφος.

3 × 20–30 δλ.

Υποκνημίδιος

Όρθιος μπροστά σε τοίχο, το πίσω γόνατο ελαφρά λυγισμένο, η φτέρνα στο έδαφος.

3 × 20–30 δλ.

Πρόσθιος κνημιαίος

Ο αστράγαλος και τα δάχτυλα σε πελματιαία κάμψη (καθιστή θέση με τη ράχη του ποδιού από κάτω).

3 × 20–30 δλ.

Μακρός περονιαίος

Το πόδι στραμμένο προς τα μέσα και σε πελματιαία κάμψη.

3 × 20–30 δλ.

Οπίσθιος κνημιαίος

Το πόδι στραμμένο προς τα έξω και σε ραχιαία κάμψη.

3 × 20–30 δλ.

Μακρός εκτείνων τους δακτύλους

Τα δάχτυλα και ο αστράγαλος σε πελματιαία κάμψη.

3 × 20–30 δλ.

Βραχύς καμπτήρας των δακτύλων

Τα δάχτυλα του ποδιού τραβηγμένα προς τα πάνω, ο αστράγαλος σε ραχιαία κάμψη.

3 × 20–30 δλ.

Απαγωγός του μεγάλου δακτύλου

Το μεγάλο δάχτυλο τραβηγμένο προς τα μέσα (προς τα άλλα δάχτυλα), ο αστράγαλος σε ραχιαία κάμψη.

3 × 20–30 δλ.

Τετράγωνος πελματιαίος

Τα δάχτυλα και ο αστράγαλος σε ραχιαία κάμψη.

3 × 20–30 δλ.

Επόμενο βήμα

Σήμερα: δοκίμασε τις διατάσεις του αυχένα και του ώμου στον εαυτό σου, για να μπορείς να τις εξηγήσεις ακριβώς στον ασθενή σου.