ΤΟ ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΚΑΙ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ™

Πρωτόκολλα για τα 10 πιο Συχνά Ενοχλήματα

Τα ενοχλήματα με τα οποία έρχονται οι περισσότεροι ασθενείς και η σειρά μυών με την οποία αξίζει να ξεκινήσεις. Η αναλυτική τεχνική είναι στα 60 πρωτόκολλα.

Περιεχόμενα

1 · Πώς χρησιμοποιείται

2 · Τα 10 ενοχλήματα

Επόμενο βήμα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Πώς χρησιμοποιείται

Ενόχλημα → μύες με σειρά → πρωτόκολλο.

1. Ρώτα τι συμβαίνει και ζήτα από τον ασθενή να δείξει πού πονάει (χρησιμοποίησε τις Φόρμες Γρήγορης Μυϊκής Αξιολόγησης).
2. Απόκλεισε όσα γράφει η ενότητα «Πρώτα αποκλείεις».
3. Αξιολόγησε τους μύες με τη σειρά που δίνεται και δούλεψε τον μυ που αναπαράγει το ενόχλημα.
4. Δώσε διάταση για το σπίτι και έλεγξε την αλλαγή στην επόμενη συνεδρία.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Τα 10 ενοχλήματα

Για καθένα: μύες με σειρά και τι πρέπει να αποκλείσεις πρώτα.

1. Κεφαλαλγία τάσεως

ΣΕΙΡΑ	ΜΥΣ	ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ
1	Τραπεζοειδής – άνω ίνες	Πάνω από τη ζώνη του ώμου, στη μέση της απόστασης ανάμεσα στον αυχένα και το ακρώμιο, στο άνω ελεύθερο χείλος.
2	Υπινιακοί μύες	Ακριβώς κάτω από το ινιακό οστό, δεξιά και αριστερά από τη μέση γραμμή, σε βάθος.
3	Στερνοκλειδομαστοειδής (ΣΚΜ)	Κατά μήκος της γαστέρας του μυός, ιδίως στη στερνική και στην κλειδική μοίρα· το πιο ευαίσθητο σημείο είναι στο μεσαίο τριτημόριο.
4	Κροταφίτης	Πάνω από το ζυγωματικό τόξο σε τέσσερις ζώνες, από μπροστά προς τα πίσω· ψηλαφάται εύκολα όταν ο ασθενής μασάει.
5	Ημιακανθώδης κεφαλής	Στον σβέρκο, 2–3 εκ. από τη μέση γραμμή, κάτω από το ινίο και στη μέση του αυχένα.

Πρώτα αποκλείεις

Αιφνίδιος, ο πιο δυνατός πονοκέφαλος της ζωής του, πυρετός και δυσκαμψία του αυχένα, διαταραχή της όρασης ή της ομιλίας, αδυναμία: αμέσως στον γιατρό.

2. Πόνος και δυσκαμψία στον αυχένα

ΣΕΙΡΑ	ΜΥΣ	ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ
1	Ανελκτήρας της ωμοπλάτης	Λίγο μέσα και πάνω από την άνω γωνία της ωμοπλάτης· στο πλάι του αυχένα, βαθιά κάτω από το άνω χείλος του τραπεζοειδούς.
2	Τραπεζοειδής – άνω ίνες	Πάνω από τη ζώνη του ώμου, στη μέση της απόστασης ανάμεσα στον αυχένα και το ακρώμιο, στο άνω ελεύθερο χείλος.

ΣΕΙΡΑ	ΜΥΣ	ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ
3	Σπληνοειδής τραχήλου	Στο κάτω μέρος του αυχένα, πάνω από την άνω γωνία της ωμοπλάτης, δίπλα στον ανελκτήρα της ωμοπλάτης.
4	Σκαληνοί μύες	Στο πλάι του αυχένα, πίσω και κάτω από τον ΣΚΜ, πάνω από την κλείδα.
5	Ημιακανθώδης κεφαλής	Στον σβέρκο, 2–3 εκ. από τη μέση γραμμή, κάτω από το ινίο και στη μέση του αυχένα.

> **Πρώτα αποκλείεις**
>
> Πόνος στον αυχένα μετά από τραυματισμό, μούδιασμα ή αδυναμία που απλώνεται στο χέρι: ιατρική εξέταση.

3. Πόνος στη γνάθο και στο πρόσωπο

ΣΕΙΡΑ	ΜΥΣ	ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ
1	Μασητήρας	Στην επιπολής στιβάδα κάτω από το ζυγωματικό τόξο και πάνω από τη γωνία της κάτω γνάθου· στη βαθιά στιβάδα μπροστά από την κροταφογναθική άρθρωση.
2	Κροταφίτης	Πάνω από το ζυγωματικό τόξο σε τέσσερις ζώνες, από μπροστά προς τα πίσω· ψηλαφάται εύκολα όταν ο ασθενής μασάει.
3	Έξω πτερυγοειδής	Βαθιά κάτω από το ζυγωματικό τόξο· ενδοστοματικά πίσω από τους πάνω γομφίους, προς τα πάνω και πίσω.
4	Έσω πτερυγοειδής	Στην έσω επιφάνεια της γωνίας της κάτω γνάθου, ψηλάφηση από κάτω· ενδοστοματικά πίσω από τον τελευταίο γομφίο.
5	Στερνοκλειδομαστοειδής (ΣΚΜ)	Κατά μήκος της γαστέρας του μυός, ιδίως στη στερνική και στην κλειδική μοίρα· το πιο ευαίσθητο σημείο είναι στο μεσαίο τριτημόριο.

> **Πρώτα αποκλείεις**
>
> Οδοντική αιτία, φλεγμονή, γνάθος που «κολλάει»: οδοντίατρος ή γναθοχειρουργός.

4. Πόνος στον ώμο όταν σηκώνει το χέρι

ΣΕΙΡΑ	ΜΥΣ	ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ
1	Υπακάνθιος	Στην οπίσθια επιφάνεια της ωμοπλάτης, κάτω από την άκανθα, στο μεσαίο και άνω τμήμα του υπακάνθιου βόθρου.
2	Υπερακάνθιος	Πάνω από την άκανθα της ωμοπλάτης, στο έσω τμήμα του υπερακάνθιου βόθρου και έξω κάτω από το ακρώμιο.
3	Υποπλάτιος	Στην πρόσθια επιφάνεια της ωμοπλάτης· τη φτάνεις από τη μασχάλη, κατά μήκος του έξω χείλους της ωμοπλάτης.
4	Δελτοειδής	Στις πρόσθιες, μέσες και οπίσθιες ίνες, 2–5 εκ. κάτω από το ακρώμιο.
5	Ελάσσων θωρακικός	Κάτω από την κορακοειδή απόφυση, πάνω από την 3η–5η πλευρά, βαθιά κάτω από τον μείζονα θωρακικό.

> **Πρώτα αποκλείεις**
>
> Αδύναμο χέρι μετά από τραυματισμό, νυχτερινός πόνος που δεν περνά: ιατρική εξέταση (στροφικό πέταλο).

5. Ενοχλήματα που μοιάζουν με «αγκώνα του τενίστα»

ΣΕΙΡΑ	ΜΥΣ	ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ
1	Εκτείνοντες του αντιβραχίου (ECRL, ECRB, εκτείνων τους δακτύλους)	Στην οπίσθια έξω επιφάνεια του αντιβραχίου, 3–6 εκ. κάτω από τον αγκώνα.
2	Τρικέφαλος βραχιόνιος	Στην πίσω πλευρά του βραχίονα, στη μακρά κεφαλή κάτω από τη μασχάλη και 4–6 εκ. πάνω από τον αγκώνα.
3	Υπερακάνθιος	Πάνω από την άκανθα της ωμοπλάτης, στο έσω τμήμα του υπερακάνθιου βόθρου και έξω κάτω από το ακρώμιο.
4	Σκαληνοί μύες	Στο πλάι του αυχένα, πίσω και κάτω από τον ΣΚΜ, πάνω από την κλείδα.

> **Πρώτα αποκλείεις**
>
> Οίδημα, τοπική θερμότητα, νυχτερινό μούδιασμα στα δάχτυλα: ιατρική εξέταση.

6. Πόνος ανάμεσα στις ωμοπλάτες

ΣΕΙΡΑ	ΜΥΣ	ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ
1	Ρομβοειδείς μύες	Ανάμεσα στο έσω χείλος της ωμοπλάτης και τη σπονδυλική στήλη, κάτω από τον τραπεζοειδή.
2	Τραπεζοειδής – μέσες ίνες	Ανάμεσα στο έσω χείλος της ωμοπλάτης και τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος της άκανθας της ωμοπλάτης, επιφανειακά.
3	Άνω οπίσθιος οδοντωτός	Κάτω από το άνω μέρος της ωμοπλάτης, δίπλα στη σπονδυλική στήλη· τον φτάνεις όταν η ωμοπλάτη τραβηχτεί στο πλάι.
4	Σκαληνοί μύες	Στο πλάι του αυχένα, πίσω και κάτω από τον ΣΚΜ, πάνω από την κλείδα.
5	Ανελκτήρας της ωμοπλάτης	Λίγο μέσα και πάνω από την άνω γωνία της ωμοπλάτης· στο πλάι του αυχένα, βαθιά κάτω από το άνω χείλος του τραπεζοειδούς.

> **Πρώτα αποκλείεις**
> Πόνος στο στήθος με την κόπωση, δύσπνοια, εφίδρωση: αμέσως στον γιατρό (καρδιά).

7. Οσφυαλγία

ΣΕΙΡΑ	ΜΥΣ	ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ
1	Τετράγωνος οσφυϊκός	Ανάμεσα στην τελευταία πλευρά και τη λαγόνια ακρολοφία, στο έξω χείλος του ορθωτήρα του κορμού, σε βάθος.
2	Οσφυϊκός λαγονοπλευρικός	Στην οσφυϊκή περιοχή, περίπου 5–7 εκ. από τη σπονδυλική στήλη, κάτω από τις κάτω πλευρές.
3	Πολυσχιδής	Ακριβώς δίπλα στις ακανθώδεις αποφύσεις, σε βάθος, σε οποιοδήποτε τμήμα της σπονδυλικής στήλης (συχνότερα στο οσφυϊκό).
4	Λαγονοψοΐτης	Στο μπροστινό μέρος του μηρού κάτω από τον βουβωνικό σύνδεσμο (έξω από τη μηριαία αρτηρία) και στην κοιλιά, στην έσω επιφάνεια του λαγόνιου οστού.
5	Μέσος γλουτιαίος	2–5 εκ. κάτω από τη λαγόνια ακρολοφία, στο άνω έξω τμήμα της γλουτιαίας περιοχής.

> **Πρώτα αποκλείεις**
>
> Μούδιασμα ή αδυναμία που απλώνεται στο πόδι, διαταραχή ούρησης ή αφόδευσης, πυρετός, απώλεια βάρους: αμέσως στον γιατρό.

8. Πόνος από τον γλουτό που απλώνεται στον μηρό

ΣΕΙΡΑ	ΜΥΣ	ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ
1	Μικρός γλουτιαίος	Βαθιά κάτω από τον μέσο γλουτιαίο, ανάμεσα στη λαγόνια ακρολοφία και τον μείζονα τροχαντήρα.
2	Απιοειδής	Στο μεσαίο και έξω τριτημόριο της γραμμής ανάμεσα στο έξω χείλος του ιερού οστού και την κορυφή του μείζονος τροχαντήρα.
3	Μέσος γλουτιαίος	2–5 εκ. κάτω από τη λαγόνια ακρολοφία, στο άνω έξω τμήμα της γλουτιαίας περιοχής.
4	Τετράγωνος οσφυϊκός	Ανάμεσα στην τελευταία πλευρά και τη λαγόνια ακρολοφία, στο έξω χείλος του ορθωτήρα του κορμού, σε βάθος.

> **Πρώτα αποκλείεις**
>
> Μούδιασμα, αδυναμία, αλλαγή αντανακλαστικών (από νευρική ρίζα): ιατρική εξέταση.

9. Πόνος στο γόνατο

ΣΕΙΡΑ	ΜΥΣ	ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ
1	Ορθός μηριαίος	Στο μπροστινό μέρος του μηρού, ακριβώς κάτω από το ισχίο, κοντά στην πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα.
2	Έσω πλατύς	Στην πρόσθια έσω πλευρά του μηρού, 5–10 εκ. πάνω από το γόνατο.
3	Έξω πλατύς	Στην έξω πλευρά του μηρού, σε διάφορα σημεία ανάμεσα σε ισχίο και γόνατο.
4	Δικέφαλος μηριαίος	Στην οπίσθια έξω πλευρά του μηρού, στο μεσαίο και κάτω τριτημόριο.
5	Μακρός και βραχύς προσαγωγός	Στην έσω πλευρά του μηρού, στο άνω τριτημόριο.

Πρώτα αποκλείεις

Οίδημα, τοπική θερμότητα, «κλείδωμα», αστάθεια, τραυματισμός: ιατρική εξέταση.

10. Πόνος στην πτέρνα και στο πέλμα

ΣΕΙΡΑ	ΜΥΣ	ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ
1	Υποκνημίδιος	Στο κάτω μέρος της γάμπας, βαθιά κάτω από τον γαστροκνήμιο, πάνω από τον αχίλλειο τένοντα.
2	Γαστροκνήμιος	Στο άνω μέρος της γάμπας, στην έσω και έξω κεφαλή, κάτω από τον ιγνυακό βόθρο.
3	Τετράγωνος πελματιαίος	Στο πίσω μέρος του πέλματος, σε βάθος, ακριβώς μπροστά από την πτέρνα.
4	Βραχύς καμπτήρας των δακτύλων	Στη μέση του πέλματος, μπροστά από την πτέρνα.
5	Απαγωγός του μεγάλου δακτύλου	Στο έσω χείλος του πέλματος, ανάμεσα στην πτέρνα και τη βάση του μεγάλου δαχτύλου.
6	Οπίσθιος κνημιαίος	Βαθιά στη γάμπα, πίσω από το έσω οπίσθιο χείλος της κνήμης.

Πρώτα αποκλείεις

Μονόπλευρο οίδημα στη γάμπα (θρόμβωση), νυχτερινός πόνος, μούδιασμα: ιατρική εξέταση.

Επόμενο βήμα

Αυτή την εβδομάδα: αναγνώρισε σε ποιο ενόχλημα ανήκουν οι επόμενοι τρεις ασθενείς σου και ακολούθησε τη σειρά.