Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ™

Πλάνα Αυτοφροντίδας 4 Εβδομάδων ανά Ενόχλημα

Για καθένα από τα 10 πιο συχνά ενοχλήματα, ένα πλάνο τεσσάρων εβδομάδων για το σπίτι που δίνεις στον ασθενή στο τέλος της συνεδρίας.

Περιεχόμενα

1 · Για τον ασθενή

2 · 10 πλάνα

Επόμενο βήμα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Για τον ασθενή

Πώς χρησιμοποιείται το πλάνο.

Σημαντικό

Αυτή τη σελίδα σού την έδωσε ο θεραπευτής σου. Δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση. Αν ο πόνος αυξηθεί ή εμφανιστεί μούδιασμα ή αδυναμία, σταμάτα την άσκηση και ενημέρωσε τον θεραπευτή ή τον γιατρό σου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

10 πλάνα

Τρεις ασκήσεις, τέσσερις εβδομάδες, μία συμβουλή για κάθε μέρα.

Κεφαλαλγία τάσεως

1. **Τραπεζοειδής – άνω ίνες:** Κάθισε ίσια, κρατήσου με το χέρι της πλευράς που πονάει από κάτω από την καρέκλα και γείρε αργά το κεφάλι προς την άλλη πλευρά μέχρι να νιώσεις ελαφρύ τέντωμα στο πλάι του αυχένα. Κράτα 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές, δύο φορές τη μέρα.

2. **Υπινιακοί μύες:** Ξάπλωσε ανάσκελα, βάλε κάτω από τον σβέρκο δύο μπαλάκια του τένις μέσα σε μια κάλτσα και ξεκουράσου πάνω τους για 2 λεπτά. Μετά τράβηξε αργά το πηγούνι προς τα πίσω 10 φορές.

3. **Κροταφίτης:** Όταν νιώθεις ότι αρχίζει πονοκέφαλος, κάνε για 1 λεπτό αργό κυκλικό μασάζ και στους δύο κροτάφους, παίρνοντας βαθιές ανάσες.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ	ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ
1η εβδομάδα · Γνωριμία	Η πρώτη άσκηση 1 φορά τη μέρα. Παρατήρησε πότε αυξάνεται ο πόνος.
2η εβδομάδα · Συνέπεια	Οι δύο πρώτες ασκήσεις 2 φορές τη μέρα και εφαρμογή της καθημερινής συμβουλής.
3η εβδομάδα · Πλήρες πρόγραμμα	Και οι τρεις ασκήσεις 2 φορές τη μέρα.
4η εβδομάδα · Διατήρηση	Και οι τρεις ασκήσεις 1 φορά τη μέρα· σημείωσε τι σε βοήθησε περισσότερο.

Κάθε μέρα

Οθόνη στο ύψος των ματιών, 1 λεπτό διάλειμμα κάθε ώρα, χαλάρωση το βράδυ.

Πόνος και δυσκαμψία στον αυχένα

1. **Ανελκτήρας της ωμοπλάτης:** Γύρνα το κεφάλι προς την άλλη πλευρά και κοίτα κάτω, προς τη μασχάλη σου. Βάλε το χέρι της πλευράς που πονάει στον σβέρκο. Κράτα 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές, δύο φορές τη μέρα.

2. **Τραπεζοειδής – άνω ίνες:** Κάθισε ίσια, κρατήσου με το χέρι της πλευράς που πονάει από κάτω από την καρέκλα και γείρε αργά το κεφάλι προς την άλλη πλευρά μέχρι να νιώσεις ελαφρύ τέντωμα στο πλάι του αυχένα. Κράτα 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές, δύο φορές τη μέρα.

3. **Σπληνοειδής τραχήλου:** Μία φορά την ώρα τράβηξε το πηγούνι ευθεία προς τα πίσω (σαν να κάνεις διπλοσάγονο) και κράτα 5 δευτερόλεπτα. 5 φορές.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ	ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ
1η εβδομάδα · Γνωριμία	Η πρώτη άσκηση 1 φορά τη μέρα. Παρατήρησε πότε αυξάνεται ο πόνος.
2η εβδομάδα · Συνέπεια	Οι δύο πρώτες ασκήσεις 2 φορές τη μέρα και εφαρμογή της καθημερινής συμβουλής.
3η εβδομάδα · Πλήρες πρόγραμμα	Και οι τρεις ασκήσεις 2 φορές τη μέρα.
4η εβδομάδα · Διατήρηση	Και οι τρεις ασκήσεις 1 φορά τη μέρα· σημείωσε τι σε βοήθησε περισσότερο.

> **Κάθε μέρα**
> Πιο χαμηλό μαξιλάρι, όχι κινητό ανάμεσα σε ώμο και αυτί.

Πόνος στη γνάθο και στο πρόσωπο

1. **Μασητήρας:** Με τις άκρες των δαχτύλων κάνε κυκλικό μασάζ για 1 λεπτό στο μάγουλο μπροστά και κάτω από τον λοβό του αυτιού. Μέσα στη μέρα πρόσεχε: αν σφίγγεις τα δόντια, χαλάρωσέ τα και άφησε τη γλώσσα να ακουμπά στον ουρανίσκο.

2. **Κροταφίτης:** Όταν νιώθεις ότι αρχίζει πονοκέφαλος, κάνε για 1 λεπτό αργό κυκλικό μασάζ και στους δύο κροτάφους, παίρνοντας βαθιές ανάσες.

3. **Έσω πτερυγοειδής:** Μερικές φορές τη μέρα έλεγξε: τα δόντια δεν ακουμπούν μεταξύ τους, τα χείλη είναι κλειστά, η γνάθος χαλαρή.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ	ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ
1η εβδομάδα · Γνωριμία	Η πρώτη άσκηση 1 φορά τη μέρα. Παρατήρησε πότε αυξάνεται ο πόνος.
2η εβδομάδα · Συνέπεια	Οι δύο πρώτες ασκήσεις 2 φορές τη μέρα και εφαρμογή της καθημερινής συμβουλής.
3η εβδομάδα · Πλήρες πρόγραμμα	Και οι τρεις ασκήσεις 2 φορές τη μέρα.
4η εβδομάδα · Διατήρηση	Και οι τρεις ασκήσεις 1 φορά τη μέρα· σημείωσε τι σε βοήθησε περισσότερο.

> **Κάθε μέρα**
>
> Πρόσεχε το σφίξιμο των δοντιών, απόφυγε την τσίχλα.

Πόνος στον ώμο

1. **Υπακάνθιος:** Τέντωσε το χέρι που πονάει μπροστά από το στήθος προς τον άλλο ώμο, πιάσε τον αγκώνα με το άλλο χέρι και τράβηξε απαλά. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.
2. **Υπερακάνθιος:** Άφησε το χέρι να κρέμεται χαλαρό και κάνε μικρούς κύκλους μπρος-πίσω σαν εκκρεμές, για 1 λεπτό. Δύο φορές τη μέρα.
3. **Ελάσσων θωρακικός:** Καθιστός, τράβηξε τις ωμοπλάτες πίσω και κάτω, σαν να θέλεις να τις βάλεις στην πίσω τσέπη. Κράτα 5 δευτερόλεπτα, 10 φορές.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ	ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ
1η εβδομάδα · Γνωριμία	Η πρώτη άσκηση 1 φορά τη μέρα. Παρατήρησε πότε αυξάνεται ο πόνος.
2η εβδομάδα · Συνέπεια	Οι δύο πρώτες ασκήσεις 2 φορές τη μέρα και εφαρμογή της καθημερινής συμβουλής.
3η εβδομάδα · Πλήρες πρόγραμμα	Και οι τρεις ασκήσεις 2 φορές τη μέρα.
4η εβδομάδα · Διατήρηση	Και οι τρεις ασκήσεις 1 φορά τη μέρα· σημείωσε τι σε βοήθησε περισσότερο.

> **Κάθε μέρα**
> Μην ξαπλώνεις στην πλευρά που πονάει, μαξιλάρι κάτω από το χέρι.

Πόνος στον αγκώνα και στο αντιβράχιο

1. **Εκτείνοντες του αντιβραχίου (ECRL, ECRB, εκτείνων τους δακτύλους):** Τέντωσε το χέρι μπροστά με την παλάμη προς τα κάτω και με το άλλο χέρι λύγισε τον καρπό και τα δάχτυλα προς τα κάτω. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

2. **Καμπτήρες του αντιβραχίου:** Τέντωσε το χέρι με την παλάμη προς τα πάνω και με το άλλο χέρι τράβηξε τα δάχτυλα προς τα κάτω και πίσω. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

3. **Τρικέφαλος βραχιόνιος:** Σήκωσε το χέρι πάνω από το κεφάλι, λύγισε τον αγκώνα και σπρώξε τον απαλά προς τα πίσω με το άλλο χέρι. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ	ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ
1η εβδομάδα · Γνωριμία	Η πρώτη άσκηση 1 φορά τη μέρα. Παρατήρησε πότε αυξάνεται ο πόνος.
2η εβδομάδα · Συνέπεια	Οι δύο πρώτες ασκήσεις 2 φορές τη μέρα και εφαρμογή της καθημερινής συμβουλής.
3η εβδομάδα · Πλήρες πρόγραμμα	Και οι τρεις ασκήσεις 2 φορές τη μέρα.
4η εβδομάδα · Διατήρηση	Και οι τρεις ασκήσεις 1 φορά τη μέρα· σημείωσε τι σε βοήθησε περισσότερο.

> **Κάθε μέρα**
> Διάταση του αντιβραχίου κάθε ώρα στη δουλειά, πιο χαλαρό πιάσιμο.

Πόνος ανάμεσα στις ωμοπλάτες

1. **Ρομβοειδείς μύες:** Αγκάλιασε τον εαυτό σου σαν να κρυώνεις και καμπούριασε την πλάτη μέχρι να νιώσεις τέντωμα ανάμεσα στις ωμοπλάτες. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

2. **Τραπεζοειδής – μέσες ίνες:** Αγκάλιασε τον εαυτό σου και καμπούριασε την πλάτη. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές. Μετά τράβηξε τις ωμοπλάτες προς τα πίσω 10 φορές.

3. **Μείζων θωρακικός:** Στάσου στο άνοιγμα μιας πόρτας, ακούμπησε το αντιβράχιο στην κάσα στο ύψος του ώμου και κάνε αργά ένα βήμα μπροστά μέχρι να νιώσεις τέντωμα στο στήθος. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ	ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ
1η εβδομάδα · Γνωριμία	Η πρώτη άσκηση 1 φορά τη μέρα. Παρατήρησε πότε αυξάνεται ο πόνος.
2η εβδομάδα · Συνέπεια	Οι δύο πρώτες ασκήσεις 2 φορές τη μέρα και εφαρμογή της καθημερινής συμβουλής.
3η εβδομάδα · Πλήρες πρόγραμμα	Και οι τρεις ασκήσεις 2 φορές τη μέρα.
4η εβδομάδα · Διατήρηση	Και οι τρεις ασκήσεις 1 φορά τη μέρα· σημείωσε τι σε βοήθησε περισσότερο.

> **Κάθε μέρα**
>
> Ίσιο κάθισμα, τράβηγμα των ωμοπλατών προς τα πίσω κάθε ώρα.

Οσφυαλγία

1. **Τετράγωνος οσφυϊκός:** Όρθιος, σήκωσε το χέρι πάνω από το κεφάλι και γείρε αργά προς την άλλη πλευρά, κρατώντας τη λεκάνη στη θέση της. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

2. **Λαγονοψοΐτης:** Γονάτισε στο ένα γόνατο, με το άλλο πόδι μπροστά σου. Σπρώξε αργά τη λεκάνη μπροστά μέχρι να νιώσεις τέντωμα στο μπροστινό μέρος του πίσω μηρού. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

3. **Πολυσχιδής:** Στα τέσσερα, τέντωσε ένα χέρι μπροστά και το αντίθετο πόδι πίσω και κράτα 5 δευτερόλεπτα. 10 φορές από κάθε πλευρά.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ	ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ
1η εβδομάδα · Γνωριμία	Η πρώτη άσκηση 1 φορά τη μέρα. Παρατήρησε πότε αυξάνεται ο πόνος.
2η εβδομάδα · Συνέπεια	Οι δύο πρώτες ασκήσεις 2 φορές τη μέρα και εφαρμογή της καθημερινής συμβουλής.
3η εβδομάδα · Πλήρες πρόγραμμα	Και οι τρεις ασκήσεις 2 φορές τη μέρα.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ	ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ
4η εβδομάδα · Διατήρηση	Και οι τρεις ασκήσεις 1 φορά τη μέρα· σημείωσε τι σε βοήθησε περισσότερο.

> **Κάθε μέρα**
>
> Σήκω όρθιος κάθε ώρα, σήκωνε βάρη από τα γόνατα.

Πόνος από τον γλουτό που απλώνεται στον μηρό

1. **Απιοειδής:** Ξάπλωσε ανάσκελα, βάλε τον αστράγαλο του ποδιού που πονάει πάνω στο άλλο γόνατο και τράβηξε τον άλλο μηρό προς το στήθος. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.
2. **Μικρός γλουτιαίος:** Ξάπλωσε ανάσκελα, βάλε τον αστράγαλο του ποδιού που πονάει πάνω στο άλλο γόνατο και τράβηξε τον άλλο μηρό προς το στήθος. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.
3. **Μέσος γλουτιαίος:** Όρθιος, σταύρωσε το πόδι που πονάει πίσω από το άλλο και σπρώξε τη λεκάνη στο πλάι μέχρι να νιώσεις τέντωμα. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ	ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ
1η εβδομάδα · Γνωριμία	Η πρώτη άσκηση 1 φορά τη μέρα. Παρατήρησε πότε αυξάνεται ο πόνος.
2η εβδομάδα · Συνέπεια	Οι δύο πρώτες ασκήσεις 2 φορές τη μέρα και εφαρμογή της καθημερινής συμβουλής.
3η εβδομάδα · Πλήρες πρόγραμμα	Και οι τρεις ασκήσεις 2 φορές τη μέρα.
4η εβδομάδα · Διατήρηση	Και οι τρεις ασκήσεις 1 φορά τη μέρα· σημείωσε τι σε βοήθησε περισσότερο.

> **Κάθε μέρα**
>
> Μην έχεις το πορτοφόλι στην πίσω τσέπη, μην κάθεσαι σταυροπόδι.

Πόνος στο γόνατο

1. **Ορθός μηριαίος:** Όρθιος, κρατήσου κάπου, πιάσε τον αστράγαλο και τράβηξε τη φτέρνα προς τον γλουτό, με τα γόνατα το ένα δίπλα στο άλλο. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

2. **Έσω πλατύς:** Κάθισε σε μια καρέκλα, τέντωσε αργά το γόνατο, κράτα 5 δευτερόλεπτα και κατέβασέ το. 10 φορές με κάθε πόδι.

3. **Έξω πλατύς:** Όρθιος, πιάσε τον αστράγαλο και τράβηξε τη φτέρνα προς τον γλουτό. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ	ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ
1η εβδομάδα · Γνωριμία	Η πρώτη άσκηση 1 φορά τη μέρα. Παρατήρησε πότε αυξάνεται ο πόνος.
2η εβδομάδα · Συνέπεια	Οι δύο πρώτες ασκήσεις 2 φορές τη μέρα και εφαρμογή της καθημερινής συμβουλής.
3η εβδομάδα · Πλήρες πρόγραμμα	Και οι τρεις ασκήσεις 2 φορές τη μέρα.
4η εβδομάδα · Διατήρηση	Και οι τρεις ασκήσεις 1 φορά τη μέρα· σημείωσε τι σε βοήθησε περισσότερο.

> **Κάθε μέρα**
>
> Αργά στις σκάλες, σταδιακή αύξηση του φορτίου.

Πόνος στην πτέρνα και στο πέλμα

1. **Υποκνημίδιος:** Στάσου μπροστά σε έναν τοίχο, πάρε το πόδι που πονάει πίσω, λύγισε ελαφρά το γόνατο και κράτα τη φτέρνα στο έδαφος. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

2. **Γαστροκνήμιος:** Στάσου μπροστά σε έναν τοίχο, πάρε το πόδι που πονάει πίσω με το γόνατο τεντωμένο και τη φτέρνα στο έδαφος και στηρίξου στον τοίχο. 30 δευτερόλεπτα, 3 φορές.

3. **Βραχύς καμπτήρας των δακτύλων:** Καθιστός, κύλα αργά ένα μπαλάκι του τένις μπρος-πίσω κάτω από το πέλμα για 2 λεπτά. Μία φορά τη μέρα.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ	ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ
1η εβδομάδα · Γνωριμία	Η πρώτη άσκηση 1 φορά τη μέρα. Παρατήρησε πότε αυξάνεται ο πόνος.
2η εβδομάδα · Συνέπεια	Οι δύο πρώτες ασκήσεις 2 φορές τη μέρα και εφαρμογή της καθημερινής συμβουλής.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ	ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ
3η εβδομάδα · Πλήρες πρόγραμμα	Και οι τρεις ασκήσεις 2 φορές τη μέρα.
4η εβδομάδα · Διατήρηση	Και οι τρεις ασκήσεις 1 φορά τη μέρα· σημείωσε τι σε βοήθησε περισσότερο.

Κάθε μέρα

Άνετα παπούτσια, το βράδυ μασάζ του πέλματος με μπαλάκι.

Επόμενο βήμα

Για τον θεραπευτή: στον επόμενο ασθενή εκτύπωσε το πλάνο που ταιριάζει στο ενόχλημά του και κλείσε επανέλεγχο στο τέλος της 4ης εβδομάδας.