УВЕРЕНО С ВСЕКИ КЛИЕНТ™

Предупредителни знаци: кога да насочите клиента

Симптоми, при които картите не бива да са първа стъпка, и процедура за насочване стъпка по стъпка.

Визуален терапевтичен атлас · Образователен материал; не замества диагноза, лечение или консултация със специалист.

Съдържание

1 · Основно правило

2 · По области

3 · Стъпки за насочване

Следваща стъпка

ЧАСТ 1

Основно правило

Не вземайте решения сами, ако имате колебания.

Защо това е важно

Добрият специалист не решава всеки проблем сам, а знае кога ситуацията изисква друга помощ. Насочването към подходящата институция е израз на грижа, а не провал.

ЧАСТ 2

По области

Проверявайте при всеки нов клиент.

Винаги, независимо от областта

Ако забележите това: не оставайте сами, насочете клиента към специалист

- [ ] Суицидни мисли, суицидни планове или предишни опити
- [ ] Самонараняване и автоагресия
- [ ] Упражняване на насилие или преживяно малтретиране (особено с участието на деца)
- [ ] Загуба на връзка с реалността (халюцинации, налудности)
- [ ] Тежки нарушения на съня, храненето или функционирането, продължаващи със седмици

Тревожност и стрес

Ако забележите това: не оставайте сами, насочете клиента към специалист

- [ ] Соматични симптоми без медицинско обяснение (болки в гърдите, припадъци)
- [ ] Употреба на психоактивни вещества или успокоителни за потискане на тревожността
- [ ] Крайно отдръпване: клиентът не напуска дома си

Настроение и емоции

Ако забележите това: не оставайте сами, насочете клиента към специалист

- [ ] Продължително понижено настроение в продължение на седмици, анхедония, безпомощност
- [ ] Необичайно приповдигнато настроение, липса на нужда от сън, рисково поведение
- [ ] Неконтролирани гневни изблици, представляващи опасност

Взаимоотношения и семейство

Ако забележите това: не оставайте сами, насочете клиента към специалист

- [ ] Признаци на домашно насилие или насилие в близките връзки
- [ ] Контролиращо поведение или заплахи в средата на клиента
- [ ] Опасност за отглеждането или безопасността на деца

Травма и сигурност

Ако забележите това: не оставайте сами, насочете клиента към специалист

- [ ] Остри симптоми непосредствено след скорошно травматично събитие
- [ ] Чести дисоциативни състояния
- [ ] Клиентът все още живее в условия на непосредствена опасност

Тяло и хранене

Ако забележите това: не оставайте сами, насочете клиента към специалист

- [ ] Значителна загуба на тегло, отказ от храна, предизвикване на повръщане
- [ ] Компулсивно спортуване въпреки травми и изтощение
- [ ] Соматични оплаквания без предварителни медицински изследвания

Скръб и загуба

Ако забележите това: не оставайте сами, насочете клиента към специалист

- [ ] Скърбящият изразява желание да умре, иска да „последва“ починалия
- [ ] Продължителна невъзможност за ежедневно функциониране в продължение на месеци
- [ ] Употреба на психоактивни вещества за притъпяване на болката

ЧАСТ 3

Стъпки за насочване

Спокойно, директно и в активно сътрудничество с клиента.

1. **Попитайте директно.** Запитването за суицидни мисли не увеличава риска от осъществяването им.
2. **Оценете текущото ниво на опасност:** има ли план, достъп до средства, времева рамка или предишни опити?
3. **При непосредствена опасност:** обадете се на 112 и не оставяйте клиента без надзор.
4. **Ако няма непосредствена опасност:** направете план за насочване заедно с клиента (личния лекар, спешна помощ, местните служби за психично здраве).
5. **Запишете и документирайте** наблюдаваните симптоми, хода на разговора и договорените мерки.
6. **Обсъдете случая в супервизия** и се погрижете за собственото си емоционално пространство.

Следваща стъпка

Днес: разпечатайте версията от една страница и я поставете на видимо място в кабинета или на работното си място.