TRYGG MED HVER KLIENT™

Varseltegn: når du bør henvise klienten videre

Symptomer der kartene ikke bør være første steg, og prosedyre for henvisning trinn for trinn.

Innhold

1 · Grunnregel

2 · Etter område

3 · Trinn for henvisning

Neste steg

DEL 1

Grunnregel

Ikke ta avgjørelser alene dersom du er i tvil.

Hvorfor dette er viktig

En dyktig fagperson løser ikke ethvert problem på egen hånd, men vet når situasjonen krever annen hjelp. Å henvise til rett instans er et uttrykk for omsorg, ikke et nederlag.

DEL 2

Etter område

Sjekk ved hver ny klient.

Alltid, uansett område

Dersom du oppdager dette: ikke stå alene med det, henvis klienten videre

- [ ] Selvmordstanker, selvmordsplaner eller tidligere forsøk
- [ ] Selvskading og autoaggresjon
- [ ] Utøvelse av vold eller å bli utsatt for overgrep (særlig med barn involvert)
- [ ] Realitetsbrist (hallusinasjoner, vrangforestillinger)
- [ ] Alvorlige søvn-, spise- eller funksjonsforstyrrelser som har vart i uker

Angst og stress

Dersom du oppdager dette: ikke stå alene med det, henvis klienten videre

- [ ] Somatiske symptomer uten medisinsk forklaring (brystsmerter, besvimelse)
- [ ] Bruk av rusmidler eller beroligende for å dempe angst
- [ ] Ekstrem tilbaketrekning: klienten forlater ikke boligen

Stemningsleie og følelser

Dersom du oppdager dette: ikke stå alene med det, henvis klienten videre

- [ ] Vedvarende nedsatt stemningsleie over flere uker, anhedoni, hjelpeløshet
- [ ] Uvanlig oppstemthet, manglende søvnbehov, risikofylt atferd
- [ ] Ukontrollerte sinneutbrudd som utgjør en fare

Relasjoner og familie

Dersom du oppdager dette: ikke stå alene med det, henvis klienten videre

- [ ] Tegn på vold i nære relasjoner
- [ ] Kontrollerende atferd eller trusler i klientens miljø
- [ ] Fare for barns omsorgssituasjon eller trygghet

Traume og trygghet

Dersom du oppdager dette: ikke stå alene med det, henvis klienten videre

- [ ] Akutte symptomer rett etter en nylig traumatisk hendelse
- [ ] Hyppige dissosiative tilstander
- [ ] Klienten lever fortsatt under umiddelbar fare

Kropp og ernæring

Dersom du oppdager dette: ikke stå alene med det, henvis klienten videre

- [ ] Betydelig vekttap, matnekt, fremkalling av oppkast
- [ ] Kompulsiv trening tross skader og utmattelse
- [ ] Somatiske plager uten forutgående medisinsk utredning

Sorg og tap

Dersom du oppdager dette: ikke stå alene med det, henvis klienten videre

- [ ] Den sørgende uttrykker ønske om å dø, vil «følge etter» den avdøde
- [ ] Vedvarende manglende evne til hverdagsfungering over flere måneder
- [ ] Bruk av rusmidler for å døyve smerten

DEL 3

Trinn for henvisning

Rolig, direkte og i aktivt samarbeid med klienten.

1. **Spør direkte.** Å spørre om selvmordstanker øker ikke risikoen for at de gjennomføres.
2. **Vurder det aktuelle farenivået:** finnes det en plan, tilgang til midler, en tidsramme eller tidligere forsøk?
3. **Ved umiddelbar fare:** ring 113 og ikke forlat klienten uten tilsyn.
4. **Dersom det ikke er umiddelbar fare:** lag en plan for henvisning sammen med klienten (fastlege, legevakt, lokale psykiske helsetjenester).
5. **Noter og dokumenter** observerte symptomer, samtalens forløp og avtalte tiltak.
6. **Drøft saken i veiledning** og ta vare på ditt eget følelsesmessige rom.

Neste steg

I dag: skriv ut énsidesversjonen og heng den opp på et synlig sted på kontoret eller arbeidsplassen.