OMRÅDE 6 · 10 KART

Stress, traume og trygghet

10 emosjonelle tankekart, hvert over 2 sider, med den samme sekstrinnsstrukturen.

Visuelt Terapeutisk Atlas · Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Kamprespons

Kamprespons

01 Forstå

Kampresponsen er en av nervesystemets automatiske forsvarsreaksjoner på fare: energi, kraft og en impuls til å konfrontere. Den er nyttig i møte med reell fare. Men når den aktiveres i hverdagslige situasjoner, fører den ofte til irritabilitet, sinne og konflikter.

> Kampresponsen er ingen karakterbrist, men nervesystemets forsvar. Du kan lære å roe den ned.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Hetetokter, anspente muskler
- Kjeven biter sammen, knyttede never
- Høy puls


I TANKENE

- «Jeg lar meg ikke herse med.»
- «Jeg må forsvare meg.»
- «De angriper meg.»

I ATFERDEN

- Hever stemmen
- Kranger, gjør motstand
- Prøver å ta kontroll over situasjonen

03 Se syklusen



Hva utløser den? Kritikk, urettferdighet, følelse av tap av kontroll.

Hva forsterker den? Tretthet, stress og tidligere vanskelige erfaringer.

Hva opprettholder den? At nervesystemet ikke opplever trygg beroligelse.

Kamprespons

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. I hvilke situasjoner utløses kampresponsen hos deg?

2. Hva kjenner du først i kroppen i slike øyeblikk?

3. Hva forsøker du å beskytte?

4. Hva hjelper deg med å finne roen igjen?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Respekt
- Kontroll

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Hvis jeg ikke angriper, vil de såre meg.»
- «Svakhet er farlig.»
- «Jeg må hele tiden være på vakt.»

Relaterte kart: 11 · Sinne, 56 · Toleransevindu, 57 · Hyperaktivering

06 Neste steg

→ Gjenkjenn signalene fra kroppen og ta et lite avbrekk.

→ Forleng utpusten og slapp av i musklene.

→ Få ut den oppbygde energien gjennom bevegelse.

→ Gå tilbake til samtalen når du kjenner deg roligere.

Hvis minner om vanskelige opplevelser jevnlig overvelder deg eller hindrer deg i hverdagen, kan det være nyttig å søke hjelp fra en fagperson som arbeider med traumer.

Fluktrespons

Fluktrespons

01 Forstå

Fluktresponsen er en automatisk impuls fra nervesystemet om å komme seg unna faren. I en reell nødssituasjon redder den liv. I hverdagen kan den arte seg som uro, unngåelse, rastløshet eller en flukt inn i et konstant aktivitetskjør.

> Fluktresponsen sier: «Her er du ikke trygg». Det er verdt å undersøke om det stemmer her og nå.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Uro, vansker med å sitte stille
- Rask pust
- Anspente ben


I TANKENE

- «Jeg må komme meg vekk herfra.»
- «Jeg holder ikke ut dette.»
- «Raskt, bare bort herfra.»

I ATFERDEN

- Forlater situasjonen
- Jobber altfor mye eller er konstant i bevegelse
- Unngår vanskelige samtaler

03 Se syklusen



Hva utløser den? Steder med mange mennesker, konflikter, følelsesmessig nærhet.

Hva forsterker den? Tidligere erfaring med at flukt ga trygghet.

Hva opprettholder den? Unngåelse som hindrer nye opplevelser av trygghet.

Fluktrespons

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvilke situasjoner har du oftest lyst til å flykte fra?

2. Hva signaliserer kroppen til deg i slike stunder?

3. Hva ville skjedd om du ble værende i bare ett minutt til?

4. Hva flykter du egentlig fra: situasjonen eller følelsen?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Frihet
- Ro

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Hvis jeg blir, vil noe forferdelig skje.»
- «Jeg tåler ikke denne ubehagelige følelsen.»
- «Flukt er den eneste utveien.»

Relaterte kart: 6 · Angstungåelse, 56 · Toleransevindu, 57 · Hyperaktivering

06 Neste steg

→ Legg merke til fluktimpulsen og sett ord på den.

→ Kjenn føttene mot underlaget og pust langsommere.

→ Bli værende i situasjonen i en kort, forhåndsbestemt tid.

→ Planlegg en trygg retrettmulighet på forhånd.

Hvis minner om vanskelige opplevelser jevnlig overvelder deg eller hindrer deg i hverdagen, kan det være nyttig å søke hjelp fra en fagperson som arbeider med traumer.

Frysrespons

Frysrespons

01 Forstå

Frysresponsen utløses når verken kamp eller flukt virker mulig. Kroppen stivner, tankene tømmes, stemmen setter seg fast i halsen. I ettertid kjenner man ofte på skam («Hvorfor gjorde jeg ingenting?»), selv om dette er en automatisk reaksjon man ikke velger.

> Å fryse til må ikke forveksles med svakhet eller samtykke: det er nervesystemets overlevelsesstrategi.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Stive muskler, ubevegelighet
- Pust som holdes igjen
- Kalde hender og føtter, prikking


I TANKENE

- «Det er helt tomt i hodet.»
- «Jeg klarer ikke å si et ord.»
- «Som om jeg ikke er til stede.»

I ATFERDEN

- Reagerer ikke, stopper helt opp
- Klarer ikke å ta en avgjørelse
- Bebreider seg selv i etterkant

03 Se syklusen



Hva utløser den? Roping, brå konflikter, situasjoner som minner om gamle traumer.

Hva forsterker den? Skam og selvbebreidelse som belaster nervesystemet ytterligere.

Hva opprettholder den? At kroppen ikke opplever en trygg vei ut av frysetilstanden.

Frysrespons

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Har du opplevd å stivne helt til?

2. Hva kjente du i kroppen etterpå?

3. Hva pleier du å si til deg selv om slike øyeblikk?

4. Hva hjelper deg å «komme tilbake» til kroppen?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Forståelse
- Selvaksept

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg var svak fordi jeg ikke gjorde noe.»
- «Det var min egen skyld.»
- «Jeg kan ikke stole på min egen kropp.»

Relaterte kart: 56 · Toleransevindu, 58 · Frakobling og hypoaktivering, 13 · Skam

06 Neste steg

→ Si til deg selv: «Kroppen min beskyttet meg så godt den kunne».

→ Beveg forsiktig på fingre og tær.

→ Se deg rundt og sett navn på farger i rommet.

→ Hvis dette skjer ofte, søk hjelp hos en terapeut som jobber med traumer.

Hvis minner om vanskelige opplevelser jevnlig overvelder deg eller hindrer deg i hverdagen, kan det være nyttig å søke hjelp fra en fagperson som arbeider med traumer.

Føyelighetsrespons

Føyelighetsrespons

01 Forstå

Føyelighetsresponsen (fawn) er en strategi i nervesystemet der vi forsøker å avverge fare ved å blidgjøre andre og være ettergivende. Den utvikles ofte i oppveksten dersom dette var den eneste måten å bevare tryggheten på. I voksen alder fører det til overtilpasning og mangel på grenser.

> Føyelighet ga trygghet en gang. I dag fører det til at det ikke blir plass til dine egne behov.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning når en konflikt nærmer seg
- Et smil som skjuler indre frykt
- Utmattelse


I TANKENE

- «Bare han eller hun ikke blir sint.»
- «Hva vil den andre høre?»
- «Mitt behov er ikke viktig.»

I ATFERDEN

- Sier ja til alt
- Unnskylder seg før det har skjedd noe
- Unngår ordet «nei»

03 Se syklusen



Hva utløser den? Anspent ansiktsuttrykk, kritikk, autoritetspersoner.

Hva forsterker den? Tidligere erfaring med at det var farlig å gjøre motstand.

Hva opprettholder den? At ettergivenhet kortsiktig faktisk reduserer spenningen.

Føyelighetsrespons

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Når sier du ja selv om du tenker nei?

2. Hva er du redd skal skje hvis du avslår?

3. Hvem lærte deg at det å føye seg ga trygghet?

4. Hva kan være et lite skritt mot å ivareta egne behov?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Aksept
- Egen stemme

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Hvis jeg sier nei, er jeg i fare.»
- «Andres følelser er viktigere.»
- «Jeg fortjener bare kjærlighet når jeg innordner meg.»

Relaterte kart: 68 · Behov for å tekkes andre, 72 · Vansker med å si nei, 71 · Personlige grenser

06 Neste steg

→ Be om tenketid før du sier ja.

→ Øv på å si et lite «nei» i trygge omgivelser.

→ Skriv ned hva du egentlig ønsker i den gitte situasjonen.

→ Legg merke til kroppens signaler når du begynner å gi etter for mye.

Hvis minner om vanskelige opplevelser jevnlig overvelder deg eller hindrer deg i hverdagen, kan det være nyttig å søke hjelp fra en fagperson som arbeider med traumer.

Emosjonelle triggere

Emosjonelle triggere

01 Forstå

Emosjonelle triggere er sanseinntrykk – lyder, ord, situasjoner, lukter – knyttet til en smertefull opplevelse fra fortiden, som utløser en reaksjon som er uforholdsmessig sterk i forhold til situasjonen her og nå. Reaksjonen hører fortiden til, men utspiller seg i nåtiden.

> Når reaksjonen er sterkere enn situasjonen tilsier, er det ofte et gammelt sår som gjør seg gjeldende.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Plutselig hjertebank
- Klump i halsen
- Prikking eller skjelving


I TANKENE

- «Akkurat som den gangen.»
- «Nå skjer det igjen.»
- En plutselig, overveldende bølge av følelser

I ATFERDEN

- Eksploderer plutselig eller trekker seg unna
- Unngår situasjoner som trigger
- Forstår ikke sin egen reaksjon i ettertid

03 Se syklusen



Hva utløser den? Tonefall, ansiktsuttrykk, merkedager, lukter.

Hva forsterker den? Tretthet og stress som svekker den psykiske motstandskraften.

Hva opprettholder den? Mangel på bevissthet om triggerne, slik at reaksjonen overrumpler deg.

Emosjonelle triggere

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvilke situasjoner vekker en voldsom reaksjon hos deg?

2. Hva minner denne situasjonen deg om?

3. Hvor gammel føler du deg i et slikt øyeblikk?

4. Hva kan hjelpe deg med å forberede deg på disse stundene?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Forutsigbarhet
- Forståelse

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg er overfølsom.»
- «Jeg klarer ikke å styre reaksjonene mine.»
- «Fortiden slipper aldri taket.»

Relaterte kart: 56 · Toleransevindu, 59 · Trygghetsfølelse, 89 · Triggere i sorgen

06 Neste steg

→ Før logg over triggere og egne reaksjoner.

→ Si til deg selv: «Dette er en gammel følelse, ikke situasjonen her og nå».

→ Bruk en jordingsteknikk (5-4-3-2-1).

→ Planlegg på forhånd hva du skal gjøre i møte med en kjent trigger.

Hvis minner om vanskelige opplevelser jevnlig overvelder deg eller hindrer deg i hverdagen, kan det være nyttig å søke hjelp fra en fagperson som arbeider med traumer.

Toleransevindu

Toleransevindu

01 Forstå

Toleransevinduet (ifølge Daniel Siegel) er den optimale sonen der aktiveringsnivået fremmer oppmerksomhet uten å forstyrre tenkeevnen. I denne sonen kan vi lære, bygge relasjoner og ta gode valg. Over vinduet oppstår hyperaktivering (angst, sinne), under oppstår hypoaktivering (tomhet, nummenhet).

> Målet er ikke ro for enhver pris, men å utvide vinduet og lære veiene tilbake.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- I vinduet: rolig pust, avspente muskler
- Over vinduet: hjertebank, spenning
- Under vinduet: nummenhet, tunghet


I TANKENE

- I vinduet: «Dette håndterer jeg.»
- Over vinduet: «Dette blir for mye.»
- Under vinduet: «Ingenting betyr noe.»

I ATFERDEN

- I vinduet: tar kontakt, reflekterer
- Over vinduet: eksploderer, flykter
- Under vinduet: trekker seg unna, stivner

03 Se syklusen



Hva utløser den? Stress, konflikt, utmattelse, gamle minner.

Hva forsterker den? Mangel på hvile og isolasjon.

Hva opprettholder den? Mangel på innarbeidede selvreguleringsverktøy som letter veien tilbake.

Toleransevindu

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvordan har du det når du er innenfor toleransevinduet?

2. Hvordan merker du at du er på vei over vinduet?

3. Og hvordan merker du at du faller under det?

4. Hva hjelper deg med å finne tilbake?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Regulering
- Relasjon

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg har ingen kontroll over min egen tilstand.»
- «Jeg reagerer alltid for sterkt eller for svakt.»
- «Indre ro er bare for andre.»

Relaterte kart: 57 · Hyperaktivering, 58 · Frakobling og hypoaktivering, 19 · Følelsesmessig overbelastning

06 Neste steg

→ Tegn toleransevinduet ditt og fyll inn egne signaler.

→ Skriv ned hva som hjelper når du er over, og hva som hjelper når du er under.

→ Ett minutt daglig: Hvor befinner jeg meg i forhold til vinduet nå?

→ Sørg for jevnlig hvile, fysisk aktivitet og kontakt med andre.

Hvis minner om vanskelige opplevelser jevnlig overvelder deg eller hindrer deg i hverdagen, kan det være nyttig å søke hjelp fra en fagperson som arbeider med traumer.

Hyperaktivering

Hyperaktivering

01 Forstå

Hyperaktivering (hyperarousal) er en tilstand der nervesystemet opererer over toleransevinduet: for mye energi, overdreven årvåkenhet og overveldende følelser. Da er det vanskelig å tenke klart, ta avgjørelser eller sove. Etter langvarig stress eller traumer kan dette bli en kronisk tilstand.

> I en tilstand av hyperaktivering trenger kroppen først og fremst beroligelse, ikke rasjonelle argumenter. Ro starter alltid i kroppen.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Høy puls, overfladisk pust
- Svettetokter, skjelving
- Søvnforstyrrelser, urolige netter


I TANKENE

- «Noe forferdelig kommer til å skje.»
- Tankeoverload
- Vansker med å konsentrere seg

I ATFERDEN

- Irritabilitet, overilte reaksjoner
- Vansker med å roe seg ned
- Påtar seg for mange oppgaver

03 Se syklusen



Hva utløser den? Konflikter, korte tidsfrister, støy, gamle minner.

Hva forsterker den? Koffein, for lite søvn og kronisk mangel på hvile.

Hva opprettholder den? Mangel på daglige metoder for utladning og beroligelse.

Hyperaktivering

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvordan merker du at du er på vei inn i høygir?
2. Hva pleier å hjelpe deg i slike stunder?
3. Hvor mye tid har du til hvile hver dag?
4. Hva kan du velge bort denne uken?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Ro
- Hvile
- Trygghet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Hvis jeg stopper opp, raser alt sammen.»
- «Å hvile er bortkastet tid.»
- «Jeg må hele tiden være i beredskap.»

Relaterte kart: 56 · Toleransevindu, 51 · Kamprespons, 97 · Spenning og beredskapstilstand

06 Neste steg

→ Lang utpust: pust inn i 4 sek, pust ut i 7–8 sek, gjenta noen ganger.

→ Kaldt vann i ansiktet eller på håndleddene.

→ Regelmessig bevegelse for å få ut overskuddsenergi.

→ Kutt ned på koffein og hold faste søvntider.

Hvis minner om vanskelige opplevelser jevnlig overvelder deg eller hindrer deg i hverdagen, kan det være nyttig å søke hjelp fra en fagperson som arbeider med traumer.

Frakobling og hypoaktivering

Frakobling og hypoaktivering

01 Forstå

Hypoaktivering (hypoarousal) er en tilstand der nervesystemet fungerer under toleransevinduet: tomhet, nummenhet, mangel på energi og frakobling fra kropp og følelser. Det oppstår ofte etter overveldende stress, når systemet slår over i «nødmodus».

> Frakobling er et vern mot sanseinntrykk som overvelder. Å finne tilbake krever tid og trygge, små skritt.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Tretthet, tunge lemmer
- Nummenhet, kuldefølelse
- Langsomme bevegelser


I TANKENE

- «Jeg føler ingenting.»
- «Jeg er som i en tåke.»
- «Alt er det samme for meg.»

I ATFERDEN

- Lukker seg inne
- Sover hele tiden eller blir sittende foran skjermen
- Klarer ikke å gå i gang med noe

03 Se syklusen



Hva utløser den? For mye stress, konflikter eller opplevelse av tap.

Hva forsterker den? Isolasjon og mangel på bevegelse.

Hva opprettholder den? Mangel på sanseinntrykk som på en trygg måte hjelper deg tilbake i kroppen.

Frakobling og hypoaktivering

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Når føler du deg «frakoblet»?
2. Hva hendte like i forkant?
3. Hva hjelper deg med å kjenne kroppen din litt igjen?
4. Hvem gir deg en følelse av lettelse bare ved sitt nærvær?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Kontakt
- Vitalitet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Det er bedre å ikke føle noe.»
- «Jeg orker ingenting uansett.»
- «Ingenting kommer til å endre seg likevel.»

Relaterte kart: 56 · Toleransevindu, 53 · Frysrespons, 14 · Tristhet

06 Neste steg

→ Start med milde bevegelser: tøyning, en gåtur, rytmisk bevegelse.

→ Bruk tydeligere sanseinntrykk: kaldt vann, en frisk duft, markant smak.

→ Ta kontakt med noen, gjerne bare med en kort melding.

→ Gi deg selv én liten, helt overkommelig oppgave.

Hvis minner om vanskelige opplevelser jevnlig overvelder deg eller hindrer deg i hverdagen, kan det være nyttig å søke hjelp fra en fagperson som arbeider med traumer.

Trygghetsfølelse

Trygghetsfølelse

01 Forstå

Trygghetsfølelse er en tilstand i nervesystemet der kropp og sinn vet at det ikke foreligger noen umiddelbar fare, slik at hvile, nysgjerrighet og nærhet til andre blir mulig. Den avhenger ikke bare av ytre omstendigheter, men bygges også av signaler fra kroppen, gode relasjoner og indre ressurser.

> Trygghet er ikke bare fravær av fare, men nærvær av kontakt og indre ro.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Dypere og roligere pust
- Avspente muskler
- Varme i kroppen


I TANKENE

- «Her og nå er jeg trygg.»
- «Jeg kan stole på noen.»
- «Jeg har god tid.»

I ATFERDEN

- Større åpenhet og nysgjerrighet
- Lettere for å knytte kontakt
- Evne til å finne hvile

03 Se syklusen



Hva utløser den? En trygg person, et trygt sted, et beroligende ritual.

Hva forsterker den? Regelmessig hvile, støttende relasjoner og forutsigbarhet.

Hva opprettholder den? Gjentakelse: enhver trygg opplevelse styrker nervesystemet.

Trygghetsfølelse

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvor og sammen med hvem føler du deg tryggest?
2. Hva kjenner du i kroppen i slike stunder?
3. Hvilke gjenstander, lukter og lyder gir deg trygghet?
4. Hvordan kan du flette disse inn i hverdagen din?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Relasjon
- Forutsigbarhet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg er ikke trygg noe sted.»
- «Roen varer aldri lenge.»
- «Jeg fortjener ikke fred og ro.»

Relaterte kart: 56 · Toleransevindu, 115 · Støttenettverk, 117 · Indre ressurser

06 Neste steg

→ Lag en «trygghetsliste»: personer, steder, ting og gjøremål.

→ Skap et daglig ritual for å roe ned.

→ Se for deg et trygt sted og vend tilbake dit hver dag.

→ Legg merke til hva som hjelper kroppen din å slappe helt av.

Hvis minner om vanskelige opplevelser jevnlig overvelder deg eller hindrer deg i hverdagen, kan det være nyttig å søke hjelp fra en fagperson som arbeider med traumer.

Stabilisering og bearbeiding etter vanskelige opplevelser

Stabilisering og bearbeiding etter vanskelige opplevelser

01 Forstå

Stabilisering og restitusjon etter vanskelige hendelser er en prosess der man først etablerer trygghet og stabilitet i hverdagen, for så – med riktig støtte – å bearbeide det som har skjedd. Tilfriskning er ikke en rett linje: gode og dårlige perioder veksler om hverandre.

> Først trygghet, deretter integrering av opplevelsene. Tempoet bestemmes av din egen trygghetsfølelse.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Svingende energinivå
- Endringer i søvn og matlyst
- Økt sårbarhet i kroppen

I TANKENE

- «Når blir jeg meg selv igjen?»
- «Noe i meg er ugjenkallelig ødelagt.»
- «Det vil bli bedre med tiden.»

I ATFERDEN

- Etablerer faste hverdagsrutiner
- Veksler mellom tilbaketrekning og nærhet
- Søker støtte

03 Se syklusen



Hva utløser den? Ulykker, tap, vold, kriser.

Hva forsterker den? Trygghet, støttende relasjoner og profesjonell veiledning.

Hva opprettholder den? Å konfrontere traumet for tidlig eller for raskt, slik at man overveldes på nytt.

Stabilisering og bearbeiding etter vanskelige opplevelser

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva gir deg størst følelse av trygghet i hverdagen akkurat nå?
2. Hvem støtter deg i denne perioden?
3. Hvordan merker du at du har det litt bedre?
4. Hva trenger du for å ta det neste skrittet?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Tålmodighet
- Støtte

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg burde vært ferdig med dette nå.»
- «Et tilbakefall betyr at jeg har mislykkes.»
- «Jeg må klare dette helt alene.»

Relaterte kart: 56 · Toleransevindu, 59 · Trygghetsfølelse, 117 · Indre ressurser

06 Neste steg

→ Bygg enkle hverdagsrutiner: søvn, faste måltider, bevegelse.

→ Kartlegg personer og steder som føles trygge for deg.

→ Lær deg minst to ulike jordingsteknikker.

→ Bearbeid vanskelige erfaringer sammen med en fagperson med traukompetanse.

Hvis minner om vanskelige opplevelser jevnlig overvelder deg eller hindrer deg i hverdagen, kan det være nyttig å søke hjelp fra en fagperson som arbeider med traumer.