MENTSD MEG AZ ELAKADT ESETET™ · 2. BÓNUSZ

Sürgős kontrollhelyzetek: letört bracket, szúró ív, eltört készülék

25 sürgős helyzet két kontrollvizit között: értékelés, protokoll és kész szöveg, amit a páciensnek mondhatsz.

Tartalom

Az első 60 másodperc sürgős helyzetben

A 25 helyzet mutatója

1 · Bracket, tubus és gyűrű

2 · Ív és ligatúra

3 · Fájdalom és lágyrészek

4 · Minicsavar

5 · Készülék

6 · Retenció és sín

7 · Trauma és lenyelés

Sürgősségi nyilvántartó lap

KEZDÉS

Az első 60 másodperc sürgős helyzetben

Minden sürgős helyzetben ugyanaz a sorrend: biztonság, ok, megoldás, rögzítés.

1. **Biztonság:** Van légzési probléma, vérzés, lenyelés vagy trauma? Ha igen, az az első.
2. **Mi tört el, mi szúr?** Keresd meg a darabot, és győződj meg róla, hogy nem maradt szabad darab a szájban.
3. **Biztonságban van a páciens?** Szüntesd meg a szúró, dörzsölő vagy szabad darabot.
4. **Mi az ok?** Harapás, étel, ragasztás, készülékkialakítás. Jegyezd fel.
5. **Döntés:** javítás most, halasztás a következő kontrollvizitre vagy továbbküldés.
6. **Rögzítés:** dátum, helyzet, ok, elvégzett beavatkozás és a páciensnek adott tájékoztatás.

Azonnali továbbküldést igénylő helyzetek

- Lenyelés vagy aspiráció gyanúja köhögéssel, légszomjjal vagy nyelési nehézséggel
- Fogsérülés: kimozdulás, törés, állcsonttrauma
- Terjedő duzzanat, láz, váladékozás
- Csillapíthatatlan vérzés

A páciensnek szóló szövegekről

A szövegekben a **[Páciens neve]**, a **[Rendelő neve]** és az **[Időpont dátuma]** mezőket töltsd ki a saját adataiddal. A szövegek tájékoztató jellegűek; a rendelőd által használt kommunikációs csatornán és a saját stílusodban küldd el őket.

MUTATÓ

A 25 helyzet mutatója

Keresd meg a helyzetet, és ugorj a számára.

SZ.	HELYZET	CSOPORT
01	Bracket leválása frontfogon	Bracket, tubus és gyűrű
02	Bracket leválása oldalsó fogon	Bracket, tubus és gyűrű
03	Moláristubus vagy -gyűrű meglazulása	Bracket, tubus és gyűrű
04	A disztális ívvég az arcba szúr	Ív és ligatúra
05	Az ív kicsúszik a tubusból	Ív és ligatúra
06	Törött ív	Ív és ligatúra
07	A ligatúradrót vége szúr	Ív és ligatúra
08	Elasztikus ligatúra vagy lánc elvesztése	Ív és ligatúra
09	A nyitórugó elmozdulása	Ív és ligatúra
10	Fájdalom és érzékenység az első napokban	Fájdalom és lágyrészek
11	Seb az arcon vagy az ajkon	Fájdalom és lágyrészek
12	Irritáció a minicsavar körül	Minicsavar
13	A minicsavar mobilitása vagy kiesése	Minicsavar
14	Meglazult az RME-csavar vagy levált a gyűrű	Készülék
15	A transzpalatinális ív leválása	Készülék
16	A Nance-gomb belenyomódik a nyálkahártyába	Készülék
17	Kivehető funkcionális készülék törése	Készülék
18	Rögzített funkcionális készülék kapcsolatának leválása	Készülék
19	Bőrirritáció vagy rögzítési probléma az arcmaszknál	Készülék

SZ.	HELYZET	CSOPORT
20	Rögzített lingvális retainer leválása	Retenció és sín
21	Eltört vagy elveszett az átlátszó sín vagy az Essix	Retenció és sín
22	Eltört a Hawley-lemez	Retenció és sín
23	Leesett egy attachment alignerkezelés alatt	Retenció és sín
24	Fogsérülés bracketes páciensnél	Trauma és lenyelés
25	Lenyelt vagy elveszett darab gyanúja	Trauma és lenyelés

01. CSOPORT

Bracket, tubus és gyűrű

3 helyzet

01. HELYZET Bracket leválása frontfogon

Értékelés: A bracket az íven lóg, vagy teljesen leesett? Sérült a fogfelszín? A leválást harapási kontaktus okozta?

PROTOKOLL

1. Ellenőrizd az ívet és a bracketet; ha az ív nem szúr, a páciens biztonságban van.
2. Jegyezd fel a leválás okát: harapás, étel, ragasztási felület.
3. Ragaszd fel újra, vagy tervezd a következő kontrollvizitre.
4. Ha ugyanazon a fogon ismét leválik, ellenőrizd a harapási kontaktust.

AMIT A PÁCIENSNEK MONDHATSZ

Kedves [Páciens neve]! A bracket leválása a fogáról nem sürgős helyzet. A bracket az íven maradhat; ha nem szúr, ne nyúljon hozzá. A [Rendelő neve] csapata az [Időpont dátuma] napi kontrollon újra felragasztja. Kerülje a kemény és ragacsos ételeket.

Mikor sürgős: Ha fogtörés vagy trauma is társul hozzá, még aznap értékeld.

02. HELYZET Bracket leválása oldalsó fogon

Értékelés: A premoláris bracket forog az íven, dörzsöli az arcot?

PROTOKOLL

1. Ha a forgó bracket dörzsöli az arcot, rögzítsd ideiglenesen vagy távolítsd el.
2. Ellenőrizd az ívet: szúr a disztális vég?
3. Tervezd meg az újraragasztást.
4. Ellenőrizd a harapási kontaktust.

AMIT A PÁCIENSNEK MONDHATSZ

Kedves [Páciens neve]! Előfordulhat, hogy az oldalsó fogán levált a bracket. Ha dörzsöli az arcát, tegyen rá ortodonciai viaszt. Az [Időpont dátuma] napi kontrollon rendbe tesszük.

Mikor sürgős: Mély seb az arcon vagy lenyelési kockázat esetén korábbi időpont.

03. HELYZET

Moláristubus vagy -gyűrű meglazulása

Értékelés: Mozog a gyűrű a fogon? Gyűlik étel a cement alatt?

PROTOKOLL

1. Vedd le a gyűrűt, tisztítsd meg a fogat és értékeld a felszínt.
2. Cementezd vissza, vagy válassz új gyűrűt.
3. Ha van hozzá kapcsolt készülék (TPA, RME), ellenőrizd az épségét.
4. Írd be a lazulást a naplóba.

AMIT A PÁCIENSNEK MONDHATSZ

Kedves [Páciens neve]! Előfordulhat, hogy meglazult a gyűrű az oldalsó fogán. Gondosan tisztítsa a területet, hogy ne gyűljön meg az étel. Javasoljuk, hogy hozza előrébb az időpontját: [Időpont dátuma].

Mikor sürgős: Ha a gyűrű teljesen levált, és a készülék szabadon van a szájban, még aznap.

02. CSOPORT

Ív és ligatúra

6 helyzet

04. HELYZET A disztális ívvég az arcba szúr

Értékelés: Mennyivel hosszabb az ív a tubusnál? A fogmozgással hosszabbodott meg (a rés záródásával)?

PROTOKOLL

1. Vágd le a felesleges ívet; tompítsd a végét, vagy hajlítsd vissza.
2. Győződj meg róla, hogy a levágott darab nem maradt a szájban.
3. Ellenőrizd az arcon lévő sebet.
4. Ha a rés záródik, jegyezd fel, hogy a következő kontrollon újra megnézed.

AMIT A PÁCIENSNEK MONDHATSZ

Kedves [Páciens neve]! Ha az ív vége az arcába szúr, tegyen rá ortodonciai viaszt. Ne vágja le saját maga az ívet. A [Rendelő neve] csapata az [Időpont dátuma] napi időponton rendbe teszi.

Mikor sürgős: Ha az ív belenyomódott a lágyrészbe és vérzik, korábbi időpont.

05. HELYZET Az ív kicsúszik a tubusból

Értékelés: Kicsúszott az ív a tubusból, a szabad vég szúrja a lágyrészt?

PROTOKOLL

1. Helyezd vissza az ívet a tubusba.
2. Ellenőrizd a kicsúszás okát: rövid az ív, vagy túlzott az aktiválás?
3. Szükség esetén cseréld az ívet.
4. Ha van szabad vég, takard le.

AMIT A PÁCIENSNEK MONDHATSZ

Kedves [Páciens neve]! Előfordulhat, hogy az ív kicsúszott a hátsó fogon lévő helyéről. Ha szúr, használjon viaszt, és ne húzza az ívet. Az időpontja: [Időpont dátuma].

Mikor sürgős: Ha a szabad ív sérülést okoz, korábbi időpont.

06. HELYZET Törött ív

Értékelés: Hol tört el az ív? Mozog a törött darab, van lenyelési kockázat?

PROTOKOLL

1. Távolítsd el a törött darabokat.
2. Cseréld az ívet.
3. Jegyezd fel a törés helyét; ha ismétlődik: harapási kontaktus vagy anyagfáradás.
4. Ellenőrizd a fogak helyzetét a terv szerint.

AMIT A PÁCIENSNEK MONDHATSZ

Kedves [Páciens neve]! Előfordulhat, hogy eltört az íve. Ha a darabok mozognak, ne próbálja kivenni őket; használjon viaszt, és hozza előrébb az időpontját: [Időpont dátuma].

Mikor sürgős: Ha a darab elveszett és lenyelés gyanúja áll fenn, lásd a 25. helyzetet.

07. HELYZET A ligatúradrót vége szúr

Értékelés: A ligatúra vége az ajak vagy az arc felé fordult?

PROTOKOLL

1. Rövidítsd le a végét, és hajtsd a bracket alá.
2. Ellenőrizd a többi ligatúrát.
3. Ellenőrizd a sebet.

AMIT A PÁCIENSNEK MONDHATSZ

Kedves [Páciens neve]! Ha egy vékony drótvég az ajkába szúr, tegyen rá viaszt. A kontrollon rendbe tesszük: [Időpont dátuma].

Mikor sürgős: Általában nem sürgős.

08. HELYZET Elasztikus ligatúra vagy lánc elvesztése

Értékelés: Melyik fogon hiányzik a ligatúra? Kicsúszott az ív a slotból? Kinyílt rés?

PROTOKOLL

1. Pótold a hiányzó ligatúrákat.
2. Lánc elvesztésénél mérd meg a rés állapotát.
3. Ha gyakori a vesztés, beszéld át az étkezési szokásokat.

AMIT A PÁCIENSNEK MONDHATSZ

Kedves [Páciens neve]! Előfordulhat, hogy leesett egy a fogain lévő kis gumik közül. Ez nem sürgős helyzet. Az [Időpont dátuma] napi kontrollon pótoljuk.

Mikor sürgős: Általában nem sürgős.

09. HELYZET A nyitórugó elmozdulása

Értékelés: Elcsúszott a rugó, nyomja az ínyt vagy az arcot?

PROTOKOLL

1. Tedd vissza a rugót a helyére, vagy távolítsd el.
2. Ellenőrizd a helynyitás célját: megmarad a megnyitott hely?
3. Ellenőrizd a rugó stopjait.

AMIT A PÁCIENSNEK MONDHATSZ

Kedves [Páciens neve]! Előfordulhat, hogy a fogai közötti rugó elcsúszott. Ha kellemetlen, használjon viaszt. Az időpontja: [Időpont dátuma].

Mikor sürgős: Ha belenyomódik az ínybe és vérzik, korábbi időpont.

03. CSOPORT

Fájdalom és lágyrészek

2 helyzet

10. HELYZET Fájdalom és érzékenység az első napokban

Értékelés: Friss aktiválás történt? A fájdalom egy fogra korlátozódik, vagy kiterjedt?

PROTOKOLL

1. Különítsd el a várható érzékenységet a nem szokásostól.
2. Egy fogra korlátozódó erős fájdalomnál ellenőrizd a korai kontaktust és a pulpa állapotát.
3. Adj a páciensnek tájékoztatást a pépes étrendről és a szájhigiéniáról.
4. Fájdalomcsillapító szükség esetén orvosi döntés alapján; adagot ez az anyag nem tartalmaz.

AMIT A PÁCIENSNEK MONDHATSZ

Kedves [Páciens neve]! Az aktiválás utáni első napokban várható, hogy a fogai érzékenyek. Részesítse előnyben a puha ételeket. Ha a fájdalom néhány nap alatt nem csökken, vagy egyetlen fogon erősödik, hozza előrébb az időpontját.

Mikor sürgős: Duzzanat, láz vagy egy fogon fokozódó fájdalom esetén még aznap értékeld.

11. HELYZET Seb az arcon vagy az ajkon

Értékelés: Melyik készülékkésszel szemben van a seb? Van éles szélű darab?

PROTOKOLL

1. Keresd meg és szüntesd meg az okot (éles vég, horog, bracketszárny).
2. Mutasd meg a páciensnek a viasz használatát.
3. Kövesd a seb gyógyulását.

AMIT A PÁCIENSNEK MONDHATSZ

Kedves [Páciens neve]! A szájában lévő sebet a készülék dörzsölése okozhatja. Tegyen viaszt a dörzsölő részre. Ha a seb néhány nap alatt nem gyógyul, hozza előrébb a kontrollt.

Mikor sürgős: Nem gyógyuló vagy növekvő sebnél az illetékes szakorvos véleménye.

04. CSOPORT

Minicsavar

2 helyzet

12. HELYZET Irritáció a minicsavar körül

Értékelés: Van körülötte bőrpír, duzzanat vagy váladékozás? Tisztítja a páciens?

PROTOKOLL

1. Tisztítsd meg a területet, és értékeld a lágyrészt.
2. Ismételd meg a higiéniás utasításokat.
3. Ha terhelés alatt van, ellenőrizd a csavar stabilitását.
4. Rögzítsd az állapotot.

AMIT A PÁCIENSNEK MONDHATSZ

Kedves [Páciens neve]! A csavar körüli területet puha fogkefével, óvatosan tisztítsa. Ha a duzzanat vagy a váladékozás fokozódik, hozza előrébb az időpontját.

Mikor sürgős: Terjedő duzzanat, láz vagy váladékozás esetén még aznapi értékelés, szükség esetén továbbküldés.

13. HELYZET A minicsavar mobilitása vagy kiesése

Értékelés: Mobilis a csavar, vagy kiesett? Megtalálták a kiesett csavart?

PROTOKOLL

1. A mobilis csavart ne terheld.
2. Ha kiesett, ellenőrizd a területet; győződj meg róla, hogy a csavar nem veszett el.
3. Állítsd a mechanikát csavar nélkül is biztonságos állapotba.
4. Tervezd meg az újrabehelyezésről szóló döntést és az új helyet.

AMIT A PÁCIENSNEK MONDHATSZ

Kedves [Páciens neve]! Előfordulhat, hogy a szájában lévő kis csavar kiesett vagy meglazult. Ha megtalálta, őrizze meg, és hozza el a kontrollra. Hozza előrébb az időpontját: [Időpont dátuma].

Mikor sürgős: Ha a csavar elveszett és lenyelés gyanúja áll fenn, lásd a 25. helyzetet.

05. CSOPORT

Készülék

6 helyzet

14. HELYZET Meglazult az RME-csavar vagy levált a gyűrű

Értékelés: Mozog a készülék? Forog a csavar? Mit mutat az aktiválási napló?

PROTOKOLL

1. Ellenőrizd a készüléket és a gyűrűket.
2. Szükség esetén vedd ki a készüléket, és cementezd vissza.
3. Állítsd le az aktiválást, és frissítsd a naplót.
4. Mérd meg a tágítás állapotát.

AMIT A PÁCIENSNEK MONDHATSZ

Kedves [Páciens neve]! Előfordulhat, hogy a szájpadláson lévő tágítókészülék meglazult. Egyelőre ne tekerje tovább a csavart. Hozza előrébb az időpontját: [Időpont dátuma].

Mikor sürgős: Ha a készülék szabadon van a szájban, még aznap.

15. HELYZET A transzpalatinális ív leválása

Értékelés: A forrasztásnál vagy a gyűrűnél vált le? Szabad az ív?

PROTOKOLL

1. Távolítsd el a szabad darabot.
2. Értékeld a lehorgonyzási igényt; tervezz ideiglenes megoldást.
3. Pótold a készüléket.

AMIT A PÁCIENSNEK MONDHATSZ

Kedves [Páciens neve]! Előfordulhat, hogy a szájpadlásán lévő ív levált. Ha a darab mozog, óvatosan vegye ki, vagy használjon viaszt, és hozza előrébb az időpontját.

Mikor sürgős: Ha a darab szabad és lenyelési kockázat áll fenn, még aznap.

16. HELYZET A Nance-gomb belenyomódik a nyálkahártyába

Értékelés: Van lenyomat, fekély vagy gyulladás a szájpadlás nyálkahártyáján?

PROTOKOLL

1. Emeld el a készüléket a nyálkahártyától, vagy vedd ki.
2. Kövesd a lágyrész gyógyulását.
3. Ismételd meg a higiéniás utasításokat.
4. Tervezz ideiglenes megoldást a lehorgonyzásra.

AMIT A PÁCIENSNEK MONDHATSZ

Kedves [Páciens neve]! Előfordulhat, hogy a szájpadlásán lévő készülék nyomja a nyálkahártyát. Tartsa tisztán a területet; a kontrollon megnézzük: [Időpont dátuma].

Mikor sürgős: Nem gyógyuló fekélynél az illetékes szakorvos.

17. HELYZET Kivehető funkcionális készülék törése

Értékelés: Hol a törés? Behelyezhető még a készülék?

PROTOKOLL

1. Értékeld a törést; dönts a javításról vagy a pótlásról.
2. Ha a készülék nem helyezhető be, jegyezd fel, a kezelés melyik fázisában tart.
3. Mondd meg a páciensnek, hogy ne hordja a törött készüléket.

AMIT A PÁCIENSNEK MONDHATSZ

Kedves [Páciens neve]! Ha eltört a készüléke, ne hordja, és őrizze meg a darabokat. Hozza el őket a kontrollra: [Időpont dátuma].

Mikor sürgős: Általában nem sürgős; a kezelés folyamatossága érdekében rövid időn belüli javítás.

18. HELYZET Rögzített funkcionális készülék kapcsolatának leválása

Értékelés: Teljesen levált a kapcsolat? Szabadon van a készülék a szájban?

PROTOKOLL

1. Távolítsd el a szabad darabokat.
2. Pótold a kapcsolatot.
3. Ellenőrizd a szájnyitási mozgást.
4. Rögzítsd az ismétlődő leválásokat.

AMIT A PÁCIENSNEK MONDHATSZ

Kedves [Páciens neve]! Előfordulhat, hogy a fogain lévő rögzített készülék egyik kapcsolata levált. Ne nyissa nagyra a száját, és hozza előrébb az időpontját: [Időpont dátuma].

Mikor sürgős: Ha a darab szabad, még aznap.

19. HELYZET Bőrirritáció vagy rögzítési probléma az arcmaszknál

Értékelés: Van bőrpír vagy seb a bőrön? Stabilak a horgok a szájban?

PROTOKOLL

1. Igazítsd a nyomási pontokat.
2. Ellenőrizd a szájon belüli kapcsolatokat.
3. Beszéld át újra a pácienssel a viselési időt és rendet.

AMIT A PÁCIENSNEK MONDHATSZ

Kedves [Páciens neve]! Ha a maszk érintkezési pontjainál bőrpír van, a kontrollon beállítjuk. Ha seb alakul ki a bőrön, átmenetileg ne viselje a maszkot, és hozza előrébb az időpontját.

Mikor sürgős: Bőrseb vagy fertőzés jelei esetén az illetékes orvos.

06. CSOPORT

Retenció és sín

4 helyzet

20. HELYZET Rögzített lingvális retainer leválása

Értékelés: Melyik fognál vált le? Elmozdultak a fogak?

PROTOKOLL

1. Rögzítsd a leválást és a fogak helyzetét.
2. Javítsd vagy pótold.
3. Ha van recidíva, mérd meg a mértékét.
4. Nézd át a retenciós tervet (2. útmutató · Ortodontiai Retenciós Kézikönyv).

AMIT A PÁCIENSNEK MONDHATSZ

Kedves [Páciens neve]! Előfordulhat, hogy a fogai mögötti vékony drót egyik vége levált. Hogy a fogak ne mozduljanak el, javasoljuk, hogy hozza előrébb a kontrollt: [Időpont dátuma]. Ha van átlátszó sínje, továbbra is hordja.

Mikor sürgős: Szúrás és seb esetén korábbi időpont.

21. HELYZET Eltört vagy elveszett az átlátszó sín vagy az Essix

Értékelés: Mióta nem hordja a sínt? Elmozdultak a fogak?

PROTOKOLL

1. Tervezz lenyomatot vagy szkennelést az új sínhez.
2. Ellenőrizd a fogak helyzetét.
3. Rögzítsd, mennyi ideig nem volt sín.

AMIT A PÁCIENSNEK MONDHATSZ

Kedves [Páciens neve]! Ha elvesztette vagy eltört a sínje, rövid időn belül új sínre van szükség, hogy a fogai ne mozduljanak el. Hozza előrébb az időpontját: [Időpont dátuma].

Mikor sürgős: Általában nem sürgős; a késlekedés recidívához vezethet.

22. HELYZET Eltört a Hawley-lemez

Értékelés: Az akrilát vagy a drót tört el? Még illeszkedik a lemez?

PROTOKOLL

1. Dönts a javításról vagy a pótlásról.
2. Ellenőrizd az illeszkedést.
3. Győződj meg róla, hogy a törött rész nem szúrja a lágyrészt.

AMIT A PÁCIENSNEK MONDHATSZ

> *Kedves [Páciens neve]! Ha eltört a lemeze, ne hordja, és őrizze meg a darabokat. Hozza el őket a kontrollra: [Időpont dátuma].*

Mikor sürgős: Általában nem sürgős.

23. HELYZET Leesett egy attachment alignerkezelés alatt

Értékelés: Melyik attachment? Illeszkedik a sín?

PROTOKOLL

1. Pótold az attachmentet sablonnal.
2. Ellenőrizd az illeszkedést.
3. Mutasd meg a páciensnek a sín kivételének technikáját.

AMIT A PÁCIENSNEK MONDHATSZ

> *Kedves [Páciens neve]! Előfordulhat, hogy leesett egy a fogain lévő kis kiemelkedések közül. Továbbra is hordja a sínjét; a kontrollon pótoljuk: [Időpont dátuma].*

Mikor sürgős: Általában nem sürgős.

07. CSOPORT

Trauma és lenyelés

2 helyzet

24. HELYZET Fogsérülés bracketes páciensnél

Értékelés: Mely fogak érintettek? Van mobilitás, törés, elmozdulás?

PROTOKOLL

1. Értékeld a fogakat, a csontot és a lágyrészeket.
2. Készíts röntgenfelvételt.
3. Vedd le az aktív erőket a sérült fogról.
4. Dokumentáld a vitalitást, és készíts követési tervet (4. útmutató · Trauma és Ankilózis).
5. Szükség esetén küldd tovább az illetékes szakorvoshoz.

AMIT A PÁCIENSNEK MONDHATSZ

Kedves [Páciens neve]! Ha ütés érte a fogait, még aznap meg kell vizsgálni. Ha kimozdult egy fog vagy letört egy darab, őrizze meg, és azonnal jelentkezzen.

Mikor sürgős: Fogkimozdulás, törés vagy állcsonttrauma esetén még aznap; szükség esetén sürgősségi ellátás.

25. HELYZET Lenyelt vagy elveszett darab gyanúja

Értékelés: Melyik darab hiányzik? Van a páciensnek köhögése, légszomja, nyelési nehézsége?

PROTOKOLL

1. Gondosan vizsgáld át a szájüreget.
2. Légzési tünet esetén azonnal küldd a pácienst sürgősségi orvosi vizsgálatra.
3. Ha nincs tünet, rögzítsd az esetet, és orvosi döntés alapján tervezd meg az orvosi kivizsgálást.
4. Állapítsd meg, miért esett ki a darab.

AMIT A PÁCIENSNEK MONDHATSZ

Kedves [Páciens neve]! Ha úgy gondolja, hogy lenyelt egy darabot a készülékéből, és köhög, légszomja vagy nyelési nehézsége van, azonnal forduljon a legközelebbi sürgősségi ellátóhelyhez. Ha nincs tünete, hozza előrébb az időpontját; közösen döntjük el, hogyan tovább.

Mikor sürgős: A légzési tünet mindig sürgős.

LAP

Sürgősségi nyilvántartó lap

Minden sürgős helyzethez egy lap. Sokszorosítva használd.

1. sürgősségi lap

Páciens

Dátum

A helyzet száma és neve

Mi történt (a páciens elmondása)

Lelet

Valószínű ok

Elvégzett beavatkozás

A páciensnek adott tájékoztatás

Ismétlődő helyzet?

Következő kontrollvizit

2. sürgősségi lap

Páciens

Dátum

A helyzet száma és neve

Mi történt (a páciens elmondása)

Lelet

Valószínű ok

Elvégzett beavatkozás

A páciensnek adott tájékoztatás

Ismétlődő helyzet?

Következő kontrollvizit

Oktatási célú anyag. Nem helyettesíti a klinikai vizsgálatot, az orvos döntését és a szakorvosi véleményt.

Következő lépés

Ha a sürgős helyzet ismétlődik, töltsd ki az **Esetnapló** gyökérok-elemzését. Ha mechanikai okot látsz, nyisd meg a **Mechanikai hibaelhárítási atlasz** anyagot, trauma esetén pedig a **4. útmutató · Trauma és Ankilózis** fejezetet.