OMRÅDE 6 · 10 KARTOR

Stress, trauma och trygghet

10 emotionella tankekartor, vardera över 2 sidor, med samma sexstegsstruktur.

Visuell Terapeutisk Atlas · Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Kamprespons

Kamprespons

01 Förstå

Kampresponsen är en av nervsystemets automatiska försvarsreaktioner vid fara: energi, kraft och en impuls att konfrontera. Den är ändamålsenlig vid verklig fara. Men när den aktiveras i vardagliga situationer leder den ofta till irritabilitet, ilska och konflikter.

> Kampresponsen är ingen karaktärsbrist, utan nervsystemets försvar. Du kan lära dig att lugna den.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Värmevallningar, spända muskler
- Sammanbitna käkar, knutna nävar
- Hög puls


I TANKARNA

- ”Jag låter mig inte köras med.”
- ”Jag måste försvara mig.”
- ”De angriper mig.”

I BETEENDET

- Höjer rösten
- Grälar, gör motstånd
- Försöker ta kontroll över situationen

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Kritik, orättvisa, upplevelse av förlorad kontroll.

Vad förstärker den? Trötthet, stress och tidigare svåra erfarenheter.

Vad upprätthåller den? Att nervsystemet inte upplever trygg lugnande reglering.

Kamprespons

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. I vilka situationer utlöses kampresponsen hos dig?
2. Vad känner du först i kroppen i sådana stunder?
3. Vad försöker du skydda?
4. Vad hjälper dig att hitta lugnet igen?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Respekt
- Kontroll

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Om jag inte går till angrepp kommer de att såra mig.”
- ”Svaghet är farligt.”
- ”Jag måste hela tiden vara på min vakt.”

Relaterade kartor: 11 · Ilska, 56 · Toleransfönster, 57 · Hyperaktivering

06 Nästa steg

→ Känn igen signalerna från kroppen och ta en kort paus.

→ Förläng utandningen och slappna av i musklerna.

→ Få ut den uppbyggda energin genom rörelse.

→ Återgå till samtalet när du känner dig lugnare.

Om minnen från svåra upplevelser regelbundet överväldigar dig eller hindrar dig i vardagen, kan det vara till hjälp att söka stöd hos en professionell behandlare med traumakompetens.

Flyktrespons

Flyktrespons

01 Förstå

Flyktresponsen är en automatisk impuls från nervsystemet att ta sig bort från faran. I en verklig nödsituation räddar den liv. I vardagen kan den ta sig uttryck i oro, undvikande, rastlöshet eller en flykt in i ständig aktivitet.

> Flyktresponsen säger: ”Här är du inte trygg”. Det är värt att undersöka om det stämmer här och nu.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Oro, svårt att sitta still
- Snabb andning
- Spända ben


I TANKARNA

- ”Jag måste bort härifrån.”
- ”Jag står inte ut med det här.”
- ”Snabbt, bara iväg härifrån.”

I BETEENDET

- Lämnar situationen
- Arbetar alldeles för mycket eller är konstant i rörelse
- Undviker svåra samtal

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Platser med mycket folk, konflikter, känslomässig närhet.

Vad förstärker den? Tidigare erfarenhet av att flykt gav trygghet.

Vad upprätthåller den? Undvikande som hindrar nya upplevelser av trygghet.

Flyktrespons

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilka situationer vill du oftast fly ifrån?

2. Vad signalerar kroppen till dig i sådana stunder?

3. Vad skulle hända om du stannade kvar i bara en minut till?

4. Vad flyr du egentligen från: situationen eller känslan?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Frihet
- Lugn

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Om jag stannar kommer något fruktansvärt att hända.”
- ”Jag tål inte denna obehagliga känsla.”
- ”Flykt är den enda utvägen.”

Relaterade kartor: 6 · Ångestundvikande, 56 · Toleransfönster, 57 · Hyperaktivering

06 Nästa steg

→ Lägg märke till flyktimpulsen och sätt ord på den.

→ Känn fötterna mot underlaget och andas långsammare.

→ Stanna kvar i situationen under en kort, förutbestämd tid.

→ Planera en trygg reträttmöjlighet i förväg.

Om minnen från svåra upplevelser regelbundet överväldigar dig eller hindrar dig i vardagen, kan det vara till hjälp att söka stöd hos en professionell behandlare med traumakompetens.

Frysrespons

Frysrespons

01 Förstå

Frysresponsen utlöses när varken kamp eller flykt verkar möjlig. Kroppen stelnar, tankarna töms, rösten fastnar i halsen. I efterhand känner man ofta skam (”Varför gjorde jag ingenting?”), trots att detta är en automatisk reaktion man inte väljer.

> Att frysa till får inte förväxlas med svaghet eller samtycke: det är nervsystemets överlevnadsstrategi.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Stela muskler, orörlighet
- Andning som hålls inne
- Kalla händer och fötter, stickningar


I TANKARNA

- ”Det är helt tomt i huvudet.”
- ”Jag klarar inte att få fram ett ord.”
- ”Som om jag inte är närvarande.”

I BETEENDET

- Reagerar inte, stannar upp helt
- Klarar inte att fatta ett beslut
- Klandrar sig själv i efterhand

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Skrik, plötsliga konflikter, situationer som påminner om gamla trauman.

Vad förstärker den? Skam och självförebråelser som belastar nervsystemet ytterligare.

Vad upprätthåller den? Att kroppen inte upplever en trygg väg ut ur frystillståndet.

Frysrespons

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Har du upplevt att du stelnat till helt?

2. Vad kände du i kroppen efteråt?

3. Vad brukar du säga till dig själv om sådana stunder?

4. Vad hjälper dig att ”komma tillbaka” till kroppen?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Förståelse
- Självacceptans

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag var svag för att jag inte gjorde något.”
- ”Det var mitt eget fel.”
- ”Jag kan inte lita på min egen kropp.”

Relaterade kartor: 56 · Toleransfönster, 58 · Frånkoppling och hypoaktivering, 13 · Skam

06 Nästa steg

→ Säg till dig själv: ”Min kropp skyddade mig så gott den kunde”.

→ Rör försiktigt på fingrar och tår.

→ Se dig omkring och benämn färger i rummet.

→ Om detta sker ofta, sök hjälp hos en terapeut som arbetar med trauma.

Om minnen från svåra upplevelser regelbundet överväldigar dig eller hindrar dig i vardagen, kan det vara till hjälp att söka stöd hos en professionell behandlare med traumakompetens.

Följsamhetsrespons

Följsamhetsrespons

01 Förstå

Följsamhetsresponsen (fawn) är en strategi i nervsystemet där vi försöker avvärja fara genom att blidka andra och vara eftergivna. Den utvecklas ofta under uppväxten om detta var det enda sättet att bevara tryggheten på. I vuxen ålder leder det till överanpassning och brist på gränser.

> Följsamhet gav trygghet en gång. I dag leder det till att det inte finns plats för dina egna behov.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning när en konflikt närmar sig
- Ett leende som döljer inre rädsla
- Utmattning


I TANKARNA

- ”Bara han eller hon inte blir arg.”
- ”Vad vill den andra höra?”
- ”Mina behov är inte viktiga.”

I BETEENDET

- Säger ja till allt
- Ursäktar sig innan något har hänt
- Undviker ordet ”nej”

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Spänt ansiktsuttryck, kritik, auktoritetspersoner.

Vad förstärker den? Tidigare erfarenhet av att det var farligt att göra motstånd.

Vad upprätthåller den? Att eftergivenhet kortsiktigt faktiskt minskar spänningen.

Följsamhetsrespons

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. När säger du ja trots att du tänker nej?

2. Vad är du rädd ska hända om du avböjer?

3. Vem lärde dig att det gav trygghet att anpassa sig?

4. Vad kan vara ett litet steg mot att tillgodose egna behov?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Acceptans
- Egen röst

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Om jag säger nej svävar jag i fara.”
- ”Andras känslor är viktigare.”
- ”Jag förtjänar bara kärlek när jag anpassar mig.”

Relaterade kartor: 68 · Behov av att vara till lags, 72 · Svårighet att säga nej, 71 · Personliga gränser

06 Nästa steg

→ Be om betänketid innan du säger ja.

→ Öva på att säga ett litet ”nej” i trygga sammanhang.

→ Skriv ner vad du egentligen vill i den givna situationen.

→ Lägg märke till kroppens signaler när du börjar ge efter för mycket.

Om minnen från svåra upplevelser regelbundet överväldigar dig eller hindrar dig i vardagen, kan det vara till hjälp att söka stöd hos en professionell behandlare med traumakompetens.

Emotionella triggers

Emotionella triggers

01 Förstå

Emotionella triggers är sinnesintryck – ljud, ord, situationer, dofter – kopplade till en smärtsam upplevelse från det förflutna, som utlöser en reaktion som är oproportionerligt stark i förhållande till situationen här och nu. Reaktionen hör till det förflutna, men utspelar sig i nutid.

> När reaktionen är starkare än situationen motiverar är det ofta ett gammalt sår som gör sig påmint.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Plötslig hjärtklappning
- Klump i halsen
- Stickningar eller skakningar


I TANKARNA

- ”Precis som den gången.”
- ”Nu händer det igen.”
- En plötslig, överväldigande våg av känslor

I BETEENDET

- Exploderar plötsligt eller drar sig undan
- Undviker situationer som triggar
- Förstår inte sin egen reaktion i efterhand

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Tonfall, ansiktsuttryck, årsdagar, dofter.

Vad förstärker den? Trötthet och stress som försvagar den psykiska motståndskraften.

Vad upprätthåller den? Brist på medvetenhet om triggers, så att reaktionen överrumplar dig.

Emotionella triggers

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilka situationer väcker en stark reaktion hos dig?

2. Vad påminner denna situation dig om?

3. Hur gammal känner du dig i en sådan stund?

4. Vad kan hjälpa dig att förbereda dig inför dessa tillfällen?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Förutsägbarhet
- Förståelse

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag är överkänslig.”
- ”Jag klarar inte att styra mina reaktioner.”
- ”Det förflutna släpper aldrig taget.”

Relaterade kartor: 56 · Toleransfönster, 59 · Trygghetskänsla, 89 · Triggers i sorgen

06 Nästa steg

→ För dagbok över triggers och egna reaktioner.

→ Säg till dig själv: ”Det här är en gammal känsla, inte situationen här och nu”.

→ Använd en grundningsteknik (5-4-3-2-1).

→ Planera i förväg vad du ska göra när du möter en känd trigger.

Om minnen från svåra upplevelser regelbundet överväldigar dig eller hindrar dig i vardagen, kan det vara till hjälp att söka stöd hos en professionell behandlare med traumakompetens.

Toleransfönster

Toleransfönster

01 Förstå

Toleransfönstret (enligt Daniel Siegel) är den optimala zonen där aktiveringsnivån främjar uppmärksamhet utan att störa tankeförmågan. I denna zon kan vi lära oss, bygga relationer och fatta bra beslut. Ovanför fönstret uppstår hyperaktivering (ångest, ilska), under uppstår hypoaktivering (tomhet, avstängdhet).

> Målet är inte lugn till varje pris, utan att vidga fönstret och lära sig vägarna tillbaka.

02 Känn igen

I KROPPEN

- I fönstret: lugn andning, avspända muskler
- Över fönstret: hjärtklappning, spänning
- Under fönstret: avstängdhet, tyngd


I TANKARNA

- I fönstret: ”Det här hanterar jag.”
- Över fönstret: ”Det här blir för mycket.”
- Under fönstret: ”Ingenting spelar någon roll.”

I BETEENDET

- I fönstret: tar kontakt, reflekterar
- Över fönstret: exploderar, flyr
- Under fönstret: drar sig undan, stelnar

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Stress, konflikt, utmattning, gamla minnen.

Vad förstärker den? Brist på vila och isolering.

Vad upprätthåller den? Brist på etablerade självregleringsverktyg som underlättar vägen tillbaka.

Toleransfönster

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Hur mår du när du befinner dig inom toleransfönstret?

2. Hur märker du att du är på väg över fönstret?

3. Och hur märker du att du faller under det?

4. Vad hjälper dig att hitta tillbaka?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Reglering
- Relation

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag har ingen kontroll över mitt eget tillstånd.”
- ”Jag reagerar alltid för starkt eller för svagt.”
- ”Inre lugn är bara för andra.”

Relaterade kartor: 57 · Hyperaktivering, 58 · Frånkoppling och hypoaktivering, 19 · Emotionell överbelastning

06 Nästa steg

→ Rita ditt toleransfönster och fyll i dina egna signaler.

→ Skriv ner vad som hjälper när du är över, och vad som hjälper när du är under.

→ En minut dagligen: Var befinner jag mig i förhållande till fönstret nu?

→ Se till att få regelbunden vila, fysisk aktivitet och kontakt med andra.

Om minnen från svåra upplevelser regelbundet överväldigar dig eller hindrar dig i vardagen, kan det vara till hjälp att söka stöd hos en professionell behandlare med traumakompetens.

Hyperaktivering

Hyperaktivering

01 Förstå

Hyperaktivering (hyperarousal) är ett tillstånd där nervsystemet arbetar över toleransfönstret: för mycket energi, överdriven vaksamhet och överväldigande känslor. Då är det svårt att tänka klart, fatta beslut eller sova. Efter långvarig stress eller trauma kan detta bli ett kroniskt tillstånd.

> I ett tillstånd av hyperaktivering behöver kroppen först och främst lugnas, inte rationella argument. Lugnet börjar alltid i kroppen.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Hög puls, ytlig andning
- Svettningar, skakningar
- Sömnstörningar, oroliga nätter


I TANKARNA

- ”Något fruktansvärt kommer att hända.”
- Tankeöverbelastning
- Svårt att koncentrera sig

I BETEENDET

- Irritabilitet, förhastade reaktioner
- Svårt att varva ner
- Tar på sig för många uppgifter

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Konflikter, snäva tidsramar, buller, gamla minnen.

Vad förstärker den? Koffein, för lite sömn och kronisk brist på återhämtning.

Vad upprätthåller den? Brist på dagliga metoder för urladdning och lugnande återhämtning.

Hyperaktivering

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Hur märker du att du är på väg upp i högvarv?
2. Vad brukar hjälpa dig i sådana stunder?
3. Hur mycket tid har du för vila varje dag?
4. Vad kan du välja bort den här veckan?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Lugn
- Vila
- Trygghet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Om jag stannar upp rasar allting.”
- ”Att vila är bortkastad tid.”
- ”Jag måste hela tiden vara i beredskap.”

Relaterade kartor: 56 · Toleransfönster, 51 · Kamprespons, 97 · Spänning och beredskapstillstånd

06 Nästa steg

→ Lång utandning: andas in i 4 sek, andas ut i 7–8 sek, upprepa några gånger.

→ Kallt vatten i ansiktet eller på handlederna.

→ Regelbunden rörelse för att få ut överskottsenergi.

→ Dra ner på koffein och håll fasta sovtider.

Om minnen från svåra upplevelser regelbundet överväldigar dig eller hindrar dig i vardagen, kan det vara till hjälp att söka stöd hos en professionell behandlare med traumakompetens.

Frånkoppling och hypoaktivering

Frånkoppling och hypoaktivering

01 Förstå

Hypoaktivering (hypoarousal) är ett tillstånd där nervsystemet fungerar under toleransfönstret: tomhet, avstängdhet, energibrist och frånkoppling från kropp och känslor. Det uppstår ofta efter överväldigande stress, när systemet slår över i ”nödläge”.

> Frånkoppling är ett skydd mot sinnesintryck som överväldigar. Att hitta tillbaka kräver tid och trygga, små steg.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Trötthet, tunga lemmar
- Avstängdhet, köldkänsla
- Långsamma rörelser


I TANKARNA

- ”Jag känner ingenting.”
- ”Jag är som i en dimma.”
- ”Allt kvittar för mig.”

I BETEENDET

- Sluter sig
- Sover hela tiden eller blir sittande framför skärmen
- Klarar inte att ta tag i saker

03 Se cykeln



Vad utlöser den? För mycket stress, konflikter eller upplevelse av förlust.

Vad förstärker den? Isolering och brist på rörelse.

Vad upprätthåller den? Brist på sinnesintryck som på ett tryggt sätt hjälper dig tillbaka till kroppen.

Frånkoppling och hypoaktivering

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. När känner du dig ”frånkopplad”?

2. Vad hände precis innan?

3. Vad hjälper dig att känna din kropp lite grann igen?

4. Vem ger dig en känsla av lättnad bara genom sin närvaro?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Kontakt
- Vitalitet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Det är bättre att inte känna något.”
- ”Jag orkar ingenting ändå.”
- ”Ingenting kommer att förändras i alla fall.”

Relaterade kartor: 56 · Toleransfönster, 53 · Frysrespons, 14 · Ledsnad

06 Nästa steg

→ Börja med mjuka rörelser: stretchning, en promenad, rytmisk rörelse.

→ Använd tydligare sinnesintryck: kallt vatten, en frisk doft, markant smak.

→ Ta kontakt med någon, gärna bara med ett kort meddelande.

→ Ge dig själv en liten, helt överkomlig uppgift.

Om minnen från svåra upplevelser regelbundet överväldigar dig eller hindrar dig i vardagen, kan det vara till hjälp att söka stöd hos en professionell behandlare med traumakompetens.

Trygghetskänsla

Trygghetskänsla

01 Förstå

Trygghetskänsla är ett tillstånd i nervsystemet där kropp och sinne vet att det inte föreligger någon omedelbar fara, så att vila, nyfikenhet och närhet till andra blir möjlig. Den beror inte bara på yttre omständigheter, utan byggs också upp av signaler från kroppen, goda relationer och inre resurser.

> Trygghet är inte bara frånvaro av fara, utan närvaro av kontakt och inre lugn.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Djupare och lugnare andning
- Avspända muskler
- Värme i kroppen


I TANKARNA

- ”Här och nu är jag trygg.”
- ”Jag kan lita på någon.”
- ”Jag har gott om tid.”

I BETEENDET

- Större öppenhet och nyfikenhet
- Lättare att knyta kontakt
- Förmåga att finna vila

03 Se cykeln



Vad utlöser den? En trygg person, en trygg plats, en lugnande ritual.

Vad förstärker den? Regelbunden vila, stödjande relationer och förutsägbarhet.

Vad upprätthåller den? Upprepning: varje trygg upplevelse stärker nervsystemet.

Trygghetskänsla

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Var och tillsammans med vem känner du dig tryggast?
2. Vad känner du i kroppen i sådana stunder?
3. Vilka föremål, dofter och ljud ger dig trygghet?
4. Hur kan du väva in dessa i din vardag?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Relation
- Förutsägbarhet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag är inte trygg någonstans.”
- ”Lugnet varar aldrig länge.”
- ”Jag förtjänar inte lugn och ro.”

Relaterade kartor: 56 · Toleransfönster, 115 · Stödnätverk, 117 · Inre resurser

06 Nästa steg

→ Gör en ”trygghetslista”: personer, platser, saker och sysslor.

→ Skapa en daglig ritual för att varva ner.

→ Föreställ dig en trygg plats och återvänd dit varje dag.

→ Lägg märke till vad som hjälper din kropp att slappna av helt.

Om minnen från svåra upplevelser regelbundet överväldigar dig eller hindrar dig i vardagen, kan det vara till hjälp att söka stöd hos en professionell behandlare med traumakompetens.

Stabilisering och återhämtning efter svåra upplevelser

Stabilisering och återhämtning efter svåra upplevelser

01 Förstå

Stabilisering och återhämtning efter svåra händelser är en process där man först etablerar trygghet och stabilitet i vardagen, för att sedan – med rätt stöd – bearbeta det som har hänt. Återhämtning är inte en rak linje: bra och dåliga perioder växlar om varandra.

> Först trygghet, därefter integrering av upplevelserna. Tempot bestäms av din egen trygghetskänsla.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Svängande energinivå
- Förändringar i sömn och matlust
- Ökad sårbarhet i kroppen


I TANKARNA

- ”När blir jag mig själv igen?”
- ”Något inom mig är oåterkalleligt förstört.”
- ”Det kommer att bli bättre med tiden.”

I BETEENDET

- Etablerar fasta vardagsrutiner
- Växlar mellan tillbakadragande och närhet
- Söker stöd

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Olyckor, förluster, våld, kriser.

Vad förstärker den? Trygghet, stödjande relationer och professionell vägledning.

Vad upprätthåller den? Att konfrontera traumat för tidigt eller för snabbt, så att man överväldigas på nytt.

Stabilisering och återhämtning efter svåra upplevelser

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad ger dig störst känsla av trygghet i vardagen just nu?
2. Vem stöttar dig under den här perioden?
3. Hur märker du att du mår lite bättre?
4. Vad behöver du för att ta nästa steg?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Tålamod
- Stöd

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag borde ha kommit över detta vid det här laget.”
- ”Ett bakslag innebär att jag har misslyckats.”
- ”Jag måste klara det här helt på egen hand.”

Relaterade kartor: 56 · Toleransfönster, 59 · Trygghetskänsla, 117 · Inre resurser

06 Nästa steg

→ Bygg enkla vardagsrutiner: sömn, fasta måltider, rörelse.

→ Kartlägg personer och platser som känns trygga för dig.

→ Lär dig minst två olika grundningstekniker.

→ Bearbeta svåra erfarenheter tillsammans med en behandlare med traumakompetens.

Om minnen från svåra upplevelser regelbundet överväldigar dig eller hindrar dig i vardagen, kan det vara till hjälp att söka stöd hos en professionell behandlare med traumakompetens.