ATLAS SPOUŠŤOVÝCH BODŮ

100+ vizuálních karet přenesené bolesti

Hlava · Rameno · Záda · Pánev · Dolní končetina

NEŽ ZAČNETE

JAK ATLAS POUŽÍVAT

STRUKTURA

102 karet uspořádaných podle pěti tělesných oblastí. Každá karta ukazuje jeden sval: funkci, začátek, úpon, inervaci, polohu spoušťového bodu, vzorec přenesené bolesti, způsob palpace a přidružené příznaky.

RYCHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Použijte abecední klinický rejstřík, záložky PDF v bočním panelu (každý sval je dostupný jedním kliknutím) nebo vyhledávač příznaků: vyberte, kde se bolest objevuje, a podívejte se, které svaly přicházejí v úvahu.

ZNAČENÍ

Bílý kroužek s černým X: spoušťový bod. Sytě červená: hlavní zóna bolesti. Světle červené tečkování: rozšířená (spillover) zóna.

TISK

Formát A4, optimalizováno pro 300 DPI. Při tisku zvolte nastavení „skutečná velikost“.

DŮLEŽITÉ

Atlas slouží ke vzdělávání a jako reference. Nenahrazuje lékařskou diagnózu. U hrudních, břišních nebo neurologických příznaků vždy nejprve vylučte lékařské příčiny.

OBSAH

PODLE TĚLESNÝCH OBLASTÍ

HLAVA, OBLIČEJ A KRK

1. Trapezius – horní vlákna · 2. Sternocleidomastoideus (SCM) · 3. Masseter (žvýkací sval) · 4. Temporalis (spánkový sval) · 5. Pterygoideus lateralis · 6. Pterygoideus medialis · 7. Splenius capitis · 8. Splenius cervicis · 9. Subokcipitální svaly · 10. Semispinalis capitis · 11. Levator scapulae (zdvihač lopatky) · 12. Skalenové svaly · 13. Digastricus · 14. Occipitofrontalis (čelní a týlní sval) · 15. Zygomaticus major · 16. Orbicularis oculi · 17. Platysma · 18. Longus colli

RAMENO, PAŽE, PŘEDLOKTÍ A RUKA

19. Trapezius – střední vlákna · 20. Trapezius – dolní vlákna · 21. Supraspinatus · 22. Infraspinatus · 23. Teres minor · 24. Teres major · 25. Subscapularis · 26. Deltoideus · 27. Latissimus dorsi · 28. Rhomboidní svaly · 29. Pectoralis major (velký prsní sval) · 30. Pectoralis minor (malý prsní sval) · 31. Serratus anterior · 32. Subclavius · 33. Coracobrachialis · 34. Biceps brachii · 35. Brachialis · 36. Triceps brachii · 37. Anconeus · 38. Supinator · 39. Brachioradialis · 40. Extensor carpi radialis · 41. Extensor digitorum · 42. Flexor carpi radialis a ulnaris · 43. Pronator teres · 44. Palmaris longus · 45. Adductor pollicis · 46. Opponens pollicis · 47. Mezikostní svaly ruky

ZÁDA, PÁTEŘ A TRUP

48. Serratus posterior superior · 49. Serratus posterior inferior · 50. Iliocostalis thoracis · 51. Iliocostalis lumborum · 52. Longissimus thoracis · 53. Multifidus · 54. Rotatores a interspinales · 55. Quadratus lumborum · 56. Rectus abdominis (přímý břišní sval) · 57. Obliquus externus abdominis · 58. Mezižeberní svaly · 59. Bránice · 60. Sternalis

PÁNEV, KYČEL A HÝŽĎOVÉ SVALY

61. Gluteus maximus · 62. Gluteus medius · 63. Gluteus minimus · 64. Piriformis · 65. Hluboké rotátory (gemelli a obturator internus) · 66. Quadratus femoris · 67. Tensor fasciae latae · 68. Iliopsoas · 69. Pectineus · 70. Adductor longus a brevis · 71. Adductor magnus · 72. Gracilis · 73. Sartorius (krejčovský sval) · 74. Svaly pánevního dna

STEHNO, BÉREC A CHODIDLO

75. Rectus femoris · 76. Vastus medialis · 77. Vastus lateralis · 78. Vastus intermedius · 79. Biceps femoris · 80. Semitendinosus a semimembranosus · 81. Popliteus · 82. Gastrocnemius (dvojhlavý lýtkový sval) · 83. Soleus (šikmý lýtkový sval) · 84. Plantaris · 85. Tibialis anterior · 86. Tibialis posterior · 87. Peroneus longus · 88. Peroneus brevis · 89. Peroneus tertius · 90. Extensor digitorum longus · 91. Extensor hallucis longus · 92. Flexor digitorum longus · 93. Flexor hallucis longus · 94. Extensor digitorum brevis · 95. Abductor hallucis · 96. Flexor digitorum brevis · 97. Quadratus plantae · 98. Abductor digiti minimi (noha) · 99. Mezikostní svaly nohy · 100. Adductor hallucis · 101. Extensor hallucis brevis · 102. Flexor hallucis brevis

ABECEDNÍ REJSTŘÍK

98	Abductor digiti minimi (noha)	Stehno
95	Abductor hallucis	Stehno
100	Adductor hallucis	Stehno
70	Adductor longus a brevis	Pánev
71	Adductor magnus	Pánev
45	Adductor pollicis	Rameno
37	Anconeus	Rameno
34	Biceps brachii	Rameno
79	Biceps femoris	Stehno
35	Brachialis	Rameno
39	Brachioradialis	Rameno
59	Bránice	Záda
33	Coracobrachialis	Rameno
26	Deltoideus	Rameno
13	Digastricus	Hlava
40	Extensor carpi radialis	Rameno
41	Extensor digitorum	Rameno
94	Extensor digitorum brevis	Stehno
90	Extensor digitorum longus	Stehno
101	Extensor hallucis brevis	Stehno
91	Extensor hallucis longus	Stehno
42	Flexor carpi radialis a ulnaris	Rameno
96	Flexor digitorum brevis	Stehno
92	Flexor digitorum longus	Stehno
102	Flexor hallucis brevis	Stehno
93	Flexor hallucis longus	Stehno
82	Gastrocnemius (dvojhlavý lýtkový sval)	Stehno
61	Gluteus maximus	Pánev
62	Gluteus medius	Pánev
63	Gluteus minimus	Pánev
72	Gracilis	Pánev
65	Hluboké rotátory (gemelli a obturator internus)	Pánev
51	Iliocostalis lumborum	Záda
50	Iliocostalis thoracis	Záda
68	Iliopsoas	Pánev
22	Infraspinatus	Rameno
27	Latissimus dorsi	Rameno
11	Levator scapulae (zdvihač lopatky)	Hlava
52	Longissimus thoracis	Záda
18	Longus colli	Hlava
3	Masseter (žvýkací sval)	Hlava
99	Mezikostní svaly nohy	Stehno
47	Mezikostní svaly ruky	Rameno
58	Mezižeberní svaly	Záda
53	Multifidus	Záda
57	Obliquus externus abdominis	Záda
14	Occipitofrontalis (čelní a týlní sval)	Hlava
46	Opponens pollicis	Rameno
16	Orbicularis oculi	Hlava
44	Palmaris longus	Rameno
69	Pectineus	Pánev
29	Pectoralis major (velký prsní sval)	Rameno
30	Pectoralis minor (malý prsní sval)	Rameno
88	Peroneus brevis	Stehno
87	Peroneus longus	Stehno
89	Peroneus tertius	Stehno

ABECEDNÍ REJSTŘÍK (POKR.)

64	Piriformis	Pánev
84	Plantaris	Stehno
17	Platysma	Hlava
81	Popliteus	Stehno
43	Pronator teres	Rameno
5	Pterygoideus lateralis	Hlava
6	Pterygoideus medialis	Hlava
66	Quadratus femoris	Pánev
55	Quadratus lumborum	Záda
97	Quadratus plantae	Stehno
56	Rectus abdominis (přímý břišní sval)	Záda
75	Rectus femoris	Stehno
28	Rhomboidní svaly	Rameno
54	Rotatores a interspinales	Záda
73	Sartorius (krejčovský sval)	Pánev
10	Semispinalis capitis	Hlava
80	Semitendinosus a semimembranosus	Stehno
31	Serratus anterior	Rameno
49	Serratus posterior inferior	Záda
48	Serratus posterior superior	Záda
12	Skalenové svaly	Hlava
83	Soleus (šikmý lýtkový sval)	Stehno
7	Splenius capitis	Hlava
8	Splenius cervicis	Hlava
60	Sternalis	Záda
2	Sternocleidomastoideus (SCM)	Hlava
32	Subclavius	Rameno
9	Subokcipitální svaly	Hlava
25	Subscapularis	Rameno
38	Supinator	Rameno
21	Supraspinatus	Rameno
74	Svaly pánevního dna	Pánev
4	Temporalis (spánkový sval)	Hlava
67	Tensor fasciae latae	Pánev
24	Teres major	Rameno
23	Teres minor	Rameno
85	Tibialis anterior	Stehno
86	Tibialis posterior	Stehno
20	Trapezius – dolní vlákna	Rameno
1	Trapezius – horní vlákna	Hlava
19	Trapezius – střední vlákna	Rameno
36	Triceps brachii	Rameno
78	Vastus intermedius	Stehno
77	Vastus lateralis	Stehno
76	Vastus medialis	Stehno
15	Zygomaticus major	Hlava

VYHLEDÁVAČ PŘÍZNAKŮ

KDE TO BOLÍ?

Najděte, kde se bolest objevuje: uvedené svaly jsou nejčastějším zdrojem spoušťových bodů.

Bolest hlavy ve spánkové oblasti
Trapezius – horní vlákna (1), Temporalis (spánkový sval) (4), Sternocleidomastoideus (SCM) (2), Subokcipitální svaly (9), Semispinalis capitis (10)

Bolest čela a okolí očí
Sternocleidomastoideus (SCM) (2), Occipitofrontalis (čelní a týlní sval) (14), Orbicularis oculi (16), Zygomaticus major (15), Splenius cervicis (8)

Bolest na temeni
Splenius capitis (7), Sternocleidomastoideus (SCM) (2)

Bolest čelisti a zubů
Masseter (žvýkací sval) (3), Temporalis (spánkový sval) (4), Pterygoideus lateralis (5), Pterygoideus medialis (6), Digastricus (13)

Ztuhlost krku
Levator scapulae (zdvihač lopatky) (11), Trapezius – horní vlákna (1), Splenius capitis (7), Semispinalis capitis (10), Skalenové svaly (12)

Závratě
Sternocleidomastoideus (SCM) (2), Subokcipitální svaly (9)

Bolest v krku a při polykání
Pterygoideus medialis (6), Digastricus (13), Longus colli (18)

Bolest mezi lopatkami
Rhomboidní svaly (28), Trapezius – střední vlákna (19), Skalenové svaly (12), Serratus posterior superior (48), Levator scapulae (zdvihač lopatky) (11)

Bolest ramene vpředu
Infraspinatus (22), Biceps brachii (34), Pectoralis major (velký prsní sval) (29), Pectoralis minor (malý prsní sval) (30), Deltoideus (26), Coracobrachialis (33)

Bolest ramene vzadu
Teres minor (23), Teres major (24), Subscapularis (25), Triceps brachii (36), Deltoideus (26), Latissimus dorsi (27)

Bolest při zvedání paže
Supraspinatus (21), Infraspinatus (22), Deltoideus (26), Subscapularis (25)

Laterální bolest lokte (tenisový loket)
Supinator (38), Extensor carpi radialis (40), Brachioradialis (39), Triceps brachii (36), Anconeus (37)

Mediální bolest lokte (golfový loket)
Flexor carpi radialis a ulnaris (42), Pronator teres (43), Triceps brachii (36), Pectoralis major (velký prsní sval) (29)

Bolest zápěstí a ruky
Extensor digitorum (41), Flexor carpi radialis a ulnaris (42), Subscapularis (25), Skalenové svaly (12), Pronator teres (43)

Bolest palce
Brachialis (35), Adductor pollicis (45), Opponens pollicis (46), Supinator (38), Skalenové svaly (12)

Necitlivost v ruce
Skalenové svaly (12), Pectoralis minor (malý prsní sval) (30), Pronator teres (43), Subclavius (32), Coracobrachialis (33)

VYHLEDÁVAČ PŘÍZNAKŮ

KDE TO BOLÍ? (POKR.)

Najděte, kde se bolest objevuje: uvedené svaly jsou nejčastějším zdrojem spoušťových bodů.

Bolest na hrudi (po lékařském vyloučení)
Pectoralis major (velký prsní sval) (29), Pectoralis minor (malý prsní sval) (30), Sternalis (60), Skalenové svaly (12), Mezižeberní svaly (58)

Bolest břicha (po lékařském vyloučení)
Rectus abdominis (přímý břišní sval) (56), Obliquus externus abdominis (57), Iliocostalis thoracis (50)

Bolest kříže
Quadratus lumborum (55), Iliopsoas (68), Iliocostalis lumborum (51), Longissimus thoracis (52), Multifidus (53), Gluteus medius (62)

Bolest hýždě
Gluteus maximus (61), Gluteus medius (62), Piriformis (64), Quadratus lumborum (55), Longissimus thoracis (52)

Bolest podobná ischiasu
Gluteus minimus (63), Piriformis (64), Hluboké rotátory (gemelli a obturator internus) (65), Semitendinosus a semimembranosus (80), Biceps femoris (79)

Bolest v třísle
Iliopsoas (68), Pectineus (69), Adductor longus a brevis (70), Adductor magnus (71), Obliquus externus abdominis (57)

Bolest na zevní straně kyčle
Gluteus medius (62), Gluteus minimus (63), Tensor fasciae latae (67), Vastus lateralis (77), Quadratus lumborum (55)

Bolest kolena vpředu
Rectus femoris (75), Vastus medialis (76), Vastus lateralis (77), Vastus intermedius (78), Adductor longus a brevis (70)

Bolest kolena vzadu
Popliteus (81), Gastrocnemius (dvojhlavý lýtkový sval) (82), Biceps femoris (79), Plantaris (84), Semitendinosus a semimembranosus (80)

Bolest a křeče v lýtku
Gastrocnemius (dvojhlavý lýtkový sval) (82), Soleus (šikmý lýtkový sval) (83), Tibialis posterior (86), Flexor digitorum longus (92)

Bolest kotníku
Peroneus longus (87), Peroneus brevis (88), Peroneus tertius (89), Tibialis anterior (85)

Bolest paty
Soleus (šikmý lýtkový sval) (83), Quadratus plantae (97), Abductor hallucis (95), Tibialis posterior (86)

Bolest chodidla
Flexor digitorum brevis (96), Adductor hallucis (100), Tibialis posterior (86), Gastrocnemius (dvojhlavý lýtkový sval) (82), Flexor digitorum longus (92)

Bolest palce nohy
Tibialis anterior (85), Extensor hallucis longus (91), Flexor hallucis longus (93), Flexor hallucis brevis (102)

TĚLESNÁ OBLAST

HLAVA, OBLIČEJ A KRK

Karty 1–18 · 18 svalů

KARTA 01 · HLAVA, OBLIČEJ A KRK

TRAPEZIUS – HORNÍ VLÁKNA

Musculus trapezius, pars descendens

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Elevace a horní rotace lopatky
- Lateroflexe hlavy a krku na stejnou stranu
- Rotace hlavy na opačnou stranu
- Zvedání ramen (krčení ramen)

ZAČÁTEK

Linea nuchae superior, protuberantia occipitalis externa, ligamentum nuchae (C1–C6).

ÚPON

Laterální třetina klíční kosti (clavicula, pars acromialis).

INERVACE

N. accessorius (XI. hlavový nerv); proprioceptivní vlákna C3–C4.

SPOUŠŤOVÝ BOD

Na horním okraji svalu v úhlu mezi krkem a ramenem, v polovině vzdálenosti mezi krkem a akromionem; dobře hmatný klešťovým úchopem.

PŘENESENÁ BOLEST

- Posterolaterální strana krku
- Oblast za uchem (processus mastoideus)
- Spánek (temporální bolest hlavy)
- Někdy úhel dolní čelisti

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vsedě nebo vleže na zádech, hlava mírně ukloněná na stejnou stranu
- Klešťový úchop podél horního okraje
- Válejte snopec mezi prsty a hledejte napjatý pruh
- Tlak reprodukuje bolest směrem ke spánku

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Tenzní bolest hlavy
- Ztuhlost krku, omezená lateroflexe
- Bolest po dlouhém sezení nebo telefonování
- Zvedání ramen ve stresu

KLINICKÝ TIP Zkontrolujte pracovní místo, nošení tašky a dechový vzor: horní trapezius bývá přetížen hlavně kvůli špatné ergonomii.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 02 · HLAVA, OBLIČEJ A KRK

STERNOCLEIDOMASTOIDEUS (SCM)

Musculus sternocleidomastoideus

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Jednostranně: lateroflexe hlavy na stejnou stranu a rotace na opačnou stranu
- Oboustranně: flexe krku
- Pomocný dýchací sval (zvedá hrudník)

ZAČÁTEK

Sternální hlava: přední plocha manubrium sterni. Klavikulární hlava: mediální třetina klíční kosti.

ÚPON

Processus mastoideus a laterální polovina linea nuchae superior.

INERVACE

N. accessorius (XI. hlavový nerv); senzitivní vlákna C2–C3.

SPOUŠŤOVÝ BOD

Po celé délce sternální i klavikulární hlavy; vyšetřujte klešťovým úchopem, hlava mírně otočená na stejnou stranu.

PŘENESENÁ BOLEST

- Čelo a okolí oka (orbitální oblast)
- Tvář a ucho, oblast za uchem
- Temeno a týl
- Horní část hrudní kosti

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech, hlava ukloněná na stejnou stranu pro uvolnění
- Uchopte každou hlavu zvlášť klešťovým úchopem
- Postupujte od klíční kosti k mastoidu
- Vyhněte se hlubokému tlaku v blízkosti a. carotis

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Závratě, poruchy rovnováhy
- Slzení oka, rozmazané vidění
- Frontální nebo orbitální bolest hlavy
- Pocit hučení v uchu na stejné straně

KLINICKÝ TIP Po úrazu krku typu whiplash bývá SCM často postižen. Vyšetřujte ho společně s horním trapeziem.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 03 · HLAVA, OBLIČEJ A KRK

MASSETER (ŽVÝKACÍ SVAL)

Musculus masseter

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Zavírání úst (žvýkání, skus)
- Pomáhá při předsunu dolní čelisti

ZAČÁTEK

Arcus zygomaticus a lícní kost (os zygomaticum).

ÚPON

Úhel dolní čelisti a zevní plocha ramus mandibulae.

INERVACE

N. massetericus (n. mandibularis, V/3).

SPOUŠŤOVÝ BOD

V povrchové vrstvě pod jařmovým obloukem a nad úhlem čelisti; v hluboké vrstvě před TMJ.

PŘENESENÁ BOLEST

- Horní a dolní stoličky
- Dolní čelist a tvář
- Nad obočím
- Hluboko v uchu (oblast TMJ)

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vsedě, ústa mírně otevřená
- Klešťový úchop: jeden prst v ústech, druhý zvenku
- Požádejte pacienta, aby skousl: napjatý snopec vystoupí

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Omezené otevírání úst
- Citlivost zubů bez zjevné zubní příčiny
- Skřípání zuby (bruxismus)

KLINICKÝ TIP Změřte otevření úst (normálně asi 3 prsty). Při bruxismu myslete na noční dlahu a zvládání stresu.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

TEMPORALIS (SPÁNKOVÝ SVAL)

Musculus temporalis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Zavírání úst
- Retrakce dolní čelisti (zadní vlákna)

ZAČÁTEK

Fossa temporalis a fascia temporalis.

ÚPON

Processus coronoideus mandibulae.

INERVACE

Nn. temporales profundi (n. mandibularis, V/3).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Ve čtyřech oblastech nad jařmovým obloukem: přední, střední a dvě zadní skupiny vláken; při žvýkání snadno hmatný.

PŘENESENÁ BOLEST

- Spánek a obočí
- Strana hlavy s prstovitým šířením
- Horní zuby
- Někdy za okem

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vsedě, zuby lehce stisknuté
- Plošná palpace na spánku nad jařmovým obloukem
- Hledejte citlivé uzlíky napříč vlákny

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest hlavy ve spánkové oblasti
- Citlivost zubů na teplo a chlad
- Únava čelisti při žvýkání

KLINICKÝ TIP Temporalis a masseter bývají postiženy společně: ošetřete oba a zeptejte se na noční skřípání zuby.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

PTERYGOIDEUS LATERALIS

Musculus pterygoideus lateralis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Otevírání úst a předsun dolní čelisti
- Boční mlecí pohyb

ZAČÁTEK

Velké křídlo kosti klínové a lamina lateralis processus pterygoidei.

ÚPON

Disk čelistního kloubu a krček processus condylaris.

INERVACE

N. pterygoideus lateralis (V/3).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Hluboko pod jařmovým obloukem; intraorálně hmatný za horními stoličkami směrem k hlavě.

PŘENESENÁ BOLEST

- Hluboko v čelistním kloubu (TMJ)
- Tvář nad čelistní dutinou
- Někdy před uchem

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Intraorální palpace v rukavici, za horními stoličkami
- Ústa mírně otevřená
- Opatrný, pomalý tlak

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Lupání v čelistním kloubu
- Změněný pocit skusu
- Bolest při žvýkání

KLINICKÝ TIP Častá příčina lupání v TMJ. Hluboký sval ošetřujte jen šetrně a při změněném skusu přizvěte zubního lékaře.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 06 · HLAVA, OBLIČEJ A KRK

PTERYGOIDEUS MEDIALIS

Musculus pterygoideus medialis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Zavírání úst
- Předsun a boční pohyb dolní čelisti

ZAČÁTEK

Fossa pterygoidea (lamina medialis processus pterygoidei).

ÚPON

Vnitřní plocha úhlu dolní čelisti.

INERVACE

N. pterygoideus medialis (V/3).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Na vnitřní straně úhlu čelisti; zvenku hmatný tlakem směrem nahoru pod úhlem.

PŘENESENÁ BOLEST

- Hrdlo a kořen jazyka
- Pod uchem a před ním (TMJ)
- Zadní stěna hltanu

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Palpujte směrem nahoru na vnitřní straně úhlu čelisti
- Hlava mírně ukloněná na stejnou stranu
- Při polykání se bolest může zesílit

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest při polykání
- Pocit bolesti v krku bez infekce
- Omezené otevírání úst

KLINICKÝ TIP Pokud polykání bolí, ale hrdlo není zanícené, myslete na pterygoideus medialis.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 07 · HLAVA, OBLIČEJ A KRK

SPLENIUS CAPITIS

Musculus splenius capitis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Extenze hlavy a krku
- Rotace a lateroflexe hlavy na stejnou stranu

ZAČÁTEK

Dolní polovina ligamentum nuchae, trnové výběžky C7–Th3.

ÚPON

Processus mastoideus a laterální třetina linea nuchae superior.

INERVACE

Zadní větve krčních míšních nervů (C3–C5).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Mezi trapeziem a SCM, asi 2–3 cm pod processus mastoideus.

PŘENESENÁ BOLEST

- Temeno (vertex) na stejné straně
- Někdy týl

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech, hlava mírně otočená
- Plošná palpace pod mastoidem
- Rotace hlavy proti odporu sval zvýrazní

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest na temeni
- Ztuhlost krku při rotaci
- Bolest po spaní ve špatné poloze

KLINICKÝ TIP Zeptejte se na výšku polštáře a polohu při spánku: spaní na břiše často přetěžuje svaly splenius.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

SPLENIUS CERVICIS

Musculus splenius cervicis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Extenze krku
- Rotace krku na stejnou stranu

ZAČÁTEK

Trnové výběžky Th3–Th6.

ÚPON

Zadní hrbolky příčných výběžků C1–C3.

INERVACE

Zadní větve krčních míšních nervů (C4–C6).

SPOUŠŤOVÝ BOD

V dolní části krku vedle levator scapulae, v úhlu mezi krkem a ramenem.

PŘENESENÁ BOLEST

- Hluboko za okem
- Bolest šířící se k týlu
- Úhel mezi krkem a ramenem

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na břiše nebo vsedě
- Hluboká palpace laterálně ve výši C7
- Sledujte snopec při rotaci hlavy

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest za okem
- Pocit rozmazaného vidění
- Ztuhlost krku

KLINICKÝ TIP Bolest za okem nemusí mít oční původ; vylučte lékařské příčiny a poté vyšetřete krční svaly.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

SUBOKCIPITÁLNÍ SVALY

Mm. recti capitis posteriores et obliqui capitis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Jemná extenze a rotace hlavy
- Jemné ladění polohy hlavy (propriocepce)

ZAČÁTEK

Atlas a axis.

ÚPON

Os occipitale (linea nuchae inferior) a příčný výběžek atlasu.

INERVACE

N. suboccipitalis (C1).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Těsně pod bází lebeční, mezi kostí týlní a C2, v hloubce.

PŘENESENÁ BOLEST

- Pruhovitá bolest od týla ke spánku
- Za okem
- Někdy až k čelu

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech, hlava v rukou terapeuta
- Bříška prstů se dostanou pod bázi lební
- Nechte tlak vytvářet váhu hlavy

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Cervikogenní bolest hlavy
- Bolest hlavy po práci u obrazovky
- Omezené kývání hlavou

KLINICKÝ TIP Hlavním zatěžujícím faktorem je předsunuté držení hlavy: zkontrolujte výšku monitoru a typ brýlí.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 10 · HLAVA, OBLIČEJ A KRK

SEMISPINALIS CAPITIS

Musculus semispinalis capitis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Extenze hlavy
- Udržení krční lordózy

ZAČÁTEK

Příčné výběžky C4–Th6.

ÚPON

Os occipitale mezi linea nuchae superior a inferior.

INERVACE

Zadní větve krčních míšních nervů.

SPOUŠŤOVÝ BOD

Ve třech úrovních: pod bází lební, uprostřed krku a dole na krku, vedle trnových výběžků.

PŘENESENÁ BOLEST

- Pruh po straně hlavy ve výši spánku
- Týl
- Zadní strana krku

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na břiše, čelo podložené
- Plošná palpace 1–2 cm od střední čáry pod týlem
- Postupujte dolů úroveň po úrovni

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest hlavy kolem dokola
- Bolest krku při extenzi
- Necitlivost v oblasti týla (n. occipitalis major)

KLINICKÝ TIP Svalem prochází n. occipitalis major: napjatý semispinalis může vyvolat necitlivost a pálení ve vlasaté části hlavy.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

LEVATOR SCAPULAE (ZDVIHAČ LOPATKY)

Musculus levator scapulae

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Elevace lopatky
- Rotace lopatky dolů
- Lateroflexe a rotace krku na stejnou stranu

ZAČÁTEK

Příčné výběžky C1–C4.

ÚPON

Horní úhel lopatky a horní část margo medialis.

INERVACE

N. dorsalis scapulae (C5) a C3–C4.

SPOUŠŤOVÝ BOD

V úhlu mezi krkem a ramenem a 1–2 cm nad horním úhlem lopatky.

PŘENESENÁ BOLEST

- Úhel mezi krkem a ramenem
- Podél vnitřního okraje lopatky
- Zadní strana ramene

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vsedě, hlava otočená na opačnou stranu
- Palpujte pod trapeziem směrem k hornímu úhlu lopatky
- Elevace ramene sval zvýrazní

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- „Ztuhlý krk“ (torticollis)
- Bolestivá rotace hlavy na stejnou stranu
- Bolest po dlouhém telefonování

KLINICKÝ TIP Klasická příčina obtíže „nemůžu otočit hlavu“. Nedoporučujte držet telefon ramenem.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 12 · HLAVA, OBLIČEJ A KRK

SKALENOVÉ SVALY

Mm. scaleni anterior, medius et posterior

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Lateroflexe krku
- Pomocné dýchací svaly (zvedají první dvě žebra)

ZAČÁTEK

Příčné výběžky C2–C7.

ÚPON

První žebro (anterior, medius) a druhé žebro (posterior).

INERVACE

Přední větve krčních míšních nervů (C3–C8).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Po straně krku nad klíční kostí, za zadním okrajem SCM.

PŘENESENÁ BOLEST

- Přední část hrudníku
- Přední a zadní strana paže
- Radiální strana předloktí, palec a ukazovák
- Vnitřní okraj lopatky

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech, hlava mírně otočená na opačnou stranu
- Palpujte za SCM nad klíční kostí
- Opatrně: prochází zde plexus brachialis

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Necitlivost v ruce
- Bolest připomínající syndrom karpálního tunelu
- Napětí krku zesilující se při dýchání

KLINICKÝ TIP Skaleny mohou napodobovat příznaky „thoracic outlet“. Vyšetřete dechový vzor: horní hrudní dýchání je přetěžuje.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 13 · HLAVA, OBLIČEJ A KRK

DIGASTRICUS

Musculus digastricus

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Otevírání úst
- Zvedání jazylky při polykání

ZAČÁTEK

Zadní bříško: incisura mastoidea; přední bříško: fossa digastrica mandibulae.

ÚPON

Mezišlacha připojená k jazylce.

INERVACE

Zadní bříško: n. facialis (VII.); přední bříško: n. mylohyoideus (V/3).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Na zadním bříšku za úhlem čelisti, na předním bříšku pod bradou.

PŘENESENÁ BOLEST

- Dolní řezáky a brada
- Horní část krku podél předního okraje SCM
- Pod uchem a za ním

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech, hlava mírně zakloněná
- Jemná palpace pod bradou a za úhlem čelisti
- Při polykání se sval napne

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Pocit obtížného polykání
- Citlivost dolních zubů
- Pocit knedlíku v krku

KLINICKÝ TIP Zatěžuje ho předsunuté držení hlavy a dýchání ústy. Zkontrolujte klidovou polohu jazyka (na patře).

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

OCCIPITOFRONTALIS (ČELNÍ A TÝLNÍ SVAL)

Musculus occipitofrontalis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Zvedání obočí, vrásčení čela
- Pohyb vlasaté části hlavy

ZAČÁTEK

Frontalis: kůže obočí; occipitalis: linea nuchae suprema.

ÚPON

Galea aponeurotica.

INERVACE

N. facialis (VII.).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Na frontálním bříšku nad obočím, na okcipitálním bříšku v horní části týla.

PŘENESENÁ BOLEST

- Čelo
- Týl
- Může se šířit i hluboko za oko

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech
- Plošná palpace nad obočím a na týlu
- Požádejte pacienta, aby zvedl obočí

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest čela
- Týlní bolest hlavy, kvůli které nemůže ležet na zádech
- Pocit napětí ve vlasaté části hlavy

KLINICKÝ TIP Vrásčení čela může být známkou stresu nebo špatného vidění: zeptejte se na brýle a čas strávený u obrazovky.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 15 · HLAVA, OBLIČEJ A KRK

ZYGOMATICUS MAJOR

Musculus zygomaticus major

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Tah koutku úst nahoru a ven (úsměv)

ZAČÁTEK

Os zygomaticum.

ÚPON

Koutek úst (modiolus).

INERVACE

N. facialis (VII.).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Ve střední části svalu mezi koutkem úst a lícní kostí; klešťovým úchopem zevnitř úst i zvenku.

PŘENESENÁ BOLEST

- Strana nosu
- Vnitřní koutek oka
- Střed čela

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Klešťový úchop: jeden prst v ústech, druhý na tváři
- Postupujte od koutku úst k lícní kosti

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest obličeje
- Bolest vedle nosu
- Někdy pocit připomínající zánět vedlejších nosních dutin

KLINICKÝ TIP Po vyloučení problémů s dutinami myslete při bolesti středu obličeje i na mimické svaly.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 16 · HLAVA, OBLIČEJ A KRK

ORBICULARIS OCULI

Musculus orbicularis oculi

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Zavírání víček
- Mžourání

ZAČÁTEK

Mediální okraj očnice a ligamentum palpebrale mediale.

ÚPON

Kůže víček a kůže kolem oka.

INERVACE

N. facialis (VII.).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Pod obočím, nad horním víčkem; velmi jemným klešťovým úchopem.

PŘENESENÁ BOLEST

- Hřbet a strana nosu
- Horní ret
- Okolí oka

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Oči zavřené, jemný klešťový úchop pod obočím
- Nikdy netlačte na oční bulbu

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Únava očí
- Mžourání na silném světle
- Napětí kolem očí

KLINICKÝ TIP Zatěžuje ho práce u obrazovky, čtení a silné světlo: doporučte pravidelné přestávky a vhodné brýle.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 17 · HLAVA, OBLIČEJ A KRK

PLATYSMA

Platysma

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Tah dolního rtu a koutku úst dolů
- Napínání kůže krku

ZAČÁTEK

Horní část hrudníku (fascia pectoralis a deltoidea).

ÚPON

Dolní okraj dolní čelisti a kůže dolní části obličeje.

INERVACE

N. facialis (VII.), ramus colli.

SPOUŠŤOVÝ BOD

Nad klíční kostí v tenké vrstvě nad SCM; klešťovým úchopem společně s kůží.

PŘENESENÁ BOLEST

- Píchavá bolest na dolní čelisti
- Dolní část obličeje a brada

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Klešťový úchop společně s kůží
- Požádejte pacienta, aby stáhl koutky dolů: plátěný sval se napne

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Píchání na bradě
- Napětí přední strany krku

KLINICKÝ TIP Často bývá aktivní spolu s body v SCM; u tenkého svalu může stačit protažení a mobilizace kůže.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 18 · HLAVA, OBLIČEJ A KRK

LONGUS COLLI

Musculus longus colli

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Flexe a stabilizace krku
- Kontrola krční lordózy

ZAČÁTEK

Těla obratlů a příčné výběžky C3–Th3.

ÚPON

Přední hrbolek atlasu a těla obratlů C2–C6.

INERVACE

Přední větve krčních míšních nervů (C2–C6).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Hluboko vedle průdušnice, mezi SCM a tracheou; jen opatrnou hlubokou palpací.

PŘENESENÁ BOLEST

- Přední část hrdla
- Bolest při polykání
- Přední strana krku

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech, hlava podložená
- SCM odsuňte do strany a palpujte opatrně vedle průdušnice
- Nahmatejte pulz karotidy a vyhněte se mu

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Pocit knedlíku v krku
- Pocit nestability krku po whiplash

KLINICKÝ TIP Po whiplash bývá často inhibován: k aktivaci pomáhá trénink hlubokých flexorů krku (kývání hlavou vleže).

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

TĚLESNÁ OBLAST

RAMENO, PAŽE, PŘEDLOKTÍ A RUKA

Karty 19–47 · 29 svalů

TRAPEZIUS – STŘEDNÍ VLÁKNA

Musculus trapezius, pars transversa

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Přitahování lopatky k páteři (retrakce)
- Stabilizace lopatky

ZAČÁTEK

Trnové výběžky C7–Th3.

ÚPON

Akromion a horní okraj spina scapulae.

INERVACE

N. accessorius (XI.).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Mezi vnitřním okrajem lopatky a páteří, ve výši spina scapulae.

PŘENESENÁ BOLEST

- Mezi lopatkou a páteří
- Pálení nad akromionem

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na břiše, paže podél těla
- Plošná palpace kolmo na vlákna

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Pálivá bolest mezi lopatkami
- Únava při práci vsedě

KLINICKÝ TIP Často bývá oslabený a přetažený (předsunutá ramena): posilování je stejně důležité jako ošetření.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

TRAPEZIUS – DOLNÍ VLÁKNA

Musculus trapezius, pars ascendens

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Stahování lopatky dolů (deprese)
- Horní rotace lopatky

ZAČÁTEK

Trnové výběžky Th4–Th12.

ÚPON

Mediální konec spina scapulae.

INERVACE

N. accessorius (XI.).

SPOUŠŤOVÝ BOD

V dolní vnitřní části lopatky, kde vlákna běží ke spina scapulae.

PŘENESENÁ BOLEST

- Horní část krku pod bází lební
- Zadní strana krku
- Horní část lopatky

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na břiše
- Klešťový úchop vedle dolního úhlu lopatky

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest krku, jejíž zdroj je na zádech
- Bolest kolem lopatky

KLINICKÝ TIP Zdroj bolesti krku může být i na zádech: pokud ošetření krku nestačí, vyšetřete dolní trapezius.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

SUPRASPINATUS

Musculus supraspinatus

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Počáteční fáze abdukce paže
- Stabilizace hlavice humeru v jamce

ZAČÁTEK

Fossa supraspinata.

ÚPON

Horní část tuberculum majus humeri.

INERVACE

N. suprascapularis (C5–C6).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Ve fossa supraspinata pod trapeziem; v mediální i laterální části.

PŘENESENÁ BOLEST

- Hluboko uprostřed ramene (oblast deltoideu)
- Zevní strana paže
- Laterální část lokte

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vsedě, paže podél těla
- Palpujte nad spina scapulae přes trapezius

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest při zvedání paže
- Noční tupá bolest ramene

KLINICKÝ TIP Může napodobovat obraz poranění rotátorové manžety. Vyšetřujte ho společně s infraspinatem.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

INFRASPINATUS

Musculus infraspinatus

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Zevní rotace paže
- Stabilizace hlavice humeru

ZAČÁTEK

Fossa infraspinata.

ÚPON

Střední část tuberculum majus humeri.

INERVACE

N. suprascapularis (C5–C6).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Pod spina scapulae, v horní části fossa infraspinata.

PŘENESENÁ BOLEST

- Hluboko v přední části ramene
- Přední a zevní strana paže
- Radiální strana předloktí a ruky

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na břiše nebo vsedě
- Plošná palpace na lopatce pod spinou

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Nemůže spát na bolestivé straně
- Obtížné sahání za záda (např. česání)

KLINICKÝ TIP Zdroj „bolesti ramene vpředu“ bývá často vzadu: infraspinatus vyšetřete vždy.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

TERES MINOR

Musculus teres minor

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Zevní rotace paže
- Stabilizace hlavice humeru

ZAČÁTEK

Horní dvě třetiny laterálního okraje lopatky.

ÚPON

Dolní část tuberculum majus humeri.

INERVACE

N. axillaris (C5–C6).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Na laterálním okraji lopatky pod infraspinatem.

PŘENESENÁ BOLEST

- Hluboká, ohraničená bolest v zadní části ramene

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na břiše, paže mírně v abdukci
- Klešťový úchop podél laterálního okraje lopatky

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bodová bolest ramene vzadu
- Necitlivost 4. a 5. prstu (vzácně)

KLINICKÝ TIP Často se projeví až po ošetření infraspinatu.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

TERES MAJOR

Musculus teres major

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Vnitřní rotace, addukce a extenze paže

ZAČÁTEK

Dolní úhel lopatky.

ÚPON

Crista tuberculi minoris humeri.

INERVACE

N. subscapularis inferior (C5–C7).

SPOUŠŤOVÝ BOD

V zadní podpažní řase nad dolním úhlem lopatky.

PŘENESENÁ BOLEST

- Zadní část ramene
- Zadní strana paže
- Někdy dorzální strana předloktí

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech, paže zvednutá
- Klešťový úchop v zadní podpažní řase

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest při natahování nad hlavu
- Ztuhlost ramene

KLINICKÝ TIP Vyšetřujte ho spolu s latissimus dorsi: společně tvoří zadní stěnu podpaží.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

SUBSCAPULARIS

Musculus subscapularis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Vnitřní rotace paže
- Přední stabilizace hlavice humeru

ZAČÁTEK

Fossa subscapularis.

ÚPON

Tuberculum minus humeri.

INERVACE

Nn. subscapulares (C5–C6).

SPOUŠŤOVÝ BOD

V podpaží, na přední ploše lopatky, blízko laterálního okraje.

PŘENESENÁ BOLEST

- Zadní část ramene
- Lopatka
- Zadní strana paže
- Páskovitá bolest kolem zápěstí

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech, paže v abdukci
- Palpujte do podpaží směrem k přední ploše lopatky
- Pomalu a opatrně

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Omezení pohybu typu „zmrzlé rameno“
- Bolest zápěstí bez zjevné příčiny

KLINICKÝ TIP V časné fázi zmrzlého ramene (frozen shoulder) často hraje klíčovou roli.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

DELTOIDEUS

Musculus deltoideus

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Abdukce paže (střední vlákna)
- Flexe (přední vlákna)
- Extenze (zadní vlákna)

ZAČÁTEK

Laterální třetina klíční kosti, akromion, spina scapulae.

ÚPON

Tuberositas deltoidea humeri.

INERVACE

N. axillaris (C5–C6).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Na předních, středních a zadních vláknech v horní třetině paže.

PŘENESENÁ BOLEST

- Místní bolest v přední, boční nebo zadní části ramene
- Horní část paže

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vsedě
- Klešťový úchop nebo plošná palpace na vláknech

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest při zvedání paže
- Pocit slabosti v rameni

KLINICKÝ TIP Bolest deltoideu je místní; pokud se šíří dál, hledejte příčinu v rotátorové manžetě.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

LATISSIMUS DORSI

Musculus latissimus dorsi

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Vnitřní rotace, addukce a extenze paže
- Tažné pohyby (shyby)

ZAČÁTEK

Trnové výběžky Th7–L5, fascia thoracolumbalis, hřeben kosti kyčelní, dolní žebra.

ÚPON

Sulcus intertubercularis humeri.

INERVACE

N. thoracodorsalis (C6–C8).

SPOUŠŤOVÝ BOD

V zadní podpažní řase, klešťovým úchopem.

PŘENESENÁ BOLEST

- Kolem dolního úhlu lopatky
- Zadní vnitřní strana paže
- 4. a 5. prst

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech, paže nad hlavou
- Klešťový úchop v zadní podpažní řase

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Stálá tupá bolest zad pod lopatkou
- Bolest při natahování nad hlavu

KLINICKÝ TIP Častý u plavců, veslařů a lezců. Myslete na něj u tupé bolesti zad, kterou pacient „nedokáže přesně ukázat“.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

RHOMBOIDNÍ SVALY

Mm. rhomboidei major et minor

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Přitahování lopatky k páteři a její elevace

ZAČÁTEK

Trnové výběžky C7–Th5.

ÚPON

Vnitřní okraj lopatky.

INERVACE

N. dorsalis scapulae (C4–C5).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Podél vnitřního okraje lopatky pod trapeziem.

PŘENESENÁ BOLEST

- Podél vnitřního okraje lopatky
- Povrchová, „bolavá“ bolest

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na břiše, paže svěšená
- Palpujte na vnitřním okraji lopatky přes trapezius

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest mezi lopatkami
- Lupání při pohybu lopatky

KLINICKÝ TIP Často je přetahují napjaté prsní svaly: ošetřujte i vpředu, nejen vzadu.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

PECTORALIS MAJOR (VELKÝ PRSNÍ SVAL)

Musculus pectoralis major

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Addukce a vnitřní rotace paže
- Flexe (klavikulární část)

ZAČÁTEK

Mediální polovina klíční kosti, hrudní kost, chrupavky 1.–6. žebra.

ÚPON

Crista tuberculi majoris humeri.

INERVACE

Nn. pectorales medialis et lateralis (C5–Th1).

SPOUŠŤOVÝ BOD

V klavikulární, sternální a kostální části; v přední podpažní řase klešťovým úchopem.

PŘENESENÁ BOLEST

- Přední část ramene
- Přední část hrudníku
- Vnitřní strana paže, mediální loket
- 4. a 5. prst

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech, paže mírně v abdukci
- Klešťový úchop v přední podpažní řase
- Plošná palpace vedle hrudní kosti

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest na hrudi připomínající srdeční
- Předsunutá ramena
- Bolest při sahání dozadu

KLINICKÝ TIP U bolesti na hrudi vždy nejprve vylučte lékařské (srdeční) příčiny, než budete uvažovat o svalovém původu.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

PECTORALIS MINOR (MALÝ PRSNÍ SVAL)

Musculus pectoralis minor

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Tah lopatky dopředu a dolů
- Pomocný dýchací sval

ZAČÁTEK

3.–5. žebro.

ÚPON

Processus coracoideus.

INERVACE

N. pectoralis medialis (C8–Th1).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Pod processus coracoideus a nad 3.–5. žebrem, přes pectoralis major.

PŘENESENÁ BOLEST

- Přední část ramene
- Hrudník
- Vnitřní strana paže a ulnární strana ruky

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech
- Palpujte z podpaží pod prsní sval směrem ke korakoidu

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Předsunuté rameno
- Necitlivost v ruce (neurovaskulární komprese)

KLINICKÝ TIP Napjatý pectoralis minor může zužovat průběh plexus brachialis: vyšetřete ho u příznaků thoracic outlet.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

SERRATUS ANTERIOR

Musculus serratus anterior

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Tah lopatky dopředu a její fixace k hrudníku
- Horní rotace lopatky

ZAČÁTEK

Zevní plocha 1.–9. žebra.

ÚPON

Vnitřní okraj lopatky (přední plocha).

INERVACE

N. thoracicus longus (C5–C7).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Ve střední axilární čáře ve výši 5.–6. žebra.

PŘENESENÁ BOLEST

- Strana hrudníku
- Dolní úhel lopatky
- Vnitřní strana paže

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na boku, paže natažená dopředu
- Palpujte mezi žebry v axilární čáře

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- „Píchání v boku“ při běhu
- Bolest zesilující se při hlubokém nádechu

KLINICKÝ TIP Jeho oslabení způsobuje odstávající lopatku; při posilování pomáhají varianty kliků.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

SUBCLAVIUS

Musculus subclavius

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Stabilizace klíční kosti

ZAČÁTEK

První žebro a jeho chrupavka.

ÚPON

Dolní plocha klíční kosti.

INERVACE

N. subclavius (C5–C6).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Pod klíční kostí ve střední třetině, přes pectoralis major.

PŘENESENÁ BOLEST

- Přední strana paže
- Radiální strana předloktí
- Palec a ukazovák

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech
- Palpujte směrem nahoru pod klíční kost

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Necitlivost prstů
- Bolest ramene vpředu

KLINICKÝ TIP Pod klíční kostí probíhá v. subclavia: nepoužívejte dlouhodobý silný tlak.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 33 · RAMENO, PAŽE, PŘEDLOKTÍ A RUKA

CORACOBRACHIALIS

Musculus coracobrachialis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Flexe a addukce paže

ZAČÁTEK

Processus coracoideus.

ÚPON

Střed mediální plochy humeru.

INERVACE

N. musculocutaneus (C6–C7).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Na vnitřní straně paže u podpaží, za krátkou hlavou bicepsu.

PŘENESENÁ BOLEST

- Přední část ramene
- Zadní strana paže a předloktí
- Hřbet ruky

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech, paže v abdukci a zevní rotaci
- Palpujte v podpaží vedle humeru

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest při sahání paží dozadu

KLINICKÝ TIP Prochází jím n. musculocutaneus: jeho napětí může způsobit necitlivost na zevní straně předloktí.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

BICEPS BRACHII

Musculus biceps brachii

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Flexe lokte
- Zevní rotace předloktí (supinace)

ZAČÁTEK

Dlouhá hlava: tuberculum supraglenoidale; krátká hlava: processus coracoideus.

ÚPON

Tuberositas radii a aponeurosis bicipitalis.

INERVACE

N. musculocutaneus (C5–C6).

SPOUŠŤOVÝ BOD

V distální třetině svalu, na obou hlavách.

PŘENESENÁ BOLEST

- Přední část ramene
- Přední strana paže
- Loketní jamka

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vsedě, loket mírně pokrčený
- Klešťový úchop na bříšku svalu

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest při zvedání nad hlavu
- Slabost při flexi lokte

KLINICKÝ TIP Za „bolestí ramene vpředu“ často nestojí šlacha, ale spoušťový bod v bicepsu.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

BRACHIALIS

Musculus brachialis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Flexe lokte (hlavní flexor)

ZAČÁTEK

Distální polovina přední plochy humeru.

ÚPON

Tuberositas ulnae a processus coronoideus.

INERVACE

N. musculocutaneus (C5–C6), částečně n. radialis.

SPOUŠŤOVÝ BOD

Několik centimetrů nad loktem, laterálně pod bicepsem.

PŘENESENÁ BOLEST

- Kořen palce (dorzální strana)
- Loketní jamka
- Přední strana paže

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vsedě, loket ohnutý do 90°
- Odsuňte biceps a palpujte hluboko vedle něj

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest palce
- Bolest při nošení břemen

KLINICKÝ TIP Při bolesti palce nehledejte jen na ruce: příčinou může být i brachialis.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

TRICEPS BRACHII

Musculus triceps brachii

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Extenze lokte
- Extenze paže (dlouhá hlava)

ZAČÁTEK

Dlouhá hlava: tuberculum infraglenoidale; laterální a mediální hlava: zadní plocha humeru.

ÚPON

Olecranon.

INERVACE

N. radialis (C6–C8).

SPOUŠŤOVÝ BOD

V dlouhé hlavě, v laterální hlavě a nad loktem.

PŘENESENÁ BOLEST

- Zadní část ramene
- Zadní strana paže
- Loket (epikondyly)
- Dorzální strana předloktí

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na břiše nebo vsedě, paže svěšená
- Klešťový úchop na dlouhé hlavě

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest lokte podobná „tenisovému lokti“
- Bolest při natažení paže

KLINICKÝ TIP Zdrojem laterální bolesti lokte nemusí být vždy předloktí: vyšetřete i laterální hlavu tricepsu.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

ANCONEUS

Musculus anconeus

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Pomáhá při extenzi lokte
- Stabilizace loketního kloubu

ZAČÁTEK

Epicondylus lateralis humeri.

ÚPON

Laterální plocha olecranu a zadní plocha ulny.

INERVACE

N. radialis (C7–C8).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Mezi olecranem a laterálním epikondylem.

PŘENESENÁ BOLEST

- Kolem laterálního epikondylu

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vsedě, loket pokrčený
- Plošná palpace vedle olecranu

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Místní bolest lokte

KLINICKÝ TIP U tenisového lokte pomáhá přesná lokalizace odlišit anconeus od extenzorů.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

SUPINATOR

Musculus supinator

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Zevní rotace předloktí (supinace)

ZAČÁTEK

Epicondylus lateralis humeri, ligamentum collaterale radiale, crista m. supinatoris ulnae.

ÚPON

Proximální třetina radia.

INERVACE

N. radialis profundus (C6–C7).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Laterálně pod loketní jamkou, kolem hlavičky radia.

PŘENESENÁ BOLEST

- Laterální epikondyl
- Hřbet ruky mezi palcem a ukazovákem

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vsedě, předloktí v supinaci
- Palpujte pod hlavičkou radia

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Tenisový loket
- Bolest při šroubování nebo otáčení klikou

KLINICKÝ TIP Prochází jím n. radialis profundus: napjatý supinator může způsobit slabost předloktí.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

BRACHIORADIALIS

Musculus brachioradialis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Flexe lokte v neutrální poloze předloktí

ZAČÁTEK

Laterální suprakondylární hrana humeru.

ÚPON

Processus styloideus radii.

INERVACE

N. radialis (C5–C6).

SPOUŠŤOVÝ BOD

1–2 cm pod loktem na radiální straně předloktí.

PŘENESENÁ BOLEST

- Laterální epikondyl
- Dorzální strana zápěstí
- Oblast mezi palcem a ukazovákem

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vsedě, předloktí v neutrální poloze
- Klešťový úchop na radiálním okraji předloktí

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest lokte při úchopu
- Bolest hřbetu ruky

KLINICKÝ TIP Klešťovým úchopem ho lze dobře oddělit od extensor carpi radialis.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

EXTENSOR CARPI RADIALIS

Mm. extensores carpi radiales longus et brevis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Extenze a radiální dukce zápěstí
- Stabilizace úchopu

ZAČÁTEK

Laterální suprakondylární hrana humeru a epicondylus lateralis.

ÚPON

Báze II. a III. záprstní kosti.

INERVACE

N. radialis (C6–C7).

SPOUŠŤOVÝ BOD

V horní třetině předloktí, na dorzálně-radiální straně.

PŘENESENÁ BOLEST

- Laterální epikondyl
- Hřbet ruky a zápěstí

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vsedě, předloktí v pronaci
- Palpujte pod loktem na dorzální straně

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Tenisový loket
- Slabost úchopu

KLINICKÝ TIP Častou zátěží je práce s myší a psaní na klávesnici: zkontrolujte polohu zápěstí při práci.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

EXTENSOR DIGITORUM

Musculus extensor digitorum

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Extenze prstů
- Pomáhá při extenzi zápěstí

ZAČÁTEK

Epicondylus lateralis humeri (společná šlacha extenzorů).

ÚPON

Dorzální aponeuróza 2.–5. prstu.

INERVACE

N. radialis profundus (C7–C8).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Na dorzální straně předloktí, 3–4 cm pod loktem.

PŘENESENÁ BOLEST

- Dorzální strana předloktí
- Hřbet ruky
- Prostředník a prsteník

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vsedě, předloktí v pronaci
- Požádejte pacienta, aby zvedal prsty jednotlivě: snopec je hmatný

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Ztuhlost prstů
- Slabost úchopu

KLINICKÝ TIP Častý u hudebníků a lidí, kteří hodně píší na klávesnici; pomáhají přestávky a protahování prstů.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

FLEXOR CARPI RADIALIS A ULNARIS

Mm. flexores carpi radialis et ulnaris

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Flexe zápěstí
- Radiální, resp. ulnární dukce

ZAČÁTEK

Epicondylus medialis humeri (společná šlacha flexorů).

ÚPON

Radialis: báze II. záprstní kosti; ulnaris: os pisiforme, V. záprstní kost.

INERVACE

N. medianus (FCR), n. ulnaris (FCU).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Na palmární straně předloktí v horní třetině.

PŘENESENÁ BOLEST

- Palmární strana zápěstí (radiálně i ulnárně)

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vsedě, předloktí v supinaci
- Požádejte o flexi zápěstí proti odporu

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Golfový loket
- Bolest zápěstí při úchopu

KLINICKÝ TIP U golfového lokte (mediální epikondylitida) ho vyšetřujte společně s pronator teres.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

PRONATOR TERES

Musculus pronator teres

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Vnitřní rotace předloktí (pronace)
- Pomáhá při flexi lokte

ZAČÁTEK

Epicondylus medialis humeri a processus coronoideus ulnae.

ÚPON

Střed laterální plochy radia.

INERVACE

N. medianus (C6–C7).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Mediálně pod loketní jamkou, v blízkosti mediálního epikondylu.

PŘENESENÁ BOLEST

- Palmárně-radiální strana zápěstí a předloktí

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vsedě, předloktí v supinaci
- Palpujte šikmo pod loketní jamkou

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest při kroutivých pohybech
- Necitlivost palce a ukazováku (n. medianus)

KLINICKÝ TIP Prochází jím n. medianus: syndrom pronator teres může napodobovat syndrom karpálního tunelu.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

PALMARIS LONGUS

Musculus palmaris longus

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Napínání dlaňové aponeurózy
- Pomáhá při flexi zápěstí

ZAČÁTEK

Epicondylus medialis humeri.

ÚPON

Aponeurosis palmaris.

INERVACE

N. medianus (C7–C8).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Na palmární straně předloktí v horní třetině.

PŘENESENÁ BOLEST

- Píchavá, jehlovitá bolest v dlani

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vsedě
- Požádejte pacienta, aby se dotkl palcem malíčku: šlacha vystoupí

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest dlaně při držení nářadí

KLINICKÝ TIP Asi u 15 % lidí chybí; pokud chybí, hledejte jiný zdroj bolesti dlaně.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

ADDUCTOR POLLICIS

Musculus adductor pollicis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Addukce palce (štipcový úchop)

ZAČÁTEK

III. záprstní kost a kosti zápěstní.

ÚPON

Základní článek palce (ulnární strana).

INERVACE

N. ulnaris (C8–Th1).

SPOUŠŤOVÝ BOD

V kožní řase mezi palcem a ukazovákem (první meziprstní prostor).

PŘENESENÁ BOLEST

- Zevní strana palce
- Kořen palce

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Klešťový úchop mezi palcem a ukazovákem

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Neobratnost při jemných pohybech
- Bolest při psaní nebo štipcovém úchopu

KLINICKÝ TIP Častý po používání telefonu, psaní a šití. Doporučte protahování prstů v pracovních přestávkách.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

OPPONENS POLLICIS

Musculus opponens pollicis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Opozice palce

ZAČÁTEK

Os trapezium a retinaculum flexorum.

ÚPON

Radiální okraj I. záprstní kosti.

INERVACE

N. medianus (C8–Th1).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Ve thenaru (bříško palce), na radiální straně dlaně.

PŘENESENÁ BOLEST

- Palmární strana palce
- Palmárně-radiální část zápěstí

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Plošná palpace na thenaru
- Požádejte o opozici: palec se dotkne malíčku

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Slabost úchopu
- Bolest při otevírání sklenice

KLINICKÝ TIP Při syndromu karpálního tunelu mohou thenarové svaly slábnout: vyšetřete i sílu.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

MEZIKOSTNÍ SVALY RUKY

Mm. interossei dorsales et palmares manus

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Abdukce a addukce prstů
- Flexe v základních kloubech, extenze v mezičlánkových kloubech

ZAČÁTEK

Přivrácené strany záprstních kostí.

ÚPON

Základní články a dorzální aponeuróza prstů.

INERVACE

N. ulnaris (C8–Th1).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Mezi záprstními kostmi, na dorzální i palmární straně.

PŘENESENÁ BOLEST

- Strany prstů až ke koncovým článkům
- Okolí Heberdenových uzlů

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Klešťový úchop mezi záprstními kostmi

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Ztuhlost prstů
- Bolest po stranách prstů

KLINICKÝ TIP Bolest prstů často vypadá jako kloubní, ale může být svalová: prohmatejte prostor mezi záprstními kostmi.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

TĚLESNÁ OBLAST

ZÁDA, PÁTEŘ A TRUP

Karty 48–60 · 13 svalů

SERRATUS POSTERIOR SUPERIOR

Musculus serratus posterior superior

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Zvedání horních žeber při nádechu

ZAČÁTEK

Trnové výběžky C7–Th3.

ÚPON

2.–5. žebro.

INERVACE

Nn. intercostales (Th2–Th5).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Pod horní částí lopatky; dostupný jen při lopatce vysunuté dopředu.

PŘENESENÁ BOLEST

- Hluboko pod lopatkou
- Zadní strana paže
- Malíček

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vsedě, paže zkřížené před hrudníkem
- Palpujte pod vnitřním okrajem lopatky

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Hluboká, trvalá bolest pod lopatkou
- Necitlivost malíčku

KLINICKÝ TIP Bez odtažení lopatky není hmatný: zkřížení paží sval odkryje.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

SERRATUS POSTERIOR INFERIOR

Musculus serratus posterior inferior

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Tah dolních žeber dolů a dozadu

ZAČÁTEK

Trnové výběžky Th11–L2.

ÚPON

9.–12. žebro.

INERVACE

Nn. intercostales (Th9–Th12).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Nad dolními žebry, laterálně od páteře.

PŘENESENÁ BOLEST

- Místní, bolavá bolest nad dolními žebry

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na břiše
- Plošná palpace na dolních žebrech

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Tupá bolest nad žebry
- Bolest při rotaci

KLINICKÝ TIP Může bolet, i když je bederní vyšetření negativní: palpujte nad žebry.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

ILIOCOSTALIS THORACIS

Musculus iliocostalis thoracis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Extenze páteře
- Lateroflexe na stejnou stranu

ZAČÁTEK

Úhly dolních 6 žeber.

ÚPON

Úhly horních 6 žeber a příčný výběžek C7.

INERVACE

Zadní větve míšních nervů.

SPOUŠŤOVÝ BOD

Ve střední a dolní hrudní oblasti, laterálně od páteře.

PŘENESENÁ BOLEST

- Směrem k lopatce
- Vpředu na stejnou stranu břicha

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na břiše
- Plošná palpace podél žeberních úhlů

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest v hrudní části zad
- Bolest břicha, která působí jako útrobní

KLINICKÝ TIP Při bolesti břicha s negativním interním vyšetřením myslete i na zádové svaly.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 51 · ZÁDA, PÁTEŘ A TRUP

ILIOCOSTALIS LUMBORUM

Musculus iliocostalis lumborum

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Extenze a lateroflexe bederní páteře

ZAČÁTEK

Crista iliaca a os sacrum.

ÚPON

Úhly dolních 6 žeber.

INERVACE

Zadní větve míšních nervů (bederní).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Ve výši L1, laterálně od páteře.

PŘENESENÁ BOLEST

- Směrem do středu hýždě
- Dolní část zad

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na břiše, polštář pod břichem
- Plošná palpace v bederní oblasti

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest kříže šířící se do hýždě
- Bolest při vstávání

KLINICKÝ TIP Část bederní bolesti se může šířit do hýždě, aniž by šlo o ischias.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 52 · ZÁDA, PÁTEŘ A TRUP

LONGISSIMUS THORACIS

Musculus longissimus thoracis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Extenze páteře
- Lateroflexe na stejnou stranu

ZAČÁTEK

Os sacrum, crista iliaca, trnové výběžky bederních obratlů.

ÚPON

Příčné výběžky hrudních obratlů a žebra.

INERVACE

Zadní větve míšních nervů.

SPOUŠŤOVÝ BOD

Ve výši Th10–L1, 2–4 cm od střední čáry.

PŘENESENÁ BOLEST

- Níže, nad hýžďovým svalem
- Sakroiliakální oblast

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na břiše
- Hluboká plošná palpace vedle střední čáry

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest dolní části zad a hýždě
- Ztuhlost po dlouhém stání

KLINICKÝ TIP Bolest se objevuje o několik segmentů níže než spoušťový bod: hledejte výše.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

MULTIFIDUS

Musculus multifidus

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Segmentální stabilizace obratlů
- Extenze a rotace páteře

ZAČÁTEK

Os sacrum, spina iliaca, příčné výběžky.

ÚPON

Trnové výběžky o 2–4 úrovně výše.

INERVACE

Zadní větve míšních nervů.

SPOUŠŤOVÝ BOD

Těsně vedle trnových výběžků, v hloubce.

PŘENESENÁ BOLEST

- Místní bolest vedle páteře
- Kost křížová a kostrč

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na břiše
- Hluboká palpace těsně vedle trnového výběžku

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Segmentální, bodová bolest zad
- Bolest kostrče

KLINICKÝ TIP U chronické bolesti kříže často atrofuje: klíčová jsou stabilizační cvičení.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 54 · ZÁDA, PÁTEŘ A TRUP

ROTATORES A INTERSPINALES

Mm. rotatores et interspinales

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Jemná rotace a extenze obratlů
- Propriocepce

ZAČÁTEK

Příčné výběžky (rotatores), trnové výběžky (interspinales).

ÚPON

Trnový výběžek sousedního obratle.

INERVACE

Zadní větve míšních nervů.

SPOUŠŤOVÝ BOD

Hluboko mezi trnovými výběžky.

PŘENESENÁ BOLEST

- Střední čára páteře v dané úrovni

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na břiše
- Tlak mezi trnovými výběžky a vedle nich

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest páteře ve střední čáře
- Obratel citlivý na poklep

KLINICKÝ TIP U bolesti ve střední čáře citlivé na poklep vždy vylučte kostní příčinu (např. zlomeninu).

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 55 · ZÁDA, PÁTEŘ A TRUP

QUADRATUS LUMBORUM

Musculus quadratus lumborum

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Lateroflexe bederní páteře na stejnou stranu
- Elevace pánve
- Fixace 12. žebra při nádechu

ZAČÁTEK

Crista iliaca a ligamentum iliolumbale.

ÚPON

12. žebro a příčné výběžky L1–L4.

INERVACE

Přední větve Th12–L3.

SPOUŠŤOVÝ BOD

Mezi 12. žebrem a hřebenem kosti kyčelní, laterálně od erector spinae.

PŘENESENÁ BOLEST

- Sakroiliakální kloub
- Dolní část hýždě
- Hřeben kosti kyčelní
- Velký trochanter (trochanter major)

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na boku, horní paže nad hlavou
- Palpujte pod laterálním okrajem erector spinae

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Silná bolest kříže při vstávání
- Bolest při kašli
- Nemůže spát na boku

KLINICKÝ TIP Častá příčina akutního „housera“. Zkontrolujte rozdíl délky dolních končetin a postavení pánve.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 56 · ZÁDA, PÁTEŘ A TRUP

RECTUS ABDOMINIS (PŘÍMÝ BŘIŠNÍ SVAL)

Musculus rectus abdominis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Flexe trupu
- Břišní lis
- Udržení pánve

ZAČÁTEK

Symphysis pubica a crista pubica.

ÚPON

Chrupavky 5.–7. žebra a processus xiphoideus.

INERVACE

Nn. intercostales (Th7–Th12).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Nad pupkem, vedle pupku a nad stydkou kostí.

PŘENESENÁ BOLEST

- Vodorovný pruh na zádech
- Kolem pupku
- Podbřišek a kříž

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech, kolena pokrčená
- Klešťový úchop na okraji břišního svalu
- Zvednutí hlavy sval napne

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Pocit nadýmání
- Bolest připomínající břišní křeč
- Bolest kříže se zdrojem vpředu

KLINICKÝ TIP U bolesti břicha vždy vylučte interní příčiny; teprve poté vyšetřete břišní stěnu.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 57 · ZÁDA, PÁTEŘ A TRUP

OBLIQUUS EXTERNUS ABDOMINIS

Musculus obliquus externus abdominis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Rotace trupu na opačnou stranu
- Flexe trupu
- Břišní lis

ZAČÁTEK

Zevní plocha 5.–12. žebra.

ÚPON

Crista iliaca, ligamentum inguinale, linea alba.

INERVACE

Nn. intercostales (Th7–Th12), n. iliohypogastricus.

SPOUŠŤOVÝ BOD

Podél dolních žeber a v blízkosti tříselného ohbí.

PŘENESENÁ BOLEST

- Nadbřišek (připomíná pálení žáhy)
- Tříslo a podbřišek

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech
- Klešťový úchop na boční břišní stěně

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest připomínající pálení žáhy
- Bolest v třísle

KLINICKÝ TIP Častý u sportovců (rotační pohyby). Vylučte interní příčiny.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 58 · ZÁDA, PÁTEŘ A TRUP

MEZIŽEBERNÍ SVALY

Mm. intercostales externi et interni

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Zvedání a spouštění žeber při dýchání
- Stabilizace hrudní stěny

ZAČÁTEK

Dolní okraj horního žebra.

ÚPON

Horní okraj žebra pod ním.

INERVACE

Nn. intercostales.

SPOUŠŤOVÝ BOD

V mezižeberních prostorech v bolestivé úrovni.

PŘENESENÁ BOLEST

- Místní bolest podél mezižebří

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Plošná palpace v mezižebří
- Hluboký nádech zvyšuje citlivost

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bodavá bolest při nádechu
- Bolest po kašli

KLINICKÝ TIP Při silné a ohraničené bolesti vylučte zlomeninu žebra a časné stadium pásového oparu.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 59 · ZÁDA, PÁTEŘ A TRUP

BRÁNICE

Diaphragma

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Hlavní nádechový sval

ZAČÁTEK

Processus xiphoideus, dolních 6 žeber, bederní obratle.

ÚPON

Centrum tendineum.

INERVACE

N. phrenicus (C3–C5).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Vpředu pod žeberním obloukem, opatrnou palpací při výdechu.

PŘENESENÁ BOLEST

- Podél žeberního oblouku
- Vrchol ramene

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech, kolena pokrčená
- Při výdechu palpujte pod žeberní oblouk směrem nahoru

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Píchání v boku
- Bolest při hlubokém nádechu

KLINICKÝ TIP Horní hrudní dýchání ukazuje na nedostatečnou funkci bránice: naučte pacienta břišní (brániční) dýchání.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

STERNALIS

Musculus sternalis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Nemá významnou funkci

ZAČÁTEK

Přední plocha hrudní kosti a žeberních chrupavek.

ÚPON

Fascia pectoralis, variabilně.

INERVACE

Nn. pectorales nebo intercostales.

SPOUŠŤOVÝ BOD

Nad hrudní kostí, ve střední čáře.

PŘENESENÁ BOLEST

- Celá hrudní kost
- Horní část hrudníku
- Vnitřní strana paže

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Plošná palpace na hrudní kosti

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest pod hrudní kostí
- Pocit svírání na hrudi

KLINICKÝ TIP Při svírání na hrudi NEJPRVE lékařské vyšetření (srdce). Sval vyšetřujte až poté.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

TĚLESNÁ OBLAST

PÁNEV, KYČEL A HÝŽĎOVÉ SVALY

Karty 61–74 · 14 svalů

KARTA 61 · PÁNEV, KYČEL A HÝŽĎOVÉ SVALY

GLUTEUS MAXIMUS

Musculus gluteus maximus

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Extenze kyčle
- Zevní rotace stehna
- Stabilizace pánve

ZAČÁTEK

Zadní část os ilium, os sacrum, os coccygis.

ÚPON

Tuberositas glutea femoris a tractus iliotibialis.

INERVACE

N. gluteus inferior (L5–S2).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Vedle kosti křížové, nad sedacím hrbolem a v dolní vnitřní části.

PŘENESENÁ BOLEST

- Kost křížová a SI kloub
- Celá hýždě
- Kostrč

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na boku nebo na břiše
- Plošná palpace nebo klešťový úchop

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest při sezení
- Bolest při chůzi do kopce

KLINICKÝ TIP Častý po dlouhém sezení; pomáhají přestávky v sezení a aktivace extenzorů kyčle.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

GLUTEUS MEDIUS

Musculus gluteus medius

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Abdukce kyčle
- Udržení pánve ve vodorovné poloze při chůzi

ZAČÁTEK

Zevní plocha os ilium.

ÚPON

Trochanter major.

INERVACE

N. gluteus superior (L4–S1).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Těsně pod hřebenem kosti kyčelní, ve třech bodech zepředu dozadu.

PŘENESENÁ BOLEST

- Podél hřebene kosti kyčelní
- SI kloub
- Střed a boční strana hýždě

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na boku
- Plošná palpace pod hřebenem kosti kyčelní

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest kříže při chůzi
- Nemůže ležet na postižené straně

KLINICKÝ TIP Při Trendelenburgově příznaku (poklesávající pánev) je oslabený: posilujte ho zvedáním nohy vleže na boku.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 63 · PÁNEV, KYČEL A HÝŽĎOVÉ SVALY

GLUTEUS MINIMUS

Musculus gluteus minimus

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Abdukce a vnitřní rotace kyčle

ZAČÁTEK

Zevní plocha os ilium (přední část).

ÚPON

Přední okraj trochanter major.

INERVACE

N. gluteus superior (L4–S1).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Hluboko pod gluteus medius, v přední a zadní části.

PŘENESENÁ BOLEST

- Zevní strana stehna a bérce až ke kotníku
- Zadní strana stehna a lýtka

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na boku
- Hluboká palpace pod mediem

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest připomínající ischias
- Bolest při vstávání a kulhání

KLINICKÝ TIP Nejčastější svalová příčina „pseudoischiasu“. Při neurologických příznacích (necitlivost, výpadek reflexů) je nutné lékařské vyšetření.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

PIRIFORMIS

Musculus piriformis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Zevní rotace stehna
- Abdukce při flektované kyčli

ZAČÁTEK

Přední plocha os sacrum.

ÚPON

Horní okraj trochanter major.

INERVACE

N. ad m. piriformem (S1–S2).

SPOUŠŤOVÝ BOD

V mediální a laterální třetině spojnice mezi kostí křížovou a trochanter major.

PŘENESENÁ BOLEST

- Oblast SI kloubu
- Celá hýždě
- Zadní strana stehna

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na boku, horní noha pokrčená
- Hluboká palpace přes hýžďový sval

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest při sezení
- Necitlivost na zadní straně nohy (syndrom piriformis)

KLINICKÝ TIP Sedací nerv (n. ischiadicus) prochází pod ním nebo skrz něj: při kompresi mohou vzniknout příznaky podobné ischiasu.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 65 · PÁNEV, KYČEL A HÝŽĎOVÉ SVALY

HLUBOKÉ ROTÁTORY (GEMELLI A OBTURATOR INTERNUS)

Mm. gemelli et obturator internus

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Zevní rotace stehna
- Stabilizace hlavice femuru

ZAČÁTEK

Spina ischiadica, vnitřní plocha membrana obturatoria, tuber ischiadicum.

ÚPON

Mediální plocha trochanter major.

INERVACE

N. ad m. obturatorium internum (L5–S2).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Pod piriformis, za trochanter major.

PŘENESENÁ BOLEST

- Hluboko v dolní části hýždě
- Zadní část kyčle

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na břiše, koleno pokrčené
- Hluboká palpace za trochanterem

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Hluboká bolest hýždě
- Nepohodlí při sezení

KLINICKÝ TIP Často bývají postiženy společně s piriformis; lze je ošetřit stejným protažením.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

QUADRATUS FEMORIS

Musculus quadratus femoris

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Zevní rotace stehna

ZAČÁTEK

Tuber ischiadicum.

ÚPON

Crista intertrochanterica.

INERVACE

N. ad m. quadratum femoris (L4–S1).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Mezi sedacím hrbolem a trochanter major.

PŘENESENÁ BOLEST

- Kolem sedacího hrbolu
- Zadní část kyčle

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na břiše
- Hluboká palpace laterálně od sedacího hrbolu

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest sedacího hrbolu při sezení

KLINICKÝ TIP U bolesti kolem sedacího hrbolu ji odlište od problému šlachy hamstringů.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

TENSOR FASCIAE LATAE

Musculus tensor fasciae latae

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Flexe, abdukce a vnitřní rotace kyčle
- Napínání tractus iliotibialis

ZAČÁTEK

Spina iliaca anterior superior.

ÚPON

Tractus iliotibialis.

INERVACE

N. gluteus superior (L4–S1).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Pod a za spina iliaca anterior superior.

PŘENESENÁ BOLEST

- Zevní strana kyčle
- Zevní strana stehna ke koleni

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech nebo na boku
- Plošná palpace pod SIAS

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest kyčle
- Bolest při rychlé chůzi

KLINICKÝ TIP U běžců ho vyšetřujte společně se syndromem iliotibiálního traktu.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

ILIOPSOAS

Musculus iliopsoas

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Flexe kyčle
- Stabilizace bederní páteře

ZAČÁTEK

Psoas: obratle Th12–L4; iliacus: fossa iliaca.

ÚPON

Trochanter minor.

INERVACE

Plexus lumbalis (L1–L3), n. femoralis.

SPOUŠŤOVÝ BOD

V třísle pod ligamentum inguinale a přes břišní stěnu na psoatu.

PŘENESENÁ BOLEST

- Svislý pruh podél páteře
- Kost křížová
- Přední strana stehna

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech, kolena pokrčená
- Pomalu, při výdechu palpujte hluboko přes břišní stěnu
- Vyhněte se břišní aortě (pulz)

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest kříže vestoje, která vleže polevuje
- Obtížné napřímení ze sedu

KLINICKÝ TIP Dlouhé sezení ho zkracuje: naučte pacienta protahovat flexory kyčle ve výpadu.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

PECTINEUS

Musculus pectineus

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Addukce a flexe stehna

ZAČÁTEK

Pecten ossis pubis.

ÚPON

Linea pectinea femoris.

INERVACE

N. femoralis (L2–L3), někdy n. obturatorius.

SPOUŠŤOVÝ BOD

Pod tříselným ohbím, v horní vnitřní části stehna.

PŘENESENÁ BOLEST

- Hluboko v třísle

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech, noha mírně v abdukci
- Palpujte mediálně od a. femoralis

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest v třísle
- Bolest při sezení se zkříženýma nohama

KLINICKÝ TIP Bolest v třísle vyšetřujte na svalový původ až po vyloučení kýly a příčiny v kyčelním kloubu.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

ADDUCTOR LONGUS A BREVIS

Mm. adductores longus et brevis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Addukce stehna
- Pomáhá při flexi kyčle

ZAČÁTEK

Os pubis.

ÚPON

Linea aspera femoris.

INERVACE

N. obturatorius (L2–L4).

SPOUŠŤOVÝ BOD

V horní třetině vnitřní strany stehna.

PŘENESENÁ BOLEST

- Tříslo
- Vnitřní strana stehna
- Vnitřní strana kolena a holenní kost

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech, koleno pokrčené a spuštěné do strany
- Klešťový úchop na vnitřní straně stehna

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Pocit natažení v třísle
- Bolest při chůzi do schodů

KLINICKÝ TIP Častý u fotbalistů: předchází se mu postupnou zátěží a posilováním adduktorů.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

ADDUCTOR MAGNUS

Musculus adductor magnus

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Addukce stehna
- Extenze kyčle (zadní vlákna)

ZAČÁTEK

Ramus inferior ossis pubis a tuber ischiadicum.

ÚPON

Linea aspera a tuberculum adductorium.

INERVACE

N. obturatorius a n. ischiadicus (L2–L4).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Na vnitřní straně stehna, uprostřed a nahoře.

PŘENESENÁ BOLEST

- Tříslo
- Vnitřní strana stehna
- Hluboko v pánvi

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech, noha v abdukci
- Palpujte na vnitřně-zadní straně stehna

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest vnitřní strany stehna
- Nepohodlí v pánvi

KLINICKÝ TIP U bolesti uvnitř pánve vylučte gynekologické a urologické příčiny.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

GRACILIS

Musculus gracilis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Addukce stehna
- Flexe a vnitřní rotace kolena

ZAČÁTEK

Ramus inferior ossis pubis.

ÚPON

Pes anserinus (mediální plocha tibie).

INERVACE

N. obturatorius (L2–L3).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Ve střední části vnitřní strany stehna.

PŘENESENÁ BOLEST

- Pálivá, povrchová bolest na vnitřní straně stehna

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech, noha v abdukci
- Klešťový úchop

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Pálení na vnitřní straně stehna

KLINICKÝ TIP Odlište od burzitidy pes anserinus: bolest gracilis se táhne po celém stehně.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

SARTORIUS (KREJČOVSKÝ SVAL)

Musculus sartorius

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Flexe, abdukce a zevní rotace kyčle
- Flexe kolena

ZAČÁTEK

Spina iliaca anterior superior.

ÚPON

Pes anserinus.

INERVACE

N. femoralis (L2–L3).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Na více místech podél průběhu svalu.

PŘENESENÁ BOLEST

- Bodavá, povrchová bolest šikmo přes přední stranu stehna

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech
- Klešťový úchop podél šikmého průběhu

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bodavá bolest stehna
- Necitlivost zevní strany stehna (n. cutaneus femoris lat.)

KLINICKÝ TIP N. cutaneus femoris lateralis prochází v blízkosti SIAS: může napodobovat příznaky meralgia paraesthetica.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 74 · PÁNEV, KYČEL A HÝŽDOVÉ SVALY

SVALY PÁNEVNÍHO DNA

Mm. levator ani et coccygeus

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Udržení pánevních orgánů
- Podpora kontinence

ZAČÁTEK

Os pubis, arcus tendineus, spina ischiadica.

ÚPON

Os coccygis a ligamentum anococcygeum.

INERVACE

Plexus sacralis (S3–S4).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Vedle kostrče a na vnitřní stěně pánve; vnitřní palpaci smí provádět jen k tomu vyškolený odborník.

PŘENESENÁ BOLEST

- Kostrč
- Dolní část kosti křížové
- Hluboko v pánvi

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Zevní palpace vedle kostrče
- Vnitřní vyšetření je úkolem vyškoleného terapeuta

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest kostrče při sezení
- Pocit tlaku v pánvi

KLINICKÝ TIP Vnitřní ošetření jen terapeutem pánevního dna s příslušným vzděláním. Doporučuje se odborné lékařské vyšetření.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

TĚLESNÁ OBLAST

STEHNO, BÉREC A CHODIDLO

Karty 75–102 · 28 svalů

KARTA 75 · STEHNO, BÉREC A CHODIDLO

RECTUS FEMORIS

Musculus rectus femoris

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Extenze kolena
- Flexe kyčle

ZAČÁTEK

Spina iliaca anterior inferior.

ÚPON

Patella a tuberositas tibiae (ligamentum patellae).

INERVACE

N. femoralis (L2–L4).

SPOUŠŤOVÝ BOD

V horní části stehna pod tříselným ohbím.

PŘENESENÁ BOLEST

- Kolem čéšky a hluboko v koleni

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech
- Plošná palpace v horní přední části stehna

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest kolena při chůzi ze schodů
- Noční bolest kolena

KLINICKÝ TIP Zdroj bolesti přední části kolena bývá často nahoře na stehně: palpujte výše.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

VASTUS MEDIALIS

Musculus vastus medialis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Extenze kolena
- Mediální stabilizace čéšky

ZAČÁTEK

Mediální okraj linea aspera.

ÚPON

Mediální okraj čéšky a ligamentum patellae.

INERVACE

N. femoralis (L2–L4).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Mediálně nad čéškou a ve střední části stehna.

PŘENESENÁ BOLEST

- Vnitřní strana kolena
- Vnitřní přední část stehna

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech, koleno mírně pokrčené
- Plošná palpace mediálně nad kolenem

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- „Podlamování“ kolena (buckling)
- Bolest kolena při dřepu

KLINICKÝ TIP „Podlamování kolena“ často vzniká kvůli spoušťovému bodu ve vastus medialis, ne kvůli poranění vazu.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 77 · STEHNO, BÉREC A CHODIDLO

VASTUS LATERALIS

Musculus vastus lateralis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Extenze kolena

ZAČÁTEK

Trochanter major, laterální okraj linea aspera.

ÚPON

Laterální okraj čéšky a ligamentum patellae.

INERVACE

N. femoralis (L2–L4).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Po celé délce svalu na zevní straně stehna.

PŘENESENÁ BOLEST

- Zevní strana stehna
- Zevní strana kolena
- Laterální okraj čéšky

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na boku
- Plošná palpace na zevní straně stehna

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Nemůže ležet na postižené straně
- „Zaseknutí“ čéšky

KLINICKÝ TIP Může způsobovat laterální tah čéšky: ošetřujte ho spolu s posilováním mediální strany.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 78 · STEHNO, BÉREC A CHODIDLO

VASTUS INTERMEDIUS

Musculus vastus intermedius

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Extenze kolena

ZAČÁTEK

Přední a laterální plocha femuru.

ÚPON

Horní okraj čéšky.

INERVACE

N. femoralis (L2–L4).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Hluboko pod rectus femoris, v horní části stehna.

PŘENESENÁ BOLEST

- Přední střední část stehna

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech
- Odsuňte rectus femoris do strany a palpujte hluboko

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Obtížné plné natažení kolena
- Bolest při vstávání

KLINICKÝ TIP Kvůli hluboké poloze se při vyšetření často vynechává.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

BICEPS FEMORIS

Musculus biceps femoris

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Flexe kolena
- Extenze kyčle (dlouhá hlava)

ZAČÁTEK

Dlouhá hlava: tuber ischiadicum; krátká hlava: linea aspera.

ÚPON

Caput fibulae.

INERVACE

N. ischiadicus (L5–S2).

SPOUŠŤOVÝ BOD

V dolní polovině zadní zevní strany stehna.

PŘENESENÁ BOLEST

- Za kolenem
- Zadní strana stehna

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na břiše
- Klešťový úchop na zadní zevní straně stehna

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest za kolenem při chůzi
- Bolest po sezení

KLINICKÝ TIP Při dlouhém sezení ho může tlačit hrana židle: zkontrolujte výšku sedu.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

SEMITENDINOSUS A SEMIMEMBRANOSUS

Mm. semitendinosus et semimembranosus

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Flexe a vnitřní rotace kolena
- Extenze kyčle

ZAČÁTEK

Tuber ischiadicum.

ÚPON

Mediální plocha tibie (pes anserinus) a condylus medialis.

INERVACE

N. ischiadicus (L5–S2).

SPOUŠŤOVÝ BOD

V dolní polovině zadní vnitřní strany stehna.

PŘENESENÁ BOLEST

- Dolní část hýždě
- Zadní strana stehna
- Vnitřní strana kolena a lýtka

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na břiše
- Klešťový úchop na zadní vnitřní straně stehna

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest při sezení
- Bolest při chůzi

KLINICKÝ TIP Hamstringy bývají často napjaté; kromě protahování chrání před zraněním excentrické posilování.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

POPLITEUS

Musculus popliteus

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- „Odemknutí“ kolena z plné extenze (vnitřní rotace)
- Zadní stabilizace kolena

ZAČÁTEK

Condylus lateralis femoris.

ÚPON

Zadní plocha tibie.

INERVACE

N. tibialis (L4–S1).

SPOUŠŤOVÝ BOD

V dolní části podkolenní jamky, mediálně mezi hlavami gastrocnemiu.

PŘENESENÁ BOLEST

- Za kolenem

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na břiše, koleno mírně pokrčené
- Hluboká palpace v podkolenní jamce (vyhněte se tlaku na cévy)

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest při chůzi z kopce
- Bolest při dřepu

KLINICKÝ TIP Pokud je podkolenní jamka oteklá nebo teplá, vylučte Bakerovu cystu a hlubokou žilní trombózu.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

GASTROCNEMIUS (DVOJHLAVÝ LÝTKOVÝ SVAL)

Musculus gastrocnemius

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Plantární flexe kotníku
- Pomáhá při flexi kolena

ZAČÁTEK

Condylus medialis a lateralis femoris.

ÚPON

Tuber calcanei (Achillova šlacha).

INERVACE

N. tibialis (S1–S2).

SPOUŠŤOVÝ BOD

V obou hlavách, v horní části lýtka.

PŘENESENÁ BOLEST

- Vnitřní strana klenby nohy
- Za kolenem
- Lýtko

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na břiše
- Klešťový úchop na hlavách lýtkového svalu

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Noční křeče v lýtku
- Bolest do kopce

KLINICKÝ TIP Za nočními křečemi v lýtku často stojí spoušťový bod: doporučuje se večerní protažení.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 83 · STEHNO, BÉREC A CHODIDLO

SOLEUS (ŠIKMÝ LÝTKOVÝ SVAL)

Musculus soleus

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Plantární flexe kotníku (zejména s pokrčeným kolenem)
- Žilní pumpa

ZAČÁTEK

Hlavička fibuly a zadní plocha tibie.

ÚPON

Tuber calcanei (Achillova šlacha).

INERVACE

N. tibialis (S1–S2).

SPOUŠŤOVÝ BOD

V dolní části lýtka nad Achillovou šlachou a výše.

PŘENESENÁ BOLEST

- Pata
- Lýtko
- Vzácně SI kloub

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na břiše, koleno pokrčené do 90°
- Klešťový úchop pod gastrocnemiem

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest paty
- Bolest při chůzi do schodů

KLINICKÝ TIP Zdrojem bolesti paty nemusí být vždy chodidlo: vyšetřete i soleus.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

PLANTARIS

Musculus plantaris

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Pomáhá při plantární flexi kotníku

ZAČÁTEK

Linea supracondylaris lateralis femoris.

ÚPON

Tuber calcanei.

INERVACE

N. tibialis (S1–S2).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Laterálně v podkolenní jamce, vedle laterální hlavy gastrocnemiu.

PŘENESENÁ BOLEST

- Za kolenem
- Horní část lýtka

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na břiše
- Palpujte v laterální části podkolenní jamky

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest za kolenem

KLINICKÝ TIP Často chybí; vyšetřete i další zdroje bolesti v podkolenní jamce.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 85 · STEHNO, BÉREC A CHODIDLO

TIBIALIS ANTERIOR

Musculus tibialis anterior

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Dorzální flexe kotníku
- Inverze nohy

ZAČÁTEK

Laterální plocha tibie.

ÚPON

Os cuneiforme mediale a I. nártní kost.

INERVACE

N. peroneus profundus (L4–L5).

SPOUŠŤOVÝ BOD

V horní třetině přední strany bérce, laterálně od holenní kosti.

PŘENESENÁ BOLEST

- Přední strana kotníku
- Palec nohy
- Holenní kost

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech
- Plošná palpace vedle holenní kosti

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Zakopávání, pocit „padající nohy“
- Bolest holeně po běhu

KLINICKÝ TIP U „shin splints“ vyšetřete tibialis anterior a zkontrolujte i běžeckou obuv.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

TIBIALIS POSTERIOR

Musculus tibialis posterior

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Udržení klenby nohy
- Inverze nohy

ZAČÁTEK

Zadní plocha tibie a fibuly, membrana interossea.

ÚPON

Tuberositas ossis navicularis a kosti chodidla.

INERVACE

N. tibialis (L4–L5).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Hluboko pod lýtkem; hmatný jen nepřímo.

PŘENESENÁ BOLEST

- Achillova šlacha
- Celé chodidlo
- Lýtko

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na břiše
- Hluboká nepřímá palpace podél zadního okraje tibie

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest chodidla při chůzi
- Plochá noha

KLINICKÝ TIP U ploché nohy bývá často přetížen: důležitá je vhodná obuv a vložky.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 87 · STEHNO, BÉREC A CHODIDLO

PERONEUS LONGUS

Musculus fibularis (peroneus) longus

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Everze nohy
- Plantární flexe kotníku
- Udržení klenby nohy

ZAČÁTEK

Caput fibulae a laterální plocha fibuly.

ÚPON

I. nártní kost a os cuneiforme mediale.

INERVACE

N. peroneus superficialis (L5–S1).

SPOUŠŤOVÝ BOD

2–3 cm pod hlavičkou fibuly.

PŘENESENÁ BOLEST

- Kolem zevního kotníku a za ním
- Zevní strana nohy

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na boku
- Plošná palpace podél fibuly

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Pocit nestability kotníku
- Opakovaná bolest po podvrtnutí kotníku

KLINICKÝ TIP N. peroneus probíhá kolem hlavičky fibuly: nepoužívejte zde silný ani dlouhodobý tlak.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

PERONEUS BREVIS

Musculus fibularis (peroneus) brevis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD



○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Everze nohy
- Plantární flexe kotníku

ZAČÁTEK

Dolní dvě třetiny fibuly.

ÚPON

Tuberositas V. nártní kosti.

INERVACE

N. peroneus superficialis (L5–S1).

SPOUŠŤOVÝ BOD

V dolní třetině zevní strany bérce.

PŘENESENÁ BOLEST

- Zevní kotník
- Zevní strana nohy

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na boku
- Plošná palpace podél dolní části fibuly

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Nestabilita kotníku
- Bolest na nerovném terénu

KLINICKÝ TIP Po podvrtnutí kotníku je klíčové posilování a trénink rovnováhy.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 89 · STEHNO, BÉREC A CHODIDLO

PERONEUS TERTIUS

Musculus fibularis (peroneus) tertius

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Dorzální flexe kotníku
- Everze nohy

ZAČÁTEK

Dolní třetina fibuly.

ÚPON

Báze V. nártní kosti (dorzální strana).

INERVACE

N. peroneus profundus (L5–S1).

SPOUŠŤOVÝ BOD

V dolní třetině přední zevní strany bérce.

PŘENESENÁ BOLEST

- Přední strana kotníku
- Zevní strana paty

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech
- Plošná palpace vedle extensor digitorum longus

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest kotníku vpředu

KLINICKÝ TIP Vyšetřujte ho společně s extensor digitorum longus.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

EXTENSOR DIGITORUM LONGUS

Musculus extensor digitorum longus

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Extenze 2.–5. prstu nohy
- Dorzální flexe kotníku

ZAČÁTEK

Condylus lateralis tibiae, přední plocha fibuly.

ÚPON

Dorzální aponeuróza 2.–5. prstu nohy.

INERVACE

N. peroneus profundus (L5–S1).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Na přední zevní straně bérce, asi 8 cm pod kolenem.

PŘENESENÁ BOLEST

- Hřbet nohy
- Prostřední prsty nohy

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech
- Požádejte o zvednutí prstů: snopec je hmatný

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest nártu
- Pocit připomínající křeč vpředu

KLINICKÝ TIP Může ho dráždit těsná obuv a pevné šněrování: zkontrolujte obuv.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

EXTENSOR HALLUCIS LONGUS

Musculus extensor hallucis longus

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Extenze palce nohy
- Dorzální flexe kotníku

ZAČÁTEK

Střední část fibuly.

ÚPON

Koncový článek palce nohy.

INERVACE

N. peroneus profundus (L5–S1).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Ve střední a dolní části přední strany bérce.

PŘENESENÁ BOLEST

- Nárt
- Palec nohy

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech
- Požádejte o zvednutí palce nohy

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest palce nohy
- Bolest po běhu

KLINICKÝ TIP Vylučte kloubní příčinu hallux rigidus.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 92 · STEHNO, BÉREC A CHODIDLO

FLEXOR DIGITORUM LONGUS

Musculus flexor digitorum longus

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Flexe 2.–5. prstu nohy
- Plantární flexe kotníku

ZAČÁTEK

Zadní plocha tibie.

ÚPON

Koncové články 2.–5. prstu nohy.

INERVACE

N. tibialis (L5–S2).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Hluboko na vnitřní straně lýtka, za tibií.

PŘENESENÁ BOLEST

- Střední část chodidla
- Menší prsty nohy

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na břiše
- Palpujte za mediálním okrajem tibie

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest chodidla při chůzi
- Křeč prstů nohy

KLINICKÝ TIP U ploché nohy bývá často přetížen.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 93 · STEHNO, BÉREC A CHODIDLO

FLEXOR HALLUCIS LONGUS

Musculus flexor hallucis longus

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Flexe palce nohy
- Udržení klenby nohy

ZAČÁTEK

Zadní plocha fibuly.

ÚPON

Koncový článek palce nohy.

INERVACE

N. tibialis (L5–S2).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Hluboko v dolní části lýtka, laterálně.

PŘENESENÁ BOLEST

- Plantární strana palce nohy
- Kořen palce nohy

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na břiše
- Hluboká palpace v dolní části lýtka

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest palce nohy na chodidle
- Bolest ve stoji na špičkách

KLINICKÝ TIP U tanečníků a běžců bývá často přetížen.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

EXTENSOR DIGITORUM BREVIS

Musculus extensor digitorum brevis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Pomáhá při extenzi 2.–4. prstu nohy

ZAČÁTEK

Dorzální plocha calcaneu.

ÚPON

Šlachy extenzorů 2.–4. prstu nohy.

INERVACE

N. peroneus profundus (L5–S1).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Na nártu, před zevním kotníkem.

PŘENESENÁ BOLEST

- Místní bolest na nártu

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech
- Plošná palpace před zevním kotníkem

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest nártu v obuvi

KLINICKÝ TIP Může ho tlačit těsný jazyk boty: pomůže volnější šněrování.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 95 · STEHNO, BÉREC A CHODIDLO

ABDUCTOR HALLUCIS

Musculus abductor hallucis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Abdukce palce nohy
- Udržení vnitřní klenby

ZAČÁTEK

Tuber calcanei (mediální výběžek).

ÚPON

Základní článek palce nohy (mediálně).

INERVACE

N. plantaris medialis (S1–S2).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Na vnitřním okraji nohy, před patou.

PŘENESENÁ BOLEST

- Vnitřní strana paty
- Vnitřní klenba

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech, noha vytočená zevně
- Plošná palpace na vnitřním okraji chodidla

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest na vnitřní straně chodidla při chůzi

KLINICKÝ TIP Probíhá v blízkosti tarzálního tunelu: při necitlivosti vyšetřete i n. tibialis.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

FLEXOR DIGITORUM BREVIS

Musculus flexor digitorum brevis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

Spoušťový bod (X) · Hlavní zóna bolesti · Rozšířená zóna

FUNKCE

- Flexe 2.–5. prstu nohy
- Udržení klenby nohy

ZAČÁTEK

Tuber calcanei.

ÚPON

Střední články 2.–5. prstu nohy.

INERVACE

N. plantaris medialis (S1–S2).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Uprostřed chodidla pod plantární fascií.

PŘENESENÁ BOLEST

- Hlavičky nártních kostí (bříško chodidla)

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na břiše
- Hluboká palpace uprostřed chodidla

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest bříška chodidla
- Bolest po dlouhém stání

KLINICKÝ TIP Odlište od zánětu plantární fascie.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 97 · STEHNO, BÉREC A CHODIDLO

QUADRATUS PLANTAE

Musculus quadratus plantae

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Koriguje směr tahu flexor digitorum longus

ZAČÁTEK

Plantární plocha calcaneu.

ÚPON

Šlacha flexor digitorum longus.

INERVACE

N. plantaris lateralis (S1–S2).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Hluboko před patou, uprostřed chodidla.

PŘENESENÁ BOLEST

- Plantární strana paty

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na břiše
- Hluboká palpace před patou

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Ranní bolest paty

KLINICKÝ TIP U bolesti paty (patní ostruha) může k příznakům přispívat i quadratus plantae.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

ABDUCTOR DIGITI MINIMI (NOHA)

Musculus abductor digiti minimi pedis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Abdukce a flexe malíčku nohy

ZAČÁTEK

Tuber calcanei.

ÚPON

Základní článek malíčku nohy.

INERVACE

N. plantaris lateralis (S1–S2).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Na zevním okraji chodidla.

PŘENESENÁ BOLEST

- Zevní okraj chodidla
- Hlavička V. nártní kosti

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na boku
- Klešťový úchop na zevním okraji chodidla

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest na zevní straně chodidla

KLINICKÝ TIP Těsná obuv může tlačit na zevní okraj chodidla.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 99 · STEHNO, BÉREC A CHODIDLO

MEZIKOSTNÍ SVALY NOHY

Mm. interossei pedis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Abdukce a addukce prstů nohy
- Stabilizace základních kloubů

ZAČÁTEK

Boční plochy nártních kostí.

ÚPON

Základní články prstů nohy.

INERVACE

N. plantaris lateralis (S1–S2).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Mezi nártními kostmi, na dorzální i plantární straně.

PŘENESENÁ BOLEST

- Strany prstů nohy
- Okolí nártních kostí

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Palpujte mezi nártními kostmi

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest prstů nohy
- Necitlivost mezi prsty

KLINICKÝ TIP Odlište od Mortonova neuromu (necitlivost mezi prsty).

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 100 · STEHNO, BÉREC A CHODIDLO

ADDUCTOR HALLUCIS

Musculus adductor hallucis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Addukce palce nohy
- Udržení příčné klenby

ZAČÁTEK

Báze 2.–4. nártní kosti a kloubní pouzdra prstů.

ÚPON

Základní článek palce nohy (laterálně).

INERVACE

N. plantaris lateralis (S1–S2).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Hluboko pod bříškem chodidla.

PŘENESENÁ BOLEST

- Bříško chodidla pod hlavičkami nártních kostí

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na břiše
- Hluboká palpace na bříšku chodidla

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest bříška chodidla
- Bolest v botách na vysokém podpatku

KLINICKÝ TIP Při poklesu příčné klenby bývá často přetížen; pomáhá cvičení prstů (shrnování ručníku).

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

KARTA 101 · STEHNO, BÉREC A CHODIDLO

EXTENSOR HALLUCIS BREVIS

Musculus extensor hallucis brevis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Extenze základního kloubu palce nohy

ZAČÁTEK

Dorzální plocha calcaneu.

ÚPON

Základní článek palce nohy.

INERVACE

N. peroneus profundus (L5–S1).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Na nártu, mediálně vedle extensor digitorum brevis.

PŘENESENÁ BOLEST

- Nárt nad kořenem palce nohy

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na zádech
- Plošná palpace na nártu

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest nártu nad palcem nohy

KLINICKÝ TIP Často bývá postižen společně s extensor digitorum brevis.

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.

FLEXOR HALLUCIS BREVIS

Musculus flexor hallucis brevis

PŘENESENÁ BOLEST A SPOUŠŤOVÝ BOD

○ Spoušťový bod (X) ● Hlavní zóna bolesti ● Rozšířená zóna

FUNKCE

- Flexe základního kloubu palce nohy
- Udržení vnitřní klenby

ZAČÁTEK

Os cuboideum a os cuneiforme laterale.

ÚPON

Základní článek palce nohy (přes sezamské kůstky).

INERVACE

N. plantaris medialis (S1–S2).

SPOUŠŤOVÝ BOD

Na vnitřní straně chodidla pod I. nártní kostí.

PŘENESENÁ BOLEST

- Hlavička I. nártní kosti
- Palec nohy

PALPACE SPOUŠŤOVÉHO BODU

- Vleže na břiše
- Palpujte pod I. nártní kostí

PŘIDRUŽENÉ PŘÍZNAKY

- Bolest při odrazu

KLINICKÝ TIP Odlište od zánětu sezamských kůstek (sesamoiditis).

Vzdělávací referenční materiál. Nenahrazuje lékařskou diagnózu ani osobní vyšetření kvalifikovaným terapeutem.